

682 - منتخب دوا  
مجلد پہلے اردو ترجمہ

# انتخاب دوا

Dr. BISHAMBER DAS

**SELECT  
YOUR  
REMEDY**

مجلد پہلے  
شیخ محمد بشیر اینڈ سنز  
اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڈاکٹر داس بشمبہر  
کی کتاب

# سلیکٹڈ یور ریمیڈی

کا مکمل اردو ترجمہ

## انتخاب دواء



# انتخاب دواء

SELECT YOUR REMEDY

ڈاکٹر داس بھمبر

ترجم

حبیب اللہ صدیقی

باہتمام

مکتبہ دانیال، لاہور

سیل پوائنٹ: شیخ محمد بشیر اینڈ سنز

اردو بازار، لاہور۔ فون: 7660736

# فہرست

باب	تفصیل امراض	صفحہ
1	دماغی امراض	1
2	اعصابی نظام کی بیماریاں	73
3	آنکھیں اور نظر سے متعلق بیماریاں	130
4	کان اور سننے کی بیماریاں	161
5	ناک اور گلے کی بیماریاں	169
6	'مسوڑھے'، 'دانت'، 'منہ' اور 'زبان' کی بیماریاں	204
7	'چھاتی'، 'پھیپھڑوں' کی بیماری اور کھانسی	234
8	دل اور خون کی نالیوں کی بیماریاں	268
9	نظام اضمہضام کی بیماریاں اور ہیٹ	288
10	پیشاب کے نظام کی بیماریاں - عام پیشاب، 'مثانہ'، 'گردے'	362
11	آلات تناسل کی بیماریاں - عام بیماریاں، 'سوزاک'	394
12	'ہڈیوں'، 'جوڑوں' اور 'پٹھوں' کی بیماریاں	478
13	جلد، 'بالوں' اور 'ناخنوں' کی بیماریاں	503
14	عام بخار... مہیات	545
15	متفرق... بیشی مرض، 'کئی مرض'	565

عنوانات کی مکمل فہرست صفحہ 663 پر دیکھیں

## دیباچہ

رائے بہادر بشبر داس نے اس کتاب میں اپنے پینتیس (35) سالہ دور طبابت میں حاصل کردہ تمام علم و تجربہ کا نیچوڑ پیش کر دیا ہے۔ ہومیو پیتھی کو وہ دیکھی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ خیال کرتے تھے اور اس طریقہ علاج کو اولاً آسان اور سستا سمجھتے تھے جسے بعد میں انہوں نے انسانی پیچیدہ اور دقت طلب پایا لیکن اپنی سچی لگن اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے انہیں اس میدان میں بہت عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔

ہومیو پیتھی کے معالجین کو ایک بڑی مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب وہ دواؤں کی طاقتوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے مبتدیوں کے پاس سوائے اپنے تجربہ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ رائے بہادر کا کہنا ہے کہ طاقتوں کے تعین کا انحصار زیادہ تر مریض کی جسمانی ساخت، اعصابی مزاج، اس کی عادات اور ماحول پر ہوتا ہے۔ نامیاتی ادویات کی چھوٹی طاقتوں کی خوراکیں بہترین کارکردگی کی حامل ہوتی ہیں اور یقینی طور پر شاندار نتائج ظاہر کرتی ہیں، ایسی ادویات کو چھوٹے وقفوں کے ساتھ دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ساختیاتی وجوہات کے باعث نامیاتی مادوں میں زیادتی والے مریضوں کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اونچے درجہ کی طاقتوں والی ادویات کے ذریعے سب سے پہلے ساختیاتی امراض کا علاج ادویات کو بلا تواتر دہرائے سے نہ کر لیا جائے۔ اصولاً ادویات 30th ڈائی لیوٹن میں استعمال کرنی چاہئیں۔ اس سے اگلی اونچے درجے کی ڈائی لیوٹن 200 طاقت کی ہونی چاہئے اور اسے صرف اسی صورت میں دیا جانا چاہئے جبکہ پہلی طاقت کے ڈائی لیوٹن کے ذریعے مرض میں افادہ رک جائے یا اچھی نشاندہی کی گئی ادویات مرض کا علاج کرنے میں ناکام ثابت ہو گئی ہوں۔ اونچی طاقت کی ادویات ہفتہ سے کم وقفہ میں تواتر کے ساتھ نہیں دہرائی جانی چاہئیں۔ ڈائی لیوٹن عموماً '6' '30' '200' '1000' '1M' اور CM طاقتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ 30 تک کے ڈائی لیوٹن نچلے درجہ میں شمار ہوتے ہیں جبکہ 30 سے اوپر کے تمام ڈائی لیوٹن اونچے درجے کے کہلاتے ہیں۔

ادویات کو دہرانے کے لئے وقفوں کا دورانیہ متعین کرنا بھی برابر کا مشکل کام ہے۔ پھوٹی طاقتوں کے ذائقے یوشن ہر 2 گھنٹوں کے بعد دہرانے چاہئیں۔ لیکن حاد کیسوں میں تیزی کے ساتھ افادہ حاصل کرنے کے لئے ہر 15 منٹ کے بعد بھی دہرائے جاسکتے ہیں۔ ادویات استعمال کرانے کا ذریعہ سٹوف گولیاں اور نکلیاں وغیرہ کے بجائے پانی کو ہٹانا چاہئے۔ رائے بہادر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے 35 سالہ دور طبابت میں ہمیشہ ادویات کے استعمال کا ذریعہ پانی کو ہٹایا ہے جس سے ہمیشہ بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ نیز ڈاکٹر ہنی مین جو اس طریقہ علاج کے موجود ہیں، وہ بھی اپنی ایک کتاب ”ادویات کا دستور العمل“ کے پیرا 246 اور 271 میں بڑی سختی سے تاکید کرتے ہیں کہ تمام ہومیو پیتھک ادویات پانی ہی میں دینی چاہئیں اور دیگر ذرائع مثلاً گولیاں، سٹوف وغیرہ کو استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ہشبر داس اپنے پڑھنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمام ہومیو ادویات ہمیشہ پانی میں حل کر کے دینی چاہئیں۔

ادویات کی تیاری بھی ایک اہم کام ہے جس سے ایک معالج کو بخوبی آگاہ ہونا چاہئے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ہشبر داس رقمطراز ہیں کہ سب سے پہلے تو مدر ٹنگر تیار کیا جاتا ہے جسے مفرد دوا کی تخلیص سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر اس ٹنگر سے آگے ادویات تیار کی جاتی ہیں:

### (الف) سوویں حصہ والی ترتیب

ٹنگر کا ایک قطرہ اور الکحل کے 99 قطرے مل کر پہلی طاقت بناتے ہیں۔ پہلی طاقت کا ایک قطرہ اور الکحل کے 99 قطرے ملنے سے دوسری طاقت تیار ہوتی ہے۔ اسی طرز پر عمل کرنے سے اونچی طاقتیں تیار ہوتی چلی جاتی ہیں۔

### (ب) اعمشاری (دسویں حصہ والی) ترتیب


مدر ٹنگر کا ایک قطرہ اور مقطر پانی کے 9 قطرے مل کر 1x طاقت بناتے ہیں۔ 1x طاقت کا ایک قطرہ اور الکحل کے 9 قطرے مل کر 2x طاقت بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اوپر والے درجوں کی طاقتیں، پچھلی طاقت کے ایک قطرے اور الکحل کے 9 قطرے ملانے سے بنتی چلی جاتی ہیں۔ ”سوویں حصہ والی ترتیب (الف)“ کی ادویات 1، 2، 3، 30 یا 200 وغیرہ کمالاتی ہیں جبکہ ”اعمشاری ترتیب ب“ کی ادویات 1x، 2x، 3x وغیرہ کمالاتی ہیں۔

رائے بہادر ہشبر داس نے اپنے دیباچہ کے آخر میں مستورات کے امراض سے متعلق

چند مخصوص نکات کا تذکرہ کیا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مستورات کے قریب قریب تمام امراض ان کی جنس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لئے مستورات کا علاج کرتے ہوئے ایک معالج کو چاہئے کہ جب وہ مستورات سے علامات اکٹھی کرے تو ایسے وقت میں سوالات کرتے ہوئے قطعی طور پر شربانے سے احتراز کرے اور کسی نہ کسی طرح سے متعلقہ موضوع کی علامات ان سے ضرور حاصل کر لے۔

دیباچہ کے تمام اہم نکات اختصار کے ساتھ درج کر دیئے ہیں۔ اب کتاب کے ترجمہ کے متعلق عرض کر دوں یہ ترجمہ عام قاری کی استعداد کو سامنے رکھ کر آسان ترین الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے معالجین حضرات کے علاوہ ایک عام قاری بھی کتاب سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے گا پھر بھی اگر ضرورت محسوس کریں تو دوا کے انتخاب میں کسی ماہر ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کے آخر میں علامات جو کتاب میں سرخیوں کی صورت میں موجود ہیں ریچ ٹریوں کے طرز پر حروف چھٹی کی ترتیب سے درج کر دی گئی ہیں۔ ایک پریکٹیشنر کے لئے دوا کے انتخاب میں یہ فہرست علامات انتہائی مفید و معاون ثابت ہوگی۔ اپنی آراء سے پبلشر کو ضرور آگاہ فرمائیے۔

مترجم



# اہم

## طاقت کا انتخاب

اس کتاب میں دی گئی تمام ادویات 'ایک عام اصول کے مطابق' 30 ویں طاقت میں استعمال کی جائیں۔ یا پھر جن ادویات کے ساتھ طاقتیں لکھی گئی ہیں انہیں دی گئی ترتیب کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر کسی موقع پر 30 ویں طاقت کی دوا موجود نہ ہو تو چھٹی (6th) یا تیسری (3rd) یا 30 ویں سے کم کوئی سی بھی طاقت کی دوا استعمال کر لی جائے۔ طاقت میں کمی بیشی 'مریض کی جسمانی ساخت کے مطابق' کی جائے گی۔ جب دوا کا مطلوبہ اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو یا افادہ بہت سستی کے ساتھ ہو رہا ہو یا رک گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی ادویات کی طاقتیں کم و بیش کی جاسکتی ہیں۔



# دماغی امراض (Mental Diseases)

## غیر حاضر دماغی

(Absent Mindedness)

(نیز دیکھئے ”بھول جانا“ اور ”سوچنا“)

نکس موسکاتا (Nux Moschata): جب نیند سے بے دار ہو تو اسے کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے اور بات کا کیا جواب دے؟ جیسے نشہ سے مدہوش ہو۔  
لیک ٹینیم (Lac Ganinum): خریداری کے بعد خریدی ہوئی چیزیں وہیں چھوڑ جائے خط کو ڈاک میں ڈالنے جائے لیکن خط ہاتھ میں پکڑے ہوئے واپس آجائے۔  
بووشتا (Bovista): پتی اچھلنے میں غیر حاضر دماغی۔ سفیدی مائل یا گلابی مائل اہمار، خارش اور جلن کے ساتھ۔  
اگنس کاسٹس (Agnus Castus): جنسی بے اعتدالیوں یا جلق کے بعد پڑھنے میں اور خیالات کے تسلسل کو جاری رکھنے میں مشکل پیش آئے۔  
ایٹھوزا (Aethusa): سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت۔  
سچرس کنٹورٹریا (Cenchrus Contortia): غیر حاضر دماغی۔ خیالات میں گم رہنے والا۔ بجائے اپنی کار کے کسی دوسرے کی کار لے جائے۔

## دشنام طرازی — (Abusiveness)

(نیز دیکھئے ”غصہ“)

اناکارڈیم (Anacardium): گلی گلوچ کرنے اور قسمیں کھانے کی رغبت۔ یادداشت کا کھو جانا۔  
ہائوسائیمس 200، لائی سین 200 (Hyoscyamus 200, Lyssin 200): بغیر کسی

ناگواری (اشتعال وغیرہ) کے گالیاں دینے کی رغبت۔ اگر پہلی دوا کارگر ثابت نہ ہو تب دوسری دوا آزمائیں۔ دونوں دوائیں ہفتہ میں صرف ایک بار ہی دی جائیں۔  
 کالی آئیوڈینم (Kali Iod): دشنام ملراز (گالیاں دینے والا)۔ اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے بچوں کے ساتھ سختی اور بد مزاجی سے پیش آئے۔  
 لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): مشکل ہی سے منذب الفاظ استعمال کر سکے۔ نری سے بلانے پر بھی کات کھانے کو دوڑے، چڑچڑی (سند مزاج)۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے سے قاصر رہیں۔ مذہبی خیالات کا جنون یا مذہبی مانگولیا۔ اسے خوش کرنا ممکن نہ ہو۔

### الکحلی۔ الفولیٹ (Alcoholism)

(نیز دیکھئے ”خواہش“)

ریجن کولس بلبوسس (Ranunculus Bulbosus): شرابیوں کا جنون۔  
 کافیا (Coffea): شراب نوشی کے باعث درد سر، جیسے کہ سر میں کیل ٹھونگے جا رہے ہوں۔  
 کھلی ہوا میں زیادتی ہو۔ بے خوابی، بے اختیاری کی نسی اور زندہ دلی۔  
 انٹیم کروڈم (Antim Crud): شراب نوشی کے بعد دیر تک مٹتی ہو۔  
 کیپسکیم (Capsicum): تے صبح کے وقت۔ معدہ کی مٹلی۔ خوف زدہ کر دینے والے خواب اور ہڈیاں۔

زنگم (Zincum): درد سر جو تھوڑی مقدار میں شراب پینے سے ہو۔  
 کینٹھارس (Cantharis): پیشاب کی تکلیفات اور جنسی اکساہٹ کے باعث مریض کانٹنے کی کوشش کرے۔

اسارم یوروپیم (Asarum Europeum): شراب نوشی کی زبردست خواہش۔  
 ایوینا سیٹوا (Avena Sativa): اعصابیت اور بے خوابی۔ شراب نوشی کی خواہش کو دور کرتی ہے۔

سی سی فوگا (Cimicifuga): ذہنی دباؤ اور ہلکے ہڈیاں کے ساتھ بے خوابی۔  
 نلکس وامیکا (Nux Vomica): انگوری شراب یا دسی شراب پینے کے باعث اعصابیت۔  
 معمولی شور سے ڈرے اور رات کو ڈراؤنے خواب دیکھ کر ہڑٹا کر جاگ جائے۔ یہ دوا شراب کے برے اثرات کو زائل کرتی ہے۔ جیسے کہ تبخیر معدہ، سر چکراتا، بے چینی وغیرہ۔ اس کی علامات میں رشک اور حسد کار، تھان بھی شامل ہے نیز مریض خود کو گولی مار کر یا چھرا گونپ کر ہلاک کرنا چاہے۔

اپو سائی نم کینابیس (Apocynum Can): حاد (بے تحاشہ 'شدید) شراب نوشی کے لئے۔  
ہایوسکیمس (Hyoscyamus): مستقل ہڈیان 'باتونی پن اور بے خوابی کے ساتھ 'یکے بعد  
دیکرے کسل کھلا کر ہٹے اور روئے۔

کنابیس انڈیکا (Cannabis Ind): شراب نوشی کے باعث تشدد اور باتونی پن۔ مبالغہ آمیز  
موضوعات 'وقت 'خلا وغیرہ سے متعلق توہمات اور قریب ہائے نظر۔ چہرے پر 'تتمہات' آنکھوں  
کی پتلیاں پھیلی ہوئیں 'پچیتہ جلد جلد آئے۔

اوپیم (Opium): پرانے پانی قسم کے لوگوں میں بڑھتے ہوئے ہڈیانی دورے 'چہرے سے خوف  
اور دہشت کا اظہار۔ سانس میں 'تکلیف' جانوروں اور بھوتوں کے خواب 'پریشان کن نیند کے  
ساتھ۔ چہرہ کا رنگ گہرا سرخ 'برانڈی پینے والوں کے لئے 'ان لوگوں کے لئے جنہیں ہلکی  
شراب پینے سے بھی نشہ ہو جائے۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): مزمن شراب نوشی کے لئے یہ دوا بلند ترین ہے۔  
خوراک کی تھوڑی سی مقدار بھی برداشت نہ ہو سکے۔ شراب اور دھسکی ملائے بغیر پانی بھی نہ پی  
سکے۔ شراب (برانڈی) کا طلب گار رہے۔ مریض کا رنگ پیلا ہو 'جلد پر جھریاں اور بدن ٹھنڈا  
ہو۔

سٹرامونیم (Stramonium): عادی شرابیوں کے لئے موزوں۔ ہر کوئے سے جانوروں کو  
اپنے اوپر جھپٹتے دیکھے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ چہرہ چمکیلا سرخ۔ توہمات اور قریب  
ہائے نظر دہشت اور خوف پیدا کریں۔

کونیم (Conium): انتہائی کم مقدار میں دہسی شراب یا انگوری شراب پانی میں ملا کر پینے سے  
بھی نشہ ہو جائے۔

کوکا (Coca): نشہ آور شراب پینے کی خواہش۔

سفیلیلیم (Syphillium): کسی بھی قسم کی شراب کی طلب۔ شراب نوشی کا وراثتی رجحان۔

ایومینا (Alumina): انتہائی ہلکی شراب پینے سے بھی آسانی کے ساتھ نشہ ہو جائے۔  
لیکسیس (Lachesis): بد نظرت لوگ 'پر تشدد جرائم کا رجحان رکھنے والے 'منعم المزاج'  
حاسد 'دوسروں کے ساتھ خار رکھنے والے 'خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو قتل کرنے کے رئیس۔

شراب نوشی سے پہلے اور شراب نوشی کے دوران زبان چلتی رہے۔ (بہت باتیں کرے۔)

پترولیئم (Petroleum): شرابیوں میں نااطاقی اور بے حوصلگی۔ شراب کے گلاس کو انکار  
کرنے کے قابل نہ ہو۔ تھوڑی سی شراب زیادہ پینے پر اٹھیاں کرنے لگے۔ شراب پینے کے بعد  
بہت باتیں کرے۔

آرسنک البم (Ars Alb): شراب کی پیاس۔ یہ دوا بھی چوٹی کی ہے اور پہلے اسی کو آزمائا جاسکے۔ اس میں تے اور اسمال کار، تھان پایا جاتا ہے۔ شرابیوں میں بازوؤں اور ٹانگوں کا کپکپانا۔ چائنا آف (China Off): شراب چھوڑنے کے خواہش مند شرابیوں میں الکو حل (شراب) کی خواہش کو دور کرتی ہے۔ دس سے تیس قطروں کی خوراک دن میں دو مرتبہ دیجئے۔  
نوٹ: اوپر درج تمام ادویات پانی میں ملا کر ہر ہفتہ 200 سے کم مقدار میں ہرگز نہ دی جائیں۔  
(یا پھر جو پوٹنسی ادویات کے ساتھ دی گئی ہے اس کے مطابق دوا استعمال کریں) یہاں تک کہ شراب نوشی کی عادت یا شراب کی طلب مکمل طور پر جاتی رہے۔

### غصہ — (Anger)

(نیز دیکھئے ”جنہلاہٹ“)

سٹیفنی سیکریا (Staphisgria): غصہ اور اس کے برے اثرات کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جذبات کے دب جانے کے باعث زبان گنگ ہو جائے۔ سر سے پاؤں تک کانپنے لگے، فینڈ اچٹ جائے۔ خود پر قابو نہ پاسکے۔ معمولی سی حرکت یا الفاظ بھی اس کے جذبات کو برہم کر دیں۔ جلد ہی غصہ میں بھر جائے لیکن اپنے غصے کا اظہار شاذ و نادر ہی کر سکے۔

کیموملا (Chamomilla): بچوں میں غصہ جس کے نتائج اسمال، کھانسی اور تشنج کی صورت میں ظاہر ہوں۔ جھگڑاؤں سے بچہ ہر وقت کسی نئی چیز کی خواہش کرے اور جب وہ چیز دی جائے تو لینے سے انکار کر دے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے آیا کے چہرہ پر مارے۔ معمولی معمولی باتوں پر برہم ہو جائے۔ ہفتہ میں ایک خوراک CM یا IM کی دیجئے۔

اورم فولی ایٹم (Aurum Foliatum): جب غصہ کا اظہار نہ کر سکے تو کانپنے لگے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ جھگڑا کھڑا کرنے کی کوشش کرے تاکہ اسے برا بھلا کہہ سکے۔

بیوفو (Bufo): اگر اسے سمجھنے میں کسی سے قلعی ہو جائے تو فوراً ناراض ہو جائے۔

کالوسٹھ (Colocynth): جذبات کے خاموشی کے ساتھ مجروح ہو جانے پر برہمی جس کے باعث سر میں، آنکھوں میں، بڑی آنت میں اور اعصاب میں شدید اعصابی درد پیدا ہو جائیں۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): جماع کے بعد غصہ۔

نکس موسکاتا (Nux Moschata): دوران حمل غصہ۔

اورم میٹ، نکس وامیکا (Aurum Met, Nux Vom): معمولی سے اختلاف (یا تروید) پر غصہ۔

آئیوڈیم 200 (Iodium 200): تشدد آمیز غصہ۔ جو بھی نزدیک آئے اسے قتل کرنا

ہا ہے۔ جب غصہ ختم ہو جائے تو خوش محسوس کرے۔  
ہیپیر سلف (Hepar Sul): جھگڑالو جس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے کسی چیز سے  
 خوش نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ حساسیت ان اشخاص یا جگہوں کے لئے جن کی موجودگی اس کے  
 لئے خلل انگیز ہو۔ اشخاص، چیزوں اور ماحول کو تبدیل کرنے کی مستقل خواہش کرتا رہے لیکن  
 یہ تبدیلیاں اسے پھر سے ناخوش اور بے چین کرتی رہیں۔  
کالی آئیوڈ (Kali Iod): انتہا درجے کا چڑچڑاہٹ۔ اپنے خاندان، بچوں اور دوسروں کے ساتھ  
 انتہائی سخت اور ظالمانہ سلوک کرے۔ کالی گلوچ کرے۔  
نیٹرم آرسینیکم (Natrum Ars): معمولی باتوں پر غصہ۔ اختلاف (تردید) سے غضب ناک ہو  
 جائے۔ ذہن کند، کھلی ہوا میں بہتر ہو، بستر میں اور رات کے وقت علامات میں شدت آجائے۔  
کروکس سیٹیوا (Crocus Sat): پر تشدد غصہ جس کے بعد پچھتاوا ہو۔

### جھنجھلاہٹ (Annoyance)

شیفنی سیکریا (Staphisagria): تھوڑے سے تھوڑے الفاظ جو غلط محسوس ہوں غصے اور  
 براہی کا باعث بن جائیں۔ معمولی سی تصوراتی جھلاہٹ کا باعث بننے والے اشخاص پر چیزیں  
 پھینکنے کی خواہش۔  
کوکولس انڈیکا (Coculus Indica): معمولی سی خلل اندازی جھلاہٹ کا سبب بن جائے۔  
آرسینیکم البم (Arsonicum Album): جھنجھلاہٹ کا باعث شور اور روشنی ہوں۔  
کونیم (Conium): معمولی اور غیر اہم معاملات جھنجھلاہٹ کا باعث بن جائیں۔  
ٹوبرکولینم 200 (Tuberculinum 200): مشکل اور بد مزاج بچہ۔ کپڑے اتار پھینکے اور  
 دوسرے بچوں کے ساتھ بلاوجہ بد تمیزی کرے۔ اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آئے۔  
 خوفناک طوفان کا سا مزاج۔ شدید غصہ کرے اور بلند آواز کے ساتھ بے قابو ہو کر روئے۔ ہر  
 ہفتہ ایک خوراک تقریباً دو ماہ تک دیجئے اور اگر ضرورت ہو تو دیر تک دہرائی جاسکتی ہے۔  
فاسفورس 200 (Phosphorus 200): وحشیانہ مزاج۔ ذہنی اور جسمانی طور پر طوفانی  
 مزاج کے غصے والا۔ سکول میں بچوں اور استادوں کے ساتھ لڑائی کرے۔ قابو میں نہ آنے والا  
 بچہ، غصے میں آکر اپنے آپ کو غسل خانہ میں بند کر لے۔ جلد خوف زدہ ہو جائے، خوف سے  
 کانپے اور کپکپائے، اندھیرے سے خوف زدہ ہو، جسم دھلا پٹلا اور رنگ دیدہ زیب۔  
ایسکولس (Aesculus): جلدی جلدی مزاج برہم ہوں لیکن آہستہ آہستہ واپس آئیں۔

تشویش — (Anxiety)

(دیکھئے۔۔ "خوف" مغالطہ)

اندیشہ — (Apprehension)

بے زاری — (Aversion)

اگنیشیا (Ignatia): تفرج سے بے زاری۔ تمباکو کے دھوئیں سے نفرت، تمباکو نوشی کو برداشت نہ کر سکے۔

سپیا (Sepia): خاندان کے افراد، کاروبار یا اپنے پیٹے اور جنس مخالف سے بیزاری، 'چڑچڑاہٹ' کیسے (الگ تھلگ رہنے والا) تھکا ہوا۔ اکیلا اندھیرے میں رہنا چاہئے۔ میز (شراب) سے نفرت پیدا کرتی ہے۔

پلائینا (Platina): اپنے خاندان کے افراد اور دوسرے لوگوں سے بے زار رہے کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بہت اعلیٰ و ارفع خیال کر کے غرور کرتی ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): عورتوں سے بے زاری، بخل سے، اور شادی سے نفرت۔

کیزیم سلف (Cadmium Sulph): ہر قسم کے جسمانی اور ذہنی کام سے بے زاری۔

اکونائٹ۔ این (Aconite N): موسیقی سے نفرت۔

کریفائٹس (Graphites): موسیقی اسے روائے، مریضہ موسیقی کی وجہ سے روئے۔

ریفے نس (Raphanus): عورتوں میں جنس مخالف سے نفرت۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): بد بھنسی کے باعث کام سے نفرت۔ اگر کام کرتی بھی ہے تو ہر کام غلط کرتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): کام سے نفرت جب کہ ساتھ میں مزمن قبض بھی ہو۔

سائی کلیمن (Cyclamen): بد بھنسی کے دوران کام سے نفرت، گوشت سے کراہت، روٹی اور مکھن سے بے زاری۔ میز (شراب) سے نفرت۔

نایٹرم میور (Natrium Mur): روٹی سے بے زاری، چکنائی اور مرغن غذاؤں سے نفرت۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vac Defl): دودھ سے، مردوں، عورتوں اور بچوں سے بیزاری۔ دودھ نہ پی سکیں کیونکہ یہ انہیں بیمار کر دیتا ہے۔ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان سے گفتگو کرنے سے بیزاری۔ دودھ پینے سے سر میں درد ہو۔

گلونائین (Glonoine): شوہر سے بے زاری۔



چیلی ڈونیم (Chelidonium): کام کرنے سے یا رات کے کھانے کے بعد حرکت کرنے سے نفرت، پیڑ سے بے زاری۔

ارجنٹم نائٹریکیم، لیکسیس (Argentum Nit, Lachesis): مائیکو لیا میں کام سے نفرت۔ اگر پہلی دوا کار آمد ثابت نہ ہو تو دوسری دوا آزمائیں۔

ایسڈ تھیور (Acid Thior): افراد خانہ سے اور عزیز ترین دوستوں سے بے زاری۔ گھر سے کہیں چلے جانا چاہیے۔ عیاش مردوں میں جنسی بے اعتدالیوں کے باعث پست ذہنی۔

کونیم (Conium): کام نہ کرنا چاہیے، کھیلنے کو ترجیح دے۔

کاجوپوٹم (Cajuputam): بلوائے جانے سے بے زار، گو دوسروں کی بات سننا پسند کرے۔ جن کتابوں کا عام طور سے مطالعہ کرتا رہا ہو ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکے۔ اپنی ہی صنف کے لوگوں کی مجلس سے بیزار۔

نیٹرم کارب (Natum Carb): ضرورت سے زیادہ مطالعہ کرنے کے باعث کام کرنے کی نااہلیت۔ دودھ سے بے زاری جسے پی لینے سے اسال لاحق ہو جائیں۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): شادی سے نفرت، اگر کبھی خیال بھی آجائے تو ناقابل برداشت ہو جائے۔

کالی بلی کرام (Kali Bich): گوشت سے نفرت، چڑچڑے پن کے ساتھ (یا صفرا کے ساتھ)۔

کوکولس (Cocculus): غذا کھانے اور پینے سے بے زاری۔

کلیکریا کارب (Calcarea Carb): بھوک بہت کم، گوشت سے نفرت اور ابلے ہوئے انڈوں کی رغبت کے ساتھ۔

ایسڈ نائٹریک، ایسڈ میور (Acid Nitric, Acid Mur): گوشت کے دیکھنے یا گوشت کے خیال کو برداشت نہ کر سکے۔ گوشت سے نفرت۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کافی اور گوشت سے بیزار، انہیں کھانے (لینے سے) نفرت کرے۔

وربرٹرم ویرائیڈ (Veratrum Viride): مٹھائیوں سے بے زاری۔ حتیٰ کہ پانی کا ذائقہ بھی مٹھا معلوم ہو۔

ابروتانم (Abrotanum): سوکھے کے بچوں میں دودھ سے بے زاری۔ ان بچوں میں دودھ میں ابلی ہوئی چیزوں سے بھوک مٹانے کی رغبت ہوتی ہے۔

الیومنا (Alumina): آلوؤں سے بیزار، جو انہیں اس نہیں آتے۔ گوشت سے بے زاری جو انہیں مزہ نہیں دیتا۔ میسر شراب سے بے زاری۔

الیمینا فاس (Alumina Phos): مجلس آرائی سے بے زاری اور سوالات کے جوابات دینے سے نفرت۔

انٹیم تارٹ (Antim Tart): دودھ سے بے زاری جو مریض کو بیمار کر دیتا ہے۔ جس کے باعث مٹلی اور قے ہو۔ ہر قسم کی غذا سے بے زاری۔

اوسیم (Osmium): کافی یا تمباکو سے بیزاری۔ ان کی بو سے کراہت۔  
پٹرولیم (Petroleum): مرغن غذا گوشت اور کھلی ہوا سے شدید بیزاری کو بھی کھانے سے زیادتی ہو۔

کیمولہ (Chamomilla): کافی، گرم مشروبات، بخنی اور مائع غذاؤں سے بیزاری۔

سلیشیا (Clieca): ماں کے دودھ سے بیزاری اگر پیئے تو قے ہو جائے۔

مگنٹ پولس آسٹریلیس (Magnet Polis Australis): محنتگو کرنے سے بے زاری۔

اپیکاک (Ipecacuanha): شدید ترین نفرت اور ناپسندیدگی ہر قسم کی غذا سے۔

کاربو ووج (Carbo Veg): قابل ہضم چیزوں اور بہترین غذا سے بے زاری۔ کافی، ترش (تیزابی) اشیاء وغیرہ کی خواہش۔

سٹرامونیم (Stramonium): مانتات سے تنفر۔ حتیٰ کہ اگر پانی کا گلاس بھی اس کے ہونٹوں کے پاس لایا جائے تو شدید دورے شروع ہو جائیں۔ سیال شے مشکل ہی سے گلے سے نیچے اتاری جاسکے۔

گرینڈیلیا (Grindelia): اندھیرے سے نفرت۔ ساری رات کمرے میں روشنی کرنا چاہے۔

ٹیرنٹولا (Tarentula H) ایٹج: موسیقی کی طرف سے حساس۔ جیسے ہی اس نے موسیقی سنی، چلاٹک لگا کر ناچنا شروع کر دے گی۔

تھیرائیڈین (Theridion): شور سے بے زاری اور ہر آواز اسے تمام جسم میں گھسکتی ہوئی محسوس ہو جس کے باعث مٹلی ہو اور چکر آئیں۔ آواز دانتوں میں گھس جائے۔ آنکھیں بند کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہو۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ہر قسم کی غذا سے بے زاری۔ گوشت سے بے زاری جسے کھانا نامکن ہو۔

### ذہنی تکان (Brain Fag)

(دیکھئے۔۔۔ "تکبراہٹ یا پریشانی" اور "اعصابی کمزوری")

### کڑھنا — (Brooding)

ایسڈ فاس (Acid Phos): کڑھنا خود اپنی حالت پر۔ محبت میں مایوس ہو کر کڑھے۔  
 اگنیشیا (Ignatia): تصوراتی طور پر پیش آنے والے تلخ واقعات اور تکالیف پہ کڑھنا۔  
 نکس وامیکا (Nux Vom): کسی ایسی عدالتی نالاش پہ کڑھنا جو ہو سکتا ہے معرض الحوائی میں  
 چلی جائے۔  
 لیلیم ٹیگ (Lilium Tig): بے ہمت، امدی (ست) لیکن نچلا بیٹھنا نہ چاہے۔ ماضی سے متعلق  
 سوچے اور کڑھے۔

ورنٹرم البم (Veratrum Alb): خاموشی میں کڑھنا۔  
 جلیسیم (Gelsimium): بچے کے کھو جانے پر مسلسل کڑھنا۔

### دھوکہ دہی — (Cheating)

(دیکھئے۔۔۔ "فریب یا دغا بازی")

### روشن ضمیری — (Clairvoyance)

(غیر موجود چیزوں اور حالات کے متعلق پیشین گوئی کرنا)

آئیوڈم (Iodum): اس وقت یہ دوا چوٹی کی ہوتی ہے جب مریض دیوانگی کے قریب پہنچ  
 جائے۔  
 لائی سین (Lyssin): مریض ایسی گھڑی یا کلاک کی سوئیوں کو دیکھے جو اس کے سامنے نہیں  
 ہے۔ مریض کہے کہ وہ جانتا ہے کہ فلاں آدمی جو اس منظر میں نہیں ہے کہاں بیٹھا ہے۔  
 اکنائٹ۔ این (Aconite N): مریض کہے کہ اس کی محبوبہ جو کہ میلوں دور ہے فلاں گاتا  
 رہی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): انتہائی پست حوصلگی اور خوف۔ جلد ہی تشویش میں مبتلا ہو  
 جائے، غیر موجود چیزوں اور حالات کے متعلق باتیں کرنے کی حالت۔  
 اگریکس ایم (Agaricus M): شعر کہنے اور پیشین گوئیاں کرنے کی رغبت۔

### رفاقت یا صحبت — (Company)

(تفرا)

کالو سنٹس (Colocynthis): دوستوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔

کیک ٹس (Cactus): ہسٹریا میں صحبت (Company) سے نفرت۔  
 کوئیم (Conium): دوران حیض۔ رفاقت سے بے ڈاری لیکن اکیلے پن سے دہشت  
 کھائے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): دوران حمل رفاقت سے نفرت۔  
 بوفو (Bufo): جلق کا ارمان نکالنے کے لئے رفاقت سے متنفر ہو۔  
 اگنیشیا (Ignatia): اعصابی مریضوں میں رفاقت یا صحبت سے نفرت۔  
 کاجوپٹم (Cajuputum): عورتوں کی رفاقت (بھلس آرائی) میں بہتر محسوس کرے گو فطرتاً  
 شرمیلا ہو۔

پلساٹیللا (Pulsatilla): مریضہ صنف مخالف کی رفاقت سے نفرت کرے کیونکہ وہ سمجھتی ہے  
 کہ کوئی خطرناک بات ظہور پذیر ہو جائے گی۔  
 لائیگوپوڈیم (Lycopodium): رفاقت سے متنفر ہو لیکن چاہے کہ کوئی شخص ساتھ والے  
 کمرے میں اس کے قریب رہے۔

### رفاقت کی تمنا (Desire for)

اورم (Aurum): دل کے امراض میں رفاقت کی خواہش کرے۔  
 کوئیم (Conium): ہسٹریا میں رفاقت کی خواہش۔  
 سٹرامونیم (Stramonium): دیوانگی کی حالت میں رفاقت کی تمنا کرے۔ روشنی کی خواہش۔  
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): اپنی بیوی یا بچے کو رفاقت کی خاطر چگا دے، اکیلا رہنے  
 سے ڈرے۔  
 آرسنک البم (Arsenic Alb): رفاقت کی تمنا کرے کیونکہ اس سے اس کے خوف میں کمی  
 ہو۔

### ارتکاز توجہ (Concentration)

(دیکھئے۔۔۔ ”سوچنا“ اور ”بھول جانا“)

### اعتماد کا فقدان

### (Confidence Loss Of)

اناکارڈیم (Anacardium): خود اعتمادی کا فقدان۔ دیوانگی، اعتماد میں فقدان کے باعث۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): ہسٹریا میں اعتماد کھو جائے، معالج اور علاج پر اعتماد نہ رہے۔  
 اورم مٹلیکیم (Aurum Metallicum): مریضہ خیال کرے کہ معالجین کے پاس اس کے لئے کوئی دوا نہیں ہے۔ یہی سوچ سوچ کر پریشانی ہو۔

## پریشانی — (Confusion "Brain-Fag")

ذہنی تھکاوٹ

سلفر (Sulphur): صبح کے وقت جاگنے پر پریشانی۔  
 ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip): ذہنی پریشانی کے ساتھ بیدار ہو، پریشانی کے ساتھ کمرے میں چاروں طرف دیکھے، الجھن کا شکار ہو، لوگوں کو نہ جانتا ہو، حیران ہو کہ وہ کہاں ہے اور جو چیزیں اسے نظر آ رہی ہیں ان کے معانی کیا ہیں۔ عظیم اداسی، تنگ مزاجی، یادداشت کا جاتے رہنا اور کام سے بے زاری۔ جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہے ان کے نہ ملنے پر اداس ہو جائے۔

زنکم (Zincum): اعصابی امراض، سرخ بخار اور کرم موسم کی تکلیفات سے دماغ پر اثرات مرتب ہوں۔

بیلادونا (Belladonna): ہریان کے بعد ذہنی پریشانی۔

لیکسیس (Lachesis): ڈنھیریا میں ذہنی پریشانی۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): کھانے کے بعد ذہنی پریشانی۔ فکر مندی اور ذہنی دباؤ کے باعث ذہنی پریشانی، بہت کم جسمانی مشقت کے ساتھ۔

کالی بروم (Kali Borm): ذہنی پریشانی، لالچو لیا میں کام کی زیادتی اور سنسنی خیزی کے باعث جس میں حواس گم ہو جائیں۔

جلیسی میم (Gelsemium): جلق کرنے والوں میں ذہنی پریشانی۔

سٹرامونیم (Stramonium): آدمی رات کے بعد جاگ جائے اور ادھر ادھر پریشانی میں پھرتا رہے۔ ذہنی پریشانی، چکروں کے ساتھ۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): ذہنی تھکان اور چاند (گدی) میں درد سر نیز گردن کے پھپھلے حصہ میں درد۔ ادیبوں اور اساتذہ کی ذہنی تھکان، قوت ارادی میں کمی، بات چیت کرنے، سوچنے یا کسی بھی ذہنی مشقت سے بے زاری۔ مریض کے اندر سے چیزوں میں دلچسپی جاتی رہے۔ کسی بھی قسم کی ذہنی مشقت سے بچنا اپنا پیدا ہو۔

پتھرولیم (Petroleum): ذہنی پریشانی اور دوران سر (چکر)۔ ایسا بد حواس ہو کہ گلی میں اپنا

راستہ ہی کھودے۔ مریضہ تصور کرے کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے قریب موجود ہیں جب کہ وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ یوں تصور کرے کہ اس کے بازو اور ٹانگیں دو دو کی بجائے چار چار ہیں۔ تصور کرے کہ اس کے بستر میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ خواب میں خود کو دو یا دو سے زیادہ دیکھے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ذہنی پریشانی اور سوچنے کی نااہلیت۔ ڈرے کہ وہ غیر ضروری شخصیت ہے۔ ناکام ہو جانے کا خوف۔ اندرونی تکاؤ۔ عزت نفس کے مجروح ہو جانے پر غمزدہ ہو۔

کوکا (Coca): ذہنی اور جسمانی تکاؤ کے باعث دہلایا۔

اسٹیم سیپا (Allium Capa): شراب نوشی کے بعد ذہنی پریشانی۔

الیومینا (Alumina): عقل مندی کی پریشانی، کسی فیصلے پر اثر انداز ہونے کے قابل نہ ہو۔ عقل (بصیرت) میں خلل پڑ جائے۔ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے یا جنہیں سب جانتے ہیں کہ وہ حقیقی ہیں، وہ چیزیں اسے غیر حقیقی محسوس ہوں اور وہ ان کے متعلق شک میں مبتلا ہو جائے کہ آیا وہ اسی طرح سے ہیں یا نہیں۔

امبر اگریسیا (Ambra Grisea): ذہنی پریشانی، ایک مضمون سے دوسرے کی طرف چلا جائے۔ ایک سوال پوچھے اور جواب کا انتظار کئے بغیر دوسرا سوال داغ دے۔ ایک موضوع سے کسی دوسرے موضوع کی طرف چھلانگ لگا دے۔ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جانا۔

ہائیڈرو سائیٹک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): ایسا محسوس ہو جیسے دماغ پر بادل تیر رہے ہیں۔

سینٹورا ٹیگٹا (Centaurea Tagana): ذہنی پریشانی اور حماقت۔ کسی ایک چیز پر کبھی بھی توجہ مرکوز نہ کر سکے۔ کوئی ایک کام شروع کرے اور پھر اسے اودھورا چھوڑ کر دوسرے کو شروع کر دے اور اسی ڈگر پر چلتا رہے۔ ست ہو اور ارتکاز توجہ کے قابل نہ ہو۔ مریضہ کی یادداشت جاتی رہے، تشویش میں مبتلا رہے اور محسوس کرے کہ وہ اچانک سر جائے گی۔ بدگمان، خیال کرے کہ اس کا شوہر اسے پاگل خانے میں داخل کرانے ہی والا ہے۔ فلفل بس یا ریل پکڑ لے یہ جانے بغیر کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب کبھی صحیح رخ کی سواری پر سوار ہو جائے تو مطلوبہ جگہ سے اترے بغیر گزر جائے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ذہنی پریشانی، کسی بات کے لئے بھی مناسب الفاظ نہ مل سکیں۔

ایٹمک ایسڈ (Acetic Acid): ذہنی پریشانی، اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتی، قریب کے واقعات کو بھی بھول جائے۔ ذہنی کوفت کے دورے، چڑچڑاپن، خیال کرے کہ کچھ ہونے والا



اگیریکس ایم (Agaricus M): بیوقوفانہ اور حماقتانہ باتیں کرے۔ بے موقع گائے اور سیٹیاں بجائے، شعر کے اور پیشین گوئیاں کرے۔ یا کسی دوسری متضاد حالت میں غرق ہو جائے، اپنے ماحول سے الگ تھلگ رہے۔ خود پسندی، ضدی اور متکبر بن جائے، غبی، بھونڈا اور بھدا۔

اناکارڈیم (Anacardium): ذہنی طور پر کمزور ہو اگرچہ مکمل طور پر فائز العقل نہ ہو۔ ست قسم (انجنے میں بہت دیر لگائے)۔ یادداشت کمزور، بھٹکتا، افسردگی اور (دماغی) ذہنی سستی، غیر مستقل مزاجی، کوئی فیصلہ نہ کر سکے خواہ اچھا ہو یا برا۔ وہ ہچکچاتا ہی رہے اور اکثر کچھ بھی نہ کر سکے۔

کینابیس سائوا (Cannabis Sat): اپنی ذات کی پہچان سے متعلق ذہنی پریشانی، سرکا چکرانا، ذہنی پریشانی کے ساتھ۔

سیکیوٹا ویر (Cicuta vir): دیکھنے کی حس، سونگھنے کی حس اور دیگر تمام حسیں خلل انداز ہوں اور ذہنی پریشانی میں مبتلا کریں۔ اس کا گھر، شناسا چہرے اور جگہیں، پ، کھائی دیں۔ سیلیسا (Silicea): طویل محنتوں اور کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی خاطر راتوں کو جاگنے کے باعث طلباء، وکلا اور پادریوں میں ذہنی تھکان۔

### دلجوئی یا دلاسا (Consolation)

نیرم میورٹیکم (Natrum Muriaticum): اداسی اور رونے کی کیفیت میں دلجوئی سے زیادتی ہو۔

لیلیئم ٹیگرینم (Lilium Tigrinum): رحم سے متعلق ذہنی شکلیات میں دلجوئی سے اضافہ ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب مریض دل جوئی سے بہتری محسوس کرے۔

اگنیٹیا (Ignatia): ہسٹریا کے مریضوں میں دلجوئی سے علامات میں زیادتی ہو۔

سپییا (Sepia): جن مریضوں میں قبض، لیکوریا کے ساتھ مشروط ہوتی ہے ان میں دل جوئی کرنے سے علامات میں زیادتی ہو۔

کافیا (Coffea): دل جوئی کرانا نہ چاہے۔ تھا اپنی بے چارگی سے لطف اندوز ہونا چاہے۔ خوش ہونے یا اپنے خوش کئے جانے کی کسی بھی کوشش پر برا مان جائے۔

سبیل سر (Sabal Ser): ہمدردی اسے ناراض کر دے۔

### تضاد یا تردید (Contradiction)

اورم میٹ (Aurum Met): تردید کے نتیجے میں امراض لاحق ہو جائیں۔  
 لائیو پوڈیم (Lycopodium): تردید کو برداشت نہ کر سکے۔  
 کافیا (Coffea): تضاد کے باعث درد سر ہو جائے۔  
 فیرم میٹلیکیم (Ferrum Metallicum): تردید گوارا نہ ہو، جھگڑالو۔

### طلب — (Craving)

(دیکھئے --- ”خواہش“)

### موت — (Death)

(یعنی موت --- Conviction Of)

ہیشیا (Baptisia): ٹائی فائیڈ بخار میں۔  
 لیسس (Lachesis): تنفس میں تنگی کے دوران۔  
 سورنیم (Psorinum): ٹائی فائیڈ بخار میں لیکن نکسیر پھوٹ جانے پر افادہ ہو۔  
 کامفر (Camphor): تھخیر معدہ میں۔  
 ایپس (Apis): دل کی عضوی بیماریوں میں۔  
 کافیا (Coffea): درد نہ میں۔  
 اکونائٹ این (Aconite N): دوران حمل، موت کے خوف کے ساتھ۔  
 ہیلی بوریس نیک (Helleborus Nig): مرنے کے خوف کے بغیر موت کے دن کی پیشین گوئی کرے۔

### خوف (موت کا) — (Fear Of)

اکونائٹ (Aconite N): موت کا ڈر، دوران حمل۔ مرنے کے دن اور کمزری کی پیشین گوئی کرے۔ مریض کو یقین ہو کہ اس کی بیماری انجام کار مسلک ثابت ہوگی۔  
 ڈی جی ٹیلس (Digitalis): امراض قلب میں۔  
 نکس وامیکا (Nux Vomica): خود کشی کے رجحان کے ساتھ لیکن مریض مرنے سے خوف زدہ ہو۔  
 ایومنا (Alumina): موت کا خوف، خود کشی کے خیالات کے ساتھ۔

کالی فاس (Kali Phos): زندگی کی تھکن کے ساتھ۔  
 وریٹرم ایلیم (Veratrum Album): موت کا خوف ہیضہ میں، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے ساتھ۔  
 کوکولس (Cocculus): موت کا خوف اور کسی انجانے خطرے کا ڈر۔  
 اونیئم (Opium): سر پر منڈلاتی موت کا ڈر، خوف اور دہشت کے اظہار کے ساتھ۔  
 آرسنک ایلیم (Arsenic Alb): ایسی موت کا خوف جو اچانک آجائے جب وہ اکیلا ہو۔  
 اکتیاسپائی کاتا (Actea Spicata): مرنے کا خوف، خاص طور سے رات کے وقت بستر میں۔

### خواہش (موت کی) (Longing For)

اورم فول (Aurum Fol): موت کی تمنا، اعتماد رہنے کی خوشی کے ساتھ، کیونکہ مریض سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے لئے موزوں نہیں ہے۔  
 اورم میٹ (Aurum Met): ذہنی خرابی کے باعث مستقل طور پر خود کشی کرنے کی ٹھانی رہے۔ پرلے درجے کا شدید مایوسگیا، تصور کرے کہ وہ کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر کام غلط کرے۔ ناامیدی۔۔۔ اور اسی وجہ سے زندگی سے شدید نفرت کرے۔ خیال کرے کہ وہ اس دنیا کے لئے ناموزوں ہے۔

### دھوکہ بازی — (Deceiving)

پلمبم (Plumbum): دھوکہ بازی اور فریب دہی کی طرف مائل رہے۔ ست فہم، مصنوعی بیماری، مریض اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ کے ساتھ بیان کرے۔  
 کوکا (Coca): صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی حس جاتی رہے۔ چڑچڑاہٹ، گوشہ نشینی اور گمنامی سے خوش ہو۔  
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ڈر پوک اور گھبرا جانے والا، غش کھا جانے والا اور بیجان میں پکپکپائے، دھوکہ بازی کا راجان۔  
 کاسٹیکم (Causticum): دھوکہ دینے کی خواہش، لڑائی جھگڑے کے میلان کے ساتھ، بلاوجہ شور مچانے والا۔

## مغالطے یا وسوسے (Delusion)

(فریب نظر، اوراک، وہم اور اندیشہ)

(Hallucination, Perception, Illusion & Apprehension)

سٹرامونیم (Stramonium): جانوروں کے 'کالے کتوں وغیرہ کے خواب (ان علامات پر اس دوا سے نمونیہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے) 'خود کو دو خیال کرے' خیال کرے کہ وہ لمبا ہے اور ایک حصہ کہیں کھو گیا ہے۔ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو چھوٹا خیال کرے۔ تھائی اور تاریکی کو برداشت نہ کر سکے۔ روشنی اور رفاقت لازم ہو 'بھوتوں کو دیکھے' آوازیں سنے اور روحوں سے بات کرے۔ مریض محسوس کرے کہ کھٹکوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ اس کے تعاقب میں ہے اور ان کے پیچھے بھونروں کا ایک جلوس ہے اور پھر کاروچوں کا ایک لشکر کا لشکر اس کے اوپر رہنکتا چلا آ رہا ہے۔ مریض اپنے سامنے کی بجائے اپنی ایک طرف ہولناک شبیہیں دیکھے۔ عشقیہ گیت گائے اور فحش باتیں کرے۔ فریب نظر اور ہذیان میں مبتلا ہو 'چہرا کھونٹے اور کانٹے کی کوشش کرے' چیزوں کو غلط ناموں سے پکارے 'اپنے ہونوں کو شہتیر اور اپنے کمرے کو اصطبل کہے۔ خدا سے باتیں کرے' وعظ بیان کرے اور پیشین گوئیاں کرے۔

لیکٹا وائرڈسا (Lactuca Virosa): محسوس کرے جیسے ہوا میں تیر رہا ہے یا زمین سے بلند ہو کر چل رہا ہے۔

کلورلیم (Chloralium): رات دہشت ناک ہو 'پادریوں کے خواب دیکھے' جب اندھیرے میں ہو یا جب آنکھیں بند کرے تو آوازیں سنے۔

لیک لیکنیم (Lac Gan): سانپوں کے توہمت 'تصور کرے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہی سانپ ہیں۔ اس ذرے کہ کہیں کوئی سانپ اسے کاٹ نہ لے آنکھیں بند کرنے سے بھی خوف زدہ ہو۔ محسوس کرے کہ ہوا میں چل رہا ہے۔ اذیت ناک سوچیں۔ محسوس کرے کہ چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے 'خیال کرے کہ وہ جو بات بھی کہتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خیال کرے کہ یہ 'وہ خود نہیں ہے۔ اس کی جائیداد اس کی اپنی نہیں ہے' جو ناک اس کے چہرے پر ہے کسی اور کی ہے۔

سباڈیلا (Sabadilla): غلط فہمیاں (غلط اندازے لگائے) 'جیسے اپنے جسم کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو' مثلاً اپنے آپ کو حاملہ خیال کرے حالانکہ پیٹ محض ہوا سے پھولا ہو۔

پلاٹینم (Platinum): غرور یا اپنے متعلق خوش فہمی۔ مریض خیال کرے کہ وہ دوسروں سے ارفع ہے 'خیال کرے کہ اس کا جسم دوسروں سے لمبا ہے' منگیبردن پر از نخوت۔

کیمفر (Camphor): ہر متحرک چیز اسے بھوت محسوس ہو اور کمرے میں موجود بے جان

چیزیں زندہ ہو کر اسے ڈرائیں۔

**گلیکیریا کارب (Calcarea Carb):** ایسے اشخاص کو دیکھئے اور ان سے گفتگو کرے جو موجود نہ ہوں۔ مریض تصور کرے جیسے کہ وہ کتوں میں گھری ہوئی ہے، ہر کام سے بے زاری۔ وہ اداس اور غم زدہ رہے، پر از خوف اور زندگی سے آکٹائی ہوئی۔

**ایل تھنس (Ailanthus):** یوں محسوس کرے جیسے کوئی چوہا یا ایسی ہی کوئی چھوٹی چیز اس کی ٹانگ پر اور بدن پر رینگ رہی ہے۔

**ایناکارڈیم (Anacardium):** مریض خود کو اچھی اور بری خواہش کے درمیان پاتا ہے۔ اس کی بیرونی خواہش اسے کسی برے کام کے لئے آکٹاتی ہے جبکہ اس کی اندرونی خواہش اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ **مذبذب**، ایک لمحہ کو سوچے کہ یہ ایسا ہے لیکن اگلے ہی لمحہ کافی وجوہات اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کم حوصلہ، تھیز دلا، خوف میں مبتلا ہو کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے، چوروں کے وہم میں ادھر ادھر دیکھئے، خوف زدہ ہو کہ دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز اور ہر شخص سے خوف زدہ ہو۔ ظالمانہ اور پر تشدد اعمال کرنے کی اس کی بری خواہش اس کا پیچھا کرتی رہے جبکہ اچھائی کی خواہش اسے روکتی رہے اور قابو میں رکھے۔ (ہائپوسائیمس، ہیلڈونا اور سٹرامونیم بھی ملاحظہ فرمائیں) اپنی بہن اور والدہ کی آوازیں سننے حالانکہ وہ وہاں سے بہت دور ہوں۔

**ہیلی بوریس نائنگ (Helleborus Nig):** جسم اور ذہن کی بدحواسی اور کالہی، ایسی مدہوشی جس سے مشکل ہی سے نکالا جاسکے اور جب وہ ہوش میں آجائے تو روجوں کے متعلق باتیں کرے یا کہے کہ وہ شیطانوں کو دیکھتا ہے جن کے سینگ اور دہیں ہیں۔ فریب نظری۔

**کاسٹیکم (Causticum):** مریض کے ضمیر پر چونٹیں لگیں جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو۔

**فیرم آیوڈ (Ferrum Iod):** محسوس کرے جیسے اس کا بدن تھیں فٹ تک لمبا ہو چکا ہے۔

**بپٹیشیا ٹی (Baptisia T):** محسوس کرے جیسے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر چکا ہے۔

**کیموملا (Chamomilla):** مریض ایسے اشخاص کی آوازیں سنے جو وہاں موجود نہ ہوں، بس کے باعث اس کی نیند خراب ہو جائے۔

**زینک میٹ (Zincum Met):** اپنے اندر سے آوازیں سنے جو گلی گلوچ کریں اور گندی زبان بولیں۔

**ہیلڈونا (Belladonna):** خوفناک چہرے اور عنقریب دیکھے۔ کانٹے اور مارے۔ مریض خود کو یا دوسروں کو اس وقت تک زخمی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ سب کچھ وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ مریض اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف کام

کرتا ہے۔

**سپاکی جیلیا (Spigelia):** اندیشہ مند اور اعصابی مریضوں کے لئے۔ کبھی استرا استعمال نہ کریں کیونکہ کوئی چیز انہیں مستقل طور پر اندر سے انکساتی رہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا گلا کاٹ ڈالیں۔ کھانے کی میز پر بھی اور آگے پیچھے بھی کھانے کے کانٹے سے خود کشی کی خواہش ہو تیز دھار اور نوکیلے آلات سے خوف زدہ رہے۔

**تھوجا (Thuja):** یہ احساس کہ جیسے زندہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اپنے جسم کو دبلا پتلا، نرم و نازک، کمزور محسوس کرے۔ محسوس کرے کہ اس کا جسم آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، جیسے شیشے سے بنا ہو۔

**کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind):** جگہ اور وقت کا غلط ادراک ہو۔ مریض محسوس کرے کہ جیسے اس نے گزشتہ چھ ماہ سے کھانا نہیں کھایا حالانکہ ابھی کھانا ختم کر کے بیٹھا ہو۔ ایک میل کے فاصلے کو ایک سو میل کا فاصلہ خیال کرے۔ اس کا ذہن کبھی نہ ختم ہونے والے خیالات سے بھرا رہے۔ گینڈوں اور ہاتھیوں کے توہمات جو اس کا پیچھا کرتے محسوس ہوں۔ تصور ہی تصور میں دل خوش کن موسیقی سنے، آنکھیں بند کرے اور لذت انگیز سوچوں اور خوابوں میں کھو جائے۔ تصور کرے کہ کوئی اسے بلا رہا ہے۔ تصور کرے کہ وہ غیر جسمانی طور پر ایک وسیع و عریض جگہ میں پھیلا ہوا موجود ہے۔ اسے اپنا جسم پھیلتا محسوس ہو حتیٰ کہ اسے اپنے سر کا کلمہ آسمان کی محراب سے بھی بڑا معلوم ہو۔ سب کچھ غیر حقیقی دکھائی دے۔ اپنے آپ کو بھی غیر حقیقی محسوس کرے۔ تمام احساسات میں انتہا درجے کا مبالغہ پایا جائے۔ آوازیں سننے اور انتہا درجے کی بہترین موسیقی سننے۔ حسین اور شاندار (پر شکوہ) مناظر (خواب) دیکھے جن کا مقابلہ صرف جنت ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

**آرسنک البم (Arsenic Alb):** تصور کرے کہ گھر چوروں سے بھرا پڑا ہے۔ سارے گھر میں بھاگتا پھرے، چوروں کی تلاش میں یا خوف کے باعث خود کو ان سے چھپاتا پھرے۔

**سکیوٹاوائروسا (Cicuta Virosa):** محسوس کرے کہ وہ کسی عجیب و غریب جگہ پر ہے اور معمولی حالات میں نہیں رہ رہا۔ ہر چیز عجیب اور تقریباً خوف ناک دکھائی دے۔ نئی نوع انسان کی خفارت، اپنے دوستوں سے دور بھاگے کیونکہ ان کی حماقتوں سے اسے کراہت ہو۔

**وسکم البم (Viscum Album):** وہم ہو جائے کہ مریض کا اوپر والا دھڑ ہوا میں تیر رہا ہے۔  
**کوکولس (Cocculus):** وہم ہو کہ کوئی چیز دیواروں پر، کرسیوں پر، فرش پر اور ہر کہیں لڑھک رہی ہے اور وہ اس پر بھی لڑھکے گی۔

**ہائوسائیمس (Hyoscyamus):** تصوراتی لوگوں سے باتیں کرے جیسا کہ وہ اس کے ساتھ

بیٹھے ہوں۔ مردہ بیوی سے، بہن سے یا شوہر سے گفتگو کرے جیسا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آچکے ہوں۔ چیزوں کو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چوہے، بلیاں تصور کرے۔ محسوس کرے کہ جیسے اس کے ہاتھ اور انگلیاں بہت لمبی ہو گئی ہیں۔

کوکین (Cocaine): خیال کرے کہ وہ اپنے متعلق ناخوش گوار باتیں سنتا ہے۔ سننے کے قریب میں مبتلا ہو، بستر پر جانے کے گھنٹوں بعد تک نہ سو سکے، کھٹلوں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنے کمرے اور بستر پر دیکھے اور محسوس کرے، اخلاقی حس کند ہو جائے۔

الیومنا (Alumina): جب مریض کوئی بات کہے تو یوں محسوس کرے جیسے یہ بات کسی اور نے کہی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ کوئی چیز دیکھے تو محسوس کرے کہ یہ چیز کسی اور نے دیکھی ہے یا جیسے کہ وہ صرف اسی صورت میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ خود کو کسی دوسرے شخص کے اندر محفل کر دے۔ اپنی ذات کی شناخت سے متعلق پریشانی۔

گلوٹائن (Glutamine): مریض اپنی تھوڑی گھنٹوں تک لمبی محسوس کرے، بار بار اپنی تھوڑی کو چھو کر یقین کرے کہ ایسا نہیں ہے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sulph): آوازیں سنے اور یقین کر لے کہ وہ ڈاکے میں ملوث ہے۔

لیکیسس (Lachesis): جب مریض کسی کو سرگوشی کرتے دیکھے تو خیال کرے کہ وہ اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ مریض اپنے متعلق خیال کرے کہ وہ کسی مافوق الفطرت ہستی کے قابو (قبضے) میں ہے جس کا وہ ہر حکم (بروزی طور پر خواب میں) مانے۔ اس بات کا خوف کہ اس کے دشمن اس کے تعاقب میں ہیں۔ اس بات کا خوف کہ دوا اصل میں زہر ہے۔ اس بات کا خوف کہ گھر میں لٹیرے گھس آئے ہیں چنانچہ مریض کھڑکی میں سے باہر چھٹانک لگا دیتا ہے۔

میلی لوتس (Melilotus): مغالطہ، مریض خیال کرے کہ ہر کوئی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بلند آواز سے بولنے سے ڈرے، بھاگ جانا چاہے۔

اگنس سی (Agnus C): مغالطہ اس بات کا کہ بھیرنگ (مچھلی کی ایک قسم) کی یا مٹک کی بو آ رہی ہے۔

کوکا (Coca): جلد پر اور کپڑوں پر کیڑے ریگنے کا وہم۔

اسارم یورپ (Asarum Europ): محسوس کرے کہ وہ ہوا میں منڈلا رہا ہے۔ پتھر آئیں جیسے شراب پی رکھی ہو۔

بیرٹا کارب (Baryta Carb): یوں محسوس کرے جیسے ہر چیز اس کے ساتھ ہلتی ہے جیسے کہ



وہ نگری جہاز میں ہے۔

کروکس (Crocus): محسوس کرے کہ جیسے کوئی زندہ چیز اس کے پیٹ میں ہے۔ تصوراتی حمل بدلتا ہوا مزاج۔

مارفینم (Morphinum): محسوس کرے کہ جیسے کمرہ بچوں سے بھرا پڑا ہے۔ بستر کے پائنتی آدمی محسوس ہو بیماری کی علامات واضح نہ کر سکے، معمولی معمولی باتوں پر آپہں بھرے۔

میڈورنیم (Medorrhinum): محسوس کرے کہ جو کام آج کئے گئے ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے کئے گئے تھے جیسے کوئی اس کے عقب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ مریض محسوس کرے کہ فرنیچر کے پیچھے سے چہرے نمودار ہوتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں "آجاؤ۔" محسوس کرے کہ زندگی حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے۔ خود کو ناقابل معافی گناہ میں ملوث پائے اور خیال کرے کہ وہ دوزخ میں دھکیلی جا رہی ہے۔ کوئی پرواہ نہ ہو کہ آیا وہ دوزخ میں جاتی ہے یا جنت میں، بے تاب، بہت خود غرض۔

مرکیورس (Mercurius): یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کیڑے اس کے حلق میں اوپر کو چڑھ رہے ہیں، سیب کا چھلکا جیسے گٹے میں پھنسا ہو، جیسے کانوں میں برف بھری ہو، کانوں سے جیسے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہو۔

پیلادیئم (Palladium): مریض محسوس کرتی ہے کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے، عزت نفس مجروح ہونے کا احساس۔

پٹیرولیم (Petroleum): مریض تصور کرے کہ اس کے ساتھ بستر میں کوئی دوسرا شخص یا کوئی بچہ بھی موجود ہے۔ خواب دیکھے کہ وہ دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، بازو اور ٹانگیں دوگنا ہونے کا احساس۔

پلاٹینم (Platinum): اسے یوں لگے کہ وہ اپنے خاندان میں سے نہیں ہے۔ تھوڑی سی غیر حاضری کے بعد ہر چیز سراسر بدلی ہوئی محسوس ہو، بھری اور ذہنی، دونوں اعتبار سے چیزوں کا تناسب معلوم کرنے کی حس کا جاتے رہتا۔

سورنیم (Psorium): محسوس کرے کہ دماغ باقی جسم سے الگ ہو چکا ہے، جیسے کہ اس کے ماتھے (سرا) میں جگہ ٹکائی ہو، جیسے کہ اس نے جن کانوں سے سنا ہے وہ اس کے اپنے نہیں ہیں۔

سائی کلیمن (Cyclamen): مریض خود کو ناپاک خیال کیا کرے، کسی آدمی کو یا کسی چیز کو چھو لینے کے بعد ہر مرتبہ نہانا چاہے، ہر چیز دو چند دکھائی دے، محسوس کرے کہ کوئی شخص بستر میں اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ فرائض کی ادائیگی نہ ہونے سے تکالیف یا برے کام میں ملوث ہونے سے تکالیف۔

شیشی سیکریا (Staphisagria): مریض جب چلے تو محسوس کرے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے، یہ احساس اسے پریشانی اور خوف میں مبتلا کر دے اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے قاصر ہو۔  
 سلفر (Sulphur): ہر چیز سن میں تبدیل ہو جائے، پرانے چیتھڑے اور پرانی پتھریاں حسین فن پارے دکھائی دیں، ہر چیز یاری لگے اور مریض اسے پر رہے، ہر چیز کو چھونے کی خواہش۔  
 کینابیس سیٹ (Cannabis Sat): خود کو قتل کر دینے کا حکم سن سنا کر ہوئی سرگوشیوں میں سنے اور خیال کرے کہ یہ اعلیٰ ترین ہستی کا حکم ہے۔

کیوپرم ایسی ٹیکم (Cuprum Aceticum): یہ وہم کہ کوئی پولیس والا اسے گرفتار کرنے آچکا ہے۔ فریب نظر، ہر قسم کے اجسام اور غمراہات کے بارے میں، خاص طور سے شام کے وقت، جب آنکھیں بند کرے یا جب سونے لگے۔

اولینڈا (Oleander): مریض اگر کسی چیز یا کسی شخص کو چھو لے تو خود کو اور اپنے کپڑوں کو دھوئے، جیسے کہ اسے یقین ہو کہ اس نے کسی گندی چیز کو چھو لیا ہے جس کے بعد اسے خود کو اور کپڑوں کو دھونا ضروری ہے۔

پائیروجینیئم (Pyrogenium): اس بات کا فریب ہو کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور بینک میں اس کی بڑی لمبی چوڑی رقم پڑی ہوئی ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Moschata): خود کو دو محسوس کرے اور اپنی دوسری ذات کو کھیلنا ہوئے دیکھے، گھویا ہوا محسوس ہو اور جب اسے بلایا جائے تو اپنے آپ میں واپس آکر پریشان ہو جائے۔ مریض محسوس کرے کہ اس کے دو سر ہیں۔

## ابتدائی دیوانگی

(Dementia Praecox)

(ذہانت، یادداشت اور سبب کا کھو جانا)

(Loss of intellect, Memory and Reason)

نکس دامیکا (Nux Vom): ہر چیز اور ہر شخص میں سے نقص نکالنے کا مزاج، دوسروں کے الفاظ اور توجہ کے متعلق انتہائی درجہ کی حساسیت، اپنے بہترین دوستوں کو قتل کرنے کی طرف مائل ہو، خود کشی کرنا چاہے لیکن بزدلی کے باعث نہ کر سکے، بہت ہی چڑچڑا، جھگڑالو اور کینہ پرور۔

میریوریس (Mercurius): شائستگی کی حس کا مکمل طور پر جاتے رہنا۔ جسمانی طور پر غلیظ اور اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال دینے والی ذہنیت رکھنے والا، یادداشت انتہائی شدید کمزور، تصور

خراب، سانس گندا، بھاری پالش کی ہوئی زبان۔  
 اگنیشیا (Ignatia): غم کے باعث اعتماد رے کی ذہنی حساسیت، معاملات محبت میں مایوسی۔  
 کلکیریا کارب (Calcarea Carb): دیگر اعضاء کے علاوہ دماغی ترقی میں مکمل طور پر  
 فقدان، بھول جانے کے مرض کے ساتھ، سستی اور اکتساب علم کی ناقابلیت۔  
 لائیکوپوڈیم (Lycopodium): عظیم دباؤ، بے حوصلگی، دل شکست و آزرده رہے، اپنی نجات  
 کے متعلق فکر مند رہے، اپنے فرائض انجام دینے کے قابل ہونے کی فکر، یہ فکر کہ وہ اپنے  
 امتحانات میں کامیاب ہو جائے، بد مزاج، غیر مطمئن، چڑچڑا، ٹیکھا، بہت زیادہ جوشیلا اور غصیلا،  
 قبض رہے اور کھٹی غذا سے ڈکار آتے رہیں۔  
 سٹیفیسیا (Staphisagria): بے خوابی، بزدلی، شرمیلے پن کے ساتھ۔ تنفر، غصہ،  
 شرمساری، قنوطیت، ناامیدی، شرمیلا پن، عزت نشینی کی خواہش کے ساتھ۔  
 کیومیلا (Chamomilla): حساسیت، چڑچڑا پن، زود رنجی، بہت جلد غصہ کر لے اور اس  
 کے دور رس نتائج بھجوا کرے۔  
 ٹیرنٹولا ہیر (Tarentula His): کسی چیز پر طیش آجائے تو جو کچھ ہاتھ میں ہو اور جو کچھ ہاتھ  
 میں آسکتا ہو، اٹھا کر پیسٹک مارے، معمولی سے اختلاف یا اعتراض پر دوسرے آدمی کو ہر اس چیز  
 سے مارے جسے پکڑ سکتا ہو۔

### افسردگی --- دباؤ (Depression)

کالی برومیٹم (Kali Br): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد، اذیت ناک وساوس کے ساتھ بے  
 خوابی اور اس بات کا اندیشہ کہ ہر چیز کی جو اس کے قریب ہے جہاں قریب آچکی ہے، خوف اور  
 اندیشوں کا دباؤ، ادھام اور اخلاقی فقدان کا احساس۔  
 اورم میٹ (Aurum Met): عظیم دباؤ جس کے باعث مریض خود کشی کرنے کی طرف  
 راغب ہو جائے۔  
 نکس وامیکا (Nux Vom): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد۔  
 امبرا گریسا (Ambra Grisea): بڑھاپے کے باعث مزاج کی شدت کی جگہ بے حوصلگی  
 لے لے جس کے باعث افسردگی ہو۔  
 آرٹنی میشیادوی (Artemisia V): مرگی کے حملے سے ایک روز پہلے (افسردگی) دباؤ۔  
 ہیلی بوریس (Helleborus): سرخ بخار کے بعد۔  
 کروٹالس (Crotalus): ضعف، غشی اور پائیں کولے میں درد کے ساتھ (افسردگی) دباؤ۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): آزر دگی، نا امیدگی اور ہمت کے فقدان کے باعث  
 افسردگی۔ خوراک 200 (Dilution)۔  
 زنگم میٹ (Zincum Met): جلدی امراض کے ساتھ افسردگی (دباؤ)۔ روزانہ دو خوراکیں  
 دی جانی چاہئیں۔  
 نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): شام کے وقت افسردگی (دباؤ)۔  
 کینابیس سیڈیوا (Cannabis Sat): قبل از دوپہرا افسردگی (دباؤ)۔  
 فاسفورس (Phosphorus): اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک ناقابل علاج دل رکھتا ہے۔  
 جلی میم (Gelsemium): گرمی سے 'نامردی کے باعث افسردگی (دباؤ)۔  
 نیٹرم میور (Natrium Mur): جوع الکلب (بے تحاشہ بھوک) کے باعث افسردگی۔  
 کیلیڈیم (Caladium): نامردی کے باعث افسردگی۔  
 ڈی جی سیلس (Digitalis): دل کی دھڑکن کے ساتھ افسردگی۔  
 کوکا (Coca): محنت و مشقت کی زیادتی کے باعث افسردگی۔  
 فائیو لاکا (Phytolacca): وجع المفاصل (جوڑوں کا درد) میں اور آتھک میں۔  
 آگنس کاسٹ (Agnus Cast): عمومی ناتوانی اور قوت حیات کی افسردگی۔ زیر دست اداسی  
 موت کی آمد کے غیر متزلزل خیال کے ساتھ۔  
 میوریکس (Murex): جب لیکوریا سے افادہ ہو۔  
 ایسڈ فاس (Acid Phos): دباؤ (افسردگی) جو لائے اعتماد رے کی لا تعلقی 'بے پرواہی' ہے  
 رخی وغیرہ۔  
 امونیا کارب (Ammonia Carb): حوصلے کی افسردگی۔ مریض بہت زیادہ روتی ہے 'بے  
 ہوشی کے دورے پڑتے ہیں' پریشانی ہو 'بے اطمینانی ہو اور حرکت سے لاغری ہو' کمزوری کے  
 باعث ضیق النفسی۔

## خواہش (طلب)

(Desire "Craving")

(نیز دیکھئے "Eatst")

سلفر (Sulphur): مریض ہر وقت شراب نوشی کا خواہاں ہو۔ صبح سے شام تک شراب پینا  
 چاہے 'بچہ ناک سے پینے والا مواد کھاتا ہے' حاملہ عورتوں میں برائڈی کی طلب۔  
 فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا معدہ کی جلن کو دور کر کے شراب نوشی کی خواہش کا

سہ باب کرتی ہے، قبل ازیں یہی معدہ کی جلن غیر معمولی اشتہا کا باعث بنتی ہے۔  
پلمبم (Plumbum): اس میں ایک عجیب علامت یہ ہے کہ مریض شراب خریدنے کے لئے  
 رقم چوری کرتا ہے لیکن جیسے ہی اس پر سے پابندی اٹھائی جائے تو یکایک شراب پینے کی خواہش  
 جاتی رہتی ہے۔

ایسڈ سلفیورک (Acid Sulphuric): شراب نوشی کی طلب کو ختم کرنے کے لئے، ایک  
 حصہ سلفیورک ایسڈ کا مکچر اور تین حصے شراب ملا کر دس سے پندرہ قطرے کی خوراک دن  
 میں تین مرتبہ، تین چار ہفتہ تک دی جائے۔

ٹیرینٹولا ہسپانیولا (Tarentula H): راکھ کھانے کی خواہش، خاص طور سے حمل کے دوران  
 اور پردرد حیض میں، ریت کھانے کی خواہش۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): چاک کھانے کی خواہش، چربی، نمک، چونا اور مٹی یا پلستر  
 کھانے کی خواہش۔

الیومنا (Alumina): نشاستہ، کچے چاول، چاک، ٹکڑی کا کونکہ، چائے اور کافی کی تلچٹ،  
 تیزاب اور ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی طلب۔ آلو، گوشت اور بیڑ شراب سے نفرت۔

سائی کوٹاوائٹروسا (Cicuta Vir): بچہ کو مکہ منہ میں رکھے اور بڑے شوق سے اسے چبائے  
 اور نگے، کچے آلو کھاتا چاہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو کہ وہ حقیقت میں چیزوں کے درمیان  
 امتیازی نہ کر سکے کہ کوئی چیز کھانے کے لئے مناسب ہے اور کون سی چیز غیر مناسب ہے۔

قیورکس (Quercus): یہ دوا شراب، تمباکو اور چائے کے برے اثرات کو دور کرتی ہے۔  
سٹروفین تھس (Strophanthus): شراب کی طلب کو یہ دوا زائل کرتی ہے۔ مدر، ٹنچر کے  
 پانچ سے دس قطروں کی خوراک دن میں دو بار دیجئے۔

پسی فلورا ان، ایویناسیٹ (Passiflora In, Avena Sat): مارفیا اور افیون کی طلب کو  
 یہ دوا ختم کرتی ہے۔ مدر، ٹنچر کی پانچ سے دس قطروں کی خوراک دیجئے۔

فالی ٹولاکا (Phytolacca): دانتوں اور مسوڑھوں کو کاٹنے کی نہ رکنے والی خواہش، خصوصاً  
 دھوائے ہوئے گوشت کی اور عموماً عام گوشت کی طلب۔

منگانم (Manganum): ہر وقت بستر پر لیٹے رہنے کی خواہش، مریض آرام سے بہتری  
 محسوس کرے جبکہ حرکت سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہو جائے۔

ہیپرسلفر (Hepar Sulphur): سرکہ اور اچار کی زبردست خواہش۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): دیوانے لوگوں میں کام کرنے کی خواہش۔

کلیڈیم (Caladium): یہ دوا تمباکو کا تریاق ہے اور اس کی طلب کو زائل کرتی ہے۔ اس

کی علامات حسب ذیل ہیں: یادداشت کا جاتے رہنا، غیر حاضر دماغی اور بھٹکتارین، ہر کام جلد بازی میں کرے، یہ دوا خوف بھر کو بھی اگر اوپر دی گئی علامات ہوں تو درست کرتی ہے۔

پیلادیم (Palladium): خوشامد کئے جانے کی خواہش۔

لیڈم پال (Ledum P): یہ دوا دہسکی کی طلب کو زائل کرتی ہے۔

کالی بائیکرام (Kali Bi): بیڑ شراب اور تیزابی مشروبات کی خواہش۔

میڈورینم (Medorrhinum): نمک، مٹھائیوں، سبز پھلوں، برف، کھٹی اشیاء اور سنگتروں کی طلب۔

مرکیوریس (Mercurius): گائے کا گوبر اور جوہڑوں کا گارا (کچھڑا) کھانے کی خواہش۔

سینی کیولا (Sanicula): پیچھے دیکھنے کی نہ رکنے والی خواہش۔

سپیا (Sepia): شراب، سرکہ اور مٹھائیوں کی خواہش۔

آئیوڈم (Iodum): گوشت اور نشہ آور مشروبات کی خواہش۔

تھلاسپی بی (Thlaspi B): دودھ مکھن کی خواہش۔

سانی کلیمن (Cyclamen): سارڈین (ایک خاص قسم کی مچھلی) کھانے کی طلب۔

کروٹالس ایچ (Crotalus H): برف (آسمان سے گرنے والی ہلکی اور باریک برف) کھانے کی خواہش۔

سٹرامونیم (Stramonium): چیزوں کو اپنے دانتوں سے کانٹے اور پھاڑنے کی شدید خواہش۔

تیزابوں (تیزابی مشروبات) کی زبردست خواہش، سرکہ سے بہتری ہو۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): تپ دق والے بچوں میں گوشت کھانے کی غیر معمولی خواہش۔

سس ٹس کین (Cistus Can): پیڑ کی طلب جاڑا لگنے کے رجحان کے ساتھ جو لمبے عرصہ

تک قائم رہے، سردیوں میں شدت ہو، تیزابی غذا اور پھل کی چاہت جس کی وجہ سے درد اور اسہال میں مبتلا ہو۔

ایلیم سپیا (Allium Cepa): کچے پیاز کھانے کی خواہش۔

کونیم (Conium): اپنا بہترین لباس پہننا پسند کرے۔ غیر ضروری خریداری کرے۔ چیزوں کی

بہت ہی تھوڑی پرواہ کرے، انہیں ضائع اور برباد کرتا رہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): انڈوں کی خواہش، چوٹا کھائے، سلیٹ کی پٹلیں،

چاک، چکنی مٹی، کچے آلو، مٹھائیاں، آئس کریم وغیرہ کھانے کی خواہش۔

اگریکس امیٹ (Agaricus Emet): پریشانی کے حملوں کے دوران، اچانک برف کے

ٹھنڈے پانی کی خواہش جس سے تکلیف میں کمی ہو۔  
کلکیریا فاس (Calcarea Phos): سور کا خشک ٹھیکین گوشت 'سور کی ران کا گوشت' ٹھیکین اور دھوانے گوشت کھانے کی خواہش 'بست زیادہ اچھارا ہو' ابتدائی ہیضہ۔  
ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nit): شکر (چینی) اور مٹھائیاں کھانے کی خواہش 'حالات' موافق نہ ہوں۔ نشاستہ اور انڈے وغیرہ نہ کھا سکے حالات بیمار نہ ہو۔

سلی نیئم (Selenium): نشہ آور مشروبات کی خواہش 'گالیاں دینے کی (ہڈیاں) قریب قریب نہ رکھنے والی خواہش کے ساتھ۔

بیوفو (Bufo): جلق کی عادت پوری کرنے کے لئے تھائی کی خواہش 'تھائی کاشیدائی' حالات بیمار ہونے پر دہشت زدہ ہو جائے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): میٹھی چیزوں اور گرم مشروبات کی طلب 'کافی اور گوشت سے نفرت کرے۔

برائی اونیا (Bryonia): کسی چیز کی خواہش لیکن مریض یہ نہ جانتا ہو کہ کس چیز کی اسے خواہش ہے۔ آپ بچے کو ایک کے بعد ایک کھلونا پیش کرتے رہیں لیکن وہ ہر ایک کو مسترد کرتا رہے گا۔

لیک فیل (Lac Fel): کانڈ کھانے کی زبردست خواہش۔

میزیریئم (Mezereum): چربی 'سور کا گوشت کھانے اور دودھ پینے کی خواہش۔

نٹرم سلف (Natrum Sulph): برف اور برف کے ٹھنڈے پانی کی طلب۔

انٹم ٹارٹ (Antum Tart): کھٹے اور تیزابی پھلوں کی خواہش جو اسے بیمار کر دیں۔ سر کے 'کھٹی چیزوں' کھٹی شرابوں اور کھٹے پھلوں سے معدے کی تکالیف میں مبتلا ہو۔

وربٹرم البم (Veratrum Alb): اپنے ہی پاخانے کو کھانے اور اپنے ہی پیشاب کو پینے کی زبردست خواہش۔

کوکا (Coca): شراب نوشی اور تمباکو نوشی کی خواہش 'عادی نشہ بازوں کے لئے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): سر کے کی طلب 'خصوصاً حاملہ خواتین میں۔

نکس و امیکا 'نیکسیس' 'پلساٹیلہ' (Nux Vom, Lachesis, Pulsatilla): براہی کی خواہش۔

کاسٹیکم (Causticum): نوجوان لڑکیاں شادی کی خواہش میں چلیں۔

ٹوبیکم (Tobacum): سگریٹ نوشی کی طلب کو ختم کرتی ہے۔ ہر ہفتہ 200 یا 1000 کی خوراک دیں۔



کاربووتج (Carboveg): کافی 'تیزابی اشیاء'، مٹائیوں اور نمکین چیزوں کی خواہش۔ قابل  
ہضم اشیاء اور بہترین غذا سے بیزاری۔  
انگس تراویرا (Angustura Vera): کافی کی عظیم ترین طلب۔

### تباہ کن (Destructive)

بیلادونا (Belladonna): حاسد، غصیل، کانٹے، مارے، بھاگ جانا چاہے، گھناؤنے چہرے اور  
خوفناک مناظر دیکھے۔  
کینتھرس (Cantharis): تیز و تند ہلیان، شدید جنسی خواہش کے باعث چیخنے اور چلائے۔

### نشوونما (Development)

برشا کارب (Baryta Carb): ذہنی نشوونما کا فقدان جبکہ جسمانی نشوونما ہوتی ہے، ایسے  
مریضوں میں ہم خوف اور سادہ لوحی دیکھتے ہیں جیسی کہ بچوں میں پائی جاتی ہے، بچکانہ سادگی اور  
معصومیت، 18 سال سے 52 سال کی لڑکیوں میں بچکانہ پن، گزریوں کے ساتھ گھٹیلے اور بیوقوفانہ  
باتیں کریں، بچکانہ طرز عمل۔ عورت اپنے میں دیر سے آنا، عورتوں والے معمولات اور  
ضروریات کو دیر سے اختیار کرتا۔

### دہشت (Dread)

(تیز دیکھے "خوف")

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): ذہنی یا جسمانی کوئی بھی کام کرنے سے دہشت زدہ

کوئیم (Conium): اکیلا ہونے سے دہشت کھائے۔

چائنا آف (China Off): کتوں اور دیگر جانوروں سے دہشت زدہ۔

فاس فورس (Phosphorus): دہشت زدہ ہو کہ جیسے ہر کوئی کھدوے سے کوئی چیز ریختی  
ہوئی باہر آ رہی ہے۔

بوریکس (Borax): نیچے کی طرف حرکت کرنے سے خوف کھائے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مشوش، نمکین اور چڑچڑا، مردوں سے خوف زدہ، رفاقت  
سے بے زار لیکن اکیلا رہنے سے بھی ڈرے۔

جلسی میم (Gelsemium): حرکت سے خوف زدہ، اعصابی خوف، گھوکاروں اور مقررہ

میں۔  
اگنیشیا (Ignatia): معمولی معمولی چیزوں سے دہشت کھائے۔

### کھانا — (Eats)

ورینٹرم البم (Veratrum Alb): خود اپنا پانا کھائے اور پیشاب پیئے۔  
سلفر (Sulphur): بچے تاک سے بہتا ہوا مواد کھا جائیں 'نزلہ' زکام کا رجحان۔

### فرار — (Escape)

بیلادونا (Belladonna): بھاگ جانے کی خواہش یا فرنیچر کے پیچھے بستر و فیروزہ میں چھپ جانے کی خواہش۔  
اوپیم (Opium): بخار، خصوصاً ٹائی فائیڈ میں کہیں بھاگ جانے کی خواہش۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): اپنے بچوں سے راہ فرار حاصل کرنے کی خواہش۔  
ورینٹرم البم (Veratrum Alb): گردن توڑ بخار میں 'بھاگ جانے کی خواہش۔  
مرکیورس (Mercurius): بستر یا میں فرار ہو جانے کی خواہش جیسے مرینڈہ خیال کرے کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہو چکا ہے۔  
ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): بستر سے چھلانگ لگائے اور کہیں بھاگ جانا چاہے۔

### امتحان (Examination)

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nit): یہ دوا امتحان میں ناکامی کے خوف و ہراس کے لئے مخصوص ہے۔ پیش از وقت دہشت جس کے باعث دست آنے لگیں۔ دروازے کے قریب بیٹھنا چاہے تاکہ فرار ہو سکے۔ سکول کے لڑکے جو سکول مدرسہ یا مسجد جانے سے خوف زدہ ہوں۔

ایناکارڈیم (Anacardium): امتحانات سے قبل خوف، بے تحاشہ مطالعہ سے کبھی نہ تھکیں، مادہ منویہ کے اخراج سے اعصابی تھکاوٹ، یادداشت کی کمزوری۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): امتحانات میں پاس ہونے کا دباؤ، خوف کی فطری وجوہات کے باعث جھلاہٹ جس کی وجہ سے جسمانی اعضاء پر گہرا اثر مرتب ہو 'چڑچڑاہٹ۔  
ایتھوزا سائپس (Aethusa Cynapium): سوچنے اور توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت، اس علامت کے ساتھ مریض پر امتحان کا خوف و ہراس طاری ہو۔

جلسی میم (Gelsemium): امتحان سے قبل خوف و ہراس۔

## خوف — (Fear)

(نیز دیکھئے "موت" اور "دہشت")

اکونائٹ این (Aconite N): موت، اندھیرے، شور والی جگہوں اور موسیقی سے خوف۔ دورانِ حمل موت کا خوف، بھوتوں کا خوف، ٹرائی، کار یا ریل گاڑی کے گھس آنے کا خوف۔ پریشانی کے ساتھ خوف۔ گلیوں کو پار کرنے کا خوف، انتہائی پریشانی اور بے چینی کے ساتھ شدید خوف۔

سٹرامونیم (Stramonium): ہڈیاں میں خوف، کتوں کا خوف، قریب نظر کے باعث خوف، پانی کا، روشنی کا، کام غلط کر دینے کا اور لعنت ملاست کئے جانے کا خوف، اندھیرے کا خوف، بکد، چمک دار چیزوں کا خوف بھی ہو، رات کا اور زخمی ہو جانے کا خوف، شدید پیاس لیکن پانی سے ڈرے۔

اوپیم (Opium): کسی الم ناک تجربہ (حادثہ) پیش آنے کے بعد ڈر کا دل میں جاگزیں ہو جانا، جب خوف سے پیٹ چالو ہو جائے، مریض بہت جلد خوف زدہ ہو جائے، موت کا خوف، خصوصاً خوف سے بزدلی جنم لے۔

کیوپرم میٹلیکیم (Cuprum Metallicum): جب خوف کے باعث ضیق النفس کے تشفی دورے پڑیں۔

مرکیورس (Mercurius): خوف، بھاگ جانے کی خواہش کے ساتھ جیسے مریضہ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے۔

آرسنک الیم (Arsenic Alb): چاقو سے قتل ہو جانے کا خوف، تھائی سے خوف، رفاقت پسند کرے، شدید بے چینی۔

کیوپرم اسی ٹیکم (Cuprum Aceticum): بستر کے کپڑوں سے خوف یا گھر کو آگ لگ جانے کا خوف۔

سلیشیا (Silicea): ذہنی تھکان، منجمد خیالات، صرف بنوں کو سوچے، انہیں ڈرائے، انہیں تلاش کرے اور گئے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): اچانک موت کی دہشت اور خوف، ڈرے کہ کوئی خوفناک بات ہونے والی ہے، رات کو اٹھ جائے اور دل کو پکڑ لے، راتوں کو خوف زدہ کر دینے والے دہشت ناک خواب دیکھے، اس بات کا خوف کہ سامنے سے آنے والوں سے ٹکرا جائے گا۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پریشانی یا خوف اس بات کا کہ کوئی خطرناک یا غمناک بات ہو جائے گی، اس بات کا خوف کہ لوگ مریضہ کی ذہنی الجھن سے واقف ہو جائیں گے، سائے کا خوف، پانگل ہو جانے کا خوف۔

بیلادونا (Belladonna): تصوراتی چیزوں اور بدیوں کا خوف، فرار ہو جانا چاہے، جانوروں کا خوف، کتوں کا خوف۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): زہر دیئے جانے کا خوف، زخمی ہو جانے کا خوف، لعنت، علامت کا خوف، پانی کا، اور لوگوں کا خوف، جنگلی جانوروں کے کاٹنے کا خوف۔

سیکسی نم (Succinum): ریل گاڑیوں اور بند کمروں کا خوف۔

اگنیشیا (Ignatia): ایسے ہسٹریائی مریضوں میں فضائی حملے کا خوف جو معمولی سی اشتعال انگیزی پر غش کھا جائیں، خوف کے باعث غمگینی۔

برائی اونیا (Bryonia): فقر و فاقہ کا خوف۔

جلسی میم (Gelsemium): فضائی حملے اور بمباری وغیرہ کا خوف، سٹیج کا خوف، متوقع ہوائی حملے یا بمباری کی خبر سن کر دھچکا لگنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تھکاوٹ کا احساس اور کپکپی۔ اس دوا میں بے چینی اور پریشانی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ گرنے کا خوف۔

فاسفورس (Phosphorus): سر پر منڈلانے والے حادثے کے پیش آجانے کا خوف، اندھیرے کا خوف، تھما ہو جانے کا خوف، دم گھٹنے کا خوف، طوفان باد و باراں کا خوف، کسی بری بات کے واقع ہو جانے کا خوف۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum): ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جائے، خوف زدہ، جلد باز انسان، فضائی حملے اور بمباری وغیرہ کے باعث۔ بے چینی اور ادھر ادھر بھاگے پھرنا اس دوا کی مخصوص علامت ہے، اس بات کا خوف کہ موت قریب آ رہی ہے۔ مجمع میں گر جایا سینما یا کسی بھی پر ہجوم جگہ جانے کا خوف، وہ سانس نہ لے سکے، اسی طرح لفٹ یا سرنگ میں جانے کا خوف۔

الیومنا (Alumina): شام کا خوف۔

لائیمین (Lyssin): پانی کا خوف، کیونکہ پانی کو دیکھنے سے مریض کو پیشاب کی تحریک ہوتی ہے۔ یہ علامت مخصوص ہے جب کہ پانی کا خوف پایا جائے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): ہمیشہ کے لئے کھو جانے کا خوف، اللہ تعالیٰ کے نام کا پکارا جانا برداشت نہ کر سکے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ روشن اشیاء کے دکھائی دینے پر خوف زدہ ہو جائے، ہوا کے معمولی جھونکے پر یا کسی کے آنکھپنے پر خوف زدہ ہو جائے۔

اندھیرے کا خوف۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): تنہا رہ جانے کا خوف، بزدلی کا خوف، تاریکی کا، موت کا، بھوتوں کا اور لوگوں کا خوف۔

کوکولس (Cocculus): موت اور انجانے خطرے کا خوف۔

کالی کارب (Kali Carb): مستقبل کا خوف، موت کا خوف، اس امر کا خوف کہ کچھ ہونے والا ہے، بھوتوں کا خوف۔ ایسے مریض تھکے ہوئے، پز پزے اور حساس ہوتے ہیں، جنہیں کبھی سبکدوش نہ ہو، جو کبھی اکیلے رہنا نہ چاہیں۔

کلیمٹس (Clematis): اکیلا رہنے سے خوف کھائے لیکن دوسری طرف موافق لوگوں کی رفاقت کی طرف بھی عدم میلان ہو۔

ایناکارڈیم (Anacardium): خوف زدہ ہو کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ چوروں کی تلاش میں نظر دوڑاتا رہے، دشمنوں کا گمان کرے۔ ہر چیز اور ہر آدمی سے خوف کھائے، اندرونی پریشانی سے بھرا رہے، انتہا درجے کا بزدل۔ جسم پر زخم کھا سکے بغیر کسی احساس کے۔ ظالم، کینہ پرور، بد معاش۔

کلیڈیم (Caladium): انتہا درجے کی اعصابیت، اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو، تمام رات شہوانی خیالات میں گم جاگا کرے، اندیشہ ناکی، خاص طور سے سونے سے پہلے، مستقبل کے متعلق خوف زدہ ہو۔

کیمفر (Camphor): ذہنی پریشانی کے ساتھ انتہا درجے کا خوف، اشخاص کا، اجنبیوں کا خوف، اندھیرے کا خوف، تصوراتی روحوں (بھوتوں) کا خوف۔

مینگانم (Manganum): ذہنی پریشانی اور خوف، عظیم اندیشہ ناکی، خیال کرے کہ کوئی دہشت ناک واقعہ ہونے والا ہے، مریض اپنے ذہن پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جوں جوں وہ اپنے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرے اور بھی زیادہ پریشان ہوتا چلا جائے۔ وہ سوچ نہیں سکتا اور غور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تھکا ہوا اور بے آرام ہوتا ہے۔ لیٹ جانے پر یہ کیفیت جاتی رہتی ہے، لیٹنے سے بہتری ہو۔

سپونجیا (Spongia): موت کا خوف، مستقبل کا خوف، رات کو کسی خوف ناک بات کے وقوع پذیر ہونے کا خوف، شوق النفسی اور ذہنی پریشانی بھی ساتھ ہو۔

پاولینیا فانیٹا (Paullinia Finata): مدقوق ہو جانے کا خوف۔

اونوسموڈیم (Onosmodium): سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے نیچے گر جانے کا خوف۔

مینسینلا (Mancinella): دیوانہ ہو جانے کا خوف، بد روحوں کا خوف۔

میڈورینم 200 (Medorrhinum 200): موت کا خوف، جب اکیلا ہو تو علامات میں تیزی آجائے، خوف کے احساس کے ساتھ جاگے، محسوس ہو کہ کوئی خوف ناک بات وقوع پذیر ہو چکی ہے۔

سنی کولا (Sanicula): اندھیرے کا خوف، مریض کو مسلسل پیچھے دیکھنے کی خواہش ہو۔

کینابیس اینڈیکا (Cannabis Ind): تاریکی کا خوف۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): مطلق خوف، یہ خوف کہ کچھ ہونے والا ہے، کسی ایسی

چیز کا خوف جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ایسی خوف ناک چیزیں دیکھتے جو وہاں موجود ہی نہ ہوں۔

سٹیفیسیگریا (Staphisagria): اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو، غصے کے ساتھ پریشانی،

گہرے طور پر اندرونی جذبات مجروح ہونے سے ہاتھ میں موجود چیز کو دور پھینک دے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): تصوراتی مشکلات کا خوف، ہر چیز ڈرائے

جیسے گھوڑے، دیگنیں، گرتے ہوئے گھر وغیرہ۔

### خوشامد — (Flattery)

پیلادیم (Palladium): خوشامد کرانے کی خواہش کرے۔

### بھول جانا

#### (Forgetfulness)

(نیز دیکھئے ”غیر حاضر دماغی“ سوچنا“ اور ”غلطی کرنا“)

لیک کینینم (Lac Caninum): مریض غیر حاضر دماغ ہوتا ہے، وہ بہت بھٹکتا ہوتا ہے، بازار

سے چیزیں خریدے اور اشیائیں لئے بغیر چل دے۔ لکھتے وقت الفاظ میں حروف چھوڑ جائے، بات

کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر یا لاپرواہی سے ذہن میں موجود چیزوں کی جگہ نظر آنے والی

چیزوں کو بول دے۔ لکھنے میں بہت زیادہ الفاظ استعمال کرے لیکن یہ مناسب الفاظ نہ ہوں۔

مطالعہ کی جانب توجہ مرکوز نہ کر سکے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جنسی بے اعتمادیوں کے باعث یادداشت کا جائے رہنا

ہونی، کمزور یادداشت، اپنے خیالات کو مجتمع نہ کر سکے۔

ایناکارڈیم (Anacardium): دماغی مشقت کے باعث فراموش کاری۔ یہ علامت سب سے

زیادہ صبح کے وقت واضح ہو، عمومی فالج کے بعد، یادداشت کی کمزوری یا یادداشت کا کھو جانا۔ بہ

دعا دینے کی، قسم اٹھانے کی نہ رکھنے والی خواہش۔

برٹا کارب (Baryta Carb): بوڑھے لوگوں کے لئے مفید دوا ہے جبکہ ان کی عمر تمام ذہنی استعدادوں سے ہاتھ اٹھالینے کی طرف راغب ہو چکی ہو۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): مریض کامل طور پر فراموش کار (بھٹکن ہو چکا ہو) اپنا جملہ پورا نہ کر سکے کیونکہ وہ بھول چکا ہو کہ وہ کیا کتنا چاہتا ہے۔

سیلیسینم (Selenium): جاگنے کے عرصہ کے دوران فراموش کار رہے اور سونے پر خواب میں وہ چیز دیکھے جو بھول گیا تھا۔

سفی لینم (Syphilinum): بھٹکن، کمزور دماغ، بغیر کسی وجہ کے روئے اور ہٹے، صحت یاب نہ ہونے سے مایوس، قم زدہ، کاروبار اور دیگر معاملات سے یکسو رہے۔

گلونائن (Glonoin): بھٹکن پر مریض کو مضحکہ خیز بنا دے، وہ مشہور گلیوں (سڑکوں) کے نام بھول جائے، خود اپنے گھر کا نمبر اور محل وقوع بھول جائے، حالانکہ وہ وہاں سال ہا سال سے رہائش پذیر ہو، گھر کا راستہ بہت لمبا محسوس ہو، مشہور و معروف گلیاں (سڑکیں) اجنبی لگیں۔

سٹیفیسیگیا (Staphisagria): حلق یا مادہ منویہ کے اخراج کے بعد یادداشت کھو جائے یا مسلسل جنسی موضوعات پر بولنے یا لکھنے کے باعث یادداشت کا کھو جانا، جب کوئی چیز پڑھے اس کی موبوم سی یاد باقی رہے اور بہت دیر تک کو شش کرنے کے بعد ہی یاد آ سکے۔

لیک-ویک-ڈیفیل (Lac. Vacc. Dell): ذہنی تھکاوٹ اور ذہنی کام سے بے زاری کے ساتھ یادداشت کا جاتے رہنے، غمگینی اور آسان ترین ذرائع سے موت کی خواہش۔

کیلیڈیم (Caladium): جنسی بے اعتدالیوں یا تباہی کے زہر کے باعث فراموش کاری (بھٹکن پر) غیر حاضر دماغی، اعتماد رعبے کا اشتعال، وہ سوچ نہیں سکتا، جتنا کسی مضمون کو سوچے اتنا ہی اس سے دور ہوتا چلا جائے، ایسا ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ کے باعث ہو سکتا ہے۔ یہ دوا "شک" والے مریضوں کے لئے بھی مفید ہے جو کسی بھی چیز کے لئے پر یقین نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ایک ایسی چیز کے متعلق بھی اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں جسے ابھی دیکھ کر اور محسوس کر کے اس کے پاس سے بٹے ہوتے ہیں۔

آئیوڈم (Iodum): بہت جلد بھول جانا، کسی ایسی چیز کو بھول جائے جس کے متعلق یہ بھی یاد نہ ہو کہ وہ کیا چیز تھی۔ لیکن وہ اس کے سر پر سوار رہے اور اسے بے چین اور پریشان کرتی رہے۔

ایل نٹھس گلینڈیولوسا (Ailanthus Glandulosa): یہاں تک کہ ایک لمحہ پہلے کسی گنی بات بھول جائے۔ یادداشت کا مستقل کھو جانا۔

اولینڈر (Oleander): کمزور یادداشت اور بھٹکن پر، مدد کہ (بھٹنے کی قوت) کی سستی کے



ساتھ۔

امبر اگریسیا (Ambra Grisea): شدید اعصابی تھکاوٹ کے باعث عام سے عام الفاظ یا حقائق کو بھی نہ یاد رکھ سکے، وقت سے پہلے پوڑھا ہو جانا، ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں چلا جائے۔

کونیم (Conium): یادداشت کی کمزوری، فراموش کاری، ذہنی کاوش کی نااہلیت۔

کالی بروم (Kali Brom): یادداشت کا جاتے رہنا، نامردی، قلت دم (خون کی کمی)، لاغری (دبلاہٹ) کے ساتھ، مفرد الفاظ بھول جائے، الفاظ کی جزو (Syllable) چھوڑ جائے۔

زنگم فاس (Zincum Phos): دماغی کمزوری، محض فراموش کاری سے فائر العقلی کی طرف مبذول ہو جائے، کم تر درجے کی فائر العقلی، ریڑھ کے ساتھ ساتھ جلدن، ریڑھ کے آخری یا پہلے مہرے میں ہلکا درد، بیٹھنے سے زیادہ ہو جائے۔ مطالعہ یا تھکاوٹ سے بھی زیادتی ہو۔ کمزوری، ہاتھوں، پاؤں وغیرہ کے بہت سے عضلات کا کانپنا اور بھڑکنا، ٹانگوں اور پاؤں میں استدار بہنے کی بے چینی، شدید استدارگیوں اور اخراج منی کے ساتھ خسیوں اور منی کی نالی میں درد۔

میڈرینیم (Medorrhinum): حقائق، اعداد اور ناموں کو بھول جائے، جو کچھ پڑھا ہو بھول جائے، لکھنے میں بھول کی اور الفاظ کی غلطیاں کرے۔ محسوس ہو کہ وقت بہت آہستگی سے گزر رہا ہے۔ ہر شخص بہت آہستہ حرکت کرنا محسوس ہو۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): اعصابیت اور ہسمانی کمزوری کے ساتھ فراموش کاری، اعداد کو بننے کرنے کی ناقابلیت، جو کچھ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھتے ہوئے پچھلا صفحہ ذہن سے صاف ہو جائے، ایک جملے کے آغاز سے اختتام تک یادداشت ساتھ نہ دے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): غلط الفاظ، تلفظ اور حروف استعمال کرے، غلط جملوں کے ساتھ لکھے اور الفاظ کے اجزاء چھوڑ جائے، پریشان خیالی، کوئی نئی چیز دیکھنا برداشت نہ کر سکے۔ اپنا لکھا ہوا نہ پڑھ سکے۔

سلفر (Sulphur): بہت زیادہ بھلکڑ، گزشتہ واقعات اور نام یاد نہ آسکیں۔ احمق اور گھبرالو، بات چیت سے پہلو تھی کرے۔ مناسب الفاظ نہ تلاش کر سکے یا بولتے یا لکھتے ہوئے الفاظ بھول جائے، دن کے دوران غمگین رہے اور رات کے دوران خوش ہو، کڑھے اور اندازے لگائے لیکن کام نہ کرے۔

روڈوڈنڈرون (Rododendron): یادداشت کا جاتے رہنا، لکھتے ہوئے الفاظ چھوٹ جائیں، سوچ کا اچانک غائب ہو جانا، بھول جائے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔

رشاکس (Rhus Tox): دماغ کی مسلسل سوچنے کی نااہلیت، مریض 12 لکھنا چاہے لیکن 1

لکھنے کے بعد سمجھ نہ سکے کہ اس کے بعد اسے کون سا ہندسہ لکھنا چاہئے۔  
سٹرامونیم (Stramonium): غلط الفاظ استعمال کرے، درست الفاظ یاد نہ آ سکیں۔

## جوئے بازی

(Gambling)

مرکیورس وائیو (Mercurius Viv): بہت بڑے جوئے باز، بعض اوقات روپیہ بیہ آزادانہ  
 (کھلے ہاتھ سے) خرچ کریں اور بعض اوقات ہاتھ کھینچ کر (کنجوسی سے) خرچ کرے۔  
سلفر (Sulphur): جوئے باز، چوری کی عادت بھی ساتھ ہو، تمباکو استعمال کرنے والے۔

## محرم ضمیر

(Guilty Conscience)

(دیکھئے "مغالطے یا دوسوے خوف" اور "مراقی حالت")

## فریب نظر

(Hallucination)

(دیکھئے "مغالطے یا دوسوے" اور "روشن ضمیری")

نفرت — (Hate)

(دیکھئے "بے زاری")

## علاقت یا د وطن

(Home Sickness)

کپسیکیم (Capsicum): علاقت یا د وطن کے لئے چونی کی دوا ہے۔ اس میں درج ذیل  
 علامات ہوتی ہیں: رخسار سرخ، بے خوابی، بچے سکول میں مطالعہ یا کام کرنے سے قاصر ہوں اور  
 گھر پہنچنا چاہیں۔

آئرس ٹینکس (Iris Tenax): اداس، افسردہ، گھر کی یاد ستائے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): علالت یا وطن کے باعث نکالیں۔  
 اگنیشیا (Ignatia): بدلتا ہوا مزاج، خاموش کزمن، اداسی، غمگینی، صدمات کے بعد غم،  
 تاسیدی۔

## مراقی حالت

(Hypochondriasis)

(نیز دیکھئے "اعصابی کمزوری")

نکسن وامیکا (Nux Vomica): واضح چڑچڑاپن، بد صورت (خطرناک)، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو قتل کرنا چاہے۔ نیز خود اپنے آپ کو بھی 'شور'، 'بو'، 'روشنی گرمی اور ٹھنڈ سے حساس ہو' اپنی خوراک اور کپڑوں وغیرہ میں نقص نکالے۔ یہ سب کچھ 'ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی عادت' کھانے پینے میں بے اعتدالیوں اور خصوصاً منشیات کے باعث ہو۔

اکتیارسی موسا (Actea Racemosa): یہ مستورات کی دوا ہے، جب حیض سے پہلے دباؤ اور مالتخویا کے حملے ہوں۔ کسی تصوراتی جلاذ کا خوف، جو کوئی دایہ، ڈاکٹر، دوست، چوہا، چوہیا، ملی یا کتا بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کے لئے ناموزوں لیکن موت سے خوف زدہ۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): تشویش مند، موت کا، بد قسمتی کا، ذہنی توازن کھو دینے کا، جان لیوا امراض کا خوف۔ ذہنی ازیت کے دورے رونے اور سسکیاں بھرنے کے ساتھ۔ مردوں اور دیگر ناخوشگوار چیزوں کے خواب۔

سٹیفیسیا سگریا (Staphisagria): اعصابی نظام کے لئے موزوں دوا ہے جو کہ دماغ اور جنسی آلات پر اثر انداز ہو، اپنے مرض کی علامات بتانے کے لئے تھائی کا خواہاں ہو۔ اترا ہوا چہرا، جھٹی جھٹی آنکھیں، کپکپاتے ہاتھ، ٹھنڈا چیچھا پیوت۔ یہ سب کچھ حلق اور جنسی بے اعتدالیوں کے باعث ہو، ذہنی و جسمانی اظہار کی حساسیت۔

فاسفورس (Phosphorus): بزدلی یا غیر مستقل مزاجی، جنسی بے اعتدالیوں یا حلق کے باعث، تپ دق میں بار بار جھٹکا ہونے کا، رحمان، قشید، باتونی، ہڈیانی، رونے والا، اداس، ہسٹریائی، دماغی طور پر کمزور، قاترا، عقل۔

اورم میت (Aurum Met): اتحاد درجے کا مایوس، خود سے تنفر، خود کشی کرنا چاہے لیکن مرنے سے ڈرے، مرد مریض لعنت طاعت کرے اور بد دعائیں دے، عورت مریض سسکیاں بھرے اور روئے۔ دونوں کی نیند کٹی ہو۔ عورتیں سوتے میں سسکیاں بھریں جبکہ مرد قسمیں کھائیں، خود کو لعنت طاعت کریں۔ خود کو شرم دلائیں۔ اپنے اوپر تنقید اس دوا کی اہم طاقت

ہے۔ تصور کرے کہ وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ ہر کام غلط کرے، محسوس کرے کہ اس نے اپنے دوستوں کو اور اپنے فرائض کو نظر انداز کیا ہے اس لئے اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔

**سپیڈیا (Sepia):** مریضہ اپنی صحت اور اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں مفہوم رہے، غیر ارادی طور پر ہنسے اور رونے کے دورے۔ بہت زیادہ چڑچڑاپن جو بے رمی سے بدل جائے، اکیلا رہنے کا خوف جبکہ رفاقت سے اشتعال پذیری ہو۔ حقیقی یا تصوراتی برائیوں سے پریشانی خوف کے ساتھ۔

**نیٹرم میور (Natrur Mur):** اداس اور روتے بسورتے مریضوں کے لئے جو دل جوئی کو پسند نہ کریں، اور جو ان کی دلجوئی کرے اس سے شدید نفرت کریں۔ غمگین، کم خن، زندگی سے تھکا ہوا، کہندہ پرور، منتظر، معمولی باتوں سے تحریک میں آجائے۔  
**کونیم (conium):** جماع سے اجتناب کے باعث مرقی حالت (یا مائینولیا)۔

### ہسٹیریا (Hysteria)

**انگیشیا (Ingriatia):** بھراؤ کا احساس، سینے میں واضح کھنچاؤ کے ساتھ، ناقابل بیان بو کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی طرح صاف پیشاب ہو۔ بے اختیار ہنسی کے دورے، پٹوں میں جھٹکے لگیں اور شے پھڑکیں۔ باری باری ہنسی کے اور رونے کے دورے، مرض کے حملہ کے دوران بدر ہجرا استعمال کریں اور بعد میں اونچی خوراکیں، ہسٹیریا کی لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ ایسی عورت جو اپنے بچے یا شوہر کو کھو دے اور اس کے باعث درد سر، کپکپاہٹ، بے خوابی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ وہ خود پر قابو پانے کے قابل نہ ہو، خیال کرے کہ اس نے اپنی کسی ذمہ داری کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ توقعانہ حرکتیں کرے جن پر اسے بڑا ناز ہو اور اسی طرح سے نمائش کرے، جوش میں پاگل ہو رہی ہو، اگر یہ تکلیف انگیشیا دینے کے بعد بھر عود کر آئے تو نیٹرم میور دی جائے جو کہ انگیشیا کی مزمن دوا ہے۔

**اکٹیرا رسی موسا (Actea Racemosa):** اعصابی اور عضلاتی دونوں نظاموں سے متعلق ہسٹیریا کی اینٹھن، عظیم دباؤ، حیض سے قبل تمام علامات میں زیادتی ہو۔ اس دوا میں مرض کی وجوہات عموماً حیض میں بے قاعدگی یا دوسرے رحم سے متعلق امراض ہوتے ہیں۔

**ایسا فوئیدا (Asafoetida):** جب ہیٹ میں باؤ گولہ اٹھنے کے باعث دورہ (ہسٹیریا کا) ہو، دورے کے دوران کھائی ہوئی غذا کی تہ ہو۔ پیشاب کی تکلیف، باؤ گولہ کے ہسٹیریا کے ساتھ غذا کی نالی میں دباؤ اور گلے میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ مٹی، مسلسل نلگتے رہنے کے ساتھ۔

سیکیوٹاوائروسا (Cicuta Virosa): بے ہوشی کے ساتھ۔ غیر ارادی طور پر پنوں میں خاص طور سے بازوؤں اور انگلیوں کے پنوں میں پھڑکن ہو اور جھٹکے لگیں۔

پوتھوس (Pothos): مدد کچھ کے دس قطرے دیئے جائیں، ہسٹیریا کے لئے مخصوص دوا ہے۔

کینامونیئم (Cannamonium): جب درد ڈکاروں، متلی اور تے کے ساتھ 'متم ہو' حیض کے دوران خون بہت زیادہ مقدار میں اور زیادہ عرصہ تک جاری رہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): 'تشیخ'، 'غشی'، 'باؤ کولہ'، 'رحم کے حصہ میں نیچے کی جانب دباؤ'، 'رحم کا تشیخ'، 'کمر میں درد کے ساتھ سیاہ رنگ کے حیض'، 'ہر پاخانہ کے بعد اور رجمی تشیخ کے بعد'، 'لیکوریا'، 'ہائمر'، 'خراب ہو'، 'رات کے کھانے کے وقت غشی'، 'ڈکاروں سے بہتری ہو'، 'حرکت کرنے سے دل کی دھڑکن بہتر ہو۔

سینسیو اورینس (Senecio Aurens): حیض کے دب جانے کے باعث ہسٹیریا۔

ایپیکاک (Ipec): متلی اور تے کے ساتھ ہسٹیریا۔

ویلیریا (Valeriana): اعصابی ہیجان، جھن سے نہ بیٹھ سکے، حرکت سے پھاڑنے والے دردوں میں سکون ہو۔

نکس موسکاتا (Nux Moschata): یادداشت کا کھو جانا، ماضی کے واقعات کو بھول جائے، بھول جائے کہ وہ سارا دن اپنے بیٹے سے باتیں کرتی رہی ہے۔ جب تکلیف ہو تو بھول جائے کہ وہ ابھی کیا کام کر رہی تھی۔ غنودگی اور غشی، مریض کی حالت میں پریشانی کے باعث اضافہ ہو جائے، ارد گرد کا ماحول عجیب و غریب معلوم ہو۔ خواب ناک اور فرضی ماحول، مریض غیر حاضر دماغی کی حالت کا شکار ہو، نیند کا غلبہ اور آخر کار گہری بے ہوشی، جذبات و احساسات کے جاتے رہنے کے ساتھ۔ بدلتا ہوا مزاج، ایک وقت میں ہنسے اور پھر ساتھ ہی رو دے۔ کچھنے میں غلطیاں کرے، چیزیں اپنی جسامت سے بڑی یا لمبی دکھائی دیں لیکن غور سے دیکھتے رہنے پر اپنی اصلی جسامت میں واپس آجائیں۔ جسمانی اذیت میں مبتلا ہو، سر اور ٹھوڑی سینہ پر گرے، سر بوجھ سے گھومے، منہ اور گلا خشک ہو، دل دھڑکے، بے تحاشہ اچھارہ ہو۔

ہائیسو سائیکس (Hyoscyamus): معمولی اینٹھن یا بغیر اینٹھن کے ہسٹیریا کے دورے، بے ہوشی کے ساتھ لمبے دورانیہ کے دورے جن کا اختتام دو یا تین روز میں ہو، مریض دوروں کے دوران کبھی ہنسے اور کبھی روئے، پیٹ پر بھی انگلی کا چھوا جانا برداشت نہ کر سکے۔

ماسکس (Moschus): اس وقت یہ دوا موزوں ہوتی ہے جب مریض جلد جلد بے ہوش ہو جائے، ایک رخسار سرخ اور ٹھنڈا ہو اور دوسرا رخسار پیلا اور گرم، 'پر جوش'، 'اعتد ملامت

کرنے والا، ٹھنڈے غشی، حلق اور پیچھڑور کا تشنج۔

پلائینا (Platina): شدید جنون اور ہست ہی زیادہ سنگبرانہ مزاج اس دوا کی علامت ہے (بے نخوت و تحارت آمیز مزاج)۔

لیلیئم ٹگرینم (Lilium Tigrinum): ہسٹریائی مستورات کے لئے، مریضہ مشکل ہی سے منڈیانہ ٹھنڈہ کر سکے۔ ابتدا درجے کا چڑچڑاہٹ، خیالات و تصورات کی دنیا میں گم، یا گل پن، مذہبی مانگو، تصورات، دل کی تکالیف کے ساتھ۔ دباؤ ہو نیچے کی جانب، یوں محسوس ہو کہ تمام اندرونی اعضاء نیچے کی جانب کھینچ رہے ہیں۔

کیسٹوریم (Castoreum): نامکمل ہسٹریا کے آغاز میں اعصابی دورے، اعصابی قویج، استثنائی تھکاوٹ کے ساتھ پشوں میں پھرنے، دہانے سے درد میں افادہ ہو، حیض کا قویج پہلے پن اور ٹھنڈے پیدینوں کے ساتھ۔

تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): ہسٹریا کے باعث جب چہرے اور بازوؤں پر سوجن ہو، حیض کے وقت دورے ہوں، ہسٹریائی دوروں کے رجحان کا علاج درج ذیل ادویات سے کیا جا سکتا ہے:

ذکم وال 30، سیپیا 30، ماسکس 6، کلی فاس 30 اور سکوٹیلریا (Scutellaria) ٹیچریا سیلی ڈائلوشن (1st Dilution)۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): شوق النفسی کے ساتھ ہسٹریا، غشی کے دوروں کے ساتھ، بے چینی اور تھکاوٹ حرکت سے۔ 200 یا اوپر کی پوٹینسی کی دوا دیجئے۔

نٹرم میور (Natrium Mure): یہ دوا انگیشیا کی مزمن ہے، جب انگیشیا غیر مؤثر ہو جائے تو یہی دوا دی جانی چاہئے۔ باری باری ہنسے اور روئے۔ خود پر اور اپنے جذبات پر قابو پانے کے قابل نہ ہو، مریضہ شادی شدہ مرد کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ یا پھر گھریلو ملازم، کوچوان وغیرہ سے محبت کرنے لگے، وہ جانتی ہے کہ یہ عقل مندی نہیں لیکن وہ خود پر قابو پانے سے قاصر ہو، اس دوا کے استعمال سے اس کا دماغ صحیح سوچنے کے قابل ہو جائے گا۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): بے قابو ہو کر گائے اور ٹاپے، ٹاپنے کی دیوانگی، سر کو جھٹکے، بال کھینچنے، کپڑے پھاڑے اور چیزیں برباد کرے، خود کو اور دوسروں کو مارے، بوڑھے لوگوں کو ان کی عمر کے بارے میں مذاق کرے، دورے غیر طبعی نیند پر ختم ہوں۔

کونیم (Conium): ہسٹریا، جماع سے اجتناب کے باعث۔

کاسٹیکم (Causticum): حیض کے دوران مرض میں اضافہ ہو، ٹھنڈی خشک ہوا لگنے سے تکلیف بڑھے۔

## ضعف عقل (فاتر العقلی)

(Idiocy)

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): علاج اس دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا 1 ایم (M) One ہر چند روز میں ایک دفعہ دینی چاہئے دیکر دی کئی ادویات کے ساتھ۔  
برشا کارب (Baryta Carb): فاطر العقلی کی چوٹی کی دوا ہے۔ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر پست رہ جائیں اور ان کی ترقی و نشوونما نہ ہونے پائے، ہیٹ پھولا ہوا، جلد سردی لگ جائے، گلے کے غدود میں سوزش، اس کی جگہ ٹیوبرکولینم ایک ایم (IM) ڈائیکلوٹن بھی دی جاسکتی ہے۔  
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): تشویش مند، جوں جوں شام ہوتی ہے، تکلیف میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلائل کے کھو جانے سے اور بد قسمتی سے خوف زدہ، بھٹکنے (یا دوا داشت گم کردہ) پریشان اور پست حوصلہ۔ پریشانی دل کی دھڑکن کے ساتھ، خد اور بیلا پن۔  
برشامیور (Baryta Mur): بچے، جو منہ کھول کر چلتے ہیں اور ناک میں بولتے ہیں، بے وقوفی چہرے سے جھلکتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): کمزور، دبیلے پتلے اور فقر الدم (خون میں سرخ ذرات کی کمی) کے مریض، چہ چہ، ہمیشہ کہیں نہ کہیں جانے کے خواہش مند۔  
سیفی لینم (Syphilinum): یہ متبادل دوا ہے، جب ٹیوبرکولینم (Tuberculinum) اور برشا کارب (Baryta Carb) مکمل طور پر فائدہ نہ دیں، یا جب یہ دونوں دوائیں غیر موثر ہو جائیں، یہ دوا مذکورہ بالا دیکر ادویات کے ساتھ بھی قیمتی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔  
ایٹھوزا (Aethusa): فاطر العقلی بچے جو ذہنی بھراؤ کے باعث مکمل مل نہ سکیں۔ اگرچہ ایک حد تک محنت کریں لیکن امتحان کے لئے زائد مطالعہ کو بے فائدہ خیال کریں۔ ذہنی اتھری، جو کچھ سیکھیں اسے یاد نہ رکھ سکیں۔

## تحرکات (Impulses)

آئیوڈیم (Iodum): گرم مزاج مریضوں میں شدید تحرکات، جو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا میں رہنا چاہیں اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا چاہیں۔ کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ یا تک کے مارنے کی تحریک، بغیر کسی وجہ کے خود کو مار ڈالنے کی تحریک، لیکن مریض مزاحمت کرتا ہے، ناقابل ضبط اور اچانک تحریک، کسی بھی شخص کو قتل کرنے یا کسی بھی چیز کو برباد کر دینے کی فراہم ہو جانے کی تحریک۔



اورم میٹ (Aurum Met): کسی اونچی جگہ سے یا کھڑکی سے گر کر خود کشی کا ارتکاب کرنے کی تحریک 'خود کشی کرنے سے متعلق خیالات' چھلانگ لگانے کی تحریک۔  
نکس وامیکا (Nux Vom): خود کشی کا ارتکاب کرنا چاہے لیکن ہمت نہ ہو 'مریضہ کے اندر اپنے بچے کو آگ میں جھونک دینے کی تحریک۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): حجام میں تحریک 'ہو کہ سرد مزاج ہوں اور گرم کمرے میں رہنا چاہیں' شیو کرتے ہوئے اپنے گاہک کو استرے کے ساتھ قتل کر دینا چاہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): دریا میں یا کھڑکی سے چھلانگ لگا دینے کی تحریک۔

لائی سین (Lyssin): ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو اپنے جسم میں گھونپ دینے کی تحریک۔

اسٹیلگو ایم (Ustilago M): خود کشی کی تحریک 'خاص طور سے ذوب کر۔

البومنا (Alumina): تیز دھار والا اوزار یا خون دیکھ کر خود کو قتل کر دینے کی تحریک۔

پلاٹینم (Platinum): اپنے بچے کو قتل کر دینے کی تحریک 'اپنے خاوند کو جس کے ساتھ وہ (جذباتی) پر جوش محبت کرتی ہے اور جس کے ساتھ کامل طور پر خوش ہے' قتل کر دینے کی نہ رکھنے والی تحریک۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): کسی ایسے شخص پر چیزیں پھینکنے کی تحریک جو انتہائی معمولی اور تصوراتی طور پر برہمی کا باعث بنا ہو۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): بغیر کسی جرم اور بغیر کسی وجہ کے قتل کا ارتکاب کرنے کی شدید تحریک 'اس دوا اور آرسنک البم (Ars Alb) کے طریق کار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ہر دو ادویات میں ٹھنڈ سے خشکی و ٹھنڈک اور حساسیت پائی جاتی ہے۔ ان کے مریض گرمی اور تپش کو پسند کرتے ہیں' جبکہ آئیوڈیم (Iodium) کے مریض گرم مزاج ہوتے ہیں اور سرد فضا کو پسند کرتے ہیں۔

مرکیورس سول (Mercurius Soli): 'مریضہ خود پر تنقید کرنے والوں کو قتل کر دینا چاہے' قتل یا خود کشی یا پرتشدد کاموں کے ارتکاب کی تحریک۔ تحریکات کی تکمیل کرنے میں عقل کھو دینے کا خوف۔

## بے رخی، بے اعتنائی، لاپرواہی

(Indifference)

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): ہر چیز سے بے اعتنائی، خوشی، غم، لوگوں وغیرہ کی کوئی پروا نہ ہو 'ایسی بے اعتنائی کا برتاؤ کرے کہ اچھے خالص متوازن افراد کا بھی دل توڑ دے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): زندگی کے معاملات سے بے اعتنائی، جب جنسی بے اعتدالیوں کے باعث ناتوانی لاحق ہو، تمام چیزوں سے ذہنی طور پر بے اعتنائی کا رویہ، زندگی میں اور باہر کی دنیا میں کسی قسم کی دلچسپی ظاہر نہ کرے۔

آرنیکا، سیکیوٹا (Arnica, Cicuta): دماغی چوٹ کے بعد۔

فاسفورس (Phosphorus): شراب نوشی کے برے اثرات کے باعث اپنے بہترین دوستوں سے بے اعتنائی، خود اپنے بچوں سے بے اعتنائی۔

سائی کلیمین (Cyclamen): سن یاس (جب چالیس سال کی عمر کے بعد عورتوں میں حیض آنا بند ہو جاتے ہیں) کے دوران دماغی خلل کے باعث بے رخی کا رویہ۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): ان اشخاص سے بے رخی جن سے مریض بہت زیادہ محبت کرتا ہے جبکہ اجنبیوں کو پسند کرے۔

سیپیا (Sepia): مریض اپنے خاندان اور جن سے وہ زیادہ محبت کرتی ہے ان سے بے رخی و بے اعتنائی برتے۔

## دیوانگی (مالینخولیا)

(Insanity "Melancholia")

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): مریض جھگڑاؤ، باتونی، بے چین (بھٹانے والا) ہو۔ کپڑے اتار دیتا ہے۔ وہ کینہ پرور اور مراقی ہوتا ہے۔ مضحکہ خیز اور بے ہودہ حرکتیں کرے، چاقو لے کر لوگوں پر چڑھ دوڑے، جن سے ملے انہیں مارے اور قتل کرنے کی کوشش کرے۔ آدمیوں کو سویر خیال کرے، جنگلی جانوروں سے کاٹے جانے کا مخصوص اور انوکھا خوف۔ مایوسی میں ڈوب کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ خیال کرے کہ وہ غلط جگہ پر ہے۔ بے وقوفانہ قہقہے لگائے، تقریباً ہر وقت خوش مزاج رہے۔ جلدی جلدی اور خوش مزاجی کے ساتھ باتیں کرے، تشدد، حاسد، جسم کو نیچا کرنے اور جنسی اعضاء دکھانے کی رغبت، عشقیہ اور فحش لگانے لگے۔

بیلادونا (Belladonna): جب کہ سر میں اختناق دم (دفور دم، خون کی زیادتی) ہو، آنکھوں میں خون اتر آئے اور مریض غصہ ناک ہو۔ کپڑے پھاڑے، کانٹے مارے، ٹھوکریں مارے، چیخے اور چلائے۔

ایسڈ فلور (Acid Fluor): دیوانگی کے اس مرحلے میں مریض سارا دن خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ منہ سے ایک لفظ تک ادا نہیں کرتا اور جب اسے بلایا

جائے تو مشکل ہی سے جواب دیتا ہے (پلسانیلا)۔

سٹرامونیم (Stramonium): حاد جنون، سرکی علامات کے بغیر جیسا کہ ہلاؤڈنا میں ہوتا ہے۔  
تصوراتی اشخاص اور چیزوں کو دیکھتے اور ان کی آوازیں سننے، مائیکولیائی، دہشت زدہ اور باتونی،  
روشنی کا خواہش مند، کھانے اور پینے سے پہلو تھی کرے، کہے کہ ان میں زہر ملا ہوا ہے۔ بے  
چین ہو اور کیکپائے، بلا ارادہ پیشاب، پاخانہ ہو جائے، حمل کے دوران جنون۔

ایگریکس (Agaricus M) بے خوف، دھمکیاں دینے والا، تباہ کن دیوانگی۔ خود اپنے خلاف  
ہو جائے اور خود کو زخمی کر بیٹھے۔ پیشین گوئیاں کرے، اشعار کہے۔ خوشگوار اور لاپرواہی کا  
مزاج۔ یہ قوفانہ اور فضول باتیں کرے۔ بے موقع گائے اور سیٹیاں بھائے۔

اورم میٹ (Aurum Met): ذہنی کبروی، زندگی سے کوئی محبت نہ ہو، خود کشی کا ارتکاب  
کرنا چاہے۔ غم زدہ و افسردہ، اداس و دل شکستہ، نا اُمید، بے ہمت، خود کو اس دنیا کے لئے  
ناسوزوں خیال کرے، ہر وقت کڑھتا ہے، گرم موسم میں بہتری ہو جبکہ سردی میں علامات میں  
زیادتی ہو۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): دیوانگی کا ترقی پذیر فالج۔

سیلیشا (Silicea): انفلوآنزا کے بعد دیوانگی۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): مزاج میں اچانک تبدیلی کے ساتھ جنون، مریضہ خود کو  
اور دوسروں کو مارے۔ چیزوں کو پھاڑے، توڑے اور تباہ کرے، اچانک شدید اور تباہ کن  
تحریک، مریضہ دورہ ختم ہو جانے کے بعد افسوس کرے اور معافی مانگے، ڈرے کہ کچھ ہونے والا  
ہے، ایسی چیز سے ڈرے جس کا وجود ہی نہ ہو، خوفناک اشیاء کو دیکھے حالانکہ وہاں کچھ بھی نہ ہو،  
بالکل بے قابو ہو کر لگائے اور ناچے، سر کو جھٹکے اور بال لہرائے، بے چینی، آنکھیں پھیلی ہوئیں  
اور کھورتی ہوئیں۔

لیکیسیس (Lachesis): مذہبی جنون، خود پسندی، حسد و جلن، نفرت اور ظالمانہ مزاج اپنے  
آپ سے بے جا محبت، جلن (حسد) رکھنے والا، بدگمان۔ مریضہ جب بھی دو اشخاص کو سرگوشیاں  
کرتے دیکھے خیال کرے کہ وہ اسی سے متعلق بات کر رہے ہیں۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): مبالغہ آمیز خیالات کے ساتھ جنون، وقت بہت آہستگی  
سے گزرے، خلا (جگہ) لامحدود دکھائی دے۔

یوفوربیم (Euphorbium): گھوڑے کی دم پر عبادت کرنے پر اصرار کرے۔

آرسنک البم اور وریمٹرم البم (Ars Alb and Veratrum Alb): یہ دوائیں ہر دو گھنٹے  
کے بعد بدل بدل کر ایک ہفتہ تک دیجئے، جب دیوانگی دوہرے نوبتی بخار کے ساتھ ہو، مریض

نم آلود ماحول میں سکونت پذیر رہا ہو۔

**نایٹرم سلف (Natrum Sulph):** سر میں زخم کے باعث ہونے والی دیوانگی اور دماغی تکالیف۔

**لائی سین 200 (Lyssin 200):** دیوانگی درج ذیل دماغی علامت کے ساتھ 'پانی یا نہانے کو ناپسند کرے' یہاں تک کہ پانی پینے کی خواہش بھی نہ ہو 'اپنے مکان کی پھٹ پر سے کود جانا چاہے۔

**کالی بروم (Kali Brom):** کسی خاص نام کو سن کر یا مخصوص چیز کو دیکھ کر تشدد پر اتر آئے۔  
**کاسٹیکم (Causticam):** شدید ہڈیان کے ساتھ 'جنون' دماغی تھکاوٹ 'نا اُمیدی' پھوڑے پھنسی کے بیرونی علاج سے انسداد کے بعد نا اُمیدی (یاسیت)۔

**برٹامیور (Baryta Mur):** بڑھی ہوئی اور طاقت ور جنسی خواہش کے ساتھ کسی بھی قسم کا 'جنون' عضلات کی بڑھتی ہوئی کمزوری 'بڑھتے ہوئے غدد کے ساتھ۔

**سائی کلیمن (Cyclamen):** جب حیض کے جاری ہونے سے مایوسیا میں افادہ ہو۔

**سلفر (Sulphur):** منتشر خیالات 'اپنے خیالات' مجتمع کرنے کے قابل نہ ہو۔ جلد باز 'تیز تیز چلے' اپنے کھانے پر تھوک دے 'زہنگی (وضع حمل) کا جنون یا دیوانگی' بچے کی پیدائش کے بعد تمام گھر کے افراد سے دلچسپی ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ بچے کو دودھ بھی نہ پالے۔ خاموش رہنا پسند کرے۔ 1000 کی پوٹینسی دیجئے۔

**کروکس (Crocus):** شدید غصے سے بے قابو ہو کر پھٹ پڑے اور اپنے بہترین دوست یا رشتہ دار کو قتل کرنا چاہے لیکن اس کے فوراً ہی بعد پشیمانی ہو 'بدلتا ہوا مزاج' روئے اور رونے کے فوراً بعد تھکے لگانے لگے۔

**تھوجا (Thuja):** مریض خود کو شیشے سے بنا ہوا خیال کرے اور اس لئے خود کو محفوظ کرنے کے لئے کانڈوں میں یا کسی دوسری ایسی ہی چیز میں لپٹے 'کسی بھی چیز کے چھونے سے نفرت کھائے کیونکہ وہ خوف زدہ ہو کہ وہ چیز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔

**میلی لوتس (Melilotus):** یہ دوا علامات کے درج ذیل امتزاج کی نشاندہی کرتی ہے:

1- مریض فرار ہو جانا چاہے 'خود کو قتل کرنا چاہے' کینہ پرور 'جو اس کے قریب آئیں انہیں قتل کی دھمکیاں دے' خیال کرے کہ اس کے پیٹ میں کوئی شیطان بیٹھا ہے جو اس کی ہر بات کی تردید کرتا ہے۔

2- مریض چھپ جانا چاہے۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ دوسرے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔  
1- صابی 'بزدل' بلند آواز سے نہ بولے جیسے کہ وہ خوف زدہ ہو 'بے خوابی۔

3- فرار اور خود کو قتل کر دینے کی دیوانگی۔

4- مذہبی مانگولیا۔

دریٹرم ایلیم (Veratrum Alb): چیزوں کو برباد کر دینے کی خواہش، اپنے کپڑے پھاڑ دینا چاہے، واضح علامت شدت اور بربادی ہے۔ گھٹنوں پر کھڑا ہو کر گھٹنوں عبادت کرے۔ اسے یقین ہو کہ وہ کوئی اوتار یا پیغمبر ہے۔ زچگی کا جنون اور ٹھنڈے گلے اور ٹھنڈے پسینے آنے کے ساتھ اینٹھن۔ ایک تنائی مریضوں کے صحت یاب ہونے کا دعویٰ اسی دوا کے ذریعے موجود ہے۔ مذہبی جنون، دلجوئی کئے جانے کے ناقابل، کمرے میں ادھر ادھر بھاگے۔ زمین کو تکتا رہے یا پھر ایک کونے میں بیٹھ کر کڑھا کرے۔ گریہ و زاری کرے اور روئے۔

سیپیا (Sepia): انتہا درجے کو پہنچی ہوئی دیوانگی، بد ہنسی اور قبض کے ساتھ، گرم مزاج مریض، 200 پوٹینسی کی خوراک دیتے (200 Dilution)۔

سٹیفی سیکریا (Stephisagra): حلق کے باعث جنون، جو بھی مریض کے قریب آئے اسے لعنت ملاست کرے اور گالی بکے۔

فاسفورس (Phosphorus): حلق یا حد سے زیادہ جنسی عیاشیوں کے باعث جنون، سل (پتھیزوں کا دق) کے باعث جنون، دماغی اور ریڑھ کی ہڈی کے اور دیگر امراض کے باعث جنون۔

آئیوڈیم (Iodium): جنون کے آخری مراحل، جب اندیشے انتہائی تیز رفتاری سے دماغ میں پہنچتے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی وہ کیا سوچ رہا تھا اور پریشان (تشویش مند) ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دماغ آرام نہیں کرے گا۔ سوچوں کے دماغ میں آنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ کھانے کے دوران جب مریض کھا رہا ہو تو ذہن میں خیالات کا ہجوم ہوتا ہے۔ باتونی پن، خیالات دماغ میں اتنی تیز رفتاری سے آتے رہتے ہیں کہ مریض گھٹنوں، جوش اور ضرورت سے زیادہ اعتماد کے ساتھ بول سکتا ہے۔ فیب دانی۔

ایناکارڈیم (Anacardium): یادداشت کے بہت زیادہ کمزور ہو جانے کے ساتھ جنون، ارتکاز توجہ میں مشکل، سرد مری، مراق، مانگولیا وغیرہ۔

اورم آرسنک (Aurum Arsi): تعصب کا جنون، شرابیوں اور مذہبی لوگوں کا جنون، افسوس ناک باتونی پن اور قمقمے، زندگی سے شدید نفرت، انتہا درجے کا چڑچڑاہٹ، ٹیلا (ضدی) اور جلدی سے ناراض ہو جانے والا، غلط کام کرنے پر خود کو ملامت کرنے والا۔ تصوراتی زخم گلے پر دوسروں کو ملامت کرے۔

یوفو (Bufo): کانٹے کا راجحان۔

### حسد (جلایا) (Jealousy)

ہائوسامیئس (Hyoscyamus): حسد کرے، قتل کرنے کی کوشش کے ساتھ، غصے اور بد اعتمادی کے ساتھ حسد، شہوانی جنون کے ساتھ حسد، حسد کے بد اثرات۔  
 ایشپس ایم (Apis M): منہجرات میں، شکوک و شبہات اور حسد، تجش، گرم کمروں اور گرم پانی سے غسل سے علامات میں زیادتی ہو۔  
 لیکسیس (Lachesis): ڈراؤنے تصورات کے ساتھ، منہ پڑانے کے رجحان کے ساتھ۔  
 مضحکہ خیز اور بودے خیالات کے ساتھ۔ بیماریوں کے باعث، بیوی اپنے خاوند پر اعتماد کرے یا خاوند اپنی بیوی پر اعتماد کرے، بیش اس کے افعال و حرکات پر کڑی نظر رکھے۔ پریشانیوں کا منتظر رہے۔ شکوک اور جلایا لڑکیوں میں، اپنی سہیلیوں پر شک کرے۔  
 پلساٹیلہ، نکسس و امیکا، سٹرامونیم (Pulsatilla, Nux Vom, Stramonium): دی گئی ترتیب سے انہیں آزمائیں، اگر اوپر والی ادویات ناکام ہو جائیں۔

### محبت میں مایوسی

#### (Love- Disappointment)

ایسڈ فاس (Acid Phos): محبت میں مایوسی کے باعث جب غنودگی ہو۔  
 ہیلےبوریس (Helleborus): محبت میں مایوسی کے باعث جب حیض میں کمی واقع ہو جائے۔  
 ہائوسامیئس (Hyoscyamus): محبت میں مایوسی کے باعث، مرگی ہو، ہنسی کے دوروں کا رجحان ہو، مانگو لیا ہو، یہ دوا ذوق کر خود کشی کرنے کے رجحان میں بھی مفید ہے۔ حسد (جلایا) جلایے کے ساتھ ناخوش گوار محبت۔  
 اگنیشیا (Ignatia): جب محبت میں مایوسی کے نتیجہ میں خاموش غم کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایک حساس جوان لڑکی محسوس کرتی ہے کہ اس نے اپنی محبت کھو دی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ جوان مرد نے اسے مایوس کیا ہے، اس دوا سے وہ مطمئن اور معقول ہو جائے گی۔  
 نیٹرم میور (Natrurn Mur): مایوس محبت، اس وجہ سے تعلق کو توڑ دینا چاہے لیکن توڑ نہ سکے، اس دوا کو اگنیشیا کے ناکام ہو جانے پر آزمائیں۔

## محبت میں گرفتار ہونا

(Love- Falling in)

نیٹرم میور (Natrur Mur): جب محبت کم کر دینے کا احساس ہو تو یہ دوا دی جائے ' جذبات پر قابو نہ پاسکے اور شادی شدہ مرد کی محبت میں گرفتار ہو جائے یا گھریلو ملازم کی محبت کا دم بھرنے لگے حالانکہ عام حالات میں وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اس لئے کچھ نہیں کر سکتی ' اپنے اوپر قابو نہیں پاسکتی ' اس دوا کا استعمال اس کی دماغی حالت کو صحیح کر دے گا۔

## دروغ گوئی — (Lying)

اوپیم (Opium): یہ دوا ایسے اشخاص کے لئے مفید ہے جن کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہو۔  
گلکیریا کارب (Calcarea Carb): چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان۔  
مارفینم (Morphinum): دروغ گوئی سے کام لے ' پڑ پڑا اور غلطیوں کا مصلحتی ' خواب کی کیفیت۔

## پاگل (جنون) — (Mania)

(نیز دیکھئے "دیوانگی")

برٹا میور (Baryta Mur): پاگل پن کی کوئی بھی صورت ' بڑھی ہوئی بھنی خواہش کے ساتھ۔

میلی لوتس (Melilotus): بھاگ جانا چاہے یا خود کو قتل کر دینا چاہے ' کینہ پرور ' جو بھی اس کے قریب آئے اسے قتل کی دھمکیاں دے ' مذہبی مانگوں یا۔

سٹرامونیم (Stramonium): شدید پاگل پن قتل کے ارتکاب کے رجحان کے ساتھ۔ پھر اگھونپے اور کانٹے کا رجحان پریشانی کے ساتھ ' کسی سو رکھ کی طرح اپنے منہ سے زمین کریدے ' روشنی اور رفاقت کی خواہش ' ہاتھ ایک دوسرے میں ڈال کر بھیچے ' دوران حمل ' مذہبی پاگل پن ' ہر وقت عبادت کرنا چاہے ' بہت زیادہ باتونی پن ' بے سرو پا اور فضول خیالات کا اظہار کرے ' ہڈیاں کے ساتھ فریب نظر ' زچگی کا پاگل پن۔ باتونی بہت زیادہ باتیں کرے ' خود کو ادر ادر گرا کر پھرے ' روشنی میں علامات میں اضافہ ہو اور اندھیرے میں افاقہ ہو۔

کوکولس انڈیکا (Cocculus Ind): جب حیض کی بندش کے باعث جنون ہو جائے۔



ہائوسکیمس (Hyoscyamus): مسمومہ خیز، نگا رہتا چاہے، کپڑے اتار دے، حسد (جلاپا) کے ساتھ پاگل پن، احمق۔

ویرٹرم ایلیم (Veratrum Alb): ہر شے کو کاٹنا اور پھاڑنا چاہے، ہر آدمی کا بوسہ لینا چاہے، تشدد، مذہبی جوش و جنون کی کیفیت۔

لیکیسیس (Lachesis): گھر کی بربادی کے بعد پاگل پن، مرگی کے حملے سے پہلے جنون، مذہبی پاگل پن، بد معاشی و بد اطواری سے بچنے، خود پسند و متکبر، دوسروں سے حسد کرے اور نفرت کرے اور ظلم کرے، مریضہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنی روحانی بربادی کی کہانی سنا کر جھنجھلا دے۔ اس کی تمام دہشت زدہ کردینے والی حرکتوں سے اس کے رشتہ دار و عزیز و اقارب جھنجھلا جائیں، مریضہ خیال کرے کہ اس سے ایسے ناقابل معافی گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن کے نتیجہ میں اس کا جہنم میں جانا لازمی ہو چکا ہے جیسا کہ وہ مذہبی کتابوں میں پڑھ چکی ہے۔

اوپیم (Opium): دہشت ناک خوابوں کے ساتھ پاگل پن، غیر منسوب رویہ۔

سپیا (Sepia): خون حیض کے بہت زیادہ مقدار میں بہہ جانے کے باعث جنون یا سن یاس کے زمانہ میں جب خون اچانک بند ہو جائے اور خاندان کے لوگوں سے دلچسپی باقی نہ رہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): حیض کی بندش کے دوران جنون۔

بیلادونا (Belladonna): ایک وقت میں خوش ہو لیکن تھوڑی ہی دیر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر تھوکنے اور انہیں کانٹے لگانے لگے، اس مرض کی علامات سٹرامونیم اور ہائوسکیمس کے بین ہیں ہوتی ہیں۔ جاگنے پر چوگے اور چھلانگ لگا کر گرے۔

مرکیورس (Mercurius): پاگل پن، رات کو کپڑے اتار پھینکے، کپڑے پھاڑے اور جھنجھکیاں دے، خود سے بہت زیادہ باتیں کرے اور خود کو جھنجھکیاں دے، مسلسل تھوکنے، جو تھوک اس کے پاؤں میں پھیلا ہوا ہو اس میں سے کچھ کو چاٹ لے، گائے کا گوبر اور جوہروں کا کیچڑ چاٹ جائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے لیکن اگر اسے چھوا جائے تو مزاحمت کرے۔ چلتے ہوئے پاس سے گزرنے والے اجنبیوں کو اپنی ناک سے پھونکے کی رغبت ہو۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): جنون، مریضہ پہلے جھنجھکا کرے اور پھر ہر کسی کو گالیاں بکے، جو چیز ہاتھ میں آئے اسے تباہ و برباد کر دے۔ اپنے کپڑے پھاڑے، بٹے اور گائے لگائے، بوڑھے لوگوں کو ان کی عمر سے متعلق چھیڑے، مذاق کرے، دورے کا انتظام بے ہوشی کی فیند پر ہو، ہر چیز کا حرکت میں رہنا پسند کرے۔ کسی شخص کو دیکھنا گوارہ نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کو بلا مقصد گھر کے گرد چکر لگاتے دیکھنا چاہے، وہ کسی آدمی کا بے کار ٹھننا اور ست ہونا پسند نہ کرے۔

سلفر فلسفیانہ پاگل پن، کچھ نہ کرنا، بے کار بیٹھے بس یہی سوچتے رہنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے اور وہ کیسے ہے؟ اور آخر میں قدرت خداوندی پر چھوڑ دینا لیکن پھر پوچھنا کہ خدا کو کس نے بنایا اور اس کا باپ کون تھا وغیرہ وغیرہ (نعوذ باللہ من ذلک)

اکٹیارلس موسا (Actea Racemosa): اعصابیت کے غائب ہو جانے کے بعد جنون۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): جنون، جس کے اختتام پر پینہ آئے۔

پلائینا (Platina): پریشانی کے بعد پاگل پن۔

آئیوڈیم (Iodium): خاموشی اور غور و فکر سے بہتری ہو۔

کلیسریا کارب (Calcarea Carb): مذہبی جنون، مذہبی ذہنیت، جنون کے باعث تناسب کی جس ختم ہو جائے۔

کیمفر (Camphor): آنکھیں جڑھ جانے کے ساتھ زچگی کا جنون، چمکتی اور گھورتی ہوئی

آنکھوں کے ساتھ، چہرہ پیلا اور ماتھا ٹھنڈا ہو جائے، گالیوں کی زبان میں بھاڑے، جھیاڑے، جلد خشک۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بے خوابی، کراوت اور جوش کے باعث جنون۔

اسٹیلگوایم (Ustilago M): نمانے کا جنون، خود کشی کا ارتکاب کرنے کی تحریک، خصوصاً ڈوب کر۔

مالینخولیا — (Melancholia)

(دیکھئے ”دیوانگی“)

یادداشت — (Memory)

(دیکھئے ”غیر حاضر دماغی، بھول جانا“ اور ”سوچنا“)

کنجوسی۔ بخل — (Miserly)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): حرص و لالچ اور کنجوسی کی عادت کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): کنجوس، لالچی و حریص، بے اعتبار، غیر حاضر دماغ اور پست حوصلہ۔

آرسنک الیم (Arsenic Alb): اوپر دی گئی ادویات جب ناکام ہو جائیں تو یہ دوا کنجوسی کی عادت کو دور کرتی ہے۔

## غلطیاں (Mistakes)

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): حساب کرنے میں غلطیاں کرے، اجزائے الفاظ میں، الفاظ کے استعمال میں، جہوں میں اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔  
 نکس واما (Nux Vom): ماپنے اور وزن کرنے میں غلطیاں کرے۔  
 گلوٹائن، نکس موسکاٹا، پیٹرولیم (Glonoine, Nux Mos, Petroleum): محل وقوع میں غلطیاں کرے (ان ادویات کو دی گئی ترکیب کے مطابق استعمال کریں)۔  
 نیٹرم میور (Natrur Mur): بولنے میں اور لکھنے میں غلطیاں کرنے کا رجحان۔  
 کینابیس سیٹوا (Cannabis Sat): لکھنے اور بولنے میں غلطیاں کرے اور جو کچھ پڑھے یا سنے اس کی صحیح تفہیم نہ ہو۔  
 چائنا (China): لفظوں کا غلط انتخاب کرے اور الفاظ کو غلط جگہ استعمال کرے۔  
 لیکسیس (Lachesis): الفاظ لکھنے میں غلطیاں کرے۔  
 تھوجا (Thuja): پڑھنے اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ اتنی آہستہ آہستہ بولے کہ جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔  
 زبروقاٹلم (Xerophyllum): بودا، ذہن کو مطالعہ کی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ ناموں کو بھول جائے۔ الفاظ کے بعد والے حروف کو پہلے لکھ جائے۔ معمول کے الفاظ کے سچے چھوڑ جائے۔  
 ایومنا سلی کیٹ (Alumina Silicate): بولنے میں اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ بھٹکڑ، یکسو (بے اعتنائی برتنے والا)، نمذیب (غیر مستقل مزاج)، قلت خیال (خیالات کی کمی)۔

## ہنسی اڑانا (منہ چڑانا)

### (Mocking)

لیکسیس، پلائٹینم (Lachesis, Platinum): اپنے رشتہ داروں اور دوسروں کا مذاق اڑائے، دی ہوئی ترتیب کے مطابق آزمائیں۔

## اعصابیت (گھبراہٹ)

### (Nervousness)

کیلڈیم (Caladium): اشتہا درجے کی اعصابیت، اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو، پڑ

شعور خیالات کے ساتھ تمام رات جاگا کرے۔ تشویش، خاص طور سے سونے سے قبل، مستقبل سے متعلق خوف زدہ ہو، احمقانہ ہنساوری، دروازہ بند ہونے کی آواز یا اخبار کی کھڑکھڑاہٹ سے چونک جائے۔

آئیوڈیم (Iodine): انتہا درجے کی اعصابیت، چیزوں کو دور پھینکے اور انہیں توڑے، لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مارنا پینا چاہے۔ بھلکڑپن، کمزوری اور چڑچڑاپن۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): مسلسل غم کے باعث اعصابی کمزوری، دماغی مشقت، جنسی بے اعتدالیاں یا جسمانی یا ذہنی کھنچاؤ۔

کیسٹوریم (Castoreum): ثانی فائیڈ بخار کے بعد اعصابیت اور چڑچڑاپن، نامکمل ہسٹریا سے پہلے اعصابی حملے، انتہا درجے کی تھکاوٹ کے ساتھ پنوں کی پھڑکن۔

ایپس ایم (Apis M): اعصابیت لڑکیوں میں، بے چینی اور ہوانگی، جنگلی کے ساتھ، غلط موقع پر نہیں، کام کرنے میں تلون مزاجی، بھونڈا پن، چیزیں گرائیں اور پھر نہیں۔

کالی فاس (Kali Phos): اعصابیت کے لئے عمدہ اور چوٹی کی دوا ہے۔

لیک سینم (Lac Can): غیر معمولی حساس، مثال کے طور پر ایک مریض کئی روز تک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کئے پڑا رہتا ہے اگر وہ ایک دوسروں سے مس ہو جائیں تو غضبناک ہو جائے۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): ذرا سے شور سے گھبرا جائے، دروازہ بند ہونے کی آواز سے گھبرا جائے، اعصابی اشتعال اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ دل کا دھڑکنا، کانڈ کی کھڑکھڑاہٹ سے بھی دل دھڑکنے لگے اور چڑچڑاہٹ ہو، موسیقی سے خود کشی کا رجحان پیدا ہو۔

کافیا (Coffea): اعصابی اشتعال انگیزی، بے خوابی، ہڈیانی رونا، اعصابی درد ہوں، عضلات کا پھڑکنا، دانتوں کا درد، چہرے کا درد، چہرہ سرخ ہو اور سر گرم ہو، خوشی یا خوشگوار حیرت سے یا کسی عظیم مقصد کی خاطر محنت کرتے ہوئے سر گرم ہو جائے اور چہرہ سرخ ہو۔

کولو سنٹھس (Colocynthis): اعصابی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن، خصوصاً کاروباری معاملات میں خرابی کے باعث یا کسی عورت کے اپنے خاوند کی دن رات نگرانی کے باعث جو اسے دوسری عورتوں سے بچانے کے لئے اس کی نگرانی کرتی ہو۔

کونیم (Conium): رائیڈ عورتوں اور رائیڈے مردوں میں اعصابیت جو اچانک جنسی مشاغل سے محروم ہو جائیں، ذہنی اور جسمانی کمزوری، توجہ مرکوز نہ کر سکیں، پنوں میں لڑزش، جھٹکے اور پھڑکن، اعصابی مریض، حالت خراب ہو جائے، زندگی سے تھکاوٹ۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): اعصابیت اور ذہنی تھکاوٹ، آرام کرنے سے، مستقل حرکت سے

اور تیز تیز چلنے سے حالت زیادہ خراب ہو جائے، مریض میں ظالمانہ مزاج اور چڑچڑاہٹ پن پاتا جائے۔

کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): اعصابیت، کیکپاہٹ اور کمزوری، قوت حیات کی اچانک اور شدید کمزوری، باتونی پن۔

اورم میٹ (Aurum Met): غم زدہ ہو اور خود کو ناقابل قبول شخصیت خیال کرے۔ کسی بھی چیز سے مطمئن نہ ہو، مانگولیا کا مریض، خود کو اس دنیا کے لئے ناموزوں خیال کرے، موت کا شائق ہو کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہو گی۔ جھگڑالو، چڑچڑا، بھلایا ہوا، معمولی سے اختلاف کو بھی برداشت نہ کر سکے۔

کیمفر (Camphor): یہ دوا انتہا درجے کی اعصابیت کے لئے ہے۔ شروع میں تشدد، اشتعال اور جنون ہو اور بعد میں چڑچڑاہٹ تو ختم ہو جائے لیکن بے ہوشی اور ٹھنڈک کے ساتھ جو اس گم ہو جائیں، سخت تھکاوٹ اور نفاہت۔

نکس و امیکا (Nux Vomica): جھگڑالو، لعنت ملامت حتیٰ کہ تشدد کی بھی پرواہ نہ کرے، تیز خوشبو، تیز روشنی، شور اور باتوں کی آوازیں برداشت نہ ہوں۔ مدبذب، غیر مستقل مزاج۔

کوکولس (Cocculus): دیکھنے میں خوش باش لگے، اپنی صحت کی پرواہ کم ہی ہو، دوسروں کی عزالت کے متعلق زیادہ فکر مندی ہو۔ اعصابی نظام کی انتہا درجے کی چڑچڑاہٹ، ہلکا سا شور یا ناگوار آواز بھی برداشت نہ ہو۔ پاؤں اور ٹانگیں اکڑ جائیں اور تھوڑی دیر اسی حالت میں رہیں پھر ڈھیلی ہونے پر درود کریں۔ ذہنی اور جسمانی افعال سست ہوں، فالجی کمزوری میں اضافہ ہو۔

تھیرائیڈین (Theridion): اعصابی حساسیت کی بہت ہی بری حالت جس میں کمزوری، کیکپاہٹ، ٹھنڈ، پریشانی، غشی، جلد جلد جوش میں آ جانا اور ٹھنڈے پینے بھی ہوں۔ انتہا درجے کی اعصابیت اور چڑچڑاہٹ پن، آنکھیں بند کرنے سے حالت مزید بری ہو جائے۔

جلسی میم (Gelsomium): خوف، صدمہ اور پھسپھگی کے باعث حکالیف، ایک فوجی کے میدان جنگ میں جاتے ہوئے بے اختیارانہ دست لگ جائیں، دہشت یا دہشت کے ساتھ حیرت کے باعث بے اختیار پیشاب خطا ہو جاتا۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): اسہال کا اچانک حملہ، اس وقت جب مریض کسی دوست کو ملنے کی تیاری کر رہا ہو یا کسی اجنبی سے ملاقات کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہو یا ادھیرا (سٹیج وغیرہ) کے لئے تیار ہو رہا ہو، یہ سب اعصابی جوش کے باعث ہوتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): دماغی طور پر بہت زیادہ بھجانی، طرح طرح کی چیزیں مانگے لیکن پیش کی جانے پر انکار کر دے۔ کوئی چیز اس کے لئے موزوں نہ ہو اور کوئی چیز اسے مطمئن نہ کر

## ضعف اعصاب (اعصابی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ یا تھکاوٹ)

Neurasthenia (Nervous Prostration, Brain Fagor exhaustion)

(نیز دیکھئے ”ذہنی تھکان“ اور ”اداسی“)

کالی فاس: (Kali Phos): ضعف اعصاب کے لئے عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا خاص طور سے ایسے نوجوانوں کے لئے مفید ہے جو کمزور پیدا ہوئے ہوں یا جن میں اعصابی قوت کا فقدان ہو، شرمیلا پن اور احتلام، مجامعت کے بعد شدید تھکاوٹ اور جنسی طاقت میں کمزوری اس دوا کی اہم علامات ہیں۔

سٹرائچی کنیا فاس (Strychnia Phos): یہ دوا کالی فاس کے بعد اہم خیال کی جاتی ہے۔ اعصابی طاقت میں بے قاعدگی اس دوا کی علامت ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ اور بعض اوقات بہت کم اعصابی طاقت میں بے قاعدگی ظاہر ہوتی ہے۔ ذہن اور پنوں دونوں پر قابو نہیں ہوتا۔ یہ عام قلت خون میں بھی دی جاتی ہے۔

پیکریک ایسڈ: (Picric Acid): سٹرائچی کنیا فاس کے بعد اس دوا کا نمبر آتا ہے۔ ماضی اور جسمانی کمزوری اس کی بنیادی علامت ہے۔ اور مشقت کے باعث تکلیف میں زیادتی اس دوا کا رہنما کن طریق کار ہے، تھوڑی سی مشقت سے تھکاوٹ محسوس ہو، بولنے یا کچھ کرنے کی خواہش نہ رہے، لیٹے رہنا چاہیے، بھوک بہت کم، عمومی طور پر دلچسپی کا فقدان۔

امبرا گریسیا: (Ambra Grisea): مریض انتہائی ناخوشگوار چیزوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہو، یہ چیزیں اس پر مسلط ہوں اور وہ ان سے بچنا چھڑانے سے قاصر ہو، شدید تجسس، انتہائی ناخوش گوار چیزوں کے درمیان رہے جو اس پر مسلط ہوں اور وہ ان سے بچنا نہ چھڑا سکے۔ اعصابی شکستگی اور ذہنی تھکاوٹ، خاندان میں کسی کی موت یا کاروبار میں نقصان وغیرہ کے صدمے کے باعث۔

نیٹرم میور: (Natrium Mur): ماضی کی ناخوشگوار یادوں میں گھرا رہنا پسند کرے اور راتیں بستر پر جاگتے ہوئے ان پر کڑھنے میں گزارے، یہ دوا انیشیا کی مزمین ہے، اسی لئے اس کی تکمیل کرتی ہے۔

ار جینٹم نائٹریکیم: (Argentum Nit): جب کالی فاس ناکام ہو جائے تو اسے آزمائیں، خصوصاً جب ارتباط جاتا رہے، جب اعصاب و عضلات پر قابو نہ رہے، اور اس کے ساتھ ٹانگوں اور بازوؤں میں کپکپاہٹ ہو، جب کسی سے ملاقات کے لئے مریض کی ہمت بندھ جائے تو پریشان

ہو جائے، اندیشوں کے باعث پینت چھوٹ جائے، سب شادی پر جانا ہو یا اوچھرایا چہرچ میں جانا ہو تو اندیشے، خوف کے ہمراہ ہوں، حتیٰ کہ اس سال لاحق ہو جائیں، مٹھائی کی طلب ہو ہو کہ مریض کے لئے موافق نہ ہو، اعصابی بالنگولیا، ٹھنڈا لگنے کے ساتھ درد سر ہو اور کپکپاہٹ ہو ذہنی تھکان ہو اور چمکے آئیں۔ معمولی طور پر سر باندھنے اور دبانے سے درد سر میں افادہ ہو، حلق میں پھانسی کا احساس ہو، ڈکار آئیں اور گاڑھی رطوبت والی تے ہو، گیس ہو جائے جو کہ گرمی سے اور رات کے وقت زیادہ ہو۔

**زکیم فاس:** (Zincum Phos): دماغی و اعصابی تھکاوٹ جس کی وجہ مرگی یا اس کا غلط علاج ہو، یہ دوا کاروبار میں ناکامی کے بد نتائج اور طلبہ کے زیادہ دماغی محنت کرنے کے بد اثرات میں بھی مفید ہے۔ یادداشت کمزور ہو، سوچنے کی ناقابلیت، چکروں کے مسلسل حملے جو لیٹنے سے بہتر ہوں، مریض تھکا ماندہ ہو اور بے حس ہو، جنسی بے اعتنائیوں کے باعث نامردی۔ دوا لمبے عرصہ تک پوٹینسی بدل بدل کر جاری رکھنی چاہئے۔

**ہائپرکیم:** (Hypericum): کسی بھی قسم کی اعصابیت کے لئے، خواہ جگہ کی تبدیلی کے صدمہ کے باعث ہو یا کسی کار وغیرہ کے حادثہ کے باعث ہو، بولنے میں جھٹکے لگیں اور ہچکچاہٹ ہو، مریض خاموش رہے اور زندگی میں دلچسپی نہ رہے۔

**ایناکارڈیم:** (Anacardium): اعصابی تھکاوٹ، بے تحاشہ مطالعہ یا مادہ منویہ کے اخراج کے باعث، یادداشت کمزور ہو، محسوس کرے جیسے وہ ایک نہیں بلکہ دو ہے، محسوس کرے کہ اس کے ہر طرف اجنبی لوگ ہیں، اپنے خاوند کو اپنا خاوند اور اپنے بچے کو اپنا بچہ خیال نہ کرے۔ ذہن اور جسم میں جدائی ہو جائے۔ ایک ہی وقت میں مریض پر دو مختلف طرح کے اثرات مرتب ہوں۔ ایک نقصان پہنچانے کا دوسرا اچھائی کرنے کا، سب کچھ خواب لگے اور دنیا میں کچھ بھی حقیقی معلوم نہ ہو۔

**ارجنٹم میٹ:** (Argentum Met): یادداشت میں خلل واقع ہو جائے اور آدمی کی ذہانت والے حصہ میں بھی خلل ہو، فہم کی نااہلیت، سوچنے سمجھنے کی نااہلیت، تاجروں، طلبہ، قارئین و مفکرین میں ذہنی شعبوں میں محنت (اس مرض کا سبب بنتی ہے)۔

**اورم میٹ:** (Aurum Met): غم، مایوس کن محبت، دہشت، غصے، تنقید، بغض لگ جانے یا سخت شرم کے باعث ہونے والی تکالیف، مریض خاموشی سے اپنی حالت پر اور دنیا سے شدید نفرت پر کڑھتا رہتا ہے وہ کسی شخص کو اپنی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور اس طرح آخر کار خود کشی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

**کونیئم:** (Conium): ذہنی مشغلت نہ کر سکے، ارٹکار توجہ کا فقدان، کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے

سے قاصر ہو، 'تفہیم آہستہ آہستہ۔

ڈی جی ٹیلیس: (Digitalis): خوفناک پریشانی یا تشویش یا اندیشہ ناکی، اکیلا رہنا پسند کرے، اداسی، مانگو لیا، دل شکستگی، نا اُمیدی اور بے چینی ہو، مریض مذہب ہو، نبض بے قاعدہ، کمزور اور ست ہو، خود کو کسی کام میں مشغول نہ کر سکے۔

سائی پری پیڈیم (Cypripedium): طویل علالت کے باعث اعصاب شل ہو جائیں، چائے اور کافی کے بے تحاشہ استعمال سے اعصاب پر برا اثر، ذہنی اشتعال سے، جس کے بعد انفلوئنزا ہو۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): حوادث کا شکار ہونے والے لوگوں میں بے تحاشہ پریشانیوں اور تفکرات کے باعث اعصابی تھکاوٹ، خوراک 200 ڈائی لیوٹن۔

زنک میٹ (Zincum Met): حساسیت، شور، اخبار کی کھڑکھاہٹ، باتوں کی آوازوں سے خواہ یہ باتیں اس کے عزیز ترین دوست ہی کیوں نہ کریں نیز بولنے سے بھی حساسیت ہو۔ میفائٹس (Mephites): چھوٹی طاقت کی خوراکیں دیجئے، یہ دوا اعصابی نظام کو درست کرتی ہے اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔

ایپس ایم (Apis M): اعصابی لڑکیوں کے لئے جن میں بے چینی اور ہرافنگ بختگی پائی جائے، بے موقع ہنسی اور اس کے ساتھ کام کے موقع پر سکون مزاجی ہو، بودا پن، چیزیں گرائے اور پھر بنے۔

کاربووےج (Carboveg): اس بات کی اثابیت کہ مریض چیزوں کی ماہیت کو سمجھ سکے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ آیا یہ چیزیں خوشگوار ہیں یا نا خوشگوار، خوفناک باتیں سن کر اس پر خوف کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ خوش کن باتیں سن کر وہ خوش ہوتا ہے، سکول کے لڑکے لڑکیاں جو یاد کرنے میں اور سیکھنے میں بہت سست ہوں اور جو رات کو ڈریں، وہ اکیلے نہیں سو سکتے، اور نہ وہ کسی اندھیرے کمرے میں کسی اور کو ساتھ لئے بغیر جاتے ہیں۔

سینٹورا ٹیگاتا (Centaurea Tagaana): ذہنی طاقت و پریشانی، مریض ادھر ادھر ہر جگہ جھپٹتا پھرتا ہے، ایک کام شروع کرتا ہے اور اسے بیچ میں چھوڑ کر پورا کئے بغیر دوسرا شروع کر دیتا ہے اور اسی ذکر پر چلتا رہتا ہے اور کوئی بھی کام مکمل نہیں کر پاتا، سست اور ناقابل ارتکاز توجہ ہوتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): سردرد کے ساتھ اعصاب شل ہو جانا، بچے یا خاوند کی وفات کے بعد جسم میں کپکپاہٹ اور بے خوابی، مریض ہر وقت روتی رہتی ہے اور اسے نیند نہیں آتی، خود پر قابو پانے کے قابل نہیں ہوتی، اپنے آپ سے شرمندہ ہو۔



ٹیوبرکولینم بوو (Tuberculinum Bov): جذبہ محبت کا جلتے رہتا، مریض اپنے غلام یا بچے سے محبت نہ کرے، ذہنی معذوری، یہ تمام علامات تپ دق کی ہسٹری کے ساتھ ہوں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): تذبذب میں مبتلا رہے، 'مکون مزاج' بے چین اور اعصابی، اس بات کا خوف کہ مریض غیر ضروری شخصیت ہے۔ ناکام ہو جانے کا خوف۔ پریشانی و تشویش اور سوچنے سمجھنے کی نااہلیت، اندرونی تناؤ اور دباؤ، متشکر ہو، عورتوں کی رفاقت میں مریض بہتری محسوس کرے، ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں بہتری ہو۔

ناجا (Naja): بھٹکنے، غیر حاضر دماغ، خودکشی کا رجحان، تصوراتی چیزوں پر کڑھتا رہے، اپنی جنسی نااہلیت پر تشویش میں مبتلا رہے جب کہ جنسی خواہش موجود ہو۔ محسوس کرے کہ ہر کام غلط ہو چکا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو کام ضروری ہیں انہیں کرنے کا بہت زیادہ احساس لیکن انہیں نہ کرنے کا ناقابل ضبط رجحان، احمق اور الجھا ہوا، گھبرایا ہوا۔

سنی کولا (Sanicula): دماغی آوارگی، کسی ایک چیز پر نہ ٹھہر سکے۔ ایک کام شروع کرے اور پھر اسے چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بھوک نہ رہے، طبع کی ہوئی زبان، منہ خشک، گرم اور تنگ کرے میں بہتری ہو، ایک ایم طاقت دیتے۔

کوکولس (Cocculus): کسی ایک نا موافق چیز پر ہی خیالات مرکز رہیں۔ خیالات میں گم رہے اور اپنی کوئی پرواہ نہ ہو۔ دماغی کمزوری کا اظہار ہو، ذہن خالی خالی (کور) محسوس ہو۔ خلا میں گھورتا رہے اور سوال کرنے والے کی طرف آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھے اور جواب دینے میں دقت محسوس کرے۔ اس بات کا اطلاق پیشہ ور نرسوں پر نہیں ہو تا کہ مریض کا ذہن بہت سستی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بھول جائے کہ ابھی اس نے کیا پڑھا تھا۔ ذہنی الجھاؤ۔

لیک کین (Lac Can): دل شکستہ، ناامید، یہ خیال کے زندہ رہنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ خیال کرے کہ اس کا مرض رفع ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ خیال کرے کہ دنیا میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ رونے کا مزاج بنا رہے، غم زدہ اور چڑچڑاہو، بچے ہر وقت روتے اور چیختے چلاتے رہیں۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): جب کوئی شخص اپنے بڑوں کے رویہ سے غیر مطمئن ہو، حالانکہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں اس نے ہر ممکن طور پر اپنی تمام صلاحیتیں صرف کی ہوں اور خود کو تھکایا ہو۔ اس سب کچھ کے بعد وہ بیمار ہو گیا ہو تو یہ دوا فوری طور پر اسے بحال کر دے گی۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): معمولی معمولی باتوں پر سخ پا ہو جائے، کام پر اختیار نہ ہو، کسی سنجیدہ کاروباری کارکردگی پر اختیار نہ ہو، ذہن کمزور اور آوارہ ہو، یادداشت کمزور ہو، اپنے عزیز

ترین دوست کے کھو جانے پر بہت بڑی روحانی اذیت میں مبتلا ہو۔ بیمار کی تیمارداری کرنے کے باعث بے تحاشہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہو۔

ڈروسیرا (Drosera): مریض بد اعتمادی سے بڑھتا ہو جیسے اسے غلط لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کرنا پڑ رہا ہے۔ بے چین، اداسی و غم کے رجحان والا تصور کرے کہ وہ حاسد قسم کے لوگوں سے دھوکہ کھا جائے گا۔ کوئی ناموافق بات سننے کا خوف۔

سپیڈیا (Sepia): اعصابی اور اچھل کود کرنے والی مریض چاہتی ہے کہ ہر آدمی اور ہر چیز سے دور بھاگ جائے اور کہیں اکیلی اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے پڑی رہے۔ اگر وہ دس منٹ کی نیند لے سکے تو ایک بدلی ہوئی عورت بن جائے۔ کند ذہن، یک سو، ٹھکی ماندی، چڑچڑی، وہ دیکھنے میں احمق اور کند ذہن معلوم ہو، ذہنی طور پر کند ہو، آہستہ آہستہ سوچے اور بھٹکے بھی ہو۔

پلاٹینم (Platinum): جب ذہنی علامات ظاہر ہوں تو جسمانی علامات غائب ہو جائیں اور اسی طرح سے اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، جسم میں تکلیف ہو لیکن ذہن ہشاش بشاش ہو اور جب جسم پر سکون ہو تو ذہن متاثر ہو جائے۔

سیلیشیا (Silicea): جب صبح کو جاگے تو چلائے کہ اس کے ہاتھ سو گئے ہیں۔ صرف پنوں (Pins) کے متعلق سوچے، ان کے متعلق خوف زدہ ہو، انہیں تلاش کرے اور انہیں بڑی احتیاط سے گئے، ہر جگہ پر پنوں کو دیکھا کرے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): تبدیلی کی مسلسل خواہش، سفر کرنے کی، کہیں جانے کی اور کوئی مختلف قسم کا کام کرنے کی مستقل خواہش، یہ اشخاص جنوں کی سرحد پر ہوتے ہیں۔

تھیرائیڈین (Theridion): ہر آواز پر رے جسم میں کھسکتی ہوئی محسوس ہو، اس کے باعث مٹی اور چکر آئیں، ہر تیز چہیتی ہوئی آواز دانتوں میں کھسکتی ہوئی محسوس ہو۔

سٹرکیولیا (Sterculia): یہ دوا دوران خون کو باقاعدہ بناتی ہے، یہ ایک مقوی دوا ہے، اس سال کو روکتی ہے، نظام دوران خون کو باقاعدہ بناتی ہے۔ اور بطور پیشاب آور کام کرتی ہے۔ ضعف قلب کے لئے مفید ہے۔

الیومینا فاس (Alumina Phos): سوالات کے جوابات دینے اور رفاقت سے بے زاری، بہت زیادہ پرجوش اور بھٹکے، اس دوا میں غم کے مزمن اثرات پائے جاتے ہیں اس طرح یہ انگیشیا کے بعد آتی ہے، دماغی پرمردگی، جنسی بے اعتمادیوں کے بعد اور طویل ذہنی مشقت کے بعد مفید دوا ہے، کلچ کے زمانے کے بعد ذہنی ناکارہ پن، ہر وقت لینے رہنا چاہیے یہاں تک کہ معمولی تھکاوٹ یا پیدل چلنا تمام علامات کے ظاہر ہونے کا باعث بن جاتا ہے، غیر حاضر دماغ، اعصابی ضعف، دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کا رجحان، غیر مستقل مزاجی اور خیالات کا

فقدان 'ذہنی تھکان ہو' طویل دماغی مشقت کے بعد۔  
کینابیس سیٹوا: (Cannabis Sat): اپنے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سرگوشیاں  
 سننے 'خیال کرے کہ یہ اعلیٰ ترین ہستی کی طرف سے حکم ہے۔

### ضدی — (Bostinate)

(نیز دیکھئے "ناراضی")

کیموملا: (Chamomilla): ضدی بچے 'جیسے کہا جائے کام ویسے نہ کریں' چیزوں کے لئے  
 روئیں گے لیکن جب دی جائیں تو لینے سے انکار کر دیں گے۔  
کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): ضدی مزاج رکھنے والے بچوں کے لئے دوا جو  
 موٹاپے کی طرف مائل ہوں۔  
سٹیفنی سیکریا: (Staphisagria): بد مزاج بچوں کے لئے جو مختلف چیزوں کے لئے ضد کریں  
 لیکن پیش کی جانے پر انکار کریں۔  
نکس وامیکا: (Nux Vomica): دوسروں کی خواہشات کے سامنے رکاوٹ پیدا کریں۔ جنون  
 اور زیادتی خیز میں۔  
ارجنٹم نائٹریکیم: (Argentum Nit): بہت ہی ضدی اور جس چیز کی بھی تجویز دی جائے اس  
 پر عجیب عجیب اعتراضات کریں۔ عجیب و غریب سوچوں سے بھرے ہوئے۔ مریض ہر چیز ٹھنڈی  
 پسند کرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی خوراک 'گرم کرے میں دم گھٹتا ہوا  
 محسوس کرے۔

### تنگ مزاج (چڑچڑا)

(Peevish)

اورم میٹ: (Aurum Met): تنگ مزاجی جو خوش مزاجی سے بدل جائے۔  
لائکوپوڈیم: (Lycopodium): اسام میں یا بیدار ہونے کے وقت چڑچڑاہن۔  
کیموملا: (Chamomilla): دانت ٹکانے کے دوران بچوں میں چڑچڑاہن 'گھٹس کی تنگی کے  
 ہمراہ۔  
فیرم میٹ: (Ferrum Met): تنگ مزاجی 'تھکید یا اختلاف رائے کو برداشت نہ کر سکے'  
 جھگڑالو۔  
پٹرولیم: (Petroleum): بہت ہی تنگ مزاج 'بغیر کسی جرم کے ہر کسی کو مارنا چاہے۔

## ادارک (شعور، سمجھ وغیرہ)

(Perception)

کالچیکم: (Colchicum): ٹائی فائیڈ بخار میں قوت بدر کہ میں کئی واقع ہو جائے۔  
 پلمبم: (Plumbum): ادارک میں سستی، محسوسات میں سستی، فالجی جنون، دماغ ست رفتاری سے کام کرے، یہ سب کچھ مریض کو فالج کی جانب لے جاسکتا ہے۔  
 اگریکس میور: (Agaricus Mur): مدر کہ کھو جائے، پھولی پھولی چیزوں کو پھلانگنے کے لئے لپی لپی چھلانگیں لگائے اور ڈگ بھرے جیسے کہ وہ درختوں کے تنے ہوں۔ معمولی سا سوراخ بہت بڑا خوفناک شکاف یا رخسہ دکھائی دے۔ مچھ بھریانی بڑی سی جھیل محسوس ہو۔

## زہر خورانی (کا خوف)

(Poisoned)

الیئم سیٹ: (Allium Sat): زہر دیئے جانے کا خوف۔  
 ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus): شک کرے کہ اسے زہر دیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ڈائیلوشن کی ایک خوراک دیجئے۔  
 لیکسیس: (Lachesis): مریض تصور کرے کہ اس کے عزیز رشتہ دار اسے زہر دیتے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے وہ غذا ان کے ہاتھوں سے لینے سے انکار کر دے۔

## غرور — (Pride)

پیلادیم: (Palladium): عزت نفس کا مجروح ہو جانا، محسوس کرے کہ اسے عملاً یا توڑا ہے عزت کیا گیا ہے۔  
 پلائینم: (Platinum): ذہنی طور پر سخت صدمہ پہنچنا، معمولی سی تنقید سے ذہنی صدمہ محسوس کرے، گہرا زخم محسوس کرے، دل کٹ جائے، دل ٹوٹ جائے۔  
 لائیکو پوڈیم: (Lycopodium): اکڑا ہوا، نمود و نمائش کا دل دادہ، اپنی بات منوانے والا۔  
 لیکسیس: (Lachesis): غرور کا جنون، خود پسند، حاسد، متنفذ، انتقام اور ظلم مریض کے اوصاف (علامات) ہوتے ہیں۔  
 فیرم میٹ: (Ferrum Met): غرور، خود سے مطمئن دکھائی دے۔

سلفر: (Sulphur): غرور، سب تمام منتخب شدہ دوائیں غیر مفید ثابت ہو جائیں تو یہ دوا انہیں کارآمد بنانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

جھگڑالو — (Quarrelsome)

(دیکھئے ”غصہ“)

اداسی (غمگینی)

(Sadness)

(نیز دیکھئے ”ضعف اعصاب“)

گریفائٹس: (Graphites): اداسی میں موسیقی سے اتھری ہو، موت کے خیالات۔

پلاٹینا: (Platina): اداسی گھر کے اندر، کھلی ہوا میں جانے سے بہتری ہو۔

سٹانم: (Stannum): آدمیوں سے بیزاری کے ساتھ اداسی۔

پلمبم میٹ: (Plumbum Met): اداسی، مائیفولیائی، یوں محسوس ہو کہ کوئی خطرناک بات ہونے

والی ہے، مریض محسوس کرے کہ وہ رحمت سے محروم کئے جانے والا گناہ کر چکی ہے، محسوس

کرے کہ اس سے ناقابل معافی گناہ سرزد ہو چکا ہے، سوچنے سے اتھری ہو، بے خوابی میں جھٹلا

ہو۔

اگنیشیا: (Ignatia): غم کے بعد اداسی۔

اورم میٹ: (Aurum Met): اداسی ہو اور مریض محسوس کرے کہ وہ اپنے دوستوں کی

عنایات سے محروم ہو چکی ہے۔

اکونائٹ نیپ: (Aconite Nap): مستقبل سے متعلق اداسی۔

ایسڈ فاس: (Acid Phos): اداسی کے باعث کمزوری ہو جائے۔

اورم فولی ایٹم: (Aurum Foliatum): مائیفولیائی، مریض محسوس کرے کہ وہ دنیا کے لئے

موزوں شخصیت نہیں ہے اس لئے انتہائی خوشی کے ساتھ مرنے کی تمنا کرے۔

کوکولس: (Cocculus): مائیفولیائی اور اداس، تذلیل سے بہت حساس، جلدی سے ناراض

ہو جائے۔ معمولی معمولی باتیں اسے ناراض کر دیں۔

شرمیلہ — (Shy)

جلی میم: (Gelsemium): عام لوگوں کے سامنے جانے سے شرمائے، بہت شرمیلہ، بزدل،

ذہن خالی خالی محسوس کرے۔

برشا کارب 'کالی فاس': (Baryta carb, Kali Phos): خود اعتمادی کے فقدان کے باعث شرمیلا پن 'خوف و بزدلی۔

سلفر: (Sulphur): شرمیلا پن 'خوف کے رجحان کے ساتھ۔

الیومنا: (Alumina): (بزدلی) شرمیلا پن 'جو خود اعتمادی سے بدل جائے (یعنی یہ تبدیلی ہوتی رہے کبھی شرمیلا پن ہو اور کبھی خود اعتمادی)۔

کوکا: (Coca): شدید ذہنی بیجان کے ساتھ شرمیلا پن۔

پلساٹیل: (Pulsatilla): شرمیلا پن 'بزدلی کے ساتھ۔

### نیند — (Sleep)

میڈورنیم: (Medorrhinum): گھنٹوں کو سینے کے ساتھ جوڑ کر سوئے 'یہاں تک کہ بڑی عمر کے مریض بھی اسی حالت میں سوتے ہیں۔

کوکولس: (Cocculus): مریض سونے کے دوران سب کچھ سن سکتا ہے یہاں تک کہ خزانے بھی۔

میوری ایٹک ایسڈ: (Muriatic Acid): بستر سے پائنٹی کی جانب سے نیچے گر جانے کا رجحان۔

اگنیشیا: (Ignatia): اتنی بکلی تھکا سوئے کہ ہر بات سن سکتا ہے 'ایک ہی موضوع پر تمام رات خواب دیکھتا رہے۔

کیڈنیم سلف 'الی کاک' لائیو پوڈیم: (Sulphur, Ipecac, Lycopodium): کھلی آنکھوں کے ساتھ سوئے۔

### غنودگی 'خواب آلودگی (خوابی دورے، غشی)

(Sleepiness, Narcolepsy)

سائی مکس: (Cimex): نہ رکنے والی غنودگی۔

سائی کلیمین: (Cyclamen): غنودگی 'ترش مزاجی' سستی (آکسی) بے ہوشی 'کام سے بے رجحانی' عظیم آلودگی اور مایوسگی۔

انڈول: (Indol): آکسی کے ساتھ غنودگی 'ہر وقت لیٹے رہنا پسند کرے' کام کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو۔

نیٹرم سلف: (Natrium Sulph): پڑھتے وقت غنودگی۔  
 آرنیکا ایم: میٹیشیا: (Arnica M. Baptisia): جب کسی سوال کا جواب دے رہا ہوں تو  
 غنودگی ہو جائے (یہ حالت عام طور سے ثانی فائیز بخار، فوبی بخاروں اور انفلو انزا میں ہوتی

ہے۔)  
 میگنیشیا کارب: (Magnesia carb): کھانے کے بعد غنودگی ہو، جبکہ کھڑا ہو۔  
 سلفر: (Sulphur): پاخانے کے بعد غنودگی۔  
 ایتھوزا: (Aethusa): پاخانے کے بعد یا قے کرنے کے بعد غنودگی۔  
 ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus): ذہنی تھکاوٹ کے بعد غنودگی۔  
 ناجا: (Naja): کسی شہتیر کی مانند پڑا سویا کرے، سانس میں خراہٹ کے ساتھ، سونے میں  
 کسی حشراتی کیڑے کی سی حالت۔  
 نیٹرم میور: (Natrium Mur): غنودگی اور اونگھ کھانا کھانے کی بعد۔  
 کاسٹیکم: (Causticum): شدید غنودگی، دن کے دوران، مزاحمت کرنا مشکل ہو، لیٹ جانا  
 پڑے۔

چیلیدونیم: (Chelidonium): واضح غنودگی، حتیٰ کہ کلی ہوا میں بھی ہو، مریض چلتے چلتے  
 اونگھ جائے اور گرنے کے قریب ہو جائے۔  
 کالی بروم: (Kali Brom): کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جائے۔

## بے خوابی

(Sleeplessness)

کافیا: (Colfea): یہ دوا بہت زیادہ جاگتے رہنے کی حالت کی نشاندہی کرتی ہے، آنکھیں بند کرنا  
 ممکن نہ ہو، غایت (انبساط) ذہنی کے باعث جسمانی جھجھکاؤ، خوشی کی خبر سن کر، بے تحاشہ محنت کے  
 بعد جو خوشی کا باعث ہو اور حیران کن مسرت کے بعد بے خوابی لاحق ہو جائے، لیکن بے سکونی  
 یا درد وغیرہ نہ ہوں۔ طویل پوکیدارہ کرنے کے باعث یا منشیات کے بے جا استعمال کے باعث  
 بے خوابی لاحق ہو جائے۔

سینی شیو: (Senecio): رحم اپنی جگہ سے نکل جانے کے باعث بے خوابی، سن یاس کے  
 دوران رحم میں سوزش یا جلن۔

سائپریری پیڈیم: (Cypripedium): جب دماغ میں ہر قسم کے خوش کن خیالات کا اثر دہام ہو  
 جائے تو اس کے باعث بے خوابی لاحق ہو، پھوٹے بچے تمام رات جاگتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور

اپنے والدین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔

**مگنیشیا کارب:** (Mag Carb): جیت میں شدید دباؤ کے باعث بے خوابی یا تشویش ناک 'بے چینی اور اندرونی گرمی کے باعث بے خوابی' کپڑا اتر جانے کے عمومی خوف کے ساتھ 'اچھارے کے باعث بے خوابی۔

**کالی فاس:** (Kali Phos): یہ دوا بے خوابی کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً جب نیند رات کے آخری حصہ میں نہ آئے 'مریض کاروباری پریشانیوں کے باعث اعصابیت کا شکار ہوتا ہے اور ذہنی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔

**میوری ایک ایسڈ:** (Muriatic Acid): نیند آئی ہو لیکن سونے کے قابل نہ ہو 'نیند سے سر نہ اٹے' ساری رات خیالات میں محو اور بے چین رہے 'چڑچڑاہٹ۔

**کاسٹیکم:** (Causticum): خشک گرمی کے باعث رات کو بے خوابی 'کسی کروٹ بچہ نہ ہو' مریض حالت سکون میں نہ رہ سکے۔

**فیرم میٹ:** (Ferrum Met): صرف چارپائی (بیلہ وغیرہ) کا سرہانہ جنوب کی طرف کر کے ہی سو سکے۔

**اگنیشیا:** (Ignatia): اتنی کچی نیند سونے کہ ہر بات دوران نیند سنائی دے۔ ایک ہی موضوع پر تمام رات خواب دیکھے۔ پر ہوش یا پر تشویش سوچوں کے باعث رات بھر سو نہ سکے۔ غم 'اداسی اور دیگر افسردہ کردینے والے جذبات کے باعث بے خوابی 'جسم میں تھر تھراہٹ دوڑ جانے کے ساتھ بے چینی۔

**آرنیکا مونٹ:** (Arnica Mont): بے تحاشہ جسمانی و ذہنی تھکاوٹ کے باعث بے خوابی۔  
**اکونائٹ این:** (Aconite N): جوش 'پریشانی' بے چینی 'ناراضی اور خوف کے باعث بے خوابی 'بچے بے قراری سے ادھر ادھر جھٹکے کھائے۔

**آرسنک البم:** (Arsenic Alb): ہوائی حملے وغیرہ کے خوف کے باعث بے خوابی۔

**اوپیم:** (Opium): جب کافی (دوا) ناکام ہو جائے تو یہ دوا بے خوابی کے لئے مفید ہے۔

**سلفر:** (Sulphur): بہت ہی مختصر نیند 'مریض دن بھر سونے اور رات بھر جاگے۔

**کلیمٹس:** (Clematis): صبح کے وقت اس بات کا احساس کہ وہ کافی نیند نہیں لے سکا۔

**پسی فلورا انک:** (Passiflora Inc): بے خوابی کے لئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے۔ لیکن اس کی مدد سچر کی بڑی خوراکیں دی جانی چاہئیں۔ 10 سے 30 قطرے فی خوراک۔

**امبرا گرےسیا:** (Ambra Grisea): کاروباری الجھنوں کے باعث پریشانی کے لاحق ہونے سے بے خوابی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض اچھی خاصی تھکاوٹ کے ساتھ بستر پہ جاتا ہے لیکن



جیسے ہی سر ٹپکنے کو چھوٹا ہے مریض مکمل طور پر بیدار ہو جاتا ہے۔

ٹباکوم: (Tabacum): اعصابی کشمکش کے باعث بے خوابی۔

بیس نی: (Ballis P): صبح بہت جلد آنکھ کھل جائے اور پھر دوبارہ سو نہ سکے۔ ہر منچر استعمال کریں۔

کو کولس انڈیکا: (Cocculus indica): راتوں کو تیار داری کرنے کے باعث بے خوابی۔  
پیشہ ور نرسوں کا راتوں کو جاگ کر تیار داری کرنا اس مرض کی علامات میں شامل نہیں بلکہ یہ علامت ایسے تیار داروں کے لئے ہے جو فکر مندی اور پریشانی کے ساتھ اپنے رشتہ دار مریض کی تیار داری کرتے ہیں۔ جب دن کے کاروبار سے متعلق سوچ و فکر نیند اڑا دے۔

سکولریپالیٹ: (Scutellaria): ایسے اعصابی مریضوں میں جو بہت ذہین، عالی حوصلہ اور فعال (چست) ہوتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے یا کسی بڑے کاروباری ادارے کے سربراہ اور وہ افراد ہوتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح نیند نہیں آتی اور یہ مسلسل معاشرتی یا کاروباری معاملات پر کڑھتے رہتے ہیں۔ اعصابی صفراوی سرود کے باعث بے خوابی۔ یہ درد و ملغ کی جڑ میں ہوتا ہے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): شرابیوں میں بے خوابی یا جب کافی یا چائے کے مضر اثرات مرتب ہو جائیں یا جب معدہ پر انگدہ ہو (معدہ میں گڑ بڑ ہو)۔

بیلادونا: (Belladonna): سر میں خون کے انجماد (یا اجتماع) کے باعث انتہا درجے کی بے سكون نیند۔ آنکھوں کو بند نہ کر سکے کیونکہ آنکھیں بند کرنے پر مریض کو دہشت ناک تصوراتی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بچے نیند سے جاگ جاتے ہیں اور دہشت زدہ ہوتے ہیں۔

ہائوسکیمس: (Hyoscyamus): اعصابی جوش کے باعث بے خوابی، دماغ پریشان کن خیالات و تصورات سے بھرا رہے، بچوں میں بے خوابی، ایسے بچے خوف سے پھڑکتے، چیختے چلاتے اور کپکپاتے ہیں۔ ایسے افراد جو بہت جلد پر جوش ہو جائیں برا ٹھیکہ ہو جائیں، ایسے افراد چڑچڑے ہوتے ہیں۔

کیموملا: (Chamomilla): درد کے باعث بے خوابی۔

جلسیم: (Gelsemium): دماغی کام کرنے والوں میں بے خوابی کے لئے، ایسے کاروباری اشخاص کے لئے مفید ہے جو بے چینی سے راتیں گزارتے ہیں، بہت صبح سویرے جاگ جاتے ہیں اور اپنے کاروباری معاملات سے متعلق پریشان و فکر مند رہتے ہیں۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind): بے خوابی کی ضدی قسم کی صورت، بے قاعدہ نیند کے ساتھ، ہر منچر کے 10 قطروں کی خوراک دی جائے۔

### چرانے (Stealing)

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان، یہ دوا پیسے چرانے کی عادت کو رفع کرتی ہے۔ مریض بعض اشخاص کو بغیر کسی وجہ کے ناپسند کرے۔  
آرٹنی میزیا ول: (Artemisia Vul): مرگی میں چوری کرنے کی عادت۔  
سٹرامونیم: (Stramonium): جنون میں چرانے کی عادت۔  
سٹیفیسگیا: (Staphisagria): چرانے کا عمومی رجحان۔  
سلفر: (Sulphur): تمباکو استعمال کرنے والوں یا جوار یوں میں چوری کرنے کی عادت۔  
اوپیم: (Opium): چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت۔

### پاخانہ (Stool)

ورٹرم ایلبم: (Veratrum Alb): مریض کے اندر اپنا ہی پاخانہ کھانے یا پیشاب پینے کی طلب ہوتی ہے۔

### خودکشی کا رجحان

#### (Suicidal Tendency)

(نیز دیکھئے ”تحرکات“)

ایناکارڈیم: (Anacardium): بندوق وغیرہ کی گولی کے ذریعے خودکشی کا رجحان اور کسی ذریعے نہیں، خودکشی کا ارتکاب کرنا چاہے لیکن ہزدلی کے باعث ایسا نہ کر سکے۔ ایک ایم ڈائی لیوشن دیجئے۔

رشاکس: (Rhus Tox): خود کو کھڑکی میں سے گرا دینا چاہے لیکن مرنے سے خوف زدہ ہو۔ جب اگر پانی کے نزدیک ہو تو خود کو پانی میں ڈبو دینا چاہے۔ باورچی خانہ میں داخل ہو تو آگ سے بھرے چولہے میں کھنسنے کی کوشش کرے تاکہ جل کر مر جائے۔ مریض مسلسل حرکت میں رہے اور آہ و فغاں کرتا رہے۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): چھرا گھونپ کر خودکشی کرنے کی خواہش۔  
کپسیکیم: (Capsicum): خودکشی کے ارتکاب سے متعلق مسلسل سوچیں لیکن مریض خود کو قتل کرنا نہ چاہے اس لئے ان سوچوں کے آگے بند باندھتا رہے۔ (مریض کے اندر خودکشی کی خواہش نہیں ہوتی، اگر خودکشی کی خواہش ہو تو دوسری دوائیں منتخب کریں۔) (کپسیکیم یہاں کلام

نہیں دے گی۔)

الیومنا: (Alumina): کم حوصلہ مریض اسے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ یہ وہ خودی ہے یا کوئی اور برے خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور وہ اپنا گلا کٹ کر اپنی ناقابل برداشت زندگی کا قصہ تمام کر دینا چاہتا ہے۔ چاقو یا خون کو دیکھ کر خود کشی کا رجحان پیدا ہو۔  
اگنس کاسٹس: (Agnus Castus): مریضہ میں اپنے خاوند بچے اور جنسی عمل سے بے زاری کے ساتھ خود کشی کا رجحان۔

اورم میٹ: (Aurum Met): جنون اور خود کشی کے خیالات کے لئے یہ ایک تیر ہدف دوا ہے۔ مریض خود کو گولی مار دینا یا خود کو اونچی جگہ سے گرا دینا چاہتا ہے۔ وہ خود کشی کرنے کے لئے ڈوب جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ یہ سب اس لئے ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے کڑھتا رہتا ہے اور کسی شخص کو اپنی پریشانیوں کی ہوا نہیں نکلتے رہتا۔

انٹیم کروڈ: (Antum Crud): جذباتی اور حساسیت کا حامل جنون پوری نہ ہو سکنے والی خواہشات مریض کو غم اور کڑھن میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ اپنی نامرادیوں و بے چارگیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے خود کو گولی مار دینا یا پانی میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔

نیٹرم سلف: (Natrium Sulph): خود کشی کے جنون کے لئے ایک اور عظیم دوا ہے۔ مریض کو مستقل طور پر اپنے آپ کو خود کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ موسیقی سے خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اسے مانٹولیا میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ خود کشی کا رجحان عموماً سر میں چوٹ لگ جانے کے باعث ہوتا ہے۔ خود کو تباہ و برباد کر دینے کی تحریک حالانکہ وہ ایسا کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتا رفاقت سے بے زار خود بولنا یا بلایا جانا پسند نہیں کرتا۔

اسٹیلگو: (Ustilago): پانی میں ڈوب کر خود کشی کرنے کا رجحان۔

اگنیٹیا: (Ignatia): کاروباری اہتری کے بعد مریض ماچس کا فاسفورس کھا کر اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہے۔

زینک میٹ: (Zincum Met): دباؤ اور مانٹولیا کے باعث خود کشی کے خیالات پیدا ہوں اتنا بزدل ہو کہ خود کشی نہ کر سکے۔ کسی اور کو اذیت دینے کی خواہش ایک ایم ڈائی لیوشن دیجئے۔  
کیناٹس سیٹو: (Cannabis Sat): سنسناتی ہوئی سرگوشیاں سننے خود کو قتل کر دینے سے متعلق اسے اعلیٰ ترین حاکم کا حکم خیال کرے۔

ارجینٹم نائٹ: (Argentum Nit): جب بلندی پر ہو تو عجیب و غریب خیالات آئیں۔ جب

کوئی پل عبور کر رہا ہو تو خیال کرے کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا کر خود کو قتل کر سکتا ہے۔ یا جب کسی بلند عمارت پر موجود ہو تو کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے ہوئے سوچے کہ کتنا برا ہو گا اگر اس نے باہر چھلانگ لگا دی۔ بعض اوقات یہ تحریکات حقیقت میں اسے باہر چھلانگ لگانے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔

جلی میم: (Gelsemium): خود کو کسی بلند مقام سے کھڑکی میں سے گرا کر خود کشی کا ارتکاب کرنا چاہے۔

ہیلی بوریس نائنگ: (Helleborus Nig): بعض لوگوں کے چوری وغیرہ کی تمہت لگا دینے کے نتیجے میں خود کشی کرنے کا رجحان۔ وہ اس تمہت یا الزام کو دل پر لگا لیتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔

آئیوڈیم: (Iodine): مریض خود کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا چاہتا ہے لیکن وہ اس رجحان کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے۔

لیک ویک ڈیفیل: (Lac Vacc Defl): یادداشت کا کھو جانا، سستی اور ذہنی کام سے بے زاری، اداسی، مریض مرنے کا خواہش مند ہو اور اپنی جہاں کے لئے آسمان ترین طرحوں کے متعلق غور و فکر کرے۔

میڈوررینم: (Medorrhinum): خود کشی کا رجحان، اٹھے اپنا پستول اٹھائے لیکن اس کی اندرونی ارادے کی طاقت اسے خود کشی سے روک لیتی ہے۔

### توہمات (Superstitions)

(دیکھئے ”مغالطے یا دوسوے“)

### بدگمانی (شک و شبہ)

(Suspicion)

لکیس: (Lachesis): مریض یا مریضہ خیال کرے کہ لوگ اسی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بدگمانی میں جتا ہو کہ لوگ اسے پاگل خانے بھیج دینا چاہتے ہیں یا زہر دے رہے ہیں۔ کسی مافوق الفطرت ہستی کے قابو میں خود کو محسوس کرے اور محسوس کرے کہ وہ مافوق الفطرت ہستی اسے چوری یا قتل کا حکم دے رہی ہے جسے ہر حال میں پورا کرنا ہو گا، حسد یا جلایا بھی اس دوا کی ایک علامت ہے۔

ہائیوسامیس: (Hyoscyamus): زہر دیئے جانے کا شک، مریض محسوس کرے کہ اس کا

تغائب کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ محسوس کرے کہ گھر کے وہ افراد جن کے متعلق اسے غلط فہمی ہو چکی ہے، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ روزانہ کپڑے تبدیل کرے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ پائیں۔ گھر سے نکلنا نہ چاہے یہ بدگمانی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تخلص نہیں ہے۔

### ہمدردی (Sympathy)

کاسٹیکم: (Causticum): دوسروں کی تکالیف پر اتنا درجے کی ہمدردی محسوس ہو۔  
نیوفر: (Nuphur): جب کاسٹیکم تکام ہو جائے تو اسے استعمال کریں۔

### باتونی پن

#### (Talkativeness)

اگیریکس ایم: (Agaricus M): گائے اور باتیں کرے لیکن جواب نہ دے۔ بے تعلقی اور بے غنی، گائے، چیخنے چلانے، بڑبڑانے، شعر کہنے یا منگنانے اور پیشین گوئیاں کرنے کی امتیازی خصوصیات والا ہڈیان۔

اکٹیا آر: (Actea R): مسلسل اور لگاتار باتیں کرے۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کو تبدیل کرے جیسا کہ ہڈیان کے دوروں میں ہوتا ہے۔

سکٹائی: (Sticta P): کسی نہ کسی چیز کے متعلق بولتے رہنے کی شدید خواہش، مریض بردہ نہیں کرتی کہ کوئی اس کی بات سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ وہ اپنی زبان کو ساکت نہیں رکھ سکتی (یعنی خاموش نہیں رہ سکتی)۔

ہائوسامس: (Hyoscyamus): انتہائی ٹکی مزاج اور باتونی، بے حیائی اور شہوت پرستی کا جنون، جسم ٹکا کرے۔ ہر چیز پر ہنسنے کی طرف مائل، آہستہ آہستہ بڑبڑائے، سوتے میں باتیں کرے اور چیخیں مارے، خود سے باتیں کرے، وہی، ایک ہی فعل کو بار بار دہرائے۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind): بے رہا گفتگو کرے۔ بے تحاشہ بولنے کے ساتھ غایت درجہ کا انبساط کے ساتھ، بے تحاشا ہنسا، ہر مرتبہ چند لمحات کے بعد خود کو بھلا دے، مریض جانتا ہے کہ وہ بے وقوفانہ باتیں کر رہا ہے لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چیخنے چلائے اور فی البدیہہ اشعار کہے۔ نہیں جانتا کہ وہ کس مقصد کے لئے زندہ ہے۔ بدلتے ہوئے خیالات کے ساتھ اتنا درجے کا باتونی پن۔

لکس: (Lachesis): باتونی پن کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ وحشیانہ جوش، اداس، دنیا کے

ساتھ گھٹنے ملنے کی خواہش نہ ہو۔ بے چین و بے آرام ہر وقت کسی الگ تھلگ جگہ رہنا چاہیے۔ بہت تیزی سے باتیں کرے، جیسے ہی کوئی شخص بولنا شروع کرے، یہ اس کے منہ سے بات چھین لے اور جلدی جلدی کہانی سنا کر ختم بھی کر دے حالانکہ اس سے پہلے وہ بات (کہانی) کبھی بھی نہیں سنی ہوتی۔ منتخب الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سجائے لیکن بات کرتے کرتے ایک موضوع سے دوسرے انتہائی مختلف موضوع میں کود پڑے۔ تسلسل کا فقدان، بعض اوقات آدھے آدھے جملے بولے اور خیال کرے کہ آپ اس کا پورا مطلب سمجھتے ہیں۔

**کروٹیلس:** (Crotalus): باتونی پن اس طرح سے کہ الفاظ بڑبڑائے، بے ترتیب الفاظ ادا کرے اور بولنے میں بار بار ٹھوکر کھائے۔ ست حالت جیسا کہ نقشے میں ہو، ٹیکسیس کے مریض صاف بولتے ہیں، بڑبڑائے یا بے ترتیب الفاظ ادا نہیں کرتے۔

**سٹرامونیم:** (Stramonium): نہ تھمنے والا باتونی پن، ہنسنا، گنا، قسمیں کھانا، دعائیں کرنا، اشعار پڑھنا، خوشی تیزی کے ساتھ غم میں بدل جائے، وسوس یا مغالطے اس مرض کی پہچان ہیں، خود کو لمبا محسوس کرے یوں محسوس ہو کہ وہ ایک نہیں دو ہے۔ اپنا ایک حصہ گرم شدہ محسوس کرے، تھمائی اور اندھیرا برداشت نہ کر سکے، خود کو لمبا محسوس کرے، یوں محسوس ہو کہ وہ ایک نہیں دو ہے۔ اپنا ایک حصہ گرم شدہ محسوس کرے، تھمائی اور اندھیرا برداشت نہ کر سکے۔ روشنی اور فراق لازم ہو۔

### چوری کرنا — (Thieving)

(دیکھئے ”چرائی“ Stealing)

### سوچنا — (Thinking)

(نیز دیکھئے ”غیر حاضر دماغی“ اور ”بھول جانا“)

**ایٹھوزا:** (Aethusa): سوچنے اور توجہ مرکوز کرنے کی ناقابلیت، ایسے طلبہ کے لئے اعلیٰ دوا ہے جن کا ذہن پڑھائی کی طرف نہ ہو۔

**کاجوپٹام:** (Cajuputam): ایک منٹ میں ہزاروں چیزوں کو سوچا کرے۔

**کینابیس انڈیکا:** (Cannabis Ind): آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوبتا ہے۔

**کافیا:** (Coffea): خیالات سے پر، جاگ کر لیٹے ہوئے ہزاروں چیزوں کو سوچا کرے، گھر کے گھڑیال کی آواز دور سے سن لے، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنے، یادداشت بہت فعال ہو، خیالات سے بھرا رہے، سوچنے اور بحث مباحثہ کرنے کی بڑھتی ہوئی قوت۔

اونوسمودیم: (Onosmodium): ارتکاز توجہ اور ذہنی ارتباط کی کمی۔  
 ار جہنم نائٹرکیم: (Argentum Nit): جب سوچ بچار کے پامٹ اسمال لاحق ہو جائیں،  
 بصارت میں ضعف۔  
 اوسیم: (Osmium): دوسروں کو درپیش ہونے والے حادثات کے متعلق سوچا کرے، یہ  
 سوچیں آخر کار اس احساس پر منتج ہوں کہ اسے بھی وہی چوتھیں آئی ہیں جو دوسروں کو آئی ہیں۔  
 پینیشیا: (Baptisia): ثانی قانیڈ بخار میں سوچنے کی ناقابلیت۔  
 ایسڈ فاس: (Acid Phos): جملع کے بعد سوچنے کی ناقابلیت۔  
 ٹیرینتھینا: (Terebinthina): اعصابی درد سر میں سوچنے کی ناقابلیت۔  
 الومینا: (Alumina): قبض کے ساتھ درد سر میں سوچنے کی ناقابلیت۔  
 ار جہنم میٹ: (Argentum Met): سوچنے کی ناقابلیت، یادداشت اور آدمی کی ذہنی  
 صلاحیت میں خلل واقع ہو جائے، سر میں اور کمر میں درد۔  
 نائٹرک ایسڈ: (Nitric Acid): ماضی کی تکالیف پر سوچ بچار۔  
 برائی اونیا: (Bryonia): یہ سوچ کہ وہ کھر سے دور ہے اور کھر پہنچنا چاہے۔  
 کروٹن ٹگ: (Croton Tig): خود سے باہر نکل کر نہ سوچ سکے۔  
 سٹرامونیم: (Stramonium): وحشیانہ خیالات۔

### رونا — (Weeping)

پلساتیل: (Pulsatilla): خوشی کے ہوں یا غم کے واقعات پر روئے، جب اپنے مرض کی  
 علامات بتائے تو روئے۔ تردید یا اختلاف رائے پر روئے۔  
 موس کس: (Moschus): جننے اور رونے کا تادل۔  
 نیٹرم میور: (Natrur Mur): رونے کا واضح رجحان، ہمدردی سے ابتری ہو۔  
 کافیا: (Coffea): اچانک خوش خبری سننے پر رونا۔ درد سے، قلبی محسوسات اور نظر انداز کئے  
 جانے پر روئے۔  
 کیمفر: (Camphor): خشک آنکھوں کے ساتھ رونے کی خواہش۔  
 سٹرامونیم: (Stramonium): بلند آواز کے ساتھ رونا۔ ذہنی کمزوری کے ساتھ رنج پہنچانے  
 اور رنجیدہ ہونے کا رجحان۔  
 کالی فاس: (Kali Phos): غم ہی جنون میں رونا۔  
 پلائینا: (Platina): خاموشی (سکوت) میں رونا۔

سپیا: (Sepia): جب اس کے مرض کی علامات پونجی جائیں تو روئے۔  
 ایلیم سیٹو: (Allium Sat): نیند کے دوران روئے۔  
 میڈورہنم: (Medorrhinum): روئے بغیر بات نہ کر سکے۔  
 کاربو انیلس: (Carbo An): مریض جب کھاتی ہے اس وقت روتی ہے۔  
 لائیوپوڈیم: (Lycopodium): جب کسی دوست یا سہیلی کا استقبال کرے اس وقت رو  
 دے یا کسی شناسا سے ملاقات کرنے پر روئے۔ جب شکر یہ ادا کرے تو رو دے۔

### قوت ارادی — (Will)

ایناکارڈیم: (Anacardium): جیسا کہ دوہرے ارادے کا حامل ہو، ایک مثبت ارادہ اور  
 ایک منفی ارادہ، ایک ارادہ قتل کے ارتکاب کا ہو اور دوسرا اس کے برخلاف کرنے کا۔

### ظریف (نر مزاح) — (Witty)

سٹرامونیم: (Stramonium): جب کوئی شخص ظریف تو ہو لیکن بد اخلاق بھی ہو۔

### مجروح عزت نفس

(Wounded Pride)

(دیکھئے "غرور")

### قلم کاروں (ادیبوں وغیرہ) میں اینٹھن

(Writers Cramps)

مگنیشیا فاس: (Magnesia Phos): کھساریوں میں اینٹھن کے لئے یہ بہت اعلیٰ دوا ہے جب  
 کہ ہاتھوں اور اور انگلیوں کے طویل استعمال کے باعث اینٹھن ہو اور جب اس اینٹھن میں  
 حرارت سے اتفاق ہو، ایک ایم ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے۔  
 جلی میم: (Gelsimium): اینٹھن، ہاتھوں کی کیکپاٹ کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے،  
 عضلات پر قابو پانے کی قوت کا فقدان، بازو کے اگلے حصہ میں پنوں کی اینٹھن۔  
 رہس ٹاکس: (Rhus Tox): انگلیاں سخت ہوں۔ پنوں کی نسبت نسوں میں زیادہ درد ہو،  
 آرام سے بہتری ہو (سوائے انگلیوں کی سختی کے) نیز خشک سینکے سے بھی بہتری ہو جیسے بجلی کے



پیڈ (Pad) سے۔  
اکونائٹ این: (Aconite N): بازو اور ہاتھ کی فابلی کمزوری خصوصاً جب لکھ رہا ہو۔ انگلیوں میں لکھتے وقت جھنجھناہٹ ہو۔  
کیوپرم میٹ: (Cuprum Met): کھنچاوت اور پھڑکن ہو پنوں میں 'ہاتھوں کا سرد ہو جانا' ہتھیلیوں میں اینٹھن ہو اور بازوؤں میں شدید تھکاوٹ ہو۔  
سٹرامونیم: (Stramonium): انگلیوں کی کمزوری ہلکی اینٹھن کے ساتھ۔  
اکٹیا آر: (Actea R): لکھتے وقت انگلیوں میں کپکپاہٹ۔  
زئکم فاس: (Zincum Phos): یہ دوا اس وقت آزمائی جائے جب تمام دوائیں ناکام ثابت ہو چکی ہوں۔ پیریس (Peresis) (فالج کی ایک قسم جس میں اعصابی حرکت زائل ہو جاتی ہے مگر حس باقی رہتی ہے) میں مبتلا ہو جانے والے مریضوں میں انگلیوں کی اینٹھن 'دماغی انحطاط یا اتھری کے شروع ہو جانے کے ہمراہ۔  
میوری ایکسک ایسڈ: (Muriatic Acid): اینٹھن کی طرح کا تشنجی درد 'دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے گولے (Ball) میں لکھنے کے دوران درد ہو 'انگوٹھے کو حرکت دینے سے یہ درد رفع ہو جاتا ہے۔  
سلفیورک ایسڈ: (Sulphuric Acid): انہوں کی مخصوص اینٹھن 'زخموں کے بعد متکثرین ہو جانے کا رجحان 'سے (رائگا) کا زہر چڑھ جاتا۔  
فیریم آیوڈیٹم: (Ferrum Iodatum): لکھاریوں کی مخصوص اینٹھن کے لئے اعلیٰ دوا ہے۔



# اعصابی نظام کے امراض

## (Diseases of Nervous System)

### صرع (مرگی)

(Apoplexy)

**اکونائٹ این:** (Aconite N): شدید ذہنی و جسمانی اضطراب کے ساتھ تیز (بھرپور) نبض، بے چینی، لرزہ یا اچانک خوف کے باعث، چہرہ سرخ ہو، 1x ذائقہ لوشن کی خوراک ہر چندہ منٹ کے بعد حملے کے دوران دی جائے۔

**بیلادونا:** (Belladonna): سر میں خون کی اثر دہام کے ساتھ چہرے پر بے اندازہ سرخی کا آ جانا۔ نبض بہت بھرپور اور تند و تیز ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں، چھٹی (6Th) ذائقہ لیوشن دیجئے اور ہر چندہ منٹ کے بعد دھراتے جائیں یہاں تک کہ حملہ ختم ہو جائے۔

**اوپیم:** (Opium): دماغی مرگی، جڑے لگے ہوئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئیں، گرم پسینے آئیں، ایک جانب کا قلع، سیاہی مائل، سرخ چہرے کے ساتھ سکتے ہو اور خراٹے دار شخص ہو، جب کہ اچانک بے تحاشہ مسرت حاصل ہو جانے کے باعث مرگی ہو، ست اور تسکی ہوئی نبض ہو۔ ایسی حالت میں یہ چوٹی کی دوا بن جاتی ہے اور ایک ایم (TM) ذائقہ لیوشن ہر پچھتے دیا جانا

**گلوٹائٹم:** (Glonoinum): شدید گرمی، جلد چمکیلی ہو جائے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں، سانس خراٹے دار، سکتے ہو، یہ تمام رہنما کن علامات ہیں۔

**نکس و امیکا:** (Nux Vomica): یہ اوپیم کی امدادی دوا ہے جو علاج کی تکمیل کرتی ہے۔ لیکن انفرادی طور پر صفراوی مزاج، کثیر الدم (جو شیلے مزاج والے) یا اعصابی اور چڑچڑے مزاج والے مریضوں کے لئے مفید ہے، یہ دوا عادی شرابیوں کے لئے بھی مفید ہے۔

**اگنیٹیا:** (Ignatia): جب بہت زیادہ مغموم رہنے کے باعث مرگی لاحق ہو یا جب اشتعال انگیزی کے باعث جذبات دب جائیں اور مریض اعصابی مزاج اختیار کر لے۔

لیکے سس (Lachesis): مسلسل دماغی استغراق، غنودگی، خون کے اژدہام کے ساتھ دماغ کے اندر گہرائی میں دردیں خصوصاً بائیں جانب، جوڑوں میں سختی، چہرہ زرد اور پھولا ہوا۔

پلساٹیل: (Pulsatilla): خواب آلودگی (اونگھ)، حواس گم ہو جانا، داغ دار، نیلاہٹ مائل سرخ، زرد اور پھولا ہوا چہرہ، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد جسے جلدی جلدی لگتا گیا ہو حملے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تقریباً مکمل طور پر دبی ہوئی نبض کے ساتھ۔

فیرم فاس: (Ferrum Phos): خون کی قلت والے اور پہلے پڑے ہوئے افراد میں مرگی، نبض تند و تیز، آہستہ اور تار کی طرح سے ہو۔

ہیلونیاس: (Helonios): دل کی شدید دھڑکن جو سینہ اور پیٹ کو ہلا کر رکھ دے، بے ہوشی اور پنوں کی پھڑکن۔

جلی میم: (Gelsemium): مریض اونگھتا رہے، حرکت سست ہو، زبان مفلوج، نبض آہستہ، بھرپور لیکن نرم نبض، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی۔

سٹرائکی کنیا فاس: (Strychnia Phos 3x): عضلات کے ریشوں میں چربی کا انحطاط (اہتری) جب یوں محسوس ہو کہ دل سے ذرہ آیا ہے اور دل چکنائی کی اہتری کا شکار ہو۔

آرنیکا مونٹ: (Arnica Mont): چوٹ کے باعث مرگی، سرگرم اور جسم ٹھنڈا ہو، یہ دوا اس وقت دینی چاہئے جب حساسیت کو شفا ہو چکی ہو، سارے جسم میں جلن اور درد ہو۔

فارمیکا: (Formica): اگر مرگی دماغی کمزوری کے باعث ہو، یہ دوا دماغ کو تقویت دیتی ہے اور بیماری کے اعادہ کو روکتی ہے۔

لاروسہ راسس: (Laurocerasus): بغیر کسی پیشگی علامت کے اچانک مرگی کا دورہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی نم دار جلد اور چہرے کے پنوں میں اینٹھن۔

## حرام مغز کی جھلیوں کا ورم

(Cecrebro Spinal Meningitis)

(دیکھئے ”گردن توڑ بخار“)

## کوریا (Chorea)

(امعصابی مرض جس میں عضلات بے اختیارانہ پھڑکتے ہیں)

(Disease of the Nerves Attended with Involuntary Twitchings)

(نیز دیکھئے "ہسٹیریا")

اگنیشیا: (Ignatia): خوف، دہشت، سزایا بری خبر کے باعث "کوریا" لاحق ہو۔ غم کے بعد یا جوش و جذباتیت کے بعد، بازوؤں میں جھنجھناہٹ، جوڑوں میں درد، ضدی اور چڑچڑاہٹ۔

کیوپرم میٹ: (Cuprum Met): تشنج میں مبتلا بچے کو رینگ کر میز کے نیچے گھستے دیکھنے کے بعد کوریا لاحق ہو، کوریا کی حرکات انگلیوں میں اور پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہو اور پھر بازوؤں اور ٹانگوں میں پھیل جائیں، سونے کے دوران بہتری ہو، لیکن جوں ہی جاگے بدترین تشنج اور عجیب و غریب بے ہنگم قسم کی حرکات دوبارہ شروع ہو جائیں۔

سٹرامونیم: (Stramonium): کوریا جس کا آغاز رونے کے رجحان کے ساتھ ہو، یا پھر ہنسنے اور چلنے والی خوش مزاجی کے رجحان کے ساتھ، بازو گھمائے اور ہاتھوں سے سر کو پکڑے اور آنکڑا سانبائے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): ریڑھ کی ہڈی کا کوریا، غیر متوازن چال اور پاؤں گھسیٹنے کے ساتھ۔ قبض لاحق ہو۔

کاسٹیکم: (Causticum): جب دائیں جانب، بائیں جانب کی نسبت زیادہ متاثر ہو۔ چہرے کے عضلات، زبان، بازو، ٹانگیں سب ہی متاثر ہو جائیں۔ بات کرتے وقت الفاظ جھکوں کے ساتھ ادا ہوں، مریض مسلسل اپنی حالت کو تبدیل کرتا رہے یہاں تک کہ تھک کر سو جائے ہو، بچے چلنا سیکھ رہے ہوں بہت جلد گر جائیں اور ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہو۔

مالیگیل: (Mygale): کوریا کے واضح کیسوں کے لئے، ٹانگیں حرکت میں رہیں جبکہ مریض بیٹھا ہوا ہو یا کھینتی ہو ملیں جبکہ مریض چلنے کی کوشش کرے۔

اگیریکس مس: (Agaricus Mus): دماغی کوریا، آنکھ کے ذہیلوں اور پلوں میں اینٹھن اور پھڑکن کے ساتھ، ہاتھوں اور پاؤں میں وتری تشنجی حرکات ہوں یعنی ایک طرف کا اوپر والا حصہ اور دوسری جانب کو نیچے والا حصہ متاثر ہو۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا: (Tarentula His): کوریائی حرکات، بازو اور دائیں ٹانگ میں ہو اور مسلسل جاری رہیں یہاں تک کہ رات کو بھی یہ خوف اور غم کے باعث ہو، بے چینی ہو ریڑھ کی حساسیت اور کپکپاہٹ کے ساتھ، مریض چلنے کی نسبت دوڑنے میں بہتر ہو، دماغی انتشار

ہو جو خاص طور سے موسیقی سے بہتر ہو۔

زنگم میٹ: (Zincum Met): مسلسل حرکت پاؤں میں جو رات کے دوران بھی جاری رہے۔ خصوصاً جب اس کا باعث پھٹیوں کا دب جانا یا خوف ہو۔

اکٹیارسی موسا: (Actea Racemosa): ریڑھ کی سوزش کے لئے جس کے ساتھ وجع المفاصل (گٹھیا) بھی لاحق ہو خصوصاً عورتوں میں سن بلوغ اور حیض کی بندش کے وقت جنونی اور باتونی ہو جائیں۔ مسلسل ایک موضوع سے دوسرے موضوع کو بدلتی رہیں۔ پٹھوں میں جھٹکن ہو جب کہ جوش کی حالت میں ہوں یا جاڑا (لرزہ) ہو رہا ہو۔ جس کروت لیٹا ہو اس جانب جھٹکے لگیں یا جسم کا جو حصہ دبا ہوا ہو اس میں جھٹکن ہو پٹھوں کا سن ہو جانا یا جھٹکے کھانے۔  
تھیسپیم: (Thaspium): کوریا، ہسٹیریا، مرگی، خود کشی کا رجحان ہو، طبیعت میں دباؤ ہو، ہنسے اور رونے بدلتا ہوا موڈ۔

فیرم آرس: (Ferrum Ars): قلت دم (خون کے ضائع ہو جانے کے باعث) کے باعث کوریا لاحق ہو۔

رہوڈوڈینڈرون: (Rhododendron): ہائیں ٹانگ، بازو اور چہرے کا کوریا، طوفان کی آمد پر ابتری ہو۔

اویٹا سیٹ: (Avena Sat): اعصابی رعشہ عمر رسیدہ لوگوں میں بازو اور ٹانگیں سن ہو جائیں جیسا کہ قارچ ہو۔

وسکم البم: (Viscum Alb): پکر آنے کے ساتھ کوریا میں یہ دوا بہت عمدہ ہے۔  
ہائوسکیمس: (Hyoscyamus): بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں، کپکپائیں اور سن ہوں، تشنجی حرکات ہوں اور لرزہ ہو، آنکھیں بہت نمایاں ہوں، مریض چیخنے چلائے اور دانت پیسے کھانے یا پینے کے بعد علامات ظاہر ہوں۔

لاروسیراسس: (Laurocerasus): مستقل جھٹکے لگیں، پھڑکن میں سکون نہ ہو سکے، عجیب علامات یہ ہیں: مریض ہانپے، ماتھا ٹھنڈا ہو، سر کی چوٹی پر وزن محسوس ہو، مریض انتہا درجے کا اعصابی ہو۔

آرسینیکم البم: (Arsenicum Alb): ٹانگوں اور بازوؤں میں کپکپاہٹ خصوصاً بازوؤں میں عادی شریبوں میں بازوؤں اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ، بے حسی کا احساس بازوؤں اور ٹانگوں میں جیسا کہ مردہ ہو دیا پایا۔

## کوما (بے ہوشی) — (Coma)

- برٹاکارب: (Baryta): مرگی میں کوما ہو۔
- انٹیم تارتارکیم: (Antim Tartaricum): دم گھٹنے کے ساتھ کوما، طلق اور بھیچڑوں کے نزل کے دوران، مریض کھانسی سے بیدار ہو جائے۔
- اوپیم: (Opium): خرخراہٹ والے تنفس کے ساتھ کوما ہو، بے اختیارانہ پیشاب، پاخانہ خطا ہو جائے، پیشاب میں خون یا پیپ کی سمیت، نبض بھرپور اور ست۔
- ایسڈ ہائیڈروسیانکیم: (Acid Hydrocyanicum): کوما ہو، دماغ میں اثر دہام خون کے ساتھ، جس میں اچانک تشنجی حرکات کے باعث خلل پیدا ہو جائے۔ مرگی کے دوروں میں گرفتار ہونے کے بعد۔
- زککم مٹلیکیم: (Zincum Metallicum): دماغی تھکاوٹ کے باعث کوما ہو، خارش کے دب جانے کے باعث۔
- جلسی میم: (Gelsimium): حرام مغز کی مھلیوں کے ورم (گردن توڑ بخار) میں۔
- لیکیس: (Lachesis): دوران مشقت کوما ہو جاتا۔
- گلوٹائن: (Glonoine): دھوپ کے باعث۔
- ہیلی بوریس: (Helleborus): دماغی چوٹ کے باعث۔
- ہیشیائی، فاس فورس، آرنیکا: (Baptisia T, Phosphorus, Arnica): ثلاثی فائید بخار میں۔
- کروٹیلز ایچ: (Crotalus H): فساد خون والے بخار میں کوما لاحق ہو، مرگی میں کوما ہو۔
- بوfo: (Bufo): مرگی میں گرفتار ہونے کے بعد ایسے افراد میں کوما کا لاحق ہو جانا جنہوں نے جلق وغیرہ کے ذریعے جنسی غلط کاریوں کا ارتکاب کیا ہو۔
- ٹیری: (Terebinth): کوما کی وہ قسم جس میں صرف ہلانے سے مریض کوما سے باہر آ سکے لیکن فوراً ہی دوبارہ کوما میں چلا جائے۔ چال میں لڑکھڑاہٹ، یوں محسوس ہو کہ مریض نشہ میں ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی بے حساسیت۔
- ایلو مینیم مٹلیکیم: (Aluminium Metallicum): ذیابیطس میں کوما کا لاحق ہونا۔ 200 ڈاکی لیوشن کی خوراک دینے۔
- سلفر: (Sulphur): مرگی کے بعد یا مرگی کے دوران۔
- پلاتینا: (Platina): زچگی کی اینٹھن (تشنج) میں۔

رینن کیولس بلبوسس: (Ranunculus Bulbosus): مرگی کے دورے میں 'جو شراب پینے سے لاحق ہو۔

## اختناق الدم — (Congestion)

(دیکھئے "سوزش، جلن")

## اینٹھن (تشنج)

(Convulsions)

بیلادونا: (Belladonna): اینٹھن کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ سرگرم ہو جس کے ساتھ چکن (پھڑکن) والا درد بھی ہو، آنکھیں گھورتی ہوئی ہوں (یعنی ٹنگلی بندھی ہوئی ہو) اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ نبض بھرپور اور اچھلتی ہوئی۔ دانت نکالنے کے دوران تشنج (اینٹھن) بچہ یک دم اکڑ جاتا ہے۔ بچوں میں تشنج جو اچانک ظاہر ہوتا ہے۔ سرگرم ہو اور پاؤں ٹھنڈے 200 ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے اور ہر چار روز کے بعد دہراتے جاسیئے یہاں تک کہ صحت پالی ہو جائے۔

کوکیولس: (Cocculus): تشنج (اینٹھن) بے خوابی کے بعد۔

جلمی میم: (Gelsimium): بخار کے ساتھ اینٹھن ہو، پہلے کندھوں میں درد ہو اور پھر کمر اور گردن میں اکڑن ہو، آنکھیں ایک جانب سے دوسری جانب گھومتی ہیں، مریض بے چین اور شدید گرم ہوتا ہے لیکن اس ساتھ ہی جلد پر نمی بھی ہوتی ہے۔

سنا: (Sina): بد ہضمی یا گرمی کے باعث ہونے والی بڑی آنت کی سوزش کی وجہ سے 'اینٹھن کا ہونا' بچہ ناراض ہو اور اس کی بھوک گھٹتی بڑھتی رہے 'بڑی آنت کی سوزش کے باعث جلد بھی غیر صحت مند ہو، چہرے کے عضلات میں پھڑکن۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): سوکھے (Rickets) کے مرض کے باعث جھٹکے (تشنج) لگیں یا دانت نکالنے کے دور میں یا نمونہ میں تشنج ہو۔

ہائیوسائیمس: (Hyoscyamus): چیخوں کے ساتھ اچانک زمین پر گر جائے اور جھٹکے کھانے لگے۔ بچوں میں تشنج خاص طور سے خوف کے باعث کھانے کے بعد اینٹھن۔

ایٹھوزا: (Aethusa): خصوصاً بچوں میں تشنج زبردست کمزوری اور خوابیدگی والی لاغری کے ساتھ 'تشنج کے ساتھ غنودگی اٹیوں اور پاخانوں کے بعد' آنکھیں الٹ جائیں اور یا اطراف کی بجائے نیچے کی جانب 'اوپری ہونٹ پر موتیوں جیسی سفیدی کے ساتھ چہرے پر جھٹکن ظاہر ہو

جائے' جس کی حد بندی 'ناک کے بیرونی سوراخ سے منہ کے زاویوں تک پھیلی ہوئی ایک نمایاں لکیر سے ہوتی ہے۔

ہیلی بوریس: (Helleborus): پیچک کے مانند پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث تشنج ہو' متواتر چبانے والی حرکت ہو' ایک ہاتھ اور پاؤں میں خود بخود حرکت ہو' سر پیچھے کی جانب کندھوں کی طرف مڑ جائے' سر تکیہ میں گھستا چلا جائے' بے ہوشی ہو' پیشاب کی بندش ہو۔

سیکونڈا وائروسا: (Cicuta Virosa): شدید جھٹکے' سر' بازوؤں اور ٹانگوں میں ہوں' بازوؤں اور پاؤں میں بدترین تحریک کے ساتھ تشنج ہو' سر کندھوں کی جانب پیچھے کو مڑ جائے' پنوں میں جھٹکے' چہرہ گہرا سرخ ہو' ہونٹ نیلے اور خون آلود ہوں۔ منہ سے جھانک اڑے' تشنج اوپر سے نیچے کی جانب اور وسط سے گردا گرد پھیلے' معمولی سے چھونے یا ہلکے سے ارتعاش سے بھی تشنج لاحق ہو جائے' ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہ ہو کہ کیا واقع ہو چکا ہے۔

زئیم فاس' اورم میور: (Zincum Phos, Aurum Mur): تاجروں' طلبہ' عیاشوں یا مرگی کا شکار ہونے والوں اور مرگی کے غلط علاج کے لئے سخت مشق بننے والوں میں' دماغ اور حرام مغز کے افعال میں ابتری واقع ہو جانے کے باعث تشنج ہو' علاج دی گئی ترتیب کے مطابق کیا جائے۔

کیوپرم میٹ: (Cuprum Met): نیلے چہرے اور بھنے ہوئے انگوٹھوں کے ہمراہ تشنج ہو' تشنج کے دوران قے ہو' زچگی والا تشنج' بڑھ میں تشنج' حملہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھوں اور پاؤں میں جھٹکے لگتے ہیں اس کے بعد آنکھوں کے ڈھیلے گھومنے لگتے ہیں۔ جو آخر کار اوپر کی جانب پلٹ کر ساکت ہو جاتے ہیں۔ ایسا تشنج جو پیشاب کی بندش یا پھنسیوں کے دب جانے کے باعث لاحق ہو۔ تشنج جو بازوؤں اور ٹانگوں سے شروع ہو کر جسم کے وسط تک پھیل جائے' ٹھنڈے مشروبات سے مرض کو افادہ ہو جبکہ مشروبات علامات کے آغاز میں دیئے جائیں۔

سلفر: (Sulphur): جب اچھی منتخب دوائیں ناکام ثابت ہو جائیں۔ اس کی 200 ڈائی لیوشن کی خوراک معان دوا کی حیثیت سے دی جائے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): تشنج ہوش کے ساتھ ہو جس کی وجہ بد ہضمی ہو' جیزوں کی چبانے والی حرکت' شراب کے بد اثرات کے بعد۔

کیموملا: (Chamomila): والدہ میں غصے کا دورہ ہونے کے بعد دودھ پلانے پر بچوں کو تشنج لاحق ہو۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران اگر بیلاڈونافیل ہو جائے تو یہ دوا دیں۔

اوپیم: (Opium): والدہ کے اچانک خوف زدہ ہو جانے کے بعد دودھ پلانے پر بچوں میں تشنج



کا ہونا، بچہ دہشت کے ساتھ جاگ جاتا ہے، چیختا ہے اور روتا چلاتا ہے یہاں تک کہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حرارت یا گرم کپڑوں وغیرہ سے ابھری ہو۔

گلوٹائین: (Glonoine): بچوں کا تشنج گرمی (حرارت) یا سر میں خون کے اثر دہام کے باعث جو دانت ٹکانے کے عرصہ کے دوران ہو۔ اگر ہلاڈونا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے، جھٹکوں کے دوران ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں پھیل جائیں اور اکڑ جائیں، تنفس میں دقت ہو اور دل کی دھڑکن سنائی دے۔

وریرٹرم ویرائیڈ: (Veratrum Viride): گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہو جانے کے باعث خون کی سمیت کا تشنج جس کے ساتھ نظر بھی کمزور ہو، تشنج کے دورے ہوں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں، ٹھنڈا چھپا پھیند آئے۔  
گریٹیولہ: (Gratiola): بے ہوشی کے بغیر تشنجی حالت۔

آرنیکا، ہائپرکیم: (Arnica, Hypericum): چینیوں کے ذریعے پیدائش ہونے یا دیر تک سر جکڑے رہنے پر فوری تشنج ہو۔ ہر دو گھنٹے میں 1000 پوٹینسی کی خوراک دی جائے یہاں تک کہ صحت یابی ہو جائے، آرنیکا میں سرگرم ہوتا ہے جبکہ جسم کا باقی حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔  
سیکیل کور: (Secale Cor): عضلات کی پھڑکن اور اینٹھن جسم کے بہت سے حصوں میں ہو، جس کے ہمراہ انگلیاں سخت، اکڑی اور پھیلی ہوئی ہوں، جسم میں اکڑن ہو جو بعض اوقات ڈھیلے پن سے بدل جاتی ہے۔

سٹرامونیم: (Stramonium): شدید تشنج جو جسم کے ہر شعبے میں ہو۔ اکڑن ہو، شدید توڑ مروڑ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں میں سکڑن ہو، زبان دانتوں سے کٹے، تشنج کی وجہ دہشت یا ڈراؤنے خواب ہوں، ہوش قائم ہوتے ہوئے، تشنج تیز روشنی میں آنے سے دوبارہ عود کر آئے، پانی کا منظر، روشنی یا آئینہ یا ہر وہ چیز جو چمکیلی ہو تشنج کے دورے کا باعث بن جائے، تنہائی اور اندھیرا برداشت نہ ہو سکے، پھینچوں کے دب جانے کے باعث تشنج لاحق ہو۔

## سرسام (حالت غشی یا دیوانگی)

(Delirium)

ہیلاڈونا: (Belladonna): شدید سرسام، سرخ خون آلود آنکھوں کے ساتھ، مریض کپڑے پھاڑتا ہے، دانت کاٹتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، فھو کریں مارتا ہے، درد ناک آواز میں داویلا کرتا اور چیختا چلاتا ہے، اور بعض تصوراتی اشخاص سے دور کہیں بھاگ جانا چاہتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سرد ہوتے ہیں جبکہ سرگرم ہوتا ہے۔ حدت اور جلن تمام جسم میں ہوتی ہے، کہیں بھاگ جانا چاہے،

شدت کے باعث کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دیتا چاہے 'اونٹنوں کے ساتھ کانٹے کی رغبت ہو' سر میں خون کے اثر وہاں میں 'بخار میں' سرسام ہو' بلاؤں یا عفرتوں کو دیکھے 'دانت نکالنے کے دوران' چہرے میں تروڑ مروڑ ہونے کے ساتھ سرسام ہو' دانت پینا مارنے کوٹنے کی رغبت' لگنے میں دقت ہو' ذہل یا رسولی وغیرہ کے غائب ہو جانے پر سرسام کا ہو جانا' چوہوں اور چوہیوں وغیرہ کے خواب دیکھے یا قریب نظر ہو۔

**ہائوس سائیکس:** (Hyoscyamus): سفالانہ انداز کے ساتھ چوری کا اصرام لگنے کے بعد سرسام کا لاحق ہو جانا۔ آنکھیں غم آلود ہوں اور چمک دار ہوں۔ عظیم جسمانی فعالیت کے ساتھ۔ حسد و جلن کے ساتھ گفتگو کرنے سے سرسام کا لاحق ہوئے۔ ہشیریا کے باعث سرسام ہو جائے 'تصوراتی غلطیوں کا دیوانہ پن' خود کو ننگا کرنا چاہے 'مرض کی شدت کے اعتبار سے ہائوس سائیکس' ہلاڈونا اور سٹرامونیم کے بیچ کی دوا ہے۔ مریض قہقہہ اور گندے لگنے لگتا ہے۔ یہ سرسام بے ہوشی کے دوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مریض خود ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔

**سٹرامونیم:** (Stramonium): ہڈیاں و سرسام کی تین اہم دواؤں میں سے یہ تیسری دوا ہے۔ پہلی دو ادویات ہلاڈونا اور ہائوس سائیکس ہیں۔ مریض کسی شخص کو غم خواری کے لئے بلائے۔ خوف سے بھرا ہو اور خیال کرے کہ جیسے کہتے اس پر حملہ کیا ہی چاہتے ہیں۔ شدید سرسام لیکن اتنا شدید نہیں جتنا ہلاڈونا یا ہائوس سائیکس میں ہوتا ہے۔ فوت شدہ بے تکلف دوستوں کی روحوں کے ساتھ باتیں کرے حالانکہ وہ موجود نہ ہوں۔ بھوتوں کو دیکھے اور ان کی آوازیں سنے 'جنسی جوش کے ساتھ مخبوط الحواس' شرمیلا ایسا کہ خود کو چھپا لینا چاہے 'متواتر ہنستا چلا جائے' اہمقانہ انداز میں تمایاں پیئے اور آنکھیں پھاڑے 'قریب نظر کے ساتھ شور و غوغا کرے۔ بے ربط ہڈراہٹ 'تمام قریب ہائے نظر مریض کے اندر دہشت اور خوف کی پیداوار کا باعث بنتے ہیں' سرخ کی بجائے چیزوں کو سیاہ رنگ میں دیکھتا ہے 'پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے۔

**اگیریکس ایگ:** (Agaricus): عظیم ذہنی بیجان (ہرلنگ بختنگی) خوش مزاجی 'ہست' باتنی پن' بے ترتیب و بے ربط گفتگو 'لمبھولیا' سرسام ایسا جس میں شعر کہنے اور پیشین گوئیاں کرنے اور اپنے ساتھیوں کو چوسنے کا رجحان موجود ہو۔

**لکے سس:** (Lachesis): ہڈراہٹ والا سرسام 'کھوپڑی کا سرخ باد' آنکھیں بند کرنے پر 'سر پر کے وقت یا سونے کے بعد سرسام کے دورے ہوں' چیچک 'خسرو وغیرہ کے دب جانے کے باعث قہقہہ 'ہلا پن' خنق میں چہرے پر خون کی کمی اداسی کے اظہار کے ساتھ ہو 'سانپوں اور دیگر خوفناک چیزوں کے خواب' گلے میں دم گھٹنے کا احساس ہو اور اچانک سوتے میں اچھل پڑے اور یوں محسوس ہو جیسے ابھی خواب میں ہے۔

**ہوفو:** (Bufu): اسل کے ساتھ سرسام۔  
**پلمبم:** (Plumbum): سرسام جو قویج کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس احساس کے باعث سرسام کا ہونا کہ مریض کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے قتل کیا جانے والا ہے یا زہر دیا جانے والا ہے اور یہ احساس کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں سب قاتل ہیں۔

**کیوپرم میٹھ:** (Cuprum Met): بیضہ میں سرسام ہو، مریض فرار ہو جاتا چاہے، پیشاب کی بندش یا غارش وغیرہ کے دب جانے کے باعث سرسام ہو جائے۔

**ویرینٹرم ویرائیڈ:** (Veratrum Viride): بچے کی پیدائش کے دوران سرسام ہو جانا، بخار یا زچگی کا سرسام، گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہو جانے کے باعث خون کی سمیت والا سرسام، ہیٹ کا پھول جانا، آنکھوں کی ٹکلی بندھ اور وحشت ناک ہو جانا، دونوں ہاتھوں کو مسلسل حرکت ہو، نبض کمزور ہو، دل کی دھڑکن میں شدت ہو۔

**آرینیکم البم:** (Arsenicum Alb): افسردگی (طبیعت میں دباؤ) بے چینی، موت کا خوف، اکیلے ہو جانے کا خوف، خودکشی کا رجحان، دماغ اور تمام جسم میں قلت دم واقع ہو جائے۔

**اکتیارسی موسا:** (Actea Racemosa): سرسام کے دورے ہوں، تمام قسم کی چیزوں کو کئی رنگوں اور شکلوں میں دیکھتا ہے۔ چوہے، سانپ، شیر، کھٹل، پھوٹے کیزے، کھیاں وغیرہ مریض کو نظر آتی ہیں، باتونی ہو اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کو بدلتا رہے، چڑچڑاپن، بے چینی اور بے خوابی اس کی علامات ہیں۔

**نکس وامیکا:** (Nux Vom): سرسام کے دورے اس وقت ہوں جب کہ مریض روٹھا ہوا ناراض، چڑچڑا، بد وضع ہو اور یہ سب شراب کے استعمال کے باعث ہو۔

**بپٹسیا:** (Baptisia): ذہنی (خلاق) میں سرسام کا ہو جانا، سرسام ہو بہرے پن کے ساتھ۔

**اوپیم:** (Opium): ایسے پرانے گناہ گاروں میں سرسام جنہوں نے بے اعتدالیوں کے باعث اپنی صحت تباہ کر لی ہو، کمرے کے متعدد حصوں سے مختلف قسم جانوروں کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھیں۔ مریض بھوتوں اور شیطانوں کو ملاحظہ کریں اور ان کے ساتھ باتیں کریں۔

**کینابیس انڈیکا:** (Cannabis Ind): جاہ و جلال اور شان و شوکت کے خیالات، خلا اور وقت کے بارے میں غلط اندازے قائم کرے۔

**کینتھارس:** (Cantharis): شدید سرسام جس میں جنسی خیالات اور گفتگو کی ملی جلی کیفیت ہو۔ شہوت انگیز اور گندے گانے گائے اور انسانی اعضائے نکاسل اور پیشاب پانخانہ کے متعلق باتیں کرے۔

**کلکیریا کارب:** (Calcarea Carb): مریض جیسے ہی ایک لمحہ کے لئے آنکھیں بند کرے اسے خوفناک مناظر نظر آئیں جو اسے دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیں 'جانوروں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ کھیلے (یہ حالت اعصابیت کے باعث ہوتی ہے)۔

**چائنا:** (China): مختلف چیزوں کو اور لوگوں کو دیکھے جیسے ہی آنکھیں بند کرے اور آنکھیں کھول دینے پر یہ سب کچھ غائب ہو جائے 'شدید کمزوری' بھوک جاتی رہے اور کھانا کھا کر سونے کی نہ رکنے والی خواہش ہو 'یا پھر یہ حالت بے خوابی کے ساتھ بدل جائے 'قلب الدم۔

**زینک میٹ:** (Zincum Met): اونچے درجے کی حرارت 'بے ہوشی اور بازوؤں اور ٹانگوں کے جھٹکے کھانے کے ساتھ سرسام کا ہو جانا۔

**کوکولس:** (Cocculus): اچانک حیض کے جاری ہو جانے پر سرسام کا ہونا حسب ذیل دسوس کی دماغی علامات کے ساتھ: یوں محسوس ہو جیسے کوئی زندہ چیز دیواروں 'فرش' کرسیوں وغیرہ پر لڑھک رہی ہے اور یہ کہ خود اس کے ساتھ بھی لپٹ رہی ہے۔

## سوزش (ورم دماغ)

### Encephalitis (Inflammation of the Brain)

**جلی میم:** (Gelsemium): کمر میں نیچے کی جانب ٹنکی ہو جو مریض کو ہلا کر رکھ دے۔ طویل اور تھکا دینے والی حدت 'گردن اور کندھوں کے پٹھوں کی دکن کے ساتھ سر درد ہو۔ (بے حسی) سستی 'چکر' غفلت 'دوران سر (اضطراب) 'پانی کی طرح کی رطوبت ناک سے بے 'چہرہ گرم بھاری اور سرخ ہو 'پٹلیں بھاری ہوں' نظر میں کمزوری ہو 'مضلات پر قابو باقی نہ رہے۔

**آر سینیکم البم:** (Arsenicum Alb): جب ذہنی انتہی کی تبدیلیاں دماغ یا کسی دوسرے عضو میں ہونا شروع ہو جائیں۔

**ہائوسائیمس:** (Hyoscyamus): دماغی سوزش 'سر اور چہرے میں خون کا اثر دہام' شدید ٹپکن (پھڑکن) ہو 'غنودگی' سرسای شدت۔

**سٹرامونیم:** (Stramonium): دماغ کی سوزش 'حدت اور سر کے چوٹی والے حصہ میں ارتعاش کے ساتھ دماغی سوزش کا ہونا' سرسای دورے 'اپنی پہچان کے متعلق مغالطہ ہو' روشنی اور رفاقت ضروری ہو۔

**ہیلی بوریس:** (Helleborus): بے ہوشی کے ساتھ دماغ کی سوزش کا ہونا 'یادداشت کمزور ہو' مانگو لیا ہو 'اوٹھ آتی رہے۔

**ارجنٹم نائٹ:** (Argentum Nit): یہ دوا بلغمی مصلیوں پر عمل کرتی ہے۔ خصوصاً غذا کی ٹہلی

پر 'اس کا عمل دماغ پر کراہوتا ہے۔ اعصابی غلیوں کے جلیسی میم کی نسبت زیادہ تر بگاڑ اور زیادہ تر تخریب پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کا اثر عضلات پر نسبتاً کم ہوتا ہے۔  
 ہینیشیا: (Baptisia): گھومتے پھرتے رہتا، بڑبڑاتے رہتا، سر سام ہو، بے ہوشی یا بے حسی ہو، باتیں کرتے کرتے گر کر سو جائے، دماغی پریشانی کا ہونا، سر میں دھن دھن محسوس ہو، سر بہت لمبا محسوس ہو، سانس متعفن ہو، رویہ جارحانہ ہوتا ہے۔

### مرگی — (Epilepsy)

کاسٹیکم: (Causticum): سن بلوغ میں قدم رکھنے کے ساتھ مرگی لاحق ہو جائے جس کا باعث حیض میں بے قاعدگی ہو یا خارش، پھوڑے، پھنسی وغیرہ کا کادب جانا ہو یا کسی قسم کا خوف ہو، نئے چاند پر اتھری ہو، بے اختیار اندہ پیشاب خطا ہو جائے، ٹھنڈا پانی پینے سے بہتری ہو۔  
 پیسی فلور انک: (Passiflora Inc): عرصہ حیض کے موقع پر اس مرض کا حملہ ہو، چھاتی میں ٹھنک کی لرز اور سختی (جکڑن) کا احساس ہو۔

اوشنتسی کروکاتا: (Oenanthe Crocata): اچانک اور عمل بے ہوشی، خطرناک قسم کے تشنج کے ساتھ، نوجوان لڑکیوں میں حیض کا نہ ظاہر ہونا جو مرگی اور تشنج کی طرف لے جائے، اس عرصہ میں اتھری ہو جس عرصہ میں حیض ہونے چاہئیں، مخصوص علامات حسب ذیل ہیں: 'تے' اچھارہ اور حملے کے دوران نیم ایستادگی، سو جا ہوا سرخ چہرہ جس کے ساتھ منہ سے جھاگ آئے۔

پلمبم: (Plumbum): جب دماغ کے پردوں میں ورم یا دبلوں (Tumors) کے باعث مرگی لاحق ہو، حملے سے قبل بھاری پن اور قانچی کیفیات ظاہر ہوں اور بعد میں طویل خزانے ہوں، شدید قبض ہو۔

بیلادونا: (Belladonna): صرف تازہ کیسوں میں یہ دوا استعمال کی جائے۔ جھپکے (تشنج) ہاتھوں اور بازوؤں سے شروع ہو کر چہرہ آنکھوں اور منہ کی طرف پھیل جائے۔ مختصر دورانیہ کے دورے دن میں کئی مرتبہ پڑیں اور جلد ہی ختم بھی ہو جائیں۔

ارجنٹم نائٹریکیم: (Argentum Nitricum): خوف کے باعث یا حیض آنے کے موقع پر مرگی ہو، حملہ سے پہلے دنوں یا گھنٹوں کے لئے پتلیاں پھیل جائیں، حملہ کے بعد بے چینی ہو اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو، تیز چیخے، شدید عضلاتی پھڑکن ہو خصوصاً گلے میں، عمل بے ہوشی، منہ پر جھاگ کے ساتھ، اکثر اپنی زبان کو کات لے، پھر تقریباً تین گھنٹوں کے لئے گہری نیند سو جائے، میٹھے پھل کھانے سے دورہ پڑ جائے۔

**کیورم متلیکم:** (Cuprum Metallicum): ٹھنڈک کی لہریاؤں کی جانب سے اٹھنا شروع ہو اور پیٹ کے زیریں حصہ تک چڑھ آئے، جب کہ بے ہوشی ہو اور تشنج ہو، نیز منہ میں جھاگ آجائے، حملے کے دوران مریض مسلسل اپنی زبان منہ سے باہر نکالے اور اندر کرے، گرم کمرے میں اتھری ہو، حملے سے قبل گرانی والا شدید درد سر ہو۔

**نیٹرم میور:** (Natrium Mur): حملے سے قبل اور دوران بازوؤں اور ٹانگوں میں پھڑکن ہو، روٹی سے بے زاری ہو، کند ذہنی، سوچنے میں دقت ہو، افسردگی اور چڑچڑاہٹ ہو، ٹھنڈک کی لہریاؤں سے شروع ہو یا یوں محسوس ہو کہ چوبانگ سے اوپر کی جانب پیٹ کے دائیں طرف کو دوڑ رہا ہے۔ حملوں سے پہلے پکر آئیں نیند ہو اور دانت مل جائیں (یعنی دندان پڑ جائے) نیز حلی اور تے ہو، منہ پر جھاگ آجائے، کپکپاہٹ ہو، جسم کو جھٹکے لگیں اور تانگیں سختی کے ساتھ اوپر کو اٹھ جائیں، ہاتھ بھینچ جائیں لیکن انگوٹھے اندر کی جانب نہ مڑیں، ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھنڈک ہو، حوض کے دوران اتھری ہو، سوزاکی بے ہوشی کے مزمین کیس، دلی ہوئی خارش۔

**نکس وامیکا:** (Nux Vom): ہوش کے ساتھ تشنج، غصے، چھوئے جانے، جوش، حرکت اور بد ہضمی سے اتھری ہو، تشنجی سختی والے جھٹکے، اکڑن ہو، چہرہ سرخ ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں، دورے کے دوران بے اختیارانہ پانخانہ و پیشاب نکل جائے، پیٹ کے اوپری حصہ میں ٹھنڈک کے لہر دوڑے، حملے کے بد کمری نیند ہو، کھلی ہوا میں اتھری ہو۔

**کالی بروم:** (kali Brom): جب دورہ نئے چاند کے ساتھ آئے اور دورے کے بعد درد سر ہو، کند ذہنی، احساسات کے اعتبار میں سستی ہو، پکر آئیں، چال میں لڑکھراہٹ ہو، بد مزاج اور اونگھتا رہنے والا۔

**لونا:** (Luna): مری پورے چاند کے ساتھ ہو۔

**بوفو:** (Bufo): جب کہ جلق اور جھنسی بے اعتدالیوں کے باعث مرض لاحق ہو، دوران مباحثت دورہ پڑ جائے، پیٹ میں بے چینی کا ایک عجیب احساس، اور پھر اچانک ہوش جاتے رہیں، حملہ سے قبل آنکھوں کی پتلیاں بے تحاشہ کھلی ہوئی ہوں اور ان پر روشنی کا کوئی اثر نہ ہو، ٹھنڈک کی لہری جھنسی آلات یا پیٹ سے شروع ہو، حملہ سے قبل منہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہو، اور حملہ کے بعد جڑے لٹک جائیں، حملہ کے بعد پیشاب بے اختیارانہ خطا ہو جائے۔

**برٹامیوری ایٹی کم:** (Baryta Muraticum): خون کی ٹالیوں کے ڈھیلا پڑ جانے کے ساتھ، دہلاپے اور کمزوری کے ساتھ، نیز غشی کے دوروں کے ساتھ، موسم بہار میں شکایات میں اتھری آجائے، تمام بدن میں سرسراہٹ ہو۔

**آرٹی میزیاوی:** (Artimisia V): شدید جذبات کے باعث دورے پڑیں، جھٹکے جلدی جلدی

لگیں اور بعد میں لمبا وقفہ ہو۔

**ایلیومینا (Alumina):** زیادہ تر دورے اس وقت پڑیں جب پاخانہ کر رہا ہو۔  
**ابسینتھیم (Absinthium):** جب دورے سے قبل کپکپاہٹ ہو، چکر آئیں اور غنودگی ہو،  
 حملہ کے بعد یادداشت کھو جائے اور ٹھنڈی اور ٹھلی پوٹیشی کی ڈائی لیوشن دیجئے۔  
**اگنیشیا (Ignatia):** مرگی کے دورے ہو کہ جذبات کو نہیں لگ جانے یا بہت بڑے خوف کے  
 بعد لاحق ہوں، خاموشی سے غم برداشت کرنے کے ساتھ یا غصے سے دورے پڑیں، جوش سے  
 اور نا آسودہ محبت کے باعث دورے ہوں۔

**تھوجا (Thuja):** حافطی نیچے گرنے کے بعد مرگی کے دورے پڑنے لگیں، جب وہ آبلہ عائب  
 ہو جائے جو حافطی نیکہ لگوانے کے بعد پیدا ہو، کانوں میں بہہ پن محسوس ہو حملے کے بعد ایک  
 ایم ڈائی لیوشن دیجئے۔

**سٹانم (Stannum):** دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران مرگی کے دورے ہیٹ میں کپڑوں کی  
 علامت کے ساتھ، چہرہ زرد ہو اور اس کے ساتھ ہاتھوں اور آنکھوں میں پھڑکن ہو، نیز ساتھ  
 میں بازو اور پاؤں لہرائے۔

**لائکی کو پوڈیم (Lycopodium):** بہت ہی منطقی ذہن رکھنے والے ضدی اشخاص میں مرگی،  
 علامت انگیز رویہ، ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کریں جنہیں بے وقوف خیال کرتے ہوں لیکن  
 اپنا یہ حل ہو کہ خود اعتمادی کے فقدان میں مبتلا ہوں، سر پر کے وقت ابتری ہو۔

**سیلیسا (Silicea):** دبے، لمبے، گہرے رنگ والے، سرد مزاج، مغرور اور پیاس نہ محسوس  
 کرنے والے اشخاص میں مرگی، پاخانہ لیس دار اور قبض کے ساتھ ہو، ہتھیلیوں میں پسینہ آتا  
 رہے اور غیر صحت مند جلد ہو، نئے اور پورے چاند کے موقع پر راتوں کو مرگی کے حملے ہوں۔  
**وسکم البم (Vescum Alb):** ایسی مرگی کے لئے جس میں حملے کے بعد پتھر آتے رہیں۔

**کلیبریا کارب (Calcarea Carb):** بچوں میں مرگی، کھلے ہوئے تالو اور دیر سے دانت  
 نکالنے کے ساتھ، سر اور گردن پر پھینہ ہو، حملے سے خوف ہو اور اس کی اذیت پر گڑھے جس  
 کے باعث لمٹھولیا میں مبتلا ہو جائے، پھنیوں کے دب جانے، جلق یا جھنسی بے اعتدالیوں کے  
 باعث مرگی کا ہونا، بازوؤں میں یا خوف معدہ سے نیچے کی جانب کسی چیز کے جلنے کا احساس ہو،  
 اچانک چکر کا حملہ ہو جائے، شیش کے بغیر حواس کا کھو جانا، حملے سے قبل منہ میں چبانے والی  
 حرکت ہو، گزیراہٹ اور یادداشت کا کھو جانا، درد سر، غنودگی، پیاس اور بھوک حملے کے بعد ہو۔  
**سیکیوٹاوائی روسا (Gicuta Virosa):** اچانک سختی ہو جس کے بعد جھٹکے لگنے لگیں اور  
 شدید توڑ پھوڑ ہو، تنفس میں دباؤ پیدا ہو جائے، جڑے بند ہو جائیں، چہرہ گہرا سرخ ہو جائے، منہ

پر جھاگ آجائے، حملے کے بعد بہت زیادہ غصہ ہو، معدے کی سوزش کے ساتھ مرگی کے دورے، دورے کے دوران انگوٹھے اندر کو مڑ جائیں، حملے کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہے، مریض ایک ہی چیز کو گھورتی رہتی ہے اور اگر وہ نظر کو ہٹالے تو فوراً گر کر بے ہوش ہو جائے، معمولی سے پھو جانے یا جلنے سے دورے میں اتھری ہو جاتی ہے۔

تھیسپیم: (Thaspium): ہسٹیریا، مرگی اور کوریا خود کشی کی رجحان کے ساتھ ہو، رونے اور جنسنے کا بدلہ ہوا رجحان، خصوصاً سونے کے دوران کوریا لاحق ہو، ہونٹوں میں سرسراہٹ ہو، بازوؤں میں نامعقولیت اور تشنجی پھڑکن، مردوں میں مباشرت کے بعد لاغری، عورتوں میں بائیں بیض دان میں درد، حیض میں رکاوٹ کے ساتھ۔

ہائوسکیمس: (Hyoscyamus): پھڑکن اور جھٹکن، منہ پر جھاگ اور زبان کاٹنے کے ساتھ، حملے سے قبل بھوک ہو، خوف کے باعث مرگی کا دورہ، دورے سے پہلے چکر آئیں، کانوں میں گھنٹیاں بھیں، آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑیں، آنکھیں مارے، دانت پیسے اور پیشاب خطا ہو جائے جس کے بعد سو جائے اور خرابے لے۔

ایگریکس ایم: (Agaricus M): ایسی مرگی میں یہ دوا دی جاتی ہے جس میں حملے کے بعد خیالات کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مریض بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ ہر سات دن کے بعد مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ہمائوں کے غلبہ کے ساتھ دورہ شروع ہوتا ہے۔

ف فیرم فاس: (Ferrum Phos): پیلاژڈن کے برعکس مریضوں کے لئے یہ دوا ہے، یعنی قلت دم والے، کمزور، اعصابی، زرد چہرے والے، ہلکی جھلی زرد والے مریض۔

گلوٹائین: (Glonoine): بہت زیادہ شدت، حملے سے پہلے یا بعد میں چھتیس یا اڑتالیس گھنٹے تک دھڑکن اور دباؤ والا درد ہو، گرم کمرے یا گرم اشیاء کے استعمال سے مرض میں اتھری ہو، دل کی دھڑکن تمام جسم میں محسوس کرے۔

سلفر: (Sulphur): یہ معاون دوا کے طور پر استعمال کی جاتی چاہئے، خصوصاً جب کہ مرگی کا سبب موروثی ہو، یہ ایک ایم ڈائی لیوٹن دی جاتی چاہئے، یہ ٹی بی کے رجحان کی نشان دہی کرتی ہے اور خارش یا پھوڑے پھینچوں کے دب جانے کی نشان دہی کرتی ہے۔

زنکم فاس: (Zincum Phos): دماغی انحطاط کی دوا ہے جو کہ کسی بھی قسم کی مرگی کے باعث پیدا ہوا ہو، جس کی اصلاح کے لئے کثرت کے ساتھ برومائیڈ استعمال کئے گئے ہوں۔



## غش کھانا — (Fainting)

ماس کس: (Moschus): معمولی سے جوش کے باعث غش کھا جاتا، اگر ہشیریا کی طرف رغبت ہو۔

اوپیم، اکونائٹ: (Opium, Aconite): جب خوف زدہ ہو جائے۔

سلفر، فاسفورس: (Sulphur, Phosphorus): بھوک سے غش کھا جاتا۔

سلفر، کوئیم، پوڈوفیلیم: (Sulphur, Conium, Podophyllum): پائخانہ کے بعد غش ہو۔

گمشیا کارب: (Magnesia Carb): مریض جب رات کا کھانا کھانے بیٹھے تو غش کھا جائے۔

الیومنا: (Alumina): جب کھڑا ہونے کے لئے مجبور ہو جائے۔

کاربو وچ: (Carbo Veg): جب بیٹھنے کے لئے مجبور ہو جائے۔

لائیکوپوڈیم، تھوجا، میوریکس: (Lycopodium, Thuja, Murex): حیض سے پہلے اور نیچے لینے پر غش ہو۔

ایسٹک الیڈ: (Acetic Acid): کمزوری میں غشی کے دورے ہوں، قلت دم والے اعضاء

درد سر، چہرہ زرد اور موم کی طرح کا نکسیر اور نہ بچنے والی پیاس، اس دوا کی علامتیں ہیں۔

امونیا کارب: (Ammonia Carb): کونکے کے بخارات کے زہر کے باعث غشی ہو۔

اوپیم: (Opium): کونکے کی گیس سانس کے ذریعے اندر داخل ہو جانے کے باعث غشی، مریض کو اونگھ، بے ہوشی ہو اور درد کا احساس نہ ہو۔

ایسافوئیڈا: (Asafoetida): انزال کے بعد غشی ہو۔

ایگریکس: (Agaricus): مباشرت کے بعد غشی ہو۔

سپیا: (Sepia): تنگی اور تھکاوٹ کے دوران غشی۔

نکس موسکاٹا: (Nux Mochata): جب دیر تک کھڑا رہے یا بظاہر کسی بھی وجہ کے بغیر ہی

غشی ہو، قبض اور یواسیر کا رجحان ہو، جب مریض خون دیکھ لے تو غش کھا جائے یا کسی شدید درد کے باعث غشی ہو۔

پٹرولیم: (Petroleum): دل کی دھڑکن کے بعد غشی۔

بربرس وگلرس: (Berberis Vul): اگر گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے غشی ہو تو یہ دوا دیتے۔

سپائی جیلیا: (Spigelia): دل کی تکلیف کے باعث غشی ہو تو یہ دوا دی جائے۔

آرنیکا ایم: (Arnica M): اگر کینیکل زخم کے باعث فحشی ہو۔  
 کروکس: (Crocus): اگر ناک سے خون بہا کرے۔  
 چائنا: (China): اگر اتنا کون گئے کہ نفاست ہو جائے اور اس کے باعث فحشی ہو تو یہ دوا دی جائے۔

### درد سر — (Headach)

(نیز دیکھئے "اعصابی درد" اور "آدھے سر کا درد")

بیلادونا: (Belladonna): کنپٹیوں میں ٹھوکریں لگنے اور پھن دالا درد سر ہو جس کے ساتھ چہرہ آگ کی طرح سرخ اور گرم ہو، آنکھوں میں خون بھرا ہو اور سرخ ہوں، چہرہ سرخ اور پھولا ہوا ہو، جیسے اچانک درد ظاہر ہو ایسے ہی اچانک غائب ہو جائے، سورج کی گرمی یا دھوپ کے باعث درد سر ہو جس کے ساتھ بھرپور نبض ہو، بے ہوشی ہو جائے۔  
 جلسیم: (Gelsimium): گردن کے قریب گدی سے درمیں شروع ہوں اور سارے سر میں پھیل جائیں، ان دردوں کے باعث ماتھے اور آنکھوں کے ڈھیلوں میں پھن کا سا احساس ہو، یوں محسوس ہو کہ سر بھرا ہوا ہے اور بڑا ہے، بے ہوشی ہو، یوں محسوس ہو کہ سر کے گرد ایک ٹی بندھی ہوئی ہے۔

گلوٹائن: (Glonoine): گیس کی روشنی کے نیچے کام کرنے یا دھوپ میں جہاں گرمی براہ راست سر پر اثر انداز ہو، کام کرنے کے باعث درد سر ہو، سر بہت زیادہ بڑا محسوس ہو، لو لگنے یا سورج کی دھوپ کے باعث درد سر ہو جس میں بے ہوشی نہ ہو، ٹھنڈی چیزوں کے استعمال یا سر کو بلند رکھنے یا طویل نیند لینے سے بہتری ہو لیکن تھوڑی نیند بعض اوقات مرض میں اضافہ کر دیتی ہے۔ شدید درد سر ہو، مریض جس کے باعث کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔

نیٹرم میور: (Natrium Mur): جب درد سر سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھے اور غروب ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہو۔ درد سر پہنے کے ساتھ، جتنا شدید درد ہو اتنا ہی زیادہ لمبیہ بنے، سکول کے لڑکے، لڑکیوں میں درد سر، آنکھیں ایک جگہ مرککز کرنے سے اجڑی ہو، بلی کھاتے ہوئے شرارے سے نظر آئیں درد سر سے پہلے، ہتھوڑے لگنے کا سادرد سر جیسا کہ سر میں ہتھوڑے مارے جا رہے ہوں، درد سر سے سر پھٹے، یوں محسوس ہو کہ سر کسی قلعہ میں کسا جا رہا ہے۔ جیسے کھوپڑی پکلی جائے گی، نظر میں خلل آجائے کے باعث درد سر۔

سپاکی جیلیا: (Spigelia): اعصابی درد جو دماغ کی جڑ میں صبح کے وقت شروع ہو پھر سارے سر میں پھیل جائے آنکھوں کے گڑھوں تک جائے اور بائیں کنپٹی تک جائے، آنکھوں کے

ذہیلوں میں دباؤ کے ساتھ ناقابل برداشت درد ہو، بائیں جانب کے عضلات میں اضطرابی حرکت ہو۔ شدید اعصابی درد کے ساتھ۔ درد شام کے وقت غائب ہو جائے یوں احساس ہو کہ جیسے سر کی چوٹی کو باندھ دیا گیا ہو۔

نیٹرم فاس: (Natrium Phos): عرصہ حیض کے دوران درد سر۔ حیض گاڑھا، لو تھوڑے دار، گرمے رنگ والا خارج ہو اور صرف ایک دن تک ہی جاری رہے، پتے کی پتھری کا قویج، پاؤں ٹھنڈے ہوں، خود کشی کرنے کی تحریک ہو۔

سینگوئی نیروسی: (Sanguinaria C): اس کی علامات بھی سپائی جیلیا ہی کی طرح کی ہیں سوائے اس کے کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے۔ کھانا نہ کھانے کے باعث صفراوی درد ہو، شریانیں اور کپٹیاں پھولی ہوئی ہوں، درد سرفشتہ میں ایک بار ہوتا ہے۔ درد صبح جاگنے پر شروع ہوتا ہے جو چاند سے شروع ہو کر دائیں آنکھ اور کپٹنی کی طرف سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ مریض کو یہ درد اندھیرے گرمے میں لے جا کر لٹا دیتا ہے، تے ہوتا شروع ہو جاتی ہے جس سے کچھ سکون ملتا ہے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے ٹگوں سے گرمی خارج ہوتی ہے، پھاڑنے والا درد جو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ اترتا چلا جائے، جھوٹی بھوک ہو جس کے ساتھ سوچنے اور خوراک کی بو سے بے زاری ہو۔

پلاٹینا: (Platina): ایک قسم کا شدید اعصابی درد جس سے چہرے کے عضلات میں اضطرابی حرکت ہوتی ہے۔ دائیں آنکھ سے درد پیچھے کی جانب پھیل جاتا ہے۔ یہ درد تیزی سے بڑھتا ہے اور آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنے کا سبب بنتا ہے۔ 1000 ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

سیڈرن: (Cedron): شدید ناقابل برداشت درد جو روزانہ 6 بجے شام کو ہوتا ہے، چہرے کے عضلات میں پھڑکن والا اعصابی درد۔

برائی اونیا: (Bryonia): جھٹنے پر درد سر کا ہونا، پوس محسوس ہو کہ جیسے دماغ ماتھے کے راستے پھٹ کر باہر آجائے گا۔ حرکت کرنے سے ابتری ہو، کھیلنے، کھیل دیکھنے پر ہونے والا درد سر۔

میلی لوتس: (Mellilotus): شدید اجتماع خون کے ساتھ اعصابی درد سر جس کو نکسیراناک سے خون بہنے سے) سے افادہ ہو۔ سر میں خون کے اثر دہام کے باعث ہونے والا درد سر جس میں یوں محسوس ہو کہ بھیجہ ماتھے کے راستے پھٹ کر نکل جائے گا۔

کولن سونیا: (Collinsonia): ایسا درد سر جس کے ساتھ بوا سیر اور قبض کا عارضہ بھی ہو۔

چائنا آف: (China Off): درد سر جس میں، سر میں اثر دہام خون، ٹپکن ہو اور ہتھوڑے لٹنے کا احساس جو کپٹیوں پر لگیں، معمولی پھوٹنے یا دبانے سے ابتری ہو جبکہ زور سے دبانے پر بہتری ہو۔

کالی بانیکیرام: (Kali Bi): اگر سر میں درد نظر کے دھندلا جانے کے ساتھ ہو تو یہ دوا دیں  
جوں جوں درد سرتیز ہوتا چلا جائے نظر درست ہوتی چلی جائے۔  
کالی سائن: (Kali Cyan): پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد۔

کالی کارب: (Kali Carb): جب نزلہ کے باعث اخراج (پیشاب، پیسہ وغیرہ کا) بند ہو جائے  
تو سر میں درد ہو لیکن جیسے ہی اخراج درست ہونا شروع ہو، سر کا درد بھی درست ہوتا چلا  
جائے۔

لیک ویک: (Lac Vac): متلی اور قبض کے ساتھ درد سر کا ہونا یا پھر حیض آنے کے موقع  
پر درد سر ہو، بکثرت پیشاب آنے سے بہتری ہو۔

لیتھیم کارب: (Lithium Carb): جب درد سر کو کھانے سے افادہ ہو۔  
روٹا: (Ruta): پڑھنے اور آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے درد سر کا ہونا۔ آنکھوں کے دباؤ کے لئے  
یہ چوٹی کی دوا ہے۔

اولی اینڈر: (Oleander): یوں محسوس ہو کہ کھوپڑی پر بہت بھاری وزن رکھا ہوا ہے جو سر  
کو کچل رہا ہے، اطراف میں دیکھنے سے یا بھیگنے پین کے ساتھ دیکھنے سے بہتری ہو۔

آرنیکا ایم: (Arnica M): جب کسی چوٹ کے باعث درد سر ہو، جو بعض مواقع پر بہت تیز  
ہو جائے، یوں محسوس ہو کہ دماغ میں کیل ٹھونکنے جا رہے ہیں، دماغی پریشانی اور گڑبڑا ہٹ ہو،  
سر کو ہاتھوں سے ملنے سے درد زیادہ سنگین ہو جائے جبکہ سر کو بلند کرنے سے درد میں افادہ ہو۔

ہائی پری کم: (Hypericum): ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگ جانے کے باعث درد سر کا لاحق ہو  
جانا، یہ دوا آرنیکا کے یوں استعمال کی جانے والی دوا ہے۔ یہ دوا بے اندازہ حساسیت کو رفع کرتی  
ہے جبکہ آرنیکا سر میں خون کے اژدہام اور چوٹ کی حالت کو درست کر چکی ہوتی ہے۔

نکس وامیکا: (Nux Vomica): الکوحل اور دوسری فحشی اشیاء کے استعمال کے باعث درد  
سر کا ہونا۔ یہ دھکن والا درد سر ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹا جا رہا ہے۔ کھنچاؤ ہوتا  
ہے، بھاری پن ہوتا ہے، کند ذہنی ہوتی ہے، جھنڈا ہٹ ہوتی ہے، غنودگی ہوتی ہے، ڈوبنے اور  
کچلے جانے کی کیفیت ہوتی ہے جس کے ساتھ متلی اور کھٹے اور بدبودار مواد والی تے کی علامات  
ہوتی ہیں۔ سرد و شام کو بہتر ہو جاتا ہے۔

کیموملا: (Chamomilla): چڑچڑے پن کے ساتھ درد سر کا ہونا، مریض ناراض اور غصیلا  
ہوتا ہے، یہ درد سر عمومی طور پر ایسے مریضوں میں ہوتا ہے جو الکوحل بے تحاشہ استعمال کرتے  
ہیں۔ انہوں کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کافی پیتے ہیں اپنے اعصاب کو سکون دینے کے لئے۔

چائینی نم سلف: (Chininum Sul): کوئین کے غلط استعمال کے باعث درد سر لاحق ہو جائے

جس میں دونوں کانوں میں گھنٹیاں بجتے، بھنٹناہٹ اور گرجنے کا احساس موجود ہو، شدید لہروں والے درد ہوں مانتے اور آنکھوں میں 1000 ڈائی لیوشن دیجئے۔

کالی میور: (Klai Mur): جب چائینی نم سلف ٹاکام ہو جائے تو یہ دوا استعمال کی جائے، یہ دوا بھی کونین کے غلط استعمال سے ہونے والے درد سر کے لئے مفید ہے۔ اس میں سر کے اندر کیڑے مکوڑوں کے ریگنے کا سا احساس ہوتا ہے اور آوازیں آتی ہیں، 100 ڈائی لیوشن دی جائے۔

آئیوڈیم: (Iodium): درد سر ہو جس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر کو کسی پٹی سے باندھا گیا ہے، کرم کمرے میں جانے یا آگ کے قریب جانے پر ابتری ہو۔ ٹھنڈے کمرے میں جانے سے اور ٹھنڈی ہوا میں رہنے سے بہتری ہوتی ہے اور جب کہ مریض کھا رہا ہو تو اس وقت بھی بہتری ہو۔

پیرس قویڈری فولیا: (Paris Quadrifolia): سر کے پھیلنے کے احساس کے ساتھ درد سر لاحق ہو جو ریڑھ کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔

فائی ٹولاکا: (Phytolacca): قوت سماعت میں زیادتی ہو جانے کے ساتھ درد سر۔

کلییریا فاس: (Calcarea Phos): سکول پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں درد سر جو اپنی کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ منہمک ہوتے ہیں خصوصاً ایسے بچوں میں جو بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی ترقی، جسمانی قوت کی نسبت کم ہو رہی ہوتی ہے۔

ٹھوچا: (Thuja): درد سر لاحق ہو اور یوں محسوس ہو جیسے ایک کیل اس کی گدی میں ٹھونکا جا رہا ہے یا پیشانی میں ٹھونکا جا رہا ہے۔

کافیا: (Coffea): درد سر، یوں محسوس ہو جیسے کیل گدی میں ٹھنک رہا ہے۔

پیکریک ایسڈ: (Picric Acid): معمولی سی ذہنی مشقت سے دماغی نری کے باعث درد سر کا لاحق ہو جانا۔ سکول میں پڑھنے والے بچوں میں درد سر جو پڑھنے یا امتحان دینے کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ طلبہ کا درد سر۔

روبینیا: (Robinia): گیس کی علامات کے ساتھ صغروی درد سر۔ درد شکم، کھنی اٹیوں اور تیزابیت کے ساتھ، یوں محسوس ہو جیسے سر اٹھتے ہوئے پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔

کلورے لم: (Chloralum): ہولناک درد سر، کند ذہنی، سر بھاری ہو، کئی روز کے دورے کے ساتھ اگلے حصے کا درد سر۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ: (Tarentula Hispania): یوں محسوس ہو جیسے ہزاروں سوئیاں سر میں چبھ رہی ہوں، شر سے، پھوٹنے سے اور تیز روشنی سے ابتری ہو، سہلانے سے بہتری ہو۔

لیک ڈیفیل: (Lac Defl): تے والا درد سر جو ہاتھ سے شروع ہو کر گدی تک پھیل جائے ' نیز جس کے ساتھ 'چکن ہو' متلی ہو' تے ہو' اندھا پن ہو اور شدید (چیزی قسم کی) قبض ہو۔ حیض آنے کے وقت درد سر۔ زیادہ پیشاب آنے سے افادہ ہو۔

ورٹرم ایلیم: (Veratrum Alb): اعصابی درد سر جس کے ساتھ بیٹائی معدوم ہو جائے ' نیز برقی ٹھنڈک کا احساس چاند میں ہوتا ہے جس کو افادہ ٹھنڈی چیزوں کے لگانے سے ہو (200) طاقت کی خوراک دیجئے درد سر ایسا جو چہرہ بگاڑ دے اور دیوانگی کی حد تک لے جائے۔

وائی اولا اوڈوراٹا: (Viola Odorata): اچانک درد سر لاحق ہو جائے جس کی وجہ بظاہر معلوم نہ ہو اور جس کے ساتھ بیٹائی بھی متاثر ہو۔

چیونٹھس: (Chionanthus): تے والے درد سر کے لئے مخصوص دوا ' غافل اور بے پرواہ ' سر کے اگلے حصہ میں کند قسم کا درد جو ناک کی جڑ کے اوپر ' آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے اور کنٹیوں میں ہوتا ہے ' بھٹکنے اور حرکت کرنے سے ابتری ہو ' مدر ٹچر استعمال کیجئے۔

پوتھوس: (Pothos): ہسٹریائی درد سر کے لئے۔

ایلیئم سیٹ: (Allium Sat): درد سر جو آغاز حیض میں بہتر ہو ' جب بعد میں ابتر ہو جائے۔  
کلیکیریا ایسٹ: (Calcaria Acet): بے ہوشی میں جٹا کر دینے والا دبانے والا درد سر جو پیشانی میں ہوتا ہے کام پھوڑ دینا پڑے اور یہ نہ جان سکے کہ وہ کہاں ہے۔

ایپی فیکس: (Apiphegus): اعصابی درد سر جس کے ساتھ بنیادی اور نمایاں علامت مسلسل تھوکتے رہنے کی ہو۔ تھوک لیس وار ہو ' درد سر جس سے پہلے بھوک ہو۔

اگنیشیا: (Ignatia): غم کے بعد اعصابی درد سر ' تیز بھاؤ کے ساتھ پیشاب آنے پر درد سر جاتا رہے ' ہسٹریا میں درد سر کا لاحق ہو جانا ' درد سر جس کے ساتھ یوں محسوس ہو کہ ایک سوئی یا کیل سر میں ٹھونکا جا رہا ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا: (Lobelia Infl): گردن توڑ بخار والا درد سر ' ہر دو گھنٹے کے بعد دن میں چھ مرتبہ 1x ذائقہ لیوشن کے دوا تین قطرے دیجئے۔

لائیکو پوڈیم: (Lycopodium): کپڑے اتار دینے سے درد سر میں افادہ ہو۔

اورم میٹ: (Aurum Met): پاگل بنا دینے والا درد سر ' یوں محسوس ہو کہ اس کے سر کے اوپر ہوا چل رہی ہے حالانکہ اسے ایک جھوٹا بھی نہ لگے ' ٹھنڈک سے انتہا درجے کی حساسیت ہو ' سر کو لپیٹنا چاہے۔

سیلیشا: (Silicea): درد سر جس میں سر ڈھانپنے اور لپیٹنے سے افادہ ہو ' اندھیرے میں ابتری ہو اور روشنی میں بہتری ہو ' اعصابی درد سر جو سکول میں بے تحاشہ مطالعہ سے لاحق ہو۔

اونوس موڈیم: (Onosmodium): تناؤ یا آنکھوں کے کھنچاؤ کے باعث درد سر، چکر آئیں، اعصابی درد سر، ضعف اعصاب لاحق ہو۔

اکٹیا آر: (Actea R): سامنے کے حصہ میں درد سر ہونا، عمودی سر کا درد، یا گدی میں درد ہو، جن کے ساتھ آنکھوں کے ڈھیلوں میں بھی درد ہو، دبانے سے بہتری ہو، جبکہ معمولی حرکت سے درد میں اضافہ ہو جائے۔

نکس موسکاٹا: (Nux Moschata): تھوڑا سا کھانے سے درد سر لاحق ہو جائے۔  
پلساٹیل: (Pulsatilla): آئس کریم کھانے سے درد سر کا لاحق ہو جانا، گیسوں کے باعث درد سر ہو، گرمی سے بہتری ہو۔

سپیا: (Sepia): درد سر، پر بھی لگنے کا سادرد، سر اور چہرے کی دائیں جانب سامنے والی ہڈی کی جانب گھومے، بائیں کینٹی میں پر بھی لگنے اور پھاڑنے والے درد، بائیں آنکھ کے اوپر درد ہو، بو گدی کی طرف پھیلے، چاند پر تنکین والا درد، یوں محسوس ہو جیسے سر اوپر سے کھل جائے گا۔ شور سے بہتری ہو، معدہ خالی ہونے کے احساس کے ساتھ ہر قسم کی خوراک سے بے ذاری ہو۔ کھانے سے بہتری ہو اور مکمل آرام سونے سے ہو۔

ٹیوبرکولینم: (Tuberculinum): ایسے اشخاص میں درد سر جن کے خاندان میں تپ دق کے اثرات پائے جائیں، مخصوص علامت اس درد میں یہ ہوتی ہے کہ مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوہے کی ایک پٹی سے اس کا سر جکڑ دیا گیا ہے۔ ریڑھ پر مریض کو گیلے کپڑوں کا تکلیف دہ احساس ہوتا ہے۔

اورم آرس: (Aurum Ars): درد سر جس کے ساتھ ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہوں، نیز ٹانگیں اور پاؤں بھی ٹھنڈے ہوں۔

سٹیفی سیکریا: (Staphisagria): گائے کا گوشت کھانے کے بعد درد سر لاحق ہو، کانوں میں گرجن کے ساتھ درد سر، سر میں بے ہوش کر دینے والا درد، خاص طور سے ماتھے میں، ایسے درد جو اندر اور باہر کی طرف دباؤ سے چھو جانے سے بڑھ جاتے ہیں۔

کلکیریا آئیوڈ: (Calcarea Iod): سر میں درد، بالوں کا باندھنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

کروٹیلس ہور: (Crotalus Hor): قے والا درد سر، بہت بڑی مقدار میں قے ہوتی ہے، دائیں کروٹ نہیں لیٹا جاسکتا نیز کمر کے بل سیدھے بھی نہیں لیٹ سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے سیاہ صفراوی قے ہوتی ہے۔

ایناکارڈیم: (Anacardium): درد سر جو کھانے سے رفع ہوتا ہے۔ حرکت کرنے اور کام

کرنے کے دوران درد تیز ہو جاتا ہے، گیس کے ساتھ درد سر ہو اور اعصابی درد سر۔  
چیلیدونیم (Chelidonium): بے قابو کر دینے والا شدید درد سر جو مریض کو ہاتھ کانٹے اور  
 جھٹکنے پر مجبور کر دے۔

کو کولس (Cocculus): سر کے پچھلے حصہ میں درد، یوں محسوس ہو جیسے سر کے حصے باری  
 باری کھل اور بند ہو رہے ہیں۔ درد سر ایک سائے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، سونے کے دوران  
 بھی مریض ہر بات سن سکتا ہے۔ حالانکہ سونے کے دوران وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔  
 غنودگی، متلی اور پکڑوں کے ساتھ اعصابی درد سر، درد کی شدت کے باعث مریض اپنے سر کی  
 گدی کو دونوں ہاتھوں سے خوب دبا کر پکڑ لیتا ہے۔

پٹیلیائی (Ptelia T): جلد اور چہرے کی جلن کے ساتھ صفراوی درد سر حتیٰ کہ سانس بھی  
 نفعوں کو جلاتی ہے۔

آئرس ور (Iris Ver): جلن اور تیزابیت کے ساتھ صفراوی درد سر۔ چکن اور شدید درد  
 بینائی میں غلغلہ پیدا کر دے، کڑوی تے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔

سورنیم (Psorinum): بھوک کے باعث درد سر لاحق ہو، کھانا چاہے لیکن کافی کھانا نہ کھا  
 سکے۔

ایلیو منا سیکیٹ (Alumina Silicate): درد سر جو بالوں کا باندھنے سے بدتر ہو جائے، اس  
 کے ساتھ دانت کانٹے، حیض سے پہلے اور دوران حیض درد سر ہو، بھاری قدموں سے چلنے کے  
 باعث درد سر ہو، ٹھنڈی ہوا سے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہو، سر کو اوپر کی جانب  
 اٹھانے سے، سر کو حرکت دینے سے اور چلنے سے بھی افادہ ہو۔

فیلین ڈریم (Phellandrium): درد سر جس میں یہ احساس ہو کہ سر کی چوٹی پر وزن رکھا ہوا  
 ہے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): اسی احساس کے ساتھ درد سر ہو کہ چاند سے سر  
 کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے۔

بیڈی آگا (Badiaga): شام کے 2 سے 7 بجے تک سر میں شدید درد ہو، چکر آئیں، سر میں  
 بھراؤ کی کیفیت۔ ٹھنڈک سے بہتری اور گرمی سے بہتری ہو۔

کالسیا لیٹیفولیا (Kalmia Latifolia): گدی میں درد سر ہو، سورج طلوع ہونے سے سورج  
 غروب ہونے تک سر میں درد رہتا ہے۔ سر جھکانے سے بہتری ہوتی ہے، چکر آئیں اور ذہنی  
 پریشانی ہو۔

جیبوراندی (Jaborandi): روزانہ سہ پہر کے وقت سر میں درد ہو، متلی ہوتی ہے، گرمی



کے ساتھ قہقہاہٹ ہوتی ہے۔ اور پسینے آتے ہیں۔  
نیٹرم سلفیورکیم (Natrium Sulphuricum): سر کی جڑ میں درد ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سر کچلا جا رہا ہے، سر میں چوٹ لگ جانے کے باعث دماغی عارضہ ہو۔ چکر آتے ہیں، کانوں میں جھین ہو، کنکشیوں میں سوراخ ہوتے محسوس ہوں، موسیقی اور مرطوب موسم کے باعث اتھری ہو۔

سلی سیم (Selenium): شراب پینے کی بد عادت یا چائے کے زیادہ استعمال کے باعث درد سر لاحق ہو، گرم موسم کے باعث بھی یہ درد سر لاحق ہو جاتا ہے۔ بے تحاشہ مطالعہ کے باعث درد سر، تیز خوشبوؤں کے سونگھنے سے درد میں اضافہ ہو، درد سر کے دوران پیشاب کے بہاؤ میں زیادتی ہو جاتی ہے۔

پوڈوفالیم (Podophyllum): جب درد اور اسہال بدل بدل کر آئیں۔  
پلمبم (Plumbum): سامنے کے حصہ میں یا گدی میں درد سر لاحق ہو، عموماً قہقہے اور صفراوی تے کے ہمراہ ہوتا ہے خصوصاً جب درد سر کے ساتھ یہ احساس بھی ہو کہ ایک گولا حلق سے سر کی طرف اٹھ رہا ہے۔

فاس فورس (Phosphorus): درد سر جو ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے کم ہو جائے اور گرم کمرے میں جانے سے اور گرم اشیاء کے استعمال سے درد میں اضافہ ہو، دماغ کی بنیاد میں لٹھک کا احساس ہوتا ہے۔

پتھرولیم (Petroleum): گدی میں درد سر جس کے ساتھ مٹلی اور تے کی سخت (ضدی) عادت۔

لیکیسس (Lachesis): عرصہ حیض کے دوران شدید درد سر، خصوصاً اس وقت بہاؤ بہت سست پڑ جائے، حیض کے درد کی مانند سر میں بھی درد ہو، بہاؤ سے اس درد میں افادہ ہوتا ہے، کچن والا اور ہتھوڑے برسنے والا درد سر، خون کے تیزی کے ساتھ سر کی طرف چڑھنے کے ساتھ۔

کونیم (Conium): شراب نوشی کے باعث چکر آئیں اور درد سر لاحق ہو، تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی اشیاء کو دیکھنے سے تے والا درد سر۔

الیومینا (Alumina): درد سر، مٹلی اور تے کے ساتھ۔ نزلہ لگ جانے کے باعث درد سر، ناک خشک اور بند ہو، ناک میں لمبے اور سبز پھلکے پھسنے ہوں، ماتھے میں آنکھوں کے اوپر درد ہونے کے ساتھ پانی کا اخراج ہو۔

سس ٹس کین (Cistus Can): پیشانی پر ٹھنڈے پسینے آنے پر درد سر میں اضافہ ہو، جتنا

زیادہ پیسہ آئے نزلہ اتنا ہی زیادہ بڑے اور اسی کے ساتھ درد سر میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔  
کھانے سے اتفاق ہو۔

کلکیریا آرسنک (Calcareo Ars): اس دوا کی عجیب علامت یہ ہے کہ جس کروٹ مریض لیٹتا ہے اس جانب سے درد دوسری جانب چلا جاتا ہے جس کروٹ وہ لیٹا نہیں ہوتا چنانچہ مریض ہر وقت کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔

امبر اگریسیا (Ambra Grisea): درد سر جو نیچے کی طرف دبانے اور پھاڑنے والا درد جو کپٹیوں سے شروع ہوتا ہے 'درد سر جب ناک بہہ رہی ہو' دائیں آنکھ اور پلوں میں جلن' کھانے کے بعد اضافہ ہو جائے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): پیشاب آنے کی خواہش کے پورا نہ ہو سکنے کے بعد درد سر کا لاحق ہو جاتا۔

ایگریکس مس (Agaricus Mus): پیشاب میں قلت اور قبض کے باعث درد سر 'پاخانہ کرنے سے اتفاق ہو' وقفوں کے ساتھ کھینچنے اور پھاڑنے والا درد جو پیشانی میں ہو۔

الیومن (Alumen): سر کی چوٹی میں درد جیسا کہ آگ جل رہی ہو اور اتنا زیادہ دباؤ ہو کہ یوں محسوس ہو کہ کھوپڑی پکلی جائے گی 'سخت دباؤ اور برقی ٹھنڈی اشیاء لگانے سے اتفاق ہوتا ہے۔

ایمونیا کارب (Ammonia Carb): ضعف اعصاب اور گھٹیا کا درد سر 'کپٹیوں میں بچھن ہوئی ہے۔

بویوٹا (Bovista): دماغ میں گہرائی میں درد ہو اس احساس کے ساتھ کہ سر پھولا ہوا اور بہت بڑا ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی جیض میں بے قاعدگی ہو اور دل کی دھڑکن بھی درہم برہم ہو اور دل بھی بڑھا ہوا محسوس ہو۔

کلکیریا کارب (Calcareo Carb): قریب اشخاص میں مزمن درد سر 'چہرے پر پیسہ آنے کے رتھان کے ساتھ 'سربرف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہو اور ہاتھ پاؤں نم آلود لگیں۔

لائکوپرسی کم (Leopersicum): سارے سر میں ہی انتہائی شدید درد ہو لیکن آنکھوں کے پیچھے اور کپٹیوں میں تو جم کر بیٹھ جائے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہو 'گرم کمرے میں یا انتہائی گرمی میں 'تمباکو کے دھوئیں سے مکمل آرام ہو۔

## سر میں پانی (رطوبت) کا بھر جانا، سر میں رطوبت کا اکٹھا ہو جانا

(Hydrocephalus)

(Accumulation of fluid in Head)

**ہیڈرا ہیکس (Hedra Helix):** ایک قطرہ دیجئے۔۔۔ صرف ایک خوراک۔ اگلی صبح ناک میں رطوبت ظاہر ہوگی اسے صاف کر لیجئے اور بس اسی ایک خوراک سے ہی شفا ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ عارضہ ہو جانے کا خطرہ ہو تو دوسری خوراک بھی دے دیجئے۔

**ایپس ایم (Apis M):** تالو میں ابھار ہو، چہرہ سو جا ہوا اور پیلا ہو، مریض لاپرواہ، اونگھنے والا، خاموش ہو، کسی موقع پر ایک تیز چیخ کے ساتھ چونک جائے، چونکنے کے بعد بخار ہو جائے۔

**زینک میٹ (Zincum Met):** مریض اپنے سر کو گھماتا ہے اور نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوف زدہ ہو، گدی گرم ہوتی ہے، ماتھا ٹھنڈا ہوتا ہے، دانت پڑتا ہے، آنکھیں روشنی سے حساس ہوتی ہیں ایک ہی جگہ جمی ہوئی اور گھورتی ہوئی، ناک خشک ہوتا ہے، سونے کے دوران عضلات میں جھٹکے لگتے ہیں۔

**ہیلی بوریس (Helleborus):** ذہنی دباؤ اس دوا کی مخصوص اور اہم علامت ہے اس دوا کے مریضوں کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، بازو اور ایک ٹانگ خود بخود ہی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ سر کو گھمانا اور نکلنے میں سوراخ کرنے کے سے انداز میں گھسنا اس دوا کی اہم علامت ہے۔ درد سر کی چیخ بھی موجود ہوتی ہے۔ جھکے (تشیخ) متواتر اور شدید ہوتے ہیں۔ گردن توڑ بخار ایک الجھن ہے (دماغی جھلیوں کی سوزش کی تکلیف) پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے اور آنکھیں روشنی سے متاثر نہیں ہوتیں۔

**کلکیریا کارب، کلکیریا فاس (Calcarea Carb, Calcarea Phos):** پہلی دوا پلپے مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے جن کے تالو کھلے ہوتے ہیں۔ ان کا سر غیر معمولی حد تک بڑا ہوتا ہے، ان کی جلد ذیلی اور ٹھکی ہوئی ہوتی ہے، سر پر پینہ ہوتا ہے۔ دوسری دوا کے متعلق سوچتے ہوئے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا چاہئے جو کنزور اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ یہ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں۔ انہیں ممکن چیزوں کی طلب ہوتی ہے، پیٹ کے عضلات اندر کو دھنے ہوئے ہوتے ہیں۔

**کالی آیوڈ (Kali Iod):** سینفی لس کی ہسٹری والے خاندان کے کیسوں میں یہ دوا مفید ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں ہونے والی خود بخود حرکت کے ساتھ بھیجکا پن، تنفس میں دشواری اور

تشخ (جھٹکے) 'قلج اور آنکھوں کی چٹلیوں کا پھیلا ہوتا ہوتا ہے۔  
 • مرک سول (Merc Sol): خسرو اور چونکتنے والے بخار کے بعد سر میں رطوبت کے بھر جانے کا عارضہ ہو، بچہ سر گھماتا ہے اور آہیں بھرتا ہے کراہتا ہے جس کے ساتھ سر پر بھی پھیند ہوتا ہے۔  
بیلادونا (Belladonna): بخار کے ساتھ حلو کیسوں میں یہ چوٹی کی دوا ہے 'بے ہوشی یا ہڈیان' شدید درد سر اور سرخ و آتشیں آنکھیں۔  
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): معاون دوا کی حیثیت سے دی جاسکتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): خنازیر میں جٹلا بچوں کے لئے مناسب دوا ہے۔ ٹھنڈا پیند آتا ہے 'بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں' پیدائشی مرض والے کیسوں کے لئے۔  
ایپوسائٹیم کین (Apocynum Can): سر میں پانی کا بھر جانا، ماتھا آگے کو نکلا ہوا ہو، پیشانی کی سیون کھلی اور پیند آنے کی حالت میں بے ہوشی ہو، ایک بازو اور ٹانگ کی بلا ارادہ حرکت، ایک آنکھ کی پٹائی جاتی رہے، جسم کے فاضل مادوں کے اخراج میں کمی خصوصاً پیشاب اور پیند بہت کم آئے۔

## پانی سے خوف

(Hydrophobia)

لائے سین (Lyssin): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ ایک خوراک 200 ڈائی لیوشن کی دی جائے اور اسے 4، 4 گھنٹوں کے بعد دہرایا جائے۔ علامات کے مطابق ادویات حسب ذیل درج کی جا رہی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): انتہائی شدید ہڈیان ہو، مریض انتہائی غصیلا ہو، مریض مارتا پھینتا ہے، کانٹا ہے، فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اسے روکا جائے تو کسی بھوت پریت کی طرح سے لڑائی کرتا ہے، گلا خشک، سرخ، صیقل کیا ہوا درد سے بھرا ہو، کھانسی، روشنی اور ہٹنے سے اتھری ہوتی ہے، یہ دوا پہلے درجے کے مرض کے لئے ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): بیلادونا ہی کی طرح کی علامات، البتہ اس میں علامات قدرے ہلکی ہوتی ہیں، سٹرامونیم میں علامات کے اندر اضافہ نہ صرف پانی پینے کی کوشش سے ہوتا ہے بلکہ صرف پانی کو دیکھ لینے سے بھی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس دوا کی بنیادی اور اہم علامت ہے۔ ہلکی بڑبڑاہٹ والا ہڈیان، یہ دوا مرض کے دوسرے درجے کے لئے ہے، پاگل جانوروں کے کاٹنے کے باعث پانی کے خوف کا مرض۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): جب غیہد میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے اور گلے کے عضلات میں مسلسل حرکت ہوتی رہے۔

کینتھارس (Cantharis): شدید غصے والا ہڈیان، دیوانہ پن اور جوش، شدید غصے کے دورے ہوں، اور غصے کے باعث بھونکے، جوشیلا ہو اور پریشان ہو، بے چینی آخر کار غصے پر منتج ہو، حادثہ جنون، حجرہ کو چھونے اور ٹھنڈا پانی پینے سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے، نکلنے میں وقت ہو، درد کے ساتھ کھنچاؤ اور سکڑاؤ ہو، جلن اور خشکی ہو، اونچے درجے کا بخار ہو۔

## دماغ میں خون کا غیر معمولی اثر دہام

(Hyperaemia of the Brain)

(Rush of Abnormal Blood to the Brain)

بیلادونا (Belladonna): سرخ چہرے کے ساتھ سر میں ٹپکن والا شدید درد ہو، ٹھنڈی چیزیں لگانے سے یا سر کو اوپر کی جانب اٹھائے رکھنے سے بہتری ہو۔

اکونائٹ این (Aconite N): سر گرم ہو، جلد خشک ہو، نبض تیز، چھوٹی باریک تار کی طرح کی ہو، بے اندازہ بے چینی اور پریشانی ہو، مرض کے آغاز کے متعلق سوچنا چاہئے۔

گلونائن (Glonaine): سر میں بھراؤ کی کیفیت کے ساتھ ٹپکن والا درد، سورج کی گرمی اور ہلکے سے درد میں اضافہ ہو۔

جلمی میم (Gelsemium): دماغ میں خون کا اثر دہام ست ہو، اس کیفیت کے ساتھ کہ سر اندر سے پھولا ہوا اور بھرا ہوا ہو، مریض کند، بے پرواہ ہو اور اس کے چہرے سے بھی لاپرواہی کے آثار ظاہر ہوں۔

وربٹرم ورائیڈ (Veratrum Viride): دماغ کے بنیاد والے حصہ میں اثر دہام خون، سر گرم ہو، آنکھوں میں خون بھرا ہو، ایک کے دو دو دکھائی دیں، نبض نرم اور ست ہو۔

## درد، سوزش، جلن (اعصابی)

(Inflammation "Neuritis")

اکونائٹ این (Aconite N): سورج کی گرمی یا اچانک جذباتی جوش کے باعث دماغ میں خون کا اثر دہام ہو جانا، یہ دوا دماغ کی سوزش کے ابتدائی درجے کے مرض کے لئے ہے، شور اور روشنی سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیلاڈونا (Belladonna): دماغ میں خون کا اثر دہام اور چڑچڑاہٹ جس کے ہمراہ سرگرم ہو اور پاؤں گرم ہوں، گردن کی شریانوں اور سر میں چپکن دار درد۔

گلوٹائسن (Glonoine): یہ احساس کہ جیسے سر بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور خون سے بھرا ہوا ہے، سر کو پیچھے کی جانب جھکانے سے ابتری ہو اور حرکت سے اور سر کو ہٹا کرنے سے بہتری ہو۔ ہیلاڈونا میں اور اس دوا میں یہی امتیاز اور فرق ہے کہ ہیلاڈونا میں سر کو پیچھے کی جانب جھکانے سے بہتری ہوتی ہے اور سر کو ڈھانچنے اور حرکت دینے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): سوزش دماغ کے ساتھ ارتعاشی لہریں سر میں ہوں جو سر کو ہلانے سے اور سر کو آگے کی جانب جھکا کر بیٹھنے سے بہتر ہوں۔ یہ ہیلاڈونا سے متضاد ہے۔

الیومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate): اعصابی درم جس کے ہمراہ درد والے حصوں کا سن ہو جانا ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): دماغ میں خون کا اثر دہام ہو جائے جب کہ اس سال یک دم بند ہو جائیں، اعصابی درد اور گھٹیا والا درد سر۔

## چلنے کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی نااہلیت

(Locomotor Ataxia)

(دیکھئے ”فلج“)

## گردن توڑ بخار (دماغ کی جھلیوں کا درم)

(Meningitis)

(Cerebro- Spinal Meningitis)

ہیلاڈونا (Belladonna): شدید ہڈیان، بعض تصوراتی اشیاء سے فرار حاصل کرنے کے لئے لڑائی کرے۔ آنکھوں میں خون بھرا ہو۔ گردن کی شریانوں میں تھر تھراہٹ، غنودگی ہو جو اس وقت ختم ہو جب مریض چچ اٹھے جیسا کہ وہ خوف زدہ ہو گیا ہو۔ شور اور روشنی سے حساسیت ہو۔ نبض تیز اور اچھلتی ہوئی ہو، حرارت اونچے درجے کی ہو، ڈھکے ہوئے جسم کے حصوں پر پھیند ہو، دانت پیسے۔

برائی اونیا (Bryonia): یہ ہیلاڈونا کے بعد بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن اسے اس کے بدلے

میں استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ یہ اسی صورت میں دی جانی چاہئے جب بیلاڈونا بخار کو کم کر چکی ہو اور نبض کو نیچے لا چکی ہو کھانسی ہلکی ہو جائے یہ گھنیاوی مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے مریض بودا اور احسق دکھائی دیتا ہے۔ گردن میں اکڑن ہوتی ہے بیٹ پھولا ہوتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): تپ دق والا گردن توڑ بخار یا حاد دماغی ریزش جس کا باعث خارش و پھوڑے پھینبوں کا دب جانا یا پوری طرح باہر نہ آنا ہو۔ مریض تیز چپچپوٹھے ساتھ دوران نیند روتا چلاتا ہے۔

ہیلی بوریس (Helleborus): جب پیشانی شکن آلود ہو آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور نچلے جڑے میں نیچے گرنے کا رجحان ہو تو یہ دوا دی جائے۔ ایک بازو اور ایک پاؤں میں خود بخود حرکت ہوتی رہے۔ پیشانی پر ٹھنڈا پھیند آئے۔ مریض پانی پینے کے لئے بہت زیادہ لالچ کا مظاہرہ کرے اور جیسے ہی اس کے منہ میں پانی والا چمچ ڈالا جائے وہ دانتوں سے چبچ کو پکڑ لے۔ آنکھیں روشنی سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتیں۔ مکمل بے ہوشی ہوتی ہے۔ تپ دق والا گردن توڑ بخار مکمل یا نیم بے ہوشی۔ سستی۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): اس دوا کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہئے اور اسے مرض کے آغاز میں ہی دینا شروع کر دینا چاہئے۔ یہ بنیادی دوا ہے اور تپ دق والے گردن توڑ بخار کا جس طرح سے علاج کرتی ہے اسی طرح یہ اسے روکتی بھی ہے۔ صرف ایک خوراک 200 ڈائی لیوشن کی دیتے اور 6 سے 12 گھنٹوں تک کوئی دوا نہ دیجئے یہاں تک کہ مریض کی حالت تبدیل ہو کر کسی دوسری دوا کی طلب ظاہر کرے۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): جب مریض اونچی آواز میں چیخیں مارے جس کے بعد شدید قسم کے تشنجی جھٹکے شروع ہو جائیں۔ انگوٹھے پہنچ جائیں چہرہ زرد پڑ جائے جبکہ ہونٹ نیلے ہوں آنکھوں کے ذیلے سلسل کھوٹے رہیں۔

ہائیوسائیس (Hyoscyamus): اس دوا کی علامت یہ ہے کہ تشنجی جھٹکے ختم ہو جانے کے بعد مریض بودے پن کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے اور حواس باختہ ہوتا ہے اور ذہنی ہڈیان میں جلا ہوتا ہے۔

گلوٹائین (Glonoine): دماغی سوزش کے باعث چیخ (جیسا کہ ایپس میں ہوتا ہے) اس احساس کے ساتھ کہ سر بے انتہا پھیل چکا ہے۔ تشنجی تپے سر میں اثر دہام خون اور تھر تھراہٹ کے ساتھ دھوپ یا لو لگ جانے کے باعث گردن توڑ بخار کا لاحق ہو جانا۔

زینک میٹ (Zincum Met): دماغی سوزش (ورم) میں یہ دوا کار آمد ہے۔ بچہ خوف سے

جاگ جاتا ہے۔ اپنے سر کو گھماتا ہے، چھین مارتا ہے اور نیند میں چوٹک جاتا ہے۔ یہ دوا ایسے بچوں کی نشاندہی کرتی ہے جو قلت دم کے عارضہ میں مبتلا ہوں اور جن میں پھوڑے پھینوں کا رجحان ہو۔

سیکیرٹاوائروسا (Cicuta Virosa): گردن توڑ بخار کے ہمراہ تشنجی جھٹکے ہوں اور بازوؤں اور ٹانگوں اور تمام جسم میں خوفناک توڑ پھوڑ ہوتی ہو۔ ساتھ ہی حواس بھی غائب ہو جائیں، پیچھے کی جانب مڑنے کے رجحان کے ساتھ تشنجی جھٹکے، معمولی سے چھو جانے سے جھٹکے دوبارہ شروع ہو جائیں۔ شور اور جھٹکے سے ہلانے پر بھی دورہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): دماغ کی بھلیوں کی سوزش، زخم والے حصہ کی ریزش کے ساتھ۔ حرام مغز کی بھلیوں کی سوزش، کان سے مواد کے اخراج میں بندش کے باعث لاحق ہو، اس دوا کے استعمال سے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کان سے دوبارہ مواد کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جبکہ دماغ کی بھلیوں کی سوزش کی تمام علامات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

اکونائٹ (Aconite): سوزش دماغ جو غصے یا دھوپ کے اثر سے دماغ میں اثر دہام خون کے باعث لاحق ہو۔ خوف کے ساتھ بخار ہو، بے چینی ہو، جلد خشک ہو اور بے انتہا پیاس ہو۔  
جلسی میم (Gelsemium): عضلاتی قوت کا مکمل طور پر یا نیم مکمل طور پر جاتے رہتا، اسی طرح سے بیٹائی اور قوت کو بائی کا مکمل یا نیم مکمل طور پر جاتے رہتا، قے ہو، عظیم نقاہت ہو، اضطراب ہو، سر میں تھر تھراہٹ والا درد ہو، منگی ہو، نبض ست ہو، تنفس میں اتھری ہو۔

وریرٹرم ورائیڈ (Veratrum Veride): جسم میں خشکی ہو، بے ہوشی لاحق ہو جائے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں، خشکی ہوئی بے قاعدہ اور ست نبض ہو، تشنجی جھٹکے ہوں اور سر میں خون کا اجتماع ہو۔

کروٹالیس ہور (Grotalus Hor): چوٹکے والا بخار، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، درد سر شدید ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتا ہے، آنکھیں کھلی اور چہرہ سرخ ہوتا ہے۔  
اوپیم (Opium): تشنجی جھٹکے، غم، دہشت، خوف کے باعث بے ہوشی، جسم کروٹوں میں گھومتا رہتا ہے۔

سلفر (Sulphur): تپ دق والا گردن توڑ بخار، ماتھے پر ٹھنڈا پینہ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگیں، تشنجی جھٹکے ہوں، پیشاب بند ہو جائے۔

آئیوڈین (Iodine): تپ دق والے گردن توڑ بخار میں یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔  
کلیکریا کارب (Calcarea Carb): بلغمی مزاج کے مریضوں کے لئے مناسب دوا ہے، سر بڑا ہو، تالو کھلا ہوا ہو، چہرہ زرد ہو، پیٹ بڑا ہو۔



## درد شقیقہ (آدھے سر کا درد)

(Migraine)

(نیز دیکھئے "درد سر")

سکیو ٹیلریا (Scutellaria): جوش اور بے انتہا تھکاوٹ کے باعث سر کا اعصابی درد متواتر لیکن کم مقدار میں پیشاب آئے، مدر ٹیچر کے پانچ قطرے دیجئے۔  
ٹونگو (Tongo): درد شقیقہ اور اعصابی درد کا عارضہ۔

چیونانتھس (Chionanthus): تیزابیت اور جگر کی سستی کے باعث درد شقیقہ لاحق ہو۔  
ڈامیانہ (Damiana): درد شقیقہ کے لئے ایک عمدہ دوا ہے، ہر دو گھنٹوں کے بعد مدر ٹیچر کے 15 سے 20 قطرے دیئے جانے چاہئیں، سخت قسم کے کیسوں میں ہر آدھے کے بعد دوا دی جائے اور دونوں خوراکیوں کے بعد مریض سو جائے گا۔

گلکیریا لیک (Calcarea Lac): ٹی بی اور ذاتی استھے کس میں یہ دوا مفید ہے۔ 3x ذاتی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

آئرس وی (Iris V): معیادی اعصابی درد سر، مریض جب ذہنی تباہی کے بعد سکون حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ درد لاحق ہوتا ہے۔ سکول کے اساتذہ میں یہ درد ہفتہ یا اتوار کو لاحق ہوتا ہے۔ بلفین میں یہ درد پیر کو لاحق ہوتا ہے۔ مریض کو کھٹے صفراوی مواد کی تہ ہوتی ہے اور تہ کے بعد درد میں اتفاق ہوتا ہے، آنکھ کا درد شقیقہ، قبض کے ساتھ ہو، چیزیں آدمی آدمی دکھائی دیتی ہیں۔

سائیکلے من (Cyclamen): اگر آئرس وی ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جائے، اس میں درد شقیقہ کے ساتھ آنکھوں کے سامنے پنکھاریاں چھوٹی ہیں۔

کافیا (Coffea): خند عتاب ہو جانے کے باعث جو درد سر ہوتا ہے اور جس میں بے خوابی کے بعد طبیعت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): جب ہسٹریائی مریضوں میں غم کے باعث درد شقیقہ لاحق ہو، جب پیشاب تواتر کے ساتھ آئے، تیز بہاؤ کے ساتھ ہو یا قلت کے ساتھ ہو۔

بیلادونا (Belladonna): دموی یا صحت مند اشخاص میں درد سر، دوران خون کے نظام میں خلل واقع ہو جانے کے باعث یہ درد سر لاحق ہوتا ہے۔ درد سر شدید دھمکن اور چٹکن والا ہوتا ہے۔

آئرس ٹینکس (Iris Tanax): درد سر ہفتہ کے روز طلوع آفتاب سے قبل شروع ہو،

بائیں آنکھ سے شروع ہو کر سر کے سارے بائیں طرف والے حصے میں پھیل جاتا ہے۔

د مائی لی ٹیرز (ریڑھ کی ہڈی کا درم یا سوزش)

(Myelitis)

(Inflammation of the Spinal Cord)

(نیز دیکھئے "فلج")

بیلادونا (Belladonna): جب کہ ریڑھ کا اوپر والا حصہ متاثر ہو۔ گولی لگنے اور چھرا گھونپنے کے سے درد ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں، عضلات میں پھڑکن ہو جیسے کہ بجلی کے شرارے چھو گئے ہوں، اونچے درجے کا بخار ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): ریڑھ کی سیون میں درد ہو۔ ریڑھ کی ہڈی میں پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں، حرکت سے دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عضلات میں سختی ہو اور سن ہو جائیں۔  
آرنیکا ایم، ہائپریری کم (Arnica M, Hypricum): ریڑھ کی ہڈی پر کسی چوٹ کے لگ جانے یا زخم کے باعث ریڑھ کی ہڈی میں درد اور سوزش ہو جائے، معمولی حرکت سے درد ہو، چھونے سے احتیاط درجے کی حساسیت ہو، کھڑے ہونے یا چلنے کی کوشش سے بھی خوف کھائے۔  
پلیم (Plumbum): ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہو، بخار بھی ہو اور تشنہ بھی جسکے بھی ہوں۔

آکسلیک ایسڈ (Oxalic Acid): ٹانگوں میں کھنچاوت اور درد۔

سیکوتھائو وروسا (Cicuta Virosa): جب مریض چنچیں مارے تو سخت تعبئی جسکے لگیں۔

کیوپریم آرس (Cuprum Ars): اینٹھن (کڑل) ہو جسے پاؤں دبانے سے اتفاق ہو، ٹانگ میں سن ہو جانے اور فلج کا سا احساس ہو، پیشاب کرنے کی متواتر خواہش ہو۔

سٹرکینیا فاس (Strychnia Phos): ریڑھ کی ہڈی کی سوزش جس کے ساتھ چکنائی کے عارضہ میں تلانی کے دوران رکاوٹ آجانے کے باعث دل میں چکنائی کا بگاڑ شروع ہو جائے۔

ایلیومنا سلیکیٹ (Alumina Silicate): دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں خون کا اژدہام ہو اور ریڑھ کے اعصاب میں نمایاں جلن ہو اور ذنک لگنے جیسے درد ہوں۔

## اعصاب — (Nerves)

### سن ہو جانا

#### Numbness (Anesthesia)

(نیز دیکھئے ”انگلیوں کا سن ہو جانا“ ”متفرق“ کے ذیل میں)

اکونائٹ (Aconite): سن ہو جانا اور جھنجھناہٹ یہ دوا مرض کے آغاز میں دی جاتی ہے۔  
پلائٹینا (Platina): سن ہو جانے کا احساس چھوٹی جگہوں کے لئے، سر میں چھوٹی جگہوں کے سن ہو جانے کا احساس، خصوصاً صبح سویرے بستر میں، دانٹوں کا سن ہو جانا، زبان میں ریگن ہو، بیٹھنے کے دوران ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے سن ہو جانے کا احساس، کیکپاہٹ، سن ہو جانے، ریگن اور اینٹھن کے دوروں کی شکایات۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): اچانک اور مکمل طور پر حساسیت کا گم ہو جانا۔

کوکا (Coca): اندرونی ٹھنڈک کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا، ہاتھوں اور پاؤں کی کمزوری۔

آرسینک (Arsenicum): سن ہو جانے کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں میں ریگن کا احساس۔  
مارفین (Morphinum): ٹانگیں اور پاؤں سن ہو جائیں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ جوں ہی مریض کھڑا ہونے کی کوشش کرے گر جائے، بائیں پاؤں کے تلوے میں برقی ٹھنڈک ہو، پھر کن بھی ہو۔

میزیریئم (Mezereum): فالجی کمزوری بازوؤں میں ہو، ٹانگیں اور پاؤں سو جائیں۔  
جلسیم (Gelsimium): بازوؤں کا سن ہو جانا اور بازوؤں کی کمزوری، فالجی عارضہ، عضلات کمزور ہوں اور مریض کے ارادے کو پورا نہ کر سکیں، مکمل فالجی کیفیت کے ساتھ جو چلنے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے مریض کو عاجز کر دے، پورے عضلاتی نظام کا دھڑن تختہ ہو جائے۔

ایگریکس ایم (Agaricus M): جسم کے حصے ٹھنڈے اور ٹپلے پڑ جائیں، اور یوں محسوس ہو جیسے مردہ ہو چکے ہیں بلکہ جم چکے ہیں، حیوانیوں کے ریگننے کا احساس۔

سیکیل کور (Secale Cor): انگلیوں کا سن ہو جانا اور انگلیوں کے پوتوں میں سونیاں چبھنے کا

احساس 'سن ہو جانا' غیر حساسیت اور ٹھنڈے پن کا احساس 'کیڑوں کے ریگنے کا احساس' گرمی سے اتھری ہو۔

لکچے سس (Lachesis): ہاتھوں اور انگلیوں کا سن ہو جانا 'صبح سویرے جاگنے پر نسوں میں سکڑن ہو ایسے مریضوں میں جو باتونی ہوتے ہیں۔ دوران شب اتھری ہوتی ہے یا صبح سویرے اتھری ہوتی ہے' جوں جوں دن گزرتا ہے بستر ہی ہوتی رہتی ہے 'گرمی سے اور سونے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔

آکسلیک ایسڈ (Oxalic Acid): کمر اور بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا 'انگوٹھے کے گولے میں سن ہو جانے اور سوزش کا احساس' کندھے سے انگلیوں تک سن ہو جانا۔  
پلمبم (Plumbum): مردکی اور بے حسیت خصوصاً دائیں جانب میں 'اعضاء کی فعالیت میں سستی آجائے' اعصاب اپنا پیغام بجلی کے کوندے کی سی تیزی سے نہ پہنچا سکیں 'جلد کا سن ہو جانا۔

سیکیوٹا وائروسا (Cicuta Virosa): فالج کے ساتھ بازو اور ٹانگیں سن ہو جائیں 'تمام جسم کا سن ہو جانا' ہاتھوں کا ٹھنڈا ہو جانا۔

اگنیشیا (Ignatia): چلنے کے دوران ایڑھیاں سن ہو جائیں اور ٹھنڈی پڑ جائیں۔  
کونیئم (Conium): سارے جسم میں سن ہو جانے کا احساس 'عظیم نقاہت' 'کیکپاہٹ' 'عضلات میں جھکن اور پھڑکن ہو۔

رافانوس (Raphanus): ہاتھوں اور پاؤں کے ٹکڑوں کا سن ہو جانا۔  
بوفو (Bufo): جلد پر بے حس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): بازوؤں اور ٹانگوں کے پنوں میں اور جلد میں گھرائی میں پتھریوں کے ریگنے کا احساس 'جسم کے حصوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں کا سن ہو جانا۔  
امبرا گریشیا (Ambra Grisea): جسم کے تمام حصوں کی حساسیت کم ہو جائے 'دوران خون ست ہو جائے' موسیقی برداشت نہ ہو 'دکھن ہو' ٹھنڈے لگے 'کیکپاہٹ ہو اور بازوؤں اور ٹانگوں میں سختی ہو۔

الیومینا (Alumina): اعصاب کی پیغام رسانی کی صلاحیت میں خلل واقع ہو جائے چنانچہ ہاتھوں اور پاؤں میں ایک سوئی چھوئی جائے تو کچھ احساس نہ ہو پھر دوسری سوئی چھوئی جائے تب بھی کوئی احساس نہ ہو اسی طرح مزید سوئیاں چھبوتے سے بھی احساس نہیں ہوتا 'پاؤں کے ٹکڑوں کا سن ہو جانا' دیگر اعضاء کے ساتھ بازوؤں اور ٹانگوں کے اعصاب کے تعلق نہ رہے۔  
فاسفورس (Phosphorus): جب مرض کی وجہ جلق ہو 'یا چمک و غیرہ کا مرض ہو' سوئیاں

چپنے کے احساس کے ساتھ جسم کا سن ہو جانا، بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا اور بے حس ہو جانا اور انگلیوں کے سروں کا سن ہو جانا یا بے حس ہو جانا۔

## ضرورت سے زیادہ حسایت

(Oversensitiveness)

(Hyperaesthesia)

کافیا (Coffea): بچوں میں غیر ضروری حسایت، زچگی کے بخار میں جس کے ساتھ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں، معمولی سی حرکت کا احساس بھی بہت زیادہ ہو، چھوئے جانے اور شور سے زود حس ہو، بینائی کی حسایت، سننے کی حسایت، سو گھٹنے، چھوئے جانے کی حسایت ہو، شور سے دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، زائدہ اعضائے تناسل کی بہت زیادہ بڑھی ہوئی حسایت، اکثر یہ حسایت جماع میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ اندام نہانی کا گرم ہونا اور حساس ہونا ہوتی ہے۔

گیومولا (Chamomilla): جب کافیا ناکام ہو جائے تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، درد کی زود حس، جسم چھونے سے درد کرنے کے ساتھ حساس ہو، چھونے سے جسم کے سارے ڈھانچے میں کپکپی دوڑ جائے، پھڑکن اور اینٹھن ہو۔

اسارم یور (Asarum Eur): انگلی یا ناخن سے لینن یا ریشم کے کپڑے کو کھرچنا، کانڈ کی کھڑکھڑاہٹ، یا اسی قسم کی آوازیں یا افعال بہت ہی ناگوار احساس کو جنم دیتے ہیں۔ کوئی بھی جذبہ پیدا ہو جو مریض کو ٹھنڈک کے ساتھ کپکپاہٹ میں مبتلا کر دے، تصور کرے کہ وہ ایک روح کی مانند فضا میں معلق ہے۔ زمین پر چلتے زمین پر پھسلنے کا احساس۔

نکس دامیکا: (Nux Vom): بیرونی اثرات مثلاً روشنی شور اور خوشبو سے زود حس۔ بیلاڈونا: (Belladonna): معمولی ہلنے یا شور سے زود حس ہو۔ معمولی ہلنا یا شور برداشت نہ کر سکے۔ کھوپڑی حساس ہوتی ہے، مریض بالوں میں، برش یا کٹکٹیں نہیں کرنا چاہتا۔

سلفر: (Sulphur): بدبوؤں سے زود حس ہو البتہ گندی چیزیں کھائے اور نگل جائے۔ تھیرائیڈین: (Theridion): حسایت ایسی ہو کہ درد کرنے والی تھر تھراہٹ جسم میں لہروں کی طرح گزرے جس کے بعد مٹتی ہو۔ شور سے مٹتی اس مرض میں بہت عجیب علامت ہے۔

ہیپیر سلف: (Hepar Sulph): نقوش (تاثرات) سے، ماحول سے اور درد سے زود حس، سردی سے زود حس جسے برداشت نہ کر سکے، غیر معمولی گرم کمرہ پسند کرے، نازک مزاج مریض۔

لیک کینیم: (Lac Can): زود حسی، روشنی اور شور کی حساسیت، چڑھتے وقت صفحہ صاف معلوم نہ ہو، مریضہ اندھیرے میں اپنے سامنے چہرے دیکھے۔

نگس واسیکا: (Nux Vom): بیرونی اثرات سے زود حسی ہو، روشنی، شور، خوشبو، ہوا سے زود حسی ہو۔ کم سے کم جھونکے نیز مریض کو اپنے ماحول سے بھی زود حسی ہو۔ اپنی خوراک کے متعلق بہت زیادہ ذکی الحس ہو۔ کئی قسم کی خوراک اس کے لئے غلط انداز ہو۔ تحریک وغیرہ پیدا کرنے والی اشیاء کی طلب رہے۔ یہ محرک اشیاء اسے چست رکھتی ہیں۔ مریض چڑچڑا اور زود رنج ہوتا ہے۔ گوشت سے بے زاری ہو کیونکہ گوشت اس کی تکلیفات میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر اس کے راستے میں کوئی کرسی آجائے تو وہ اسے ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹائے یا کپڑے اتارتے ہوئے اگر لباس کا کوئی ٹن کھلنے میں دقت پیدا کرے تو وہ بغیر ٹن کھولے لباس کھینچ کر اتارے، ایسا کرتے ہوئے بعض اوقات اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ناقابل مزاحمت چڑچڑا پن۔ اپنے مزاج کے مطابق دوسروں پر بھی چیزیں مسلط کرے۔ اگر کسی چیز کے متعلق یا کسی بات کے متعلق کوئی تفصیل بیان کرے تو غصے میں آجائے اور اس کو ترک کرنا چاہے۔ چیزوں کو پھاڑ ڈالے۔ لعنت ملامت کرے۔ اپنے گھر جائے تو ان چیزوں کے متعلق اپنے گھر والوں سے بھی باتیں کرے اور انہیں سب کچھ بتائے، مریض جھگڑا کرے، سرزنش کرے، لعنت ملامت کرے، حسد کی باعث توہین کرے اور یہ سب کچھ کرنے کے فوراً بعد چلائے اور بلند آواز کے ساتھ روئے۔

آرسنک البم: (Arsenic Alb): سو ٹکھنے سے اور چھونے سے حساسیت ہو، کمرے کے ماحول سے زود حسی ہو، انتہا درجے کا نازک مزاج، چاہے کہ کمرے میں ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھی ہو۔

کوکولس: (Cocculus): سن ہو جانے کا اور فالجی کیفیت کا احساس ہو بازوؤں میں، ایک وقت میں ایک ہاتھ سن ہو جیسا کہ سو گیا ہو اور دوسرے وقت میں دوسرے ہاتھ کی یہی کیفیت ہو۔

سلیشا: (Silicea): کام کرنے کے دوران ہاتھ اور پاؤں سو جائیں۔ شور سے حساسیت ہوتی ہے۔

الیومینا سلیکیٹ: (Alumina Silicate): انفرادی حصص کا سن ہو جانا اور درد کرنے والے حصص کا سن ہو جانا۔ گرمی کی لہروں کا یکایک سر کی طرف جانا اور گرمی کا تیزی کے ساتھ سر کی طرف جانا پایا جاتا ہے۔

ہائیوسائیمس: (Hyoscyamus): جلد کے اعصاب کی زود حسی جس کے نتیجے میں مریض

کے اندر بٹکا ہونے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔  
اوپیم: (Opium): شور سے زود حسی، مریض دیوار پر چلنے والی مکھی کی آواز سن لے اور دور سے گھڑی کی ٹک ٹک بھی سن لے۔  
بیوفو: (Bufo): جلد پر مخصوص ککڑوں کی بڑھی ہوئی حساسیت، جبکہ دیگر حصے میں سنا ہو جانے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔  
پلمبرم: (Plumbum): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی جلد کی حساسیت جس کے ساتھ قالج اور طاقت میں کمی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ چھوئے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ چھوئے جانے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ حاد امراض میں بڑھی ہوئی حساسیت ہوتی ہے اور مزمن امراض میں جلد کی بے حسی ہوتی ہے۔  
تھیرائیڈین: (Theridion): اعصابی زود حسی، لینن اور ریشم کے کپڑوں کی رگڑ سے بھی خراشیں پڑ جائیں۔ کاتھ کی کھڑکھڑاہٹ ناقابل برداشت ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر علامتوں میں اتاری واقع ہو۔  
گرافٹس: (Graphites): سردیوں میں سردی سے اور گرمیوں میں گرمی سے حساسیت ہو۔

## درد اعصاب (درد جو اعصاب پر اثر انداز ہو)

### (Nevralgia)

#### (Pain Affecting Nerves)

آرسینکیم ایلبم: (Arsenicum Alb): جب اس کی وجہ ملیریا ہو اور دورے باقاعدہ وقفوں کے ساتھ آئیں۔ جلن اس مرض کی مخصوص علامت ہے۔ بائیں آنکھ کے حلقہ چشم کے اعصاب اور بائیں جانب کے عرق النساء کے اعصاب تواتر کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔  
مگنیشیا فاس: (Magnesia Phos): یہ دوا دائیں جانب کی ترچگی دوا ہے۔ یہ دوا اعصابی فراہمی کے کسی بھی حصہ کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثلاً آنکھ کی کلن کی 'رحم' (بیضہ دان) کی یا ٹانگ کی۔ یہ دوروں کی دافع دوا ہے۔ عضلات کی سکڑن کے ساتھ بے تحاشہ درد ہو، گرم اشیاء لگانے، دبانے اور اندھیری جگہ چلے جانے سے بہتری ہوتی ہے۔  
اگیریکس ایم: (Agaricus M): یہ دوا چہرے کے عضلات میں اضطرابی حرکت والے اعصابی درد کے لئے مفید ہے یا چہرے کے اعصابی درد کی کوئی بھی صورت ہے یہ ایک مفید دوا ہے، درد پھاڑنے والے، بھلا لگنے جیسے تیز اور ہمیشہ شدید ہوتے ہیں۔ معمولی چھوٹے سے درد

میں شدت آ جاتی ہے۔ ان دردوں کے ساتھ ہمیشہ عضلات کی پھڑکن ہوتی ہے۔ جن عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے ان کے ریشوں میں سختی ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔  
بیلادونا: (Belladonna): جب حملے اچانک ہوں اور اچانک ہی رفع ہو جائیں 'شور سے' روشنی سے اور چوٹ سے اور ہوا کے جھونکے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ چہرے کا سر 'عصبی' درد اعصاب 'جڑے' کے دائیں جانب کے اوپر والے اور نیچے والے حصہ میں تیز کانٹے والے درد۔

کیموملا: (Chamomila): اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے اس وقت جب مریض کا ہر عصب مارفین، کوکین، یا حتیٰ کہ کافی کی طلب میں پھنسا رہا ہو جس سے کہ وہ محروم ہو چکا ہو۔ ناقابل برداشت درد کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ دانت کے درد اور رحم کے درد کے لئے۔

ارجنٹم میٹ: (Argentum Met): جوڑوں میں پھاڑنے اور چیرنے والے درد ہوں جن کے ساتھ اعصاب میں اور کمری ہڈی میں بھی درد ہو۔ ٹھنڈے 'مرطوب' اور طوفانی موسم کے دوران مرض میں زیادتی ہو۔ حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ باوجود تھکاوٹ کے مریض کو چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ: (Argentum Nit): چلتے وقت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ٹانگوں کے نچلے حصہ میں پھاڑنے والے 'بر چھبی گئے جیسے اور گولی گئے جیسے درد ہوں۔ مریض ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈے کمرے، بڑے ٹھنڈے مشروبات جیسے آئس کریم وغیرہ کی خواہش کرے۔ گرمی سے اتری ہو۔

سٹانم میٹ: (Stannum Met): اعصابی درد جو آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جائیں۔ کسی بھی کام کے کرنے سے نفرت ہو۔ اگر درد دب جائیں تو اس کے نتیجے میں سل ہو جائے۔ یہ عورتوں کی دوا ہے۔ جہاں شدید قسم کا اعصابی درد رک جائے اور پھر زیادہ مقدار میں پیلا، سبز لیکوریا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ انہیں سل سے محفوظ کر لیتا ہے۔

کالو سنٹھس: (Colocynthis): پیٹ کے اعضاء کے اعصاب پر بہترین عمل کرتا ہے۔ کانٹے والے 'مروڑنے والے اور پیٹنے والے درد ہوتے ہیں۔ دبائے سے 'تیز تیز چلنے سے اور چل قدمی سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ اعصابی درد کچے پھلوں کے کھانے سے 'مخلوط مشروبات خصوصاً ٹھنڈے مشروبات پینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ سر کا اعصابی درد آنکھوں کا 'پشت کے نچلے حصہ کا اور آنٹوں کا اعصابی درد 'غصے اور بد مزاجی کے بعد ہو۔ بعض کیسوں میں 'متاثرہ حصوں کا سن ہو جانا' ان میں سونپوں کا چھنا اور تھنچنا جیسے چیزیں چل رہی ہوں پائی جاتی ہے۔ بائیں



جانب کا عرق انشاء ' جس کے لئے 200 ذاتی یوشن استعمال کیا جاتا ہے۔

چائنا آف: (China Off): اعصابی درد ہو جس کی وجہ بار بار کا اخراج خون ' طویل عرصہ تک مسلسل دودھ پلانا یا میعادى بخار کے بار بار کے حملوں کا ہونا ہو۔ اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب درد ' حلقہ چشم کے زیریں حصہ میں ہو اور جڑے کی ہڈی کے بالائی حصہ کی شاخوں کے پانچویں عصب میں ہو۔ درد میں زیادتی معمولی سے چھو جانے یا ہوا کے جھوکے سے ہوتی ہے ' یہ درد دورہ والا ہوتا ہے یہی اس کا مخصوص نشان ہے۔

تھوچا: (Thuja): سوئیاں چھوئے جانے کا ساشدید درد جس کے ساتھ اعضاء میں اور دانٹوں میں بھی درد ہوتا ہے نیز اس کے ساتھ منہ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور بالائی ہونٹ میں پھڑکن ہوتی ہے۔ چہرے کے بائیں جانب کا اعصابی درد۔

زینتھو آگزاٹلم: (Xanthoxylum): بازوؤں اور ٹانگوں میں ہر کہیں گولی لگنے کا ساعصابی درد ہوتا ہے جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ رحم کا اعصابی درد۔

میزیریئم: (Mezereum): آنکھوں کی پلکوں کے اعصابی درد کے لئے مفید دوا ہے۔ جس کے بعد ہونٹوں اور حلقہ ہائے چشم میں کھجلی ہو۔ اس کی وجہ دانت کا سڑنا ہو ' درد والے حصہ میں سن ہو جانے کا عارضہ بھی ہوتا ہے۔ رخساروں کے عضلات کی پھڑکن بھی اس کی ایک مخصوص علامت ہے۔ گرمی اور پھونے سے مرض میں اتھری ہوتی ہے۔

فاسفورس: (Phosphorus): یہ دوا چہرے کے ہتھکانی درد کے لئے ہے ' جب اس ویزکی زب نہت زیادہ ذاتی سسکن یا ہوش ہو ' درد چلنے والے ' پھاڑنے والے اور کھینچنے والے ہوتے ہیں ' چہرے کے عضلات کی ہر حرکت درد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس درد کے ہمراہ غشی اور ہر قسم کا شور ہوتا ہے۔

برائی اوٹیا: (Bryonia): اس کا تعلق دائیں بازو کی کلائی کی سب سے نیچے والی ہڈی کے عصب کے ساتھ ہے۔ ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور حرکت درد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بازو میں کہنی سے اوپر دھکن والا درد ہو ' غیر معمولی سردی لگنے کے ساتھ اعصابی درد ہو ' غصہ اور بد مزاجی کے بعد۔

نیرم میور: (Natrur Mur): جب دورہ رات 9 بجے سے 11 بجے کے دوران لوٹے ' ضدی قسم کی قبض اور جلد کی خشکی موجود ہو ' ساحل سمندر پر اور نمک زیادہ استعمال کرنے سے درد میں اتھری ہو۔

کیپسکیم ' پلساٹیل ' ورباسکم: (Capsicum, Pulsatilla, Verbascum): کان کے درد کے لئے۔

آرنیکا ایم، شیفسی سیکریا، پلانٹیگو: (Arnica M, Staphisagria, Plantago): دانت درد کے لئے۔

سکوتیلریا: (Scutallaria): سر کے اعصابی دردوں کے لئے۔

کالی سائی نیئم: (Kali Cyanatum): کینٹیوں والے حصہ میں، چکوں کی محراب میں اور جڑے میں اذیت ناک درد، اوپر والے جڑے کی دائیں جانب کے درد کا بھی اس دوا سے علاج کیا جاتا ہے، دماغ کی رسولی کے باعث پیدا شدہ بے لگام سر کا درد ہو تو 1000 یا اس سے اوپر والی طاقتوں کی خوراکیں دی جائیں۔

کالی آیوڈ: (Kali Iod): سرد کننے کے ساتھ بائیں آنکھ کے اوپر اعصابی درد ہو۔

مگنیشیا کارب: (Magnesia Carb): منی کے ساتھ دانت کا درد، حاملہ عورتوں میں ہوتا ہے۔

سپائی جیلیا (Spigelia): بائیں جانب کا اعصابی درد، بائیں آنکھ میں، بائیں حلقہ چشم میں اور بائیں بازو کے اعصاب میں درد ہو۔ درد گولی گلتے جیسے جلن دار، پھاڑنے والے ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چہرے اور گردن میں سے گرم کی ہوئی سوئیاں گزاری جا رہی ہیں۔ گردن اور کندھے کے دردوں میں گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ آنکھوں کے درد ٹھنڈک سے آرام پاتے ہیں۔

رشاکس (Rhus Tox): جسم کو تنگ کرنے اور پسینہ آنے کے بعد پانی میں بھیک جانے کے باعث پیدا شدہ اعصابی درد، درد میں بہتری جسم کی پہلی حرکت پر ہوتی ہے لیکن مسلسل حرکت سے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے یا پھر چلتے رہنے سے بہتری ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): شراب نوشی یا شراب کے بد اثرات سے پیدا شدہ اعصابی درد۔ درد شدید، غضب ناک، بدترین، کانٹے والے، جکڑنے والے اور کھرپنے والے ہوتے ہیں۔ بد ہضمی، قے، ڈکار، اسہال یا قبض اس مرض کی علامات ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے اور صبح کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔ گھٹیاوی مریضوں میں چہرے کا اعصابی درد ہوتا ہے۔ جس کے ہمراہ ٹھنڈک کا احساس بھی ہو۔

کالی بائی (Kali Bi): روزانہ ایک ہی وقت پر آنے والا اعصابی درد۔

پلمبرم (Plumbum): شدید کھینچنے والے اور ایٹھن والے طے جلتے اعصابی درد جن کا آغاز پیٹ سے ہوتا ہے اور پھر وہ سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ قبض ہوتی ہے اور پاخانہ سخت ہوتا ہے۔ پاخانے کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے کبری کی بیگنیاں ہوں۔

سینگوینی نیریا سی (Sanguinaria C): دائیں جانب کا اعصابی درد جس کی علامات سپائی جیلیا

کی طرح ہوتی ہیں۔

روٹا (Ruta): ڈنگ لگنے جیسے پھاڑنے والے اور جلن دار درد 'ٹھنڈ اور نیچے لینے سے ابتری ہوتی ہے۔ عمومی طور پر مزمن دردوں کو اس دوا سے افادہ ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): عرق النساء کا درد 200 کی خوراک دیں یا سی۔ ایم (C.M) کی خوراک دیجئے۔

نے فالیم (Gnaphalium): عرق النساء کے لئے مخصوص دوا ہے۔ اس میں دردوں کے اندر آرام اور جسم کی پہلی حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔

اگنیشیا، سٹیفنی سگریا (Ignatia, Staphisagria): بد مزاجی کے بعد پیدا ہونے والے اعصابی درد۔

نیفرم سلف (Nat Sulph): سائیکوٹک اعصابی درد 'چلتے وقت کو لمبے کے جوڑ میں اچانک درد ہو۔

ویلیریانا (Valeriana): اعصابی درد 'جن میں زیادتی آرام کرنے سے ہوتی ہے۔

سٹرانٹیم کارب (Strantium Carb): چیر پھاڑ (سرجری) کے صدمات کے باعث پیدا شدہ دردوں کے لئے یہ دوا خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔

ہورا براگیلنس (Hura Bragilensis): مریض جتنا زیادہ ہنستا ہے۔ درد اتنا ہی شدید ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس مرض کی عجیب علامت ہے۔ اسے ہنسی والا اعصابی درد کہا جاسکتا ہے۔

سی سی فیوگا (Cimicifuga): یہ شدید درد ہے۔ جو سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے۔ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک دیجئے۔ مریض دباؤ کا شکار ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی باتونی بھی ہوتا ہے۔ شراب نوشی سے ابتری ہوتی ہے۔

## سن ہو جانا (Numbness)

(دیکھئے "اعصاب میں سن ہو جانا")

(Paralysis, Paraplegia, Locomotor Ataxia & Spinal Affections)

(قارچ، چلنے کی نااہلیت اور ریڑھ کی تکلیفات)

جلسیم (Gelsimium): جھٹکے لگیں، پھڑکن ہو، بجلی لگنے کے سے درد ہو، سرد درد ہوں، دکھن ہو، لنگڑاہٹ ہو نیز ایک کے دو دکھائی دیں۔ آنکھ کے بالائی پچھیر کا قارچ ہو نیز قارچ کی اور بہت سی اقسام۔ بازو اور ٹانگیں جلد جلد تھکیں، گردن میں اکڑاؤ ہو، دماغ ست ہو اور نظام

اعضلات میں ڈھیلا پن ہو، فالج ذہنی و جسمانی کی وہ قسم جس میں اعصابی حرکت زائل ہو جاتی ہے لیکن حس باقی رہتی ہے۔

اولینڈر (Oleander): فالج جس میں درد نہ ہو۔

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): جسم کے تمام حصوں میں حساسیت کی کمی واقع ہو جائے۔ دوران خون بھی سست ہو اور غیر متوازن ہو۔

الیومینا (Alumina): جب اعصاب کی پیغام رسانی کی استعداد میں انتہائی کمزوری واقع ہو جائے چنانچہ ایک سوئی چھونے سے بھی کچھ پچ نہ چلے اور دوسری سوئی چھونے سے بھی کچھ محسوس نہ ہو اور اسی طرح مزید سوئیاں چھونے سے بھی کوئی احساس نہ ہو۔ ریزہ کی ہڈی میں درد اس طرح سے ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آخری مہرہ میں گرم و سرخ لوہا ٹھسٹرا جا رہا ہے۔ پیٹ کے پیچھے کی جانب سے بجلی لگنے کے سے اور گولی لگنے کے سے درد ہوں۔ ٹانگوں کے نیچے والے حصے بہت بھاری ہوں چنانچہ انہیں مشکل ہی سے ہلایا جاسکے۔ چلنے کی ناقابلیت سوائے دن کے وقت جبکہ ہر قدم بہت دیکھ بھال کے رکھے۔ چہرے کی جلد میں اتنا زیادہ کھنچاؤ ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انڈے کی سفیدی کو چہرے پہ ڈال کر خشک کر دیا گیا ہے۔ بڑھی ہوئی جنسی خواہش ہوتی ہے۔ منی بلا ارادہ خارج ہو جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ ایڑیاں یا تو سن محسوس ہوتی ہیں یا پھر جلتی ہوئی گرم محسوس ہوں۔ بچوں کا فالج، ٹانگوں کا۔

پلمبم (Plumbum): عام اور جزوی فالج کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں قبض ہوتی ہے۔ ذہنی اجتری کے بعد والا فالج، کیکاپاہٹ کے دورے، گولی لگنے کے سے اور تیر لگنے کے سے درد اعصاب میں ہوں۔ جلد غیر معمولی حساس ہو ذرا سا پھونکا بھی برداشت نہ ہو کیونکہ پھونکا اسے تکلیف دیتا ہے۔ بازو کے آگے والے حصے کے اعصاب کے فالج کے باعث کھانسیاں گر جائیں۔ پاؤں کے گر جانے کا علاج بھی اس دوا سے کیا جاتا ہے۔

سلفر (Sulphur): اس دوا کی نشاندہی اسی وقت کی جاتی ہے جب فالج، اکونائٹ کے زیادہ استعمال کے باعث لاحق ہو۔ مخصوص ہیجان ہو حیض کی بندش سے لاحق ہو۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): پیدائش کے وقت کا فالج، چھوٹے بچوں میں یہ مرض پیدائش کے وقت کسی ضرب کے لگ جانے کے باعث ہو سکتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں فالج ہو جاتا ہے۔ پٹٹیوں کے ذریعے پیدائش کے نتیجہ میں دماغ یا ریزہ کی ہڈی کے دب جانے کے باعث یہ مرض ہو سکتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): متاثرہ حصص کا سن ہو جانا، یہ مرض گیارہ دن کے باعث یا تھکاوٹ کے بعد گیلی زمین پہ لیٹنے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ وضع حمل سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا

ہے۔ جنسی بے اعتدالیوں، تب لرزہ یا تب محرقہ (ٹائیفائیڈ) سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کا ادھر تک، آنکھوں کے پچھروں کا گر جانا (یا فالج) سردی (یا بے حسی) من ہو جانا اور جھنجھناہٹ کا ہونا لاحق ہو۔ کھنچاؤ کے باعث اعصاب کو نقصان پہنچنے سے فالج لاحق ہو۔ آئرینکا کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے آزمایا جاسکتا ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** ریزہ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جملن ہو۔ جس کے ساتھ چوٹیوں کے ریگنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ مرض کے آغاز کے مراحل میں جنسی اشتعال پایا جاتا ہے۔ جو نہ صرف ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کے بعد نامردی کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغ کے ریشوں میں چکنائی کی ابتری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ کام سے بے رغبتی پائی جاتی ہے۔ نیز مطالعہ اور ارتکاز توجہ کی بھی رغبت نہیں رہتی۔

**کالی ہائیڈ (Kali Hyd):** یہ دوا اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں آتشک (سٹلس) کی ہسٹری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اعصاب اور غدود بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں دماغ کی رسولی پائی جاتی ہے نیز جگر اور دوسرے غدودوں اور غدودی اعضاء میں بھی رسولی پائی جاتی ہے۔ اس مرض میں بکلی لگنے کے سے درد بنیادی علامت ہیں جو کہ ٹانگوں کی نسبت سر میں زیادہ تواتر کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ گرمی اور متاثرہ جانب لینے سے دردوں میں ابتری واقع ہوتی ہے۔

**پیکریک ایسڈ (Picric Acid):** یہ مرض ذہنی اور جنسی بے اعتدالیوں اور خون کی کمی کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ جب جنسی خواہش کا موقع گزر جاتا ہے تو بے انتہا تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹانگوں میں کمزوری، تھکاوٹ اور بھاری پن کا احساس پایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے چلنے میں دقت ہوتی ہے۔ بے حسی کی نشاندہی ہوتی ہے۔

**پیکریٹ آف آئرن (Picrate of Iron):** یہ دوا پیکریک ایسڈ کی جگہ استعمال کی جاسکتی ہے جبکہ مرض بے حسی کے ساتھ قلت دم کا مرض بھی پایا جائے۔

**اوپیم (Opium):** حلق کی بے عملی یا گلے کا فالج، جس کے نتیجے میں مائع غلط راستے سے نیچے جاتے ہیں یا ناک کے راستے باہر آ جاتے ہیں۔

**کیورارے (Curare):** چلنے کے نظام کا فالج، اضطرابی عمل میں رکاوٹ یا اس عمل کا ختم ہو جانا، عمومی فالج، اعصابی کمزوری، غنودگی، شیق الشقی، چکر، آنکھوں کی پلکوں کا گر جانا، عضلات کا فالج، پنوں یا عصب کے مادے کو متاثر کئے بغیر۔

**ہائپرکیم (Hypericum):** اعصابی صدمے کا برا اثر، سر میں چوٹ کے باعث تشنج یا جھٹکے، چٹیوں کے ذریعے وضع حمل کے نتیجے میں چہرے کے فالج کو بھی یہ دوا خصوصی طور پر ٹھیک کرتی ہے۔ نیز آئرینکا کے ناکام ہونے پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔

**لا تھیرس سائیوا (Lathyrus Sat):** بازوؤں اور ٹانگوں کا فالج، خصوصاً ٹانگوں کا فالج، تشنجی فالج، ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں۔ ٹانگیں نیلی اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انہیں لٹکایا جائے۔ گھٹنے اور ٹخنے اکڑ جاتے ہیں اور ان میں لنگڑاہٹ آ جاتی ہے۔ انگوٹھوں کو فرش سے نہیں اٹھایا جاسکتا جبکہ ایزیاں فرش کے ساتھ نہیں لگتیں۔ مریض آگے کو جھک کر بیٹھتا ہے۔ سیدھے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بازو اور ٹانگیں بہت بھاری ہیں اور فرش اونچا نیچا ہے چنانچہ مریض چلتے ہوئے دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھتا ہے۔ پھونے سے اور مرطوب موسم میں بہتری ہوتی ہے۔

**بیسلی لینم (Bacillinum):** جب بہترین منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا استعمال کی جاتی ہے جو کہ درمیانی عمل انگیز ہے۔ 200 ڈائی لیوٹن کی صرف ایک خوراک دیجئے۔ صبح سویرے نہار منہ۔

**کاسٹیکم (Causticum):** انفرادی حصوں کا فالج، آواز پیدا کرنے والے اعضاء، حلق اور گلا، زبان، پلکیں، چہرہ، بازو اور ٹانگیں، مثلاً عمومی طور پر دائیں جانب، ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے جھونکے کے ننگے بدن پر لگنے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ ٹائیفائیڈ، ٹائفس یا خناق کے بعد بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کے زہر کے باعث فالج کا ہو جانا۔ ٹائپنگ کرنے والے افراد کی زبان کا فالج جبکہ وہ ٹائپ کے حروف کو ہونٹوں سے پکڑتے ہیں۔ ایم ڈائی لیوٹن خوراک دیجئے اور پھر اگر بہتری نہ ہو رہی ہو تو خوراک بڑھاتے جالیے البتہ جب بہتری ہونے لگے تو خوراک بڑھانا بند کریں۔

**آر جینٹم نائٹرکیم (Argentum Nit):** جلدی میم والی علامات ہی اس دوا کی علامات ہیں لیکن جلدی میم والے کیسوں میں اسے حکمی دوا کے طور پر دیا جاتا ہے جبکہ جلدی میم عمل کرنا چھوڑ دے۔ پاگل پن کے فالج میں۔ مریض بے وقوف ہوتا ہے اور جلد پر جوش ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ میں خوش ہو جاتا ہے جبکہ اگلے ہی لمحے غصے سے بھر جاتا ہے اور مشتعل ہو جاتا ہے۔ ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکتا۔ پنوں کی پھڑکن کے ساتھ چیخ مری۔

**اکٹیاریس موسا (Actea Racemosa):** رحم کی تکالیف کے باعث جب ریزہ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اضطرابی نظام میں خرابی آتی ہے تو یہ دوا خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں نچلے دھڑکا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

**آگریکس مس (Agaricus Mus):** ریزہ کی ہڈی میں جمجمہاٹ اور بلن ہوتی ہے۔ جیسا کہ برف کے کانٹے سے جلن ہوتی ہے۔ جسم کے کئی حصوں میں عضلات کی پھڑکن ہوتی ہے۔ خصوصاً آنکھوں کی پلکوں میں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے برف کی سونیاں جلد میں چبھ رہی

ہوں۔

**زنگم میٹ (Zincum Met):** ریڑھ کی ہڈی میں اینٹھن ہو۔ جس کے ساتھ کمر میں دکھن والا درد ہو۔ جس میں چلنے سے بہتری ہو۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جھلن ہوتی ہے۔  
**فائیسوسٹگما (Physostigma):** جب ہر عصب میں بیجان ہو اور اس کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں جھلن اور پھڑکن کا احساس ہو۔ پاؤں اور ہاتھوں میں سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اینٹھن والے درد ہوتے ہی کمر کے عضلات سخت ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں گولی لگنے جیسے درد کے ساتھ دائیں جانب کا فالج۔

**کوکولس انڈ (Cocculus Ind):** کمر میں فالجی دکھن، پیٹ میں چٹکیاں لینے کا احساس، ایزبوں میں سختی ہو۔

**تھوجا (Thuja):** بازو کا فالج اور دکھن جو کہ پیچک کے خلاف حفاظتی ٹیکہ لگوانے کے بعد لاحق ہو۔ ایم ڈائی لیوشن دن میں 2 بار صبح شام دیجئے۔ یہ دوا ایک ہفتہ تک دی جائے۔  
**سفلینیم (Syphilinum):** یہ دوا لڑکھڑاہٹ والی چال کے لئے درمیانی محل انگیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے جبکہ اس مرض کی بنیاد میں آتشک کا مرض ہوتا ہے۔

**اورم میٹ (Aurum Met):** خود کشی کے رجحان کے ساتھ ادھرنگ یا جزوی فالج۔ اپنے آپ سے اور ہر کسی سے اور ہر چیز سے مریض بے زار ہوتا ہے۔ مریض کی خواہشات اور بے زاریاں انتہا درجے کی ہوتی ہیں۔

**آر سینک ایلم (Arsenic Alb):** ریڑھ کی ہڈی کا دق، جھلن دار اور گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے تمام حصوں میں گرم سرخ سوئی چبھ رہی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

**کونیم (Conium):** فالج کا آغاز پاؤں کی طرف سے ہوتا ہے جو اوپر کو جاتا ہے۔ چھوٹے سے اعضاء ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ تھوک کو نگل سکے اور نہ باہر نکال سکے۔

**کوکولس (Cocculus):** ریڑھ کی ہڈی کا نرم ہو جانا، چلنے کی ناقابلیت، ریڑھ کی ہڈی کا نچلے دھڑ والا علاقہ متاثر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کمر صغیر میں فالج ہو چکا ہو۔ یہ جگہ باہر کو نکل آتی ہے۔ چلتے وقت گھٹنے باہر کو نکلتے ہیں۔ رانوں میں درد ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلوے سوئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ہاتھ اور بازو سو جاتے ہیں۔ ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں اور وہیں کی وہیں ٹھہر جاتی ہیں البتہ تھوڑی دیر کے لئے، لیکن ان کو ہلانے انتہا درد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آنکھوں کی پلکوں کا فالج اور گلے کا جزوی فالج جس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جب مریض بیضا ہوتا ہے تو پاؤں کے تلوے سو جاتے ہیں۔

ڈروسیرا (Drosera): ریزہ کی ہڈی کا ناسور جس کے پیچھے انگلیوں کا اور / یا گھٹنوں کا تپ  
دق لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر پندرہ دن کے بعد 200 طاقت کی خوراک دیجئے۔  
الیومنا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): نچلے دھڑ کا بغیر درد والا فالج نیز متاثرہ حصوں میں  
درد ہو۔ بازوؤں میں کھنچاوت ہوتی ہے۔ بازوؤں، ٹانگوں اور ہاتھوں اور پاؤں میں جھنجھناہٹ  
ہوتی ہے۔

زکیم فاس (Zincum Phos): چلنے کی نااہلیت کے مرض کے آغاز میں یہ دوا دی جاتی ہے  
جبکہ بھالے لگنے کے سے تیز درد ہوتے ہیں۔ ٹانگوں اور بازوؤں میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی  
ہے۔ خصوصاً ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ ریزہ کی ہڈی میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ سونے  
کے دوران بے چینی ہوتی ہے۔ بازوؤں، ٹانگوں اور پاؤں کو ہلاتا رہتا ہے۔

### رعشہ — (Paralysis Agitans "Tremor")

جلسی میم (Gelsemium): اس دوا کی مخصوص علامت کیکپاہٹ ہے۔ کمزوری اور فالج  
فصوصاً سر کے عضلات کا، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، لرزہ کے لئے یہ دوا سرفہرست ہوتی  
ہے۔ دماغ ست اور عضلاتی نظام ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔

ارجنٹیم نائٹرکیم (Argentum Nit): یہ جلسی میم کی شکمیلی دوا ہے۔ اس میں یادداشت کمزور  
ہو جاتی ہے، مریض جلدی جلدی پر جوش ہو جاتا ہے اور غصہ میں بھر جاتا ہے، اچھارہ والے اور  
سبزی مائل اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔

اگیریکس مس (Agaricus Mus): اس مرض میں کیکپاہٹ، خارش اور جھٹکے پائے جاتے  
ہیں۔ عضلات میں سختی ہوتی ہے، متاثرہ حصوں والی جلد میں خارش ہوتی ہے اور ریزہ کی ہڈی  
میں انتہا درجہ کی حساسیت ہوتی ہے۔ پھوٹے جانے کو مریض برداشت نہیں کر سکتا۔

ابسنٹیم (Absinthium): زبان میں لرزہ ہوتا ہے نیز دل کا بھی لرزہ پایا جاتا ہے۔  
کوکولس (Cocculus): کھاتے وقت ہاتھ کپکپاتے ہیں اور جب ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے  
اس وقت بھی ان میں کیکپاہٹ ہوتی ہے۔ گھٹنے کمزوری کے باعث نیچے ڈوب جاتے ہیں۔ ایک  
جانب کو گرنے کے رجحان کے ساتھ چلنے میں لڑکھڑاہٹ پائی جاتی ہے۔ گھٹنے جب حرکت کرتے  
ہیں تو کڑکڑ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

گنیشیا فاس (Magnesia Phos): کیکپاہٹ، ہاتھوں کا ہلنا، ہر ہفتے 1000 طاقت کی خوراک  
دیجئے۔

لتھیرس (Lathyrus): بازوؤں کا رعشہ، نچلے دھڑ کی کمزوری کے ساتھ، یوں محسوس ہوتا



ہے کہ بازو اور ٹانگیں سخت اور سکڑی ہوئی ہیں نیز بازو اور ٹانگیں بھاری محسوس ہوتی ہیں۔  
فرش غیر اموار محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو دیکھ دیکھ کر قدم بڑھانا پڑتا ہے۔  
رشاکس: (Rhus Tox): جب رعشہ درد کے ساتھ شروع ہو جس میں حرکت سے بہتری  
ہو، متاثرہ حصوں میں سختی پائی جاتی ہو۔

فائیکسٹوگما: (Physostigma): عضلات کا رعشہ اور تشنج جو کہ خوب واضح ہو، حرکت  
سے، ٹھنڈے پانی کے لگنے سے ابتری ہوتی ہے، دل کی دھڑکن اور پھر کن سارے جسم میں  
محسوس ہوتی ہے۔

امبرا گرےسا: (Ambra Grisea): رعشہ، سن ہو جانے کے ساتھ بازو اور ٹانگیں معمولی  
حرکت سے سو جاتے ہیں، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی اور سخت ہوتی ہیں، ناخن نونٹے ہیں اور چہرہ  
سو جاتے ہیں۔

ہیلوڈرما: (Heloderma): بازو اور ٹانگوں کے اعصاب کے ساتھ ساتھ کیکپاہٹ، تھکاوٹ کا  
احساس ہو، مریض بہت کمزور اور مشوش ہوتا ہے۔ غشی ہو نیز سن ہو جانے کا احساس ہو۔  
زنکم: (Zincum): پورے جسم میں شدید کیکپاہٹ (پھڑکن) خصوصاً ذہنی ہوانگی بخنگی کے  
بعد، بچوں میں پھڑکن، کوریا، ہاتھوں اور پاؤں کا فالج، لگتے وقت ہاتھوں میں کیکپاہٹ ہو۔

## پارکنسن کے امراض

(Parkinso's Disease)

(دیکھئے ”لرزہ“ رعشہ“)

## عضلات کی سختی (Sclerosis)

(نیز دیکھئے ”فالج“ اور ”پنوں کی بڑھتی ہوئی کمزوری“)

میڈورنیم: (Medorrhinum): سوزاک کے دب جانے کے باعث یا محض سوزاک کے باعث  
یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ ایم ڈائی لیوشن دیجئے۔

پلمبم: (Plumbum): عضلات کے ریشوں کی سختی کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ متعدد  
ریشوں کی سختی کی دوا۔ 200 ڈائی لیوشن کی خوراک ہر ہفتہ دی جائے۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا: (Tarentula His): متعدد ریشوں کی سختی کیکپاہٹ کے ساتھ، پھڑکن ہو  
اور جھٹکے لگیں، ٹانگیں سن ہو جائیں۔

اوگزے ملک الیڈ: (Oxalic Acid): دماغی اور ریزہ کی بڑی کے نچلے حصوں کی ملی جلی سختی۔

بھالے لگنے جیسے ہگولی لگنے جیسے اور جھٹکے دار درد ہو، جسم کے کئی حصوں میں 'ریڑھ کی سوزش' عضلات کی بے انتہا کمزوری۔

### حساسیت (Sensitiveness)

(دیکھئے اعصاب --- زود حس)

### تشنجی دورے (Spasms)

(دیکھئے "جھٹکے")

### کزاز (تشنج) (Tetanus)

ہائیڈروسیانک ایسڈ: (Hydrocyanic Acid): یہ دوا پنوں کے مستقل تشنج میں استعمال کی جاتی ہے خصوصاً چہرے کے عضلات کا تشنج، جڑے کا اور کمر کا تشنج، نظام تنفس میں الجھن ہو، منہ پر نیلے نیلے داغوں اور منہ سے بھاگ پھوٹنے کے ساتھ، بازو اور ٹانگوں میں بہت زیادہ سختی ہو نیز باقی جسم میں بھی سختی ہو اور مریض پیچھے کی جانب جھک جائے۔

لیکیسیس: (Lachesis): جڑے آپس میں مل جائیں اور حلق میں تشنج ہو جس کے ساتھ عقلی شخص کے باعث مریض نیلا پڑ جاتا ہے اور بے ہوشی کی نیند سو جاتا ہے۔

ورینٹرم البم (Veratrum Album): جڑے مل جائیں جس کے ساتھ سانس کی نالی کا تشنج ہو۔ سینے میں دباؤ ہوتا ہے جو قریب قریب سانس کو دبا دیتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اندر کی جانب کھینچ جاتے ہیں اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ تھکا دینے والے امراض کی نسبت اس میں تشنج دوسرے درجے کا ہوتا ہے۔ جبکہ سڑکنیا میں پہلے درجے کا تشنج ہوتا ہے۔

بیلادونا: (Belladonna): پھوٹے بچوں کا تشنج، پھر کن ہو، بچے اچانک چونک جاتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ آنکھیں کھورتی ہوئی ہوتی ہیں۔ شدید جھٹکے ہوتے ہیں۔ گلے کے عضلات اکڑ جاتے ہیں اکڑن والا تشنج ہوتا ہے۔

سٹرامونیم: (Stramonium): کزاز کی جھٹکے جن میں پھوٹنے سے اور روشنی سے اتھری ہوتی ہے، دماغ میں گڑبڑا ہٹ ہوتی ہے، جنون کے ساتھ۔

کیمفر: (Camphor): یہ دوا کزاز کی جھٹکوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس کے ساتھ منہ کے کنارے اوپر کو مڑ جاتے ہیں اور دانت نظر آتے ہیں۔ مردگی والا ٹھنڈا پن ہوتا ہے۔

کیوپریم میٹ: (Cuprum Met): ہوش جاتے رہنے کے ساتھ تشنجی دورے ہوتے ہیں جو

چوٹ لگنے یا تیز آلات کے ساتھ زخم لگنے کے باعث ہوں۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ جڑے مل جاتے ہیں منہ سے جھاگ چھوٹ جاتے ہیں بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں اور شدید اکڑن والا تشنج ہوتا ہے۔

سٹرائکی چینم: (Strychinum): چھاتی میں گھٹن کے ساتھ تشنج اس دوا کو نکس دامیکا کے ناکام ہو جانے کے بعد آزمایا جاسکتا ہے۔

انگس چورا ویرا: (Angustura Vera): تشنج میں چوٹ لگنے میں یا جب پھڑکن والے تشنجی دورے ہوں یا پنوں میں جھٹکے لگیں یا سکتے ہو جائے جس کے ساتھ جسم پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ ان تمام امراض میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ تشنج پھڑکن اور جھٹکوں کا لگنا کمر میں یوں جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔

فانیسوسٹگما: (Physostigma): تشنجی جھٹکے، چلنے کی نااہلیت، فالجی حصوں میں سن ہو جانے کی کیفیت (بازوؤں) اور ٹانگوں میں ایٹشن والے درد ہوتے ہیں۔ ریشوں میں ریشہ ہو۔

پسی فلورا انک: (Passiflora Inc): یہ دوا تشنج کے لئے مخصوص ہے اس دوا کی مدد سے 10 قطروں کی خوراک دینی چاہئے اس میں گردن اور کندھوں کے عضلات کی انتہا درجہ والی سختی پائی جاتی ہے۔ جس کے ساتھ لگنے میں دقت بھی ہوتی ہے جھوٹی مسکراہٹ اور جھج اس مرض کی عجیب علامت ہے۔

سیکونڈا ویروسا: (Cicuta Virosa): جھٹکے لگنے کے ساتھ اچانک سختی ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ شدید تخریب جس کے بعد بے انتہا نفاہت ہو جائے۔ چھوٹے سے عضلات میں تشنجی دورے دوبارہ سے شروع ہوں تنفس میں بہت زیادہ دباؤ واقع ہو جائے، جڑے مل جائیں، چہرہ بے انتہا سرخ ہو جائے، منہ سے جھاگ چھوٹ جائیں، اکڑن والا تشنج ہو، اس جاتے رہیں، پیپ والے زخموں میں یا جب زخموں سے پیپ بہنا رک جائے۔

آرسینک البم: (Arsenic Alb): پھانسی کے ذریعے خود کشی کرنے کی کوشش کے ساتھ تشنج خوف زدہ کر دینے والی بازوؤں اور ٹانگوں کی تخریب کے ساتھ تشنجی دورے، زہریلے مادوں کا اظہار ہو۔

ایکونائٹ این: (Aconite N): خوف، پریشانی، عضلات کی اکڑن، جھنجھناہٹ اور سن ہو جانا۔

ہائپرکیم: (Hypericum): زخموں میں شدید درد کے ساتھ تشنج، یہ دوا نو زائیدہ بچوں کو حفظ بالقدم کے طور پر دینی چاہئے جن کی ناف تندرست نہ ہو۔

سیلیشا: (Silicea): پیپ بننے والے زخموں کے لئے یا جب زخموں میں سے پیپ بہنا رک

جائے۔  
 ٹکس وامیکا: (Nux Vom): اکڑن والے تشفی جھٹکے، آنکھوں میں 'تخریب' چہرے میں  
 'تخریب' خشکی، شخص کے ساتھ 'معمولی پھو جانے سے' روشنی سے یا شور سے دور سے پھر سے  
 شروع ہو جائیں خاص طور سے اس وقت اس دوا کے متعلق سوچنا چاہے جب حواس برقرار  
 ہوں۔

## لرزہ (کیکیپاہٹ)

(Tremors "Trenbling")

(دیکھئے "رعشہ")

## دماغی رسولیاں (Tumors "Brain")

ٹیوبرکولینم: (Tuberculinum): علاج کے شروع میں اس دوا کی 200 طاقت کی ایک  
 خوراک دی جانی چاہئے۔ یہ مرض کو روک دے گی اور درد سر کو آرام ہو گا جو کہ دماغ کی  
 رسولی میں عموماً ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): پکڑوں کے ساتھ اور سر گھومنے کے ساتھ درد سر  
 بھاری پن اور درد کے ساتھ ٹاک کی جانب دباؤ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ پریشانی کہ سر بہت زیادہ بھرا  
 ہوا ہے۔ کھوپڑی میں ٹانگے لگنے کے سے درد۔ سردی اور مرطوب موسم میں ابتری ہو 'سر کے  
 اور اندر پہلی ٹھنڈک ہوتی ہو۔

کلکیریا فلور، کلکیریا فاس: (Calcarea Fluor, Calcarea Phos): جب کلکیریا کارب  
 ناکام ہو جائے تو یہ دوائیں آزمائی جاسکتی ہیں۔

مرک آئیوڈائیڈ: (Merc lod): یہ دوا کھوپڑی کی ہڈی والی دماغی رسولی کو روکتی ہے اور  
 تحلیل کرتی ہے۔

کالی آئیوڈائیڈ: (Kali lod): آنکھوں اور ٹاک کے اور سر کے دونوں جانب بجلی لگنے کے  
 سے درد ہوتے ہیں۔ تیلے کی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔ آنکھی ہسٹری۔

ہائپرکیم: (Hypericum): چوٹ لگنے کے باعث آہستہ آہستہ بڑھنے والی رسولیاں۔

تھوجا: (Thuja): شدید درد حقیقہ اور درد سر کے ساتھ دماغ کی رسولیاں، مریض پر جوش  
 حساس اور چنچڑا ہوتا ہے۔ روزانہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔  
 تیزابی اور نمکین خوراک پسند کرتا ہے۔ بھٹ میں گیس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، قبض ہوتی

ہے۔ پیشانی پر اور بازوؤں پر پھینک دیا جاتا ہے۔

## بے ہوشی

(Unconsciousness)

(نیز دیکھئے ”ہسٹریا مرگی“)

لیکیسی: (Lachesis): دماغ میں خون جاری ہونے کے باعث جب بے ہوشی ہو۔ بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ کو بے ہوشی ہوتی ہو۔

ہیلی بوریس: (Helleborus): مکمل بے ہوشی، ہونٹوں کو اور کپڑوں کو نوچتا ہے۔ گھورتا ہے، غیر ارادی طور پر آہیں بھرتا ہے۔

اوپیم: (Opium): حواس کا مکمل طور پر کھو جانا، قبض، خراٹے دار تنفس۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ: (Hydrocyanic Acid): ہر چیز کے خوف کے ساتھ بے ہوشی۔

فاسفورس: (Phosphorus): بے ہوشی جب ہڈیاں کے ساتھ اولتی بدلتی رہے۔

آرنیکا مونت: (Arnica Mont): کو بے ہوشی ہو لیکن جب بولے تو جواب درست دے، زخم کے صدمے کے باعث بے ہوشی ہو۔

سکونٹاوائروسا: (Gicuta Virosa): جھکوں کے دوران بے ہوشی ہو جائے۔

سنا: (Cina): کھانسی کے حملے سے پہلے بے ہوشی ہو جاتا۔

گلوٹائین: (Glonoine): درد سر کے دوران بے ہوشی ہو، لو لگنے میں۔

نکس موسکاٹا: (Nux Mosch): بائیں ٹانگ کے ہلانے کی نااہلیت کے ساتھ بے ہوشی کا ہونا۔

ایٹھوزا: (Aethusa): بے ہوشی میں ٹانگیں لمبی ہو کر پھیل جاتی ہیں۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind): ہر چند لمحات کے بعد خود کو کھودے۔

بیلادونا: (Belladonna): اکڑن والے تشنج کے ساتھ بے ہوشی۔

کاسٹیک: (Causticum): پیٹھے پیٹھے بے ہوشی، ناکامل ہو (خون کی کمی کے باعث)۔

ہائیوسامیس: (Hyoscyamus): جب ہڈیاں کے دوران بولے تو بے ہوش ہو جائے۔

## خون کی نالیوں کا پھیل جانا (Vasodilatation)

(غددی اعضاء کے فعل میں تبدیلی واقع ہو جانے کے باعث اعصابی دوران میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے) خون کی نالیوں کی پھیلاؤ

فیرم فاس (Ferrum Phos): دل کی نس تیز اور ضربات والی ہو۔ جس کے ساتھ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز اور کمزور ہوتی ہے لیکن بے قاعدہ، قلت دم، ضیق النفس اور سانس چھوٹا ہو جائے۔ چہرہ خون سے بھرا ہوا چمک دار سرخ ہوتا ہے۔

گلوٹائین (Glonoin): دل کی دھڑکن اس مرض کی مخصوص علامت ہے۔ دل کی دھڑکن نہ صرف سینہ میں ہوتی ہے بلکہ جسم کے تمام اعضاء میں محسوس ہوتی ہے۔ چہرہ روشن خون سے بھرا ہوا لیکن اتنا نہیں جتنا فیرم فاس میں ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): یہ دوا نظام دوران خون پر تیزی سے اور شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں میں پھڑکن ہوتی ہے اور تیزی سے ایک حالت دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔ حیض میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ جلدی جلدی آتے ہیں اور بست بدبودار ہوتے ہیں۔

## چکر (Vertigo)

(Minier,s Disease)

چائیم سلف (Chinium Sulph): کان کے عصب کی تکلیف کے باعث چکر آتے ہیں۔ جس کے ساتھ پیشانی میں درد ہوتا ہے۔ کانوں میں بہرہ پن کے ہمراہ کانوں کا بجنا اور گرج ہوتی ہو۔ کوکولس (Cocculus): چکروں کی چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں ٹپھنے پر اور سواری کرنے سے ابتری ہوتی ہے نیز اس میں تے بھی ہو سکتی ہے۔

چینوپوڈیم (Chenopodium): عصب سمعی کے سن ہو جانے کے باعث اچانک چکر، نامکمل بہرہ پن جو نیچی آواز کی نسبت بلند آواز سے بہتر ہو لیکن انسانی آواز سے ابتری ہوتی ہے۔ کانوں میں گھنٹیاں بگیں۔

گرافٹس (Graphites): صبح کے وقت چلنے سے چکر آئیں۔ شام کے وقت چکر آئیں۔ اوپر کو دیکھنے سے، اٹھنے سے، نیز ہاکڑے ہونے سے چکر آتے ہوں۔ ضرور ہی لیٹ جانا پڑے، آگے کی طرف گرنے کا رجحان۔

نیٹرم سلف (Natrurn Sul): کانوں میں گھنٹیاں بجنے کے ساتھ چکروں کا آنا۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): یہ دوا اس وقت دی جاتی ہے۔ جب نیرم سلف ناکام ہو جائے۔

بیلادونا (Belladonna): کیروٹڈ شریانوں میں چپکن کے ساتھ چکر، پر خون مریضوں میں بستر میں گھومنے یا مڑنے یا سر کو حرکت دینے سے مریض کو غنودگی ہو۔ چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوں۔ بستر پر لیٹ جائے اور سر نہ اٹھائے۔

گلوٹائین (Glonoine): کھوپڑی میں درد کے ساتھ چکر آئیں۔ سر ہلانے سے چکر آتے ہوں۔ جب جھکے تو نشے میں محسوس ہو۔

جلسی میم (Gelsemium): آنکھوں کے عمل میں نامناسبیت کے باعث چکر آئیں۔ ایک کا دو دیکھنا مخصوص ہے۔ لڑکھڑاہٹ کا رجحان۔

نکس دامیکا (Nux Vom): گیس کے ساتھ چکر آئیں جو کہ کھانا کھانے کے بعد آتے ہیں یا رات کی عیاشی کے بعد صبح سویرے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): قلت دم یا خون کے ضیاع کے بعد چکر۔ چہرہ پیلا ہو جاتا ہے۔ عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ چہرہ چمکیلا چمک دار سرخ ہوتا ہے۔ حملے کے دوران دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): چکر آئیں جبکہ آنکھیں بند کرے۔  
لیکسیس (Lachesis): جب چکروں کے دوران بائیں جانب گرنے کا رجحان ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر آئیں۔ ڈوبنے کا احساس۔

سکولوپنڈرا (Scolopendra): چکر جب ان کے ساتھ بصارت بھی جاتی رہے۔  
گرلیسی اولا (Gratiola): کھانا کھانے کے دوران اور کھانا کھانے کے بعد چکروں کا آنا پڑھتے وقت آنکھیں بند کرنے پر چکر آئیں، نشست سے اٹھنے پر چکر آئیں۔

تھیرائیڈین (Theridion): آنکھیں بند کرنے پر حرکت سے، جھکنے سے، جہاز پر سوار ہونے پر چکر آتے ہیں۔ ایسے چکر جن کے باعث متلی ہو اور تھوے ہو۔ جس کے ہمراہ بصارت جاتی رہے اور آنکھوں میں درد ہو۔

سلینیم (Selenium): بستر سے یا نشست سے اٹھنے پر حرکت کرنے سے متلی کے ساتھ اور تھوے کے ساتھ چکر آتے ہیں نیز کھانے کے بعد بے ہوشی ہوتی ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): صبح سویرے اٹھنے پر چکر آئیں۔ ضرور ہی لیٹ جانا پڑے۔  
لیک ویک ڈیف (Lac. Vacc. Def): مریض جب سوئی میں دھماکہ ڈالنے کے لئے ہاتھ اوپر اٹھائے تو چکر آجائے۔ جب بستر میں مڑے یا ٹکلیے پر سر کو حرکت دے تو چکر آتے ہیں۔

کوئیم (Conium): شراب نوشی سے چکر آئیں۔ ایسے چکر جن میں گول دائرے کے اندر گھومتا ہوا محسوس کرے۔ خواہ کھڑا ہو بیٹھا ہو یا بستر میں ہو۔ بستر یا کرسی گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اطراف کی جانب سر کو گھمانے سے یا بستر میں سر کو موڑنے سے چکروں میں اتھری ہوتی ہے۔ اس طرح سے چکر آتے ہیں جیسے سر کو اطراف میں دائرے کی صورت گھمایا جا رہا ہو۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): جب کمرے میں ہو تو بستر گھومتا ہوا محسوس ہو۔ امبرا گریسیا (Ambra Grisea): چاند پر وزن محسوس ہونے کے ساتھ چکر آئیں۔ سونے کے بعد اتھری ہو۔ خصوصاً صبح کے وقت کھانے کے بعد اتھری ہو۔ چکروں کے باعث نیچے لیٹ جانا پڑے اور معدے میں کمزوری محسوس ہو۔ عمر رسیدگی کے باعث چکروں کا آنا۔ سکیوٹا وائروسا (Cicuta Virosa): جب انھنے کی کوشش کرے تو چکر آجائیں۔ آنکھوں کے سامنے چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوں۔ پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجائے۔ جب اسے دوبارہ نیچے لیٹ جانا پڑے۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، رخسار پیلے، قلت سماعت کمزور، سانس میں دقت، پیشاب نکل جائے اور بستر گھلایا کر دے۔

کیلڈیم (Caladium): آنکھیں بند کرنے پر چکر آئیں۔ آنکھیں بند کر کے کھڑا نہ ہو سکے یا چل نہ سکے۔

لیک کینیم (Lac. Can): ہوا میں تیرنے کے احساس کے ساتھ چکر یا مریضہ جب بستر پر لیٹی ہو محسوس کرے کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔

لارویرا سس (Laurocerasus): کھلی ہوا میں چکر آئیں۔ اسے ضرور ہی لیٹ جانا پڑے۔ الیومنا (Alumina): چکر آئیں جن کے ہمراہ پاؤں کے تلوؤں کا سن ہو جانا، چلنے میں لڑکھڑاہٹ اور ٹانگوں اور بازوؤں میں بے ربطی ہوتی ہے۔

مارفینم (Morphinum): سر کی معمولی حرکت سے چکر آتے ہیں۔ اسارم یورپ (Asarum Europ): چکر آتے ہوں جیسا کہ اس نے شراب پی رکھی ہو۔ ہوا میں معلق محسوس کرے، خود کو۔

مرکیوری الیس پیرینس (Mercurialis Perennis): میڑھیاں اترتے ہوئے چکر آئیں۔ کلکیریا سلف (Calcarea Sul): صبح جاگتے وقت یا شام کو دوبارہ چکر آتے ہیں۔ کھلی ہوا میں بھتری ہو۔ چکر آئیں مقل کے ساتھ۔

اگیریکس ایم (Agaricus M): صبح کے وقت چکر آئیں پھر سارا دن وقفے وقفے سے آتے رہیں۔ تیز دھوپ کے باعث چکروں میں اشتعال ہوتا ہے۔ لڑکھڑاہٹ والی چال کے ساتھ




چکروں کا حملہ۔ کھلی ہوا میں چکر آئیں۔  
 فاسفورس (Phosphorus): جب اوپر کی جانب دیکھے یا نیچے کی جانب دیکھے تو چکر آئیں۔  
 کھلی ہوا میں کھانے کے بعد شام کے وقت چکر آئیں۔  
 سینو تھس (Ceonathus): دائیں جانب مڑنے پر بہت شدید چکر آتے ہیں۔ بائیں جانب  
 لیٹنے پر چکر نہیں آتے۔  
 پٹیلیائی (Petelia T): مسلسل متلی اور تے کے ساتھ سر چکرائے۔ چکروں کے ساتھ ٹانگیں  
 غیر متوازن ہوں۔  
 ایلن تھس (Allanthus): متلی، ابکائی اور کچھ تے کے ساتھ سر کا چکرانا، لڑکھڑاہٹ والی  
 چال، بجلی کی سی تھر تھراہٹ سر سے شروع ہو اور ہاتھوں اور پاؤں طرف جائے۔  
 ار جینم نائٹریکیم (Argentum Nit): کھلی میں بلند و بالا گھروں کو دیکھنے سے چکر آئیں۔ یہ  
 مریض کو لڑکھڑادیں۔ وہ اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھوں کے بند کرنے پر چکر آئیں۔  
 کلکییریا کارب (Calcareia Carb): جب اونچی جگہوں پر چڑھ رہا ہو تو چکر آئیں۔  
 میڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پھاڑی پر چڑھتے ہوئے، اچانک اوپر کو اٹھتے ہوئے یا سر کو گھماتے  
 ہوئے جبکہ وہ آرام کر رہا ہو یا چلتے ہوئے چکر آتے ہیں۔ پیچھے کی جانب یا اطراف میں گرنے کا  
 رجحان ہو۔  
 میوریٹک ایسڈ (Muriatic Acid): کھلی ہوا میں گھوم جانے والے چکر اور چلنے میں توازن  
 کا نہ ہونا۔ جب چلے تو لڑکھڑا جائے۔ رانوں کی کمزوری کے باعث۔  
 سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): جب بیضا ہوا ہو تو چکر آجائے۔ دائرے میں چلنے سے بہتری  
 ہو۔  
 اکنائٹ این (Aconite N): چکر جو خوف کے باعث آتے ہوں، اچانک خوف سے چکر آ  
 جائے، خوف زدہ کر دینے والی باقیات کے ڈر سے چکر آئیں۔ مریض کو یہ خوف ہو کہ کتا یا کوئی  
 چور اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں چکر آجائے۔ دائیں جانب لڑکھڑاہٹ ہو۔ متلی کے  
 ساتھ چکر آئیں۔ خاص طور سے اٹھتے وقت سر ہلانے سے چکروں میں اتھری ہوتی ہے جبکہ  
 آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔  
 آئیوڈیم (Iodium): صرف بائیں جانب کا چکر آگے کو ٹھکنے سے اتھری ہو، دل پر لرزہ طاری  
 ہونے اور بے ہوشی ہونے کے ساتھ چکر آئیں۔  
 پلساٹیل (Pulsatilla): ایسے چکر جن میں چلنے سے بہتری ہو۔ ایسے چکر جن میں مریض نشے  
 کی حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ خصوصاً جب وہ بیضا ہو۔ سر بھاری ہوتا ہے۔

رہوڈوڈینڈرون (Rhododendron): جب بستر میں لیٹا ہو تو چکر آئیں۔ حرکت کرنے سے بہتری ہو۔

الیومنا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): صبح اور شام چکر آئیں جبکہ مریض بیٹھا ہو، چلتا ہو، اچانک سر کو گھمائے۔ آنکھوں کے بند کرنے پر بھی چکر آتے ہوں۔ لینے سے بہتری ہوتی ہے۔

برومیم (Bromium): پیچھے کی جانب گرنے کے رجحان کے ساتھ چکروں کا آنا، جب کسی پل کو عبور کر رہا ہو اور چلتے ہوئے پانی کو دیکھے یا جب اس کے سامنے بہت تیزی سے حرکت ہو رہی ہو۔

بیرٹا کارب (Baryta Carb): ہر چیز اس کے ساتھ ملے جیسا کہ وہ بحری جہاز میں بیٹھا ہو۔



# آنکھیں اور بصارت

(Eyes and Vision)

پھوڑا (آنکھ کے پردے کا) — (Abscess)

کلیریا میور (Calcaria Mur): آنکھوں کے پردے کا پھوڑا۔

بصارت میں دھندلاہٹ

(Amblyopia) (Dimness of Vision)

(دیکھنے "بصارت")

کمزوری (آنکھ کے عضلات میں)

(Asthenopia)

(Weakness of Ocular Muscles of the eyes)

سنا آرنی میزاول (Cina Artemesia Vul): آنکھوں کی موافقت میں خرابی آ جانے سے  
پڑھتے وقت آنکھوں میں درد ہو، حروف دھندلے ہو جائیں اور جیٹ بصارت میں باؤل آ  
جائیں۔ آنکھیں ملنے سے تسکین ہوتی ہو۔

سکڑاؤ (آنکھ کے پردہ شبکی کا) — (Atrophy)

(نیز دیکھئے "آنکھ کا پردہ شبکی" اور "عصب بینائی")

نکس وامیکا (Nux Vomica): آنکھوں کے استعمال کی کوشش کے وقت شدید درد کے  
ساتھ پردہ شبکی کا سکڑنا، روشنی برداشت نہ ہو سکے۔ صبح کے وقت بہتری ہو۔  
فاسفورس (Phosphorus): عصب بصارت کا موتیا بند کے ساتھ ناکارہ ہو جانا۔

آرسینک ایلیم (Arsenic Alb): تمباکو کھانے یا تمباکو نوشی کے باعث عصب بصارت کا تکارہ ہو جاتا۔

## پلکوں کی سوزش — Blepharitis

(Inflammation of the Eyelids)

پٹرولیم (Petroleum): پلکوں کی سوزش یا پلکوں کے کناروں کی سوزش، پلکیں گرم جائیں۔  
کراسوفارکیم ایسڈ (Chrysopharicum Acid): پلکوں کی سوزش، پردہ قرنیہ کا ورم،  
روشنی سے خوف زدہ رہنے کا مرض وغیرہ۔ 30 طاقت کا استعمال اندرونی طور پر کیجئے۔ بیرونی  
طور پر 4 گرین ایک اونس ویزلین میں ملا کر مرہم بنا کر لگائیں۔  
ماربیلینم (Morbillinum): چیچک کے بعد یا چیچک کے بد اثرات کی وجہ سے پلکوں کی سوزش  
ہو جائے۔

گرافائٹس (Graphites): پلکوں پر پھنسیاں جو کہ جھلکوں سے ڈھکی ہوں اور سرخ ہو  
جائیں۔ آنکھوں کی پلکیں سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ پلکیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ پلکوں میں  
چرنے اور خون بننے کا رجحان۔

مرکیوریس کار (Mercurius Cor): خصوصاً آنکھ کے باعث جب پلکوں کا ورم ہو، پلکیں  
موٹی سرخ، سوجی ہوئی اور پھنسیوں والی ہوتی ہیں۔ گرمی، سردی اور چھونے سے حساسیت ہوتی  
ہے۔ مکمل ہوا اور ٹھنڈی چیزوں کے لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ آنکھ کے ڈھیلوں میں درد اور  
خارش ہوتی ہے۔

ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): حاد کیسوں میں جبکہ مرض کا پہلا مرحلہ گزر چکا ہو اور پیپ  
بننے کے قریب ہو یا پہلے ہی بن چکی ہو۔ پلکیں چمکن والے درد کے ساتھ جلتی ہیں اور چھونے  
سے حساس ہوتی ہیں۔ ٹھنڈک سے بہتری ہوتی ہے جبکہ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔  
الیومنا (Alumina): مزمن دانے دار پلکیں، بلغمی مواد اور جھلیاں گاڑھی اور موٹی ہوتی  
ہیں۔ پلکوں کا گر جانا، پلکوں کے حصے مکمل طور پر بالوں سے ننگے ہو جائیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): اونچے طبقے کا طرز زندگی اور مرغن غذاؤں کا استعمال، آنکھوں کی  
سوزش کا ذریعہ بنتا ہے۔ چہرے پر دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ گوبانجیاں نکلنے کا رجحان، آنکھوں سے  
رطوبت بہت زیادہ خارج ہو۔

سٹیفی سگریا (Staphisagria): پلکوں کے حاشیے خشک ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ سخت  
گوبانجیاں یا رسولیاں ہوں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): برتن کے پیٹ والے غیر صحت مند بچوں کی آنکھوں کی سوزش، یہ بچے خنازیر میں جٹلا ہوتے ہیں اور ان کے سر پر بہت زیادہ پیٹ آتا ہے۔ پلکیں سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Iod): غدود کے بڑھ جانے خصوصاً ٹائلسز کے بڑھ جانے کے ساتھ پلکوں کی سوزش۔

رشاکس (Rhus Tox): آنکھوں کے میل (گید) کے بننے کے ساتھ پلکوں کی سوزش۔

میزیریئم (Mezereum): پلکوں کا اور سر کا آگزیما۔

کونیئم (Conium): پلکیں سخت ہوں، موٹی ہوں اور بھاری ہوں، پلکوں کا اور ناف اور رخساروں کا کینسر۔

### نا بینائی (اندھا پن) — (Blindness)

(نیز دیکھئے "بصارت")

ہیلی بوریس (Helleborus): جب کہ وجہ معلوم نہ ہو۔

سیلیشیا (Silicea): اچانک آنکھوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ بینائی کا جاتے رہنا۔

قیرم میٹ (Ferrum Met): ہسٹیریا میں بینائی کا جاتے رہنا۔

فاسفورس (Phosphorus): بجلی لگنے سے بینائی کا جاتے رہنا۔

جلمسی میم (Gelsemium): آنکھوں کے چھپر اور / یا پلکوں کے پھیل جانے کے ساتھ ہسٹیریا

میں یا تم کے باعث آنکھ سے خون بننے کے باعث نا بینائی۔

بوویشا (Bovista): عصب بصارت کے فالج کے باعث بصارت کا جاتے رہنا۔

کالی میور (Kali Mur): جب برف کے باعث بینائی جاتے رہے ہر طرف دھواں اور دھند دھالی دے۔

گلو نائن (Glonoin): گردن توڑ بخار یا دماغ کی مہلیوں کے ورم کے بعد یا دوران بصارت کا جاتے رہنا۔

سلفر (Sulphur): یہ دوا 200 ڈائی لیوٹن کی دینی چاہئے۔ بطور عمل انگیز دوا کے استعمال ہوتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): رات کے اندھے پن کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سب سے

پہلے کی دوا استعمال کرنی چاہئے۔ کانٹے والے دردوں کے ساتھ اچانک بصارت کا جاتے رہنا۔

چائنا آف (China Off): اگر لائیکو پوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا استعمال کرنی چاہئے۔ یوں

محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں ریت پڑی ہو۔  
پٹروسلینیم (Petroselinum): آنکھوں کی سوزش کے ساتھ بصارت کا جاتے رہتا۔  
فائیسوگلما (Physostigma): رات کا اندھا پن جو سبز موتیا کے ساتھ یا اس کے بغیر یا دور  
 کی نظر کمزور ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔  
رینن کولس بلبوس (Ranunculus Bulboses): عورتوں میں دوران حمل دن کا اور  
 رات کا اندھا پن۔  
ہائوسکینیس (Hyoscyamus): کپکپاہٹ اور جھٹکن کے ساتھ رات کا اندھا پن۔  
گلوٹائین بل (Glonoine Bul): گردن توڑ بخار میں اندھا پن۔  
کالی بائیکروسیکم (Kali Bich): درد سر سے پہلے اندھا پن، جیسے جیسے درد میں زیادتی ہوتی  
 رہتی ہے بصارت درست ہوتی جاتی ہے۔  
مانسی نیلا (Mancinella): شدید سوزش کے باعث اندھا پن۔

### آنکھوں کا جھپکنا (Blinking of the Eyes)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): اعصابی کمزوری کے ساتھ آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا۔ مریض  
 زود رنج ہوتا ہے۔ اندھیرے سے خوف کھاتا ہے۔ اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔ چہرے کے اعصاب  
 میں پھڑکن ہوتی ہے۔  
بیلادونا (Belladonna): ر خون مریضوں میں آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا۔  
یوفریزیا (Euphrasia): مستقل طور پر پلکوں کا جھپکنا۔  
کالی بائیک (Kali Bich): مستقل طور پر پلکوں کا جھپکنا، مرگی کے حملے کے دوران۔  
کروکس، کلکیریا کارب (Crocus, Calcareia Carb): پڑھنے کے دوران اور بعد میں  
 پلکوں کا جھپکنا۔

### چمک (آنکھوں کی) (Brightness)

بووشا (Bovista): چمک کے بغیر آنکھیں۔  
یوفریزیا (Euphrasia): آنسوؤں اور آنکھوں کے میل (کیدا) کے بننے والے ساتھ جلن اور  
 کٹن ہو۔ آنکھیں ضرور ہی جھپکے۔  
ایلیم سیپا (Allium Cepa): جلن ہو جیسے کہ دھوئیں سے ہوتی ہے۔ مریض آنکھیں ملتا  
 چاہے۔ آنکھوں سے پانی نکلے۔

روٹا (Ruta): رات کے دوران یوں محسوس ہو جیسے آگ کے گولے آنکھوں میں ہوں۔  
 کریوزوٹ (Kreozote): آنکھوں کے میل کے ساتھ جلن، تیز روشنی میں ابتری ہو۔  
 آئرس ٹینکس (Iris Tenax): آنسوؤں کے بغیر آنکھوں میں جلن۔  
 اگریکس ایم (Agaricus M): آنکھوں کے پوٹے آپس میں مل جانے کے ساتھ آنکھوں میں جلن۔  
 کاسٹیکم (Causticum): آنکھوں میں جلن ہو جیسا کہ چھوٹے چھوٹے نقطوں کی صورت میں آنکھوں کے اندر چمکتا ہوا کوئلہ رکھا گیا ہو۔

### موتیا بند — (Cataract)

کاسٹیکم (Causticum): دور کی نظر کمزور ہو جانے کے بلند درجے کے ساتھ ابتدائی مرحلہ میں یہ دوا 11 ایم ہر مہینہ کے بعد دی جاتی ہے۔ آنکھوں کا شیشہ والا پردہ خراب ہو جاتا ہے اور قریب کی نظر میں خرابی ہوتی ہے نیز سر کے دو چھوٹے پٹھوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔  
 گلکیریا فلور، سلفر (Calcarea Flour Sulphur): بعد کے مراحل میں سلفر 200 طاقت کا ہر پندرہ دن کے بعد دیا جانا چاہئے۔ اس دوا سے ایک روز پہلے اور ایک روز بعد کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ دوسرے دنوں میں گلکیریا فلور دی جائے۔ 30 طاقت کی خوراک دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ گھنٹوں کے وقفوں کے ساتھ۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ بھی موتیا بند کی بہت اچھی دوا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کالے نقطے تیرتے ہیں۔ بصارت کے سامنے رنگ نظر آتے ہیں۔ آنکھیں گرمی اور آگ سے جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھند آ جاتی ہے۔ 11 ایم طاقت کی ایک دوا ہر ماہ دی جائے۔

سلفر (Sulphur): معدہ کے گڑھے میں ڈوبنے کے احساس کے ساتھ موتیا بند، گرمی چہرے کی طرف جڑھتی ہے۔ غسل کرتے وقت بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ دوا گلکیریا فلور کے ہمراہ عمل انگیز کا کام کرتی ہے۔ ہر پندرہ روز کے بعد دی جائے۔

### سوزش (آنکھ کے سیاہ حلقے کی)

#### Choroiditis (Inflammation of the Choroid)

سلفر آیوڈ، آیوڈیم (Sulphur Iod, Iodium): زبان سخت اکڑی ہوئی ہونے کے ساتھ موتیا بند جیسا کہ کارڈ بورڈ ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): آنکھوں میں دبانے والے درد کے ساتھ جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف دہاتے ہیں یا اندر کی جانب دہنے کے بغیر یا آنکھوں کے گرد والی ہڈیوں میں درد کے ساتھ 'پھوٹنے سے اتری ہوتی ہے اور روشنی سے حساسیت۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): آنکھوں کے سیاہ حلقے کی آنکھ کے لئے جو کسی بھی صورت میں ہو۔ یہ عمومی طور پر بہترین دوا ہوتی ہے۔ خصوصاً آنکھ کے اس سفید گاڑھے مادے کا دھندلا پن جو آنکھ کے عدسہ کے پیچھے والے خلا کو پُر کرتا ہے۔

مرکیوریس کارب (Mercurius Carb): آنکھ کے گرد اور آنکھ کے اندر شدید درد آنکھ کے سیاہ پردہ کا ورم جبکہ پردہ عینہ یا انگوری پردہ بھی متاثر ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): موتیا بند جب کہ اس کے ہمراہ چند یا پن یا روشنی سے ڈرنے کا مرض لاحق ہو اور چیزیں بہت سی شکلوں اور رنگوں میں نظر آئیں۔ (جن میں سرخ رنگ نمایاں ہوتا ہے) آنکھوں کے سامنے سے کالے دھبے گزرتے ہیں۔

پرونس سپن (Prunus Spin): شدید درد جیسا کہ آنکھوں کے ڈھیلے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دب رہے ہوں۔ تیز گولی لگنے جیسے کپلے جانے جیسے اور کانٹے جیسے درد آنکھ میں سے گزر کر سر کی طرف جاتے ہوں۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): آنکھ کی سیاہ پتلی میں پیپ بننے کے عمل کے شروع ہونے کے بعد۔ آنکھیں پھوٹنے سے حساس ہوتی ہیں اور شدید درد ہوتا ہے اور ٹپکن ہوتی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

فائیٹولاکا (Phytolacca): ٹیکلیں بے حد سخت ہوتی ہیں نیز سرخ اور سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ آنکھ کے اندرونی حصہ میں پیپ ہوتی ہے۔

ڈوبوئسیا (Duboisia): آپٹک ڈسک اور پردہ شبکی رگیں بڑھی ہوئی تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ آپٹک ڈسک میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

ٹیوبریکولینم (Tuberculinum): جب تمام اچھی منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی یا اونچی طاقت کی صرف ایک خوراک دیجئے۔

## پلکوں کے امراض

(Siliary Body- Diseases of the)

جبورانڈی (Jaborandi): پلکوں کی ہم آہنگی کے دوروں میں یا پلکوں کے عضلات کے



بجائے میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ کچھ فاصلے سے دیکھنے پر ہر چیز جینک (مفر شیشے) کے بغیر دھندلی نظر آتی ہے البتہ قریب کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ بصارت مسلسل بدلتی ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کے استعمال پر مٹتی ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں۔

فانیسوسگما (Physostigma): آنکھوں کے گرد اور پلکوں میں پھڑکنے، پلکوں کے عضلات میں تشنج یا اینشن۔

اگریکس ایم (Agaricus M): پلکوں کے تشنج یا عمومی رعشہ کے ساتھ اگر ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ پلکوں میں پھڑکنے ہوتی ہے۔

### قریب نظر (رنگوں کا) — (Coloured Vision)

(نیز دیکھئے ”بصارت“ قریب نظر“)

فاسفورس (Phosphorus): رنگوں کے اندھے پن کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے اور عام استعمال ہونے والی دوا ہے۔

سٹرانٹیم (Strantium): چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے خون میں لتھڑی ہوئی ہوں۔

آرسینک البم (Ars. Alb): چیزیں سبز نظر آتی ہیں۔

کیپسکیم (Capsicum): چیزیں کالی نظر آتی ہیں۔

اکٹیاسپائی (Actea Spi): چیزیں نیلی نظر آتی ہیں۔

کیمفرا (Camphara): چیزیں روشن اور چمک دار نظر آتی ہیں۔

ایناہولیئم (Anaholinum): بصارت میں بے انتہا چمک اور رنگ بھرے ہوتے ہیں۔

سٹرامونیم (Stramonium): چیزیں سرخ کی جگہ سیاہ نظر آتی ہیں جبکہ سیاہ چیزیں بھوری نظر آتی ہیں۔

سنا (Cina): چیزیں پیلی نظر آئیں۔

اگریکس ایم (Agaricus M): آنکھوں کے سامنے رنگوں اور شکلوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔

ڈی جی نیلس (Digitalis): پیلی چیزیں سفید نظر آتی ہیں۔

کاربونیم سلف (Carbonium): سرخ اور سبز چیزیں سفید نظر آتی ہیں۔

ہائیوسامس (Hyoscyamus): چیزیں سنہری نظر آتی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): سرخ چیزیں پیلی نظر آتی ہیں۔

کونیم (Conium): چیزیں سرخ نظر آتی ہیں نیز قوس قزح کے رنگوں والی نظر آتی ہیں۔

بچوں والی نظر آئیں۔ ہر چیز دو دو نظر آئے۔ روشنی سے نفرت ہو، نظر کمزور ہو جائے۔

گر وشیولا (Grotiola): سبز چیزیں سفید ظاہر ہوتی ہیں۔

آشوب چشم — (Conjunctivitis)  
(دیکھئے ”سوزش“)

تھیلی (آنکھ میں ہو) — (Cyst)

کلیریا فلور (Calcareo Fluor): پلکوں پر تھیلی ہو۔ 16 ایکس یا 30 طاقت کی دوا دیجئے۔  
نایٹرک ایسڈ (Nitric Acid): جب کلیریا فلور ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاسکتی ہے۔  
سٹیفیسیا (Staphisagria): آنکھ کی تھیلی کے لئے بہترین دوا ہے۔ جو کہ پلکوں پر نکلنے والی پھٹیوں سے گوبانجیوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔

پردہ شبکی کی علیحدگی

(Detachment of Retina)

(دیکھئے ”پردہ شبکی“)

ایک کے دو نظر آنا — (Diplopia)

(دیکھئے ”دوہری بصارت“)

پانی کا اخراج (آنکھ سے)

(Discharge - Watery)

(دیکھئے ”آنسو“)

رنگت (کی تبدیلی) — (Discolouration)

سٹیفیسیا (Staphisagria): آنکھ کے گرد نیلے یا کالے دائرے بن جاتے ہیں۔  
سائیکل من (Cyclamen): آنکھوں کے گرد نیلے دائرے ہوں۔  
چائنا (China): خون کی کمی کے باعث آنکھوں کے گرد نیلے دائرے بن جائیں۔  
وریٹرم البم (Veratrum Alb): بیض کے حلقے کے بعد یا دوران آنکھوں کے گرد نیلے حلقے،

یہ سبز حلقوں کو بھی درست کرتی ہے۔  
نیٹرم کارب (Natrium Carb): پیلے چہرے کے ساتھ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔  
فاسفورس (Phosphorus): حیض کے بعد آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔  
سنا (Cina): ہیٹ میں کیڑوں یا قلت دم کے باعث آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑ جائیں۔  
نکس وامیکا (Nux Vom): آنکھوں کے گرد پیلے حلقے۔  
سیکیل کار (Cecale Cor): آنکھوں کے ڈھیلے آنکھوں کے گڑھوں میں ڈوب جائیں اور  
 آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑ جائیں۔  
اکٹیا آر (Actea R): آنکھیں لمبی ہو جائیں، ڈوب جائیں اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ  
 حلقے پڑ جائیں۔  
بربرس دی (Berbe V): آنکھیں ڈوب جاتی ہیں۔ جن کے گرد نیلاہٹ مائل گڑھے پڑ  
 جاتے ہیں یا گہرے سبز حلقے پڑ جائیں۔  
مینسی نیلا (Mancinella): آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوں۔

### آنکھوں کے ڈھیلے — (Eye-Balls)

آئوڈیم، لائیوپس ویر، کالی میور (Iodium, Lycopus Vir, Kali Mur): آنکھوں کے  
 ڈھیلوں کا باہر کو نکلے ہوتا دی ہوئی ترتیب کے مطابق دوائیں استعمال کریں۔  
اگنیشیا (Ignatia): گھڑی کے پینڈولم کی طرح سے آنکھوں کے ڈھیلے حرکت کریں۔ باوجود  
 اس کے کہ مریض اپنی نگاہ آپ پر جمائے کی کوشش کرے۔ یہ کیفیت صرف سونے کے دوران  
 رکتی ہے۔

### پلکیں — (Eye-Lashes)

(دیکھئے ”ہالوں کا گرنا“ اور ”پلکوں کا اندر کی جانب اگنا یا مڑنا“)

### مسامات اشکی کی خرابی (بندش)

(Fistula of Lachrymal Duct)

(دیکھئے ”آنسو“)

## آنکھوں کی جھپکاہٹ

(Flicking of the Eyes)

اگبریکس ایم، سائیکلے من، نیرم میور (Agaricus M, Cyclamen, Natrum Mur) دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جانی چاہئیں۔

## ریشوں کی نشوونما (Fibrous Growths)

(دیکھئے ”رسولیاں“)

## سبز موتیا (Glaucoma)

فاسفورس (Phosphorus): سبز موتیے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو لائیکو پوڈیم اور سلیشیا آزمائیں۔

سپائی جیلیا (Spigella): سبز موتیا سر کے بائیں جانب کے شدید درد کے باعث ہو۔

پروٹس سپائی نوسا (Prunus Spinosa): جب سپائی جیلیا ناکام ہو جائے تو اسے آزمایا جاتا چاہئے۔

ہیمپٹر سلف، گریفائٹس (Hepar Sulph, Graphites): پچھلے دانے دار ہوں۔ دی گئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں آزمائیں۔

بوریکس (Borax): آنکھوں کے پچھلے دانے دار ہوں جبکہ پلکیں اندر کی جانب آنکھوں کی طرف مڑی ہوئی ہوں اور جلن پیدا کریں۔ پچھلے دانے دار اور بھلیاں موٹی ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کے نیچے والے پچھلے کھل طور پر اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پچھلے دانے کو کھولنے میں دقت محسوس ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): پلکوں کے اندر کی طرف مڑنے کے مرض کے لئے یہ بھی ایک اچھی دوا ہے۔ جب بوریکس ناکام ہو جائے تو اسے استعمال کریں۔

جلسیم (Gelsimium): یہ سبز موتیے کے لئے مخصوص دوا ہے جبکہ درد سر گردن کی گدی سے شروع ہو۔

اوسیم (Osmium): سبز موتیا میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے جبکہ مریض قوس قزح کے رنگ دیکھتا ہے۔ جس کے ساتھ اوپر کی جانب یا آنکھوں کے نیچے کی جانب آنکھوں کے (گید) میل کے ہمراہ شدید درد ہوتا ہے۔ روشنی کے گرد سبز دائرہ نظر آتا ہے۔ آنکھوں کا دباؤ بڑھا ہوا

ہوتا ہے۔ روشنی سے خوف کھانے کا مرض لاحق ہو۔ نظر کمزور ہوتی ہے۔ آنکھوں اور سر میں تیز اور شدید درد ہوتا ہے۔  
 سلفر (Sulphur): جب اچھی منتخب شدہ دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اسے عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کے نیچے والے حصے میں جلن ہوتی ہے۔  
 کالو سنٹھس (Colocynth): درد خفیفہ اور معدے میں گیس کے ساتھ سبز موتیا ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

## آنکھ کے پوٹوں کے دانے

(Granulation of Lids)

(دیکھئے ”پٹکوں کی سوزش“)

## سیلان خون — Haemorrhage (Bleeding)

کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): آنکھوں سے خون آتا ہے۔ پردہ شبکی سے سوزش کے بغیر خون بہتا ہے۔  
 لیکسیس (Lachesis): آنکھ کے اندرونی حصہ کی جانب پردہ شبکی سے خون کا بہنا۔ یہ دوا بنے والے خون کو جذب کر لے گی۔  
 جلسی میم (Gelsemium): آنکھ کے سیلان خون کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ اس سیلان خون کے نتیجہ میں اندھا پن لاحق ہوتا ہے۔ 200 طاقت کی دوا دن میں دو بار صبح و شام روزانہ دی جائے۔  
 فاسفورس (Phosphorus): جب جلسی میم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جانی چاہئے۔  
 آرنیکا ایم (Arnica M): جب سیلان خون آنکھ کے زخم کے باعث ہو۔ 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ دوا روزانہ صبح نہار منہ دی جائے۔  
 سلفر (Sulphur): آنکھوں کے پوٹوں سے سیلان خون ہو۔

## بال (آنکھوں کے) گریں — (Hair, Falling of)

کالی کارب (Kali Carb): آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کا گرنا۔  
 ایناٹھیرم (Anatherum): آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کے گرنے میں اگر کالی کارب ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

ایلیومینا (Alumina): آنکھوں کی پلکوں کا کرنا۔  
 رشاکس (Rhus Tox): آنکھوں کی پلکوں کا کرنا۔  
 پلساٹیل (Pulsatilla): آنکھ میں بال گرنے کا احساس۔

## سوزش، ورم (آنکھ کے سفید پردے کا ورم)

### Inflammation (Conjunctivitis)

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): (نزہ، زکام) ٹھنڈک سے، چوٹ سے، گرد سے، بڑا جی سے، نذر و دوں کے بڑھ جانے کے ہمراہ، خنازیری سوزش ہو۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): جب سخت لیس دار مادہ ہٹانا مشکل ہو۔

بیلادونا (Belladonna): جب آنکھوں میں خون بھرا ہو اور وہ سرخ ہوں۔ بہت زیادہ سوزش ہو اور درد کریں۔

مرک کور (Merc Cor): آنکھ دکھنے کے مرض کے لئے یہ بہترین دوا ہے۔ یہ حاد اور مزمن امراض دونوں میں دی جا سکتی ہے اور آپ کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ (چھنی طاقت استعمال کیجئے۔)

یوفریزیا (Euphrasia): اس وقت یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جب آنکھوں سے چھیلنے والا (تیزابی) پانی خارج ہوتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): پیپ کا بہت زیادہ اخراج ہو۔ آنکھ کا پردہ دھندلا ہو، آنکھوں کے پونے دکھیں، پونے مونے، سوچے ہوئے اور زخمی ہوں۔ صبح کے وقت پونے آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ آنکھوں کے زاویے خون کی مانند سرخ ہوں۔ آنکھوں سے نکلنے والا لیس دار مواد بصارت کے آگے رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے۔ آنکھیں نزلادوی زخموں کی حامل ہوتی ہیں۔ آنکھ کا شفاف پردہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): آنکھوں سے گاڑھا سبز مادہ افراط کے ساتھ خارج ہو۔

کریو زوٹ (Krosote): آنکھوں میں سوزش ہو، سرخ ہوں، جن سے آسانی کے ساتھ سیلان خون ہو۔

ماربیلینم (Morbillinum): چچک کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد سیلان خون ہوتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): آنکھوں کے پونوں میں ڈنک لگنے کے ساتھ سوزش ہو، گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں اور روشنی سے خوف کے مرض میں مبتلا ہو۔

رشاکس (Rhus Tox): گاڑھی پیپ آنکھوں سے خارج ہو۔ بہت زیادہ سوزش ہوتی ہے۔  
گرم آنکھوں کا میل ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ آدھی رات کے وقت ابھری ہوتی ہے۔  
اورم میور (Aurum Mur): دراشتی آنکھ کے باعث سوزش، بے چینی پیدا کرنے والا  
آنکھوں کا میل (گید) روشنی سے خوف زدہ ہو۔

روٹا جی (Ruta G): ٹاؤ کے باعث آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ جس میں ٹھنڈک سے ابھری  
ہوتی ہے۔ (ارجنٹم ٹائٹ) کے برعکس۔  
سلفر (Sulphur): پپوٹے سو جے ہوں اور سیلان خون آسانی سے ہو۔

الیمنا سیلیکیٹ (Alumin Silicate): آنکھوں میں درد، شام کے وقت آنکھیں جلیں جیسا  
کہ دھوئیں سے جلتی ہوں۔ کھلی ہوا میں غارش کے ساتھ آنکھوں میں سوزش ہو۔ پپوٹوں میں  
اور آنکھوں کے زاویوں میں جلن ہوتی ہے۔ آنکھوں میں درد ہو جیسا کہ آنکھوں میں ریت  
بڑی ہو۔

منینسی نیلا (Mancinella): شدید سوزش جس کے باعث کچھ روز تک میٹلی جاتی رہے۔  
ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): گاڑھے بدبودار پیپ کا اخراج ہو جس کے ساتھ آنکھوں  
میں سوزش ہوتی ہے۔ آنکھوں کے شفاف پردے کا زخم جس کے ساتھ بدبودار سیلان خون ہوتا  
ہے۔

### چوٹ (یا زخم آنکھ میں) — (Injury)

آرنیکا ایم، ہائپرکیم (Arnica M, Hypericum): تمام قسم کی چوٹوں کی تکلیفوں میں آرنیکا  
کی ایم کی دو تین خوراکیں چوبیس گھنٹے کے وقفے کے ساتھ مرض کے آغاز میں دی جائیں اگر  
اس سے کوئی بہتری نہ ہو تو پھر ہائپرکیم کی 6 یا 30 طاقت کی خوراک ہر دو گھنٹے کے بعد دی  
جائے۔

ہیمامیلس وی (Hamamelis V): آنکھ کے عصب کے بیجان کے لئے یہ دوا استعمال کی  
جاتی ہے۔ اس میں روشنی کا خوف اور آنکھوں میں دکھن ہوتی ہے۔

### قرنیہ کی سوجن — (Interstitial Keratitis)

(قرنیہ بغیر ماسوری کیفیت کے موٹا اور دھندلا ہو جاتا ہے)

مرک سول (Merc Sol): تیزابی آنسوؤں کے ساتھ آنکھ کے شفاف پردے میں شدید درد۔  
ہیمپیر سلف (Haper Sulp): پپوٹے سے اور روشنی سے آنکھوں میں حساسیت ہوتی ہے۔

گاڑھا پیلا مواد خارج ہوتا ہے۔ آنکھ کے شفاف پردہ کے ریشوں کے لیے حصے میں غلاظت ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrur Mur): آنکھ کے شفاف پردہ کا آتھکی دھندلا پن تمام حلقہ چشم میں دبا دیا درد ہو۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): آتھکی دھندلاہٹ رات کے درد کے ساتھ 'تیزابی آنسو بہتے ہیں۔ گاڑھی غلاظت نکلتی ہے اور آنکھ کی سطح پر زخم ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔

### آنکھ کی پتلیوں کی سوزش — (Iritis)

مرکیوریس کار (Mercurius Cor): آنکھ کی پتلی کے ہر قسم کے امراض کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً سوزاکی اور آتھکی امراض میں۔ آنکھ کے اندر اور آنکھ کے گرد عمومی طور پر شدید درد ہوتے ہیں۔ نیز ماتھے اور کنپٹیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ درد رات کو بڑھ جاتے ہیں۔ روشنی سے حساسیت ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی کی جھلیاں بے رنگ ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے۔ یہ دوا چپکنے کی صورت کو روکتی اور درست کرتی ہے۔ آنکھ کے شفاف پردے کی سوزش نیز آنکھ کے عصب کی سوزش 'ہر قسم کی بصارت کی تکلیف۔

ہیپیر سلف (Haper Sulph): جب سوزش قریب کی رگوں 'آنکھ کے شفاف پردے اور پلکوں تک پھیل جائے اور جب اندرونی حصہ میں پیپ بڑ جائے۔ درد گرمی سے دور ہوتی ہے اور حرکت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اور گرم چیزوں سے آنکھ کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔

سینڈرون (Cedron): شدید اعصابی درد حلقہ چشم کے اعصاب میں ہوتا ہے۔ خصوصاً دورے کی صورت میں۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): آنکھ کی پتلی کی جھلیوں کے آتھکی مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): وجع المفاصل والی آنکھ کی پتلی کی جھلیوں کی تکلیف ہو جو کہ پانی میں آنکھیں کھولنے کے باعث ہو یا وجع المفاصل والے مریضوں میں پانی جائے۔ موتیا بند کی جراحی کے بعد لاحق ہو جانے والے آنکھ کی پتلی کی جھلیوں کے مرض کے لئے آنکھیں کھولنے پر بہت زیادہ آنسو بہنے کے ساتھ آنکھوں کے پونے سوج جائیں۔

تھوجا (Thuja): آنکھ کی پتلیوں کی جھلی کا آتھکی مرض جس کے ساتھ آنکھ کی پتلی کی جھلیوں پر چھچھاہٹ ہوتی ہے۔ آنکھوں میں شدید تیز ذک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جن میں اضافہ رات



کے وقت ہوتا ہے اور گری سے یہ درد دور ہوتے ہیں۔  
آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): آنکھوں کی پتلی کی مھلیوں کا مرض جو کہ چوٹ لگنے سے  
 لاحق ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوا وجع المفاصل والے مھلیوں کے کیسوں میں بھی مدد دیتی ہے۔  
اورم میٹ (Aurum Met): آنکھ کی مھلیوں کے مرض میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے اور  
 مرکز کی یا پوٹاش کی دوا استعمال کرنے کے بعد بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ آنکھ کے گرد  
 ہڈیوں میں گہرائی کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو چھونے سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ درد  
 اوپر سے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ جس میں آرام اور دباؤ کے باعث ابتری ہوتی ہے۔

### سوجن — (Keratitis)

(دیکھئے ”قرنیہ کی سوجن“)

### آنکھوں سے پانی کا اخراج — (Lachrymation)

(نیز دیکھئے ”آنسو“ کے ذیل میں)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ٹھنڈے لگنے سے آنسوؤں کی ٹالی بند ہو جاتی ہے۔

### پلکوں کا اندر کی جانب اگنا — (Lashes- Ingrowing)

بوریکس (Borax): پلکیں اندر کی طرف اگتی ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پلکیں اندر کی جانب اگتی ہیں۔ یہ دوا بوریکس کے ناکام ہو جانے کے  
 بعد استعمال کی جاتی ہے۔

گرافائٹس (Graphites): پلکیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور اندر کی طرف مل جاتی ہیں۔ آنکھ  
 کے ذیل کی طرف اور آنکھ کے سفید پردہ میں سوزش ہوتی ہے۔

### دور کی نظر کی کمزوری — (Myopia)

(نیز دیکھئے ادویات ”بصارت“ کے ذیل میں)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): اخبار کو صرف آنکھوں کے انتہائی قریب کر کے جب  
 کہ اخبار ناک کو چھو رہی ہو پڑھ سکے۔

فائیسوسٹگما (Physostigma): جب دور کی نظر کمزور ہونے کی وجہ ”پلکوں کا تشنج“ ہو سبز  
 مورتیا ہو دور کی نظر کمزور ہو جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ رات کے وقت پینائی جاتی

رہے۔  
چائنا آف (China Off): ٹائیفس بخار کے بعد دور کی نظر کمزور ہو جائے۔ جس کے ساتھ اس سال بھی ہوں۔

اگیریکس ایم (Agaricus M): پلکوں کے عضلات کا تشنج، بچوں کے چھوٹے کے ساتھ، نظر بہت قریب کی رہ جائے۔ بصارت میں دھندلاہٹ ہو، ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ کڑی کے جالے سے ڈھکی ہوئی ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): موم بتی کے گرد ہال، سیاہ انعکاس یا چنگاری اور آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت بہتر دکھائی دیتا ہے نیز آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا سایہ کرنے سے بھی بہتر دکھائی دے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): دور کی نظر کمزور ہو جائے۔ جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ٹاپتے ہوئے دکھائی دیں۔ آتشک کے باعث یا مرکری کے غلط استعمال کی وجہ سے نظر بہت قریب کی رہ جائے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sulph): دور کی نظر کمزور ہو جائے۔ دیکھنے میں تکلیف ہو۔ قوس قزح کے بنیادی رنگوں میں تمیز نہ رہے۔ مختلف قسم کے رنگ دیکھ سکنے کی نااہلیت، آنکھ کے عصی پٹوں میں کمزوری ہو نیز نظر کے سامنے بادل آجائیں۔ آدھا دیکھ سکنے کے مرض کے بعد اچانک بینائی کا جاتے رہتا۔

کلکیریا فلور (Calcarea Flour): آنکھ کے قرنیہ کی دھندلاہٹ۔ اس مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ لمبے عرصہ کے لئے اسے استعمال کرنا چاہئے۔

نیفتھالین (Naphthaline): قرنیہ اور اسی طرح آنکھ کے عدسہ کی دھندلاہٹ۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔

سلیشیا (Silicea): جھجک کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔ یہ دوا لمبے عرصہ کے لئے استعمال کرنی چاہئے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔

آنکھ کے امراض — (Ophthalmia)

(دیکھئے ”سوزش“)

## آنکھ کا درد — (Pain in the Eyes)

روٹا (Ruta): پڑھنے سے آنکھوں میں درد لاحق ہو۔  
بیلادونا (Belladonna): سوزش کے باعث آنکھوں کا درد، آنکھیں خون سے بھری ہوں۔  
 بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔  
سائی جیلیا (Spigelia): جب بائیں طرف درد سر ہو جو بائیں آنکھ کے ڈھیلے تک آتا ہے۔  
سینگولٹی نیریا (Sanguinaria): جب درد سر دائیں جانب ہو اور دائیں آنکھ کے ڈھیلے کی طرف جائے۔  
نیٹرم میور (Natrium Mur): جب درد کسی ایک جانب یا دونوں جانب ہوتا ہے اور آنکھ کے ڈھیلوں تک جاتا ہے۔  
سیڈرون (Cedron): جماع کے بعد بائیں آنکھ کے اوپر درد۔  
اونوسموڈیم (Onosmodium): آنکھوں میں کھنچاؤ محسوس ہو۔ جیسا کہ انہیں کھینچا جا رہا ہو۔ باریک لکھائی پڑھنے پر دیکھنے کے لئے چیزوں کو دور رکھنے کی خواہش۔

## روشنی کا خوف (نور ترسی)

### Photophobia (Intolerance of Light)

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے باعث روشنی برداشت نہ ہو سکے جس کے نتیجہ میں آنکھیں خشک اور دھنسی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ آنکھوں کا میل نہیں ہوتا۔ روشنی سے خوف کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔  
گرافٹس (Graphites): روشنی سے خوف کا انتہا درجے کا مرض جو سورج کی روشنی میں لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ آنکھوں کا میل باافراط ہوتا ہے۔  
نکس وامیکا (Nux Vomica): بے انتہا شراب نوشی کے باعث یا رات کی عیاشی کے بعد لاحق ہونے والے روشنی کے خوف کے مرض کے لئے یہ راہنما کن دوا ہے۔ شراب نوشی کی زیادتی عصب بصارت کے ناکارہ ہونے کا باعث بن سکتی ہے چنانچہ یہ دوا اسے درست کرتی ہے۔ دماغی اور عصبی ہیجان بھی اس دوا سے درست ہوتا ہے۔  
مرکیورس (Mercurius): آگ کی روشنی آنکھوں کو بہت زیادہ چندھیا دیتی ہے۔ آنکھیں آگ کی روشنی اور دن کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتیں۔  
اکونائٹ این (Aconite N): روشنی کے خوف کا مرض لاحق ہو۔ جس کے ساتھ ٹھنڈ یا

زکام کے باعث یا آنکھوں میں تیزابی مادے کے باعث درد والی سوزش ہوتی ہے۔  
گلوٹائن (Glonoine): جب پیلا ڈونا تکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔  
رشاکس (Rhus Tox): روشنی بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہو۔ یہاں تک کہ رات کو  
 بھی مریض آنکھیں کھول ہی نہ سکے۔ اس میں آنکھ کی استسقاءی سوزش کے ساتھ آنکھیں سرخ  
 ہوتی ہیں اور تیزابی مادے کا اخراج ہوتا ہے۔  
یوفریزیا (Euphrasia): آنکھوں سے بہت زیادہ جلن دار پانی بہنے کے ساتھ روشنی کے  
 خوف کا مرض لاحق ہو۔ مصنوعی روشنی برداشت نہ کر سکے۔  
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): حتیٰ کہ معمولی روشنی میں بھی نہ کھڑا ہو سکے۔ سورج  
 کی روشنی میں کھڑا ہوتا تو یقیناً ناممکن ہو۔

## آنکھوں کی جراحی کے بعد کی تکلیفات

(Post-Operation of the Eyes)

آرنیکا ایم (Arnica M): سرجری کے بعد اثرات کے لئے یہ دوا بہت کامیاب رہی ہے۔  
اگنیشیا (Ignatia): کپنیوں میں شدید درد ہو۔  
رشاکس (Rhus Tox): سر میں گولی لگنے جیسے درد ہوں۔  
لیڈم پال (Ledum Pal): انگوری پردہ کاٹنے کے بعد آنکھ کے اندرونی حصہ میں سیلان  
 خون۔  
برائی اونیا (Bryonia): آنکھ کے ہمراہ سر میں درد ہو۔  
اسارم (Asarum): آنکھ اور اسال کے ساتھ جھٹکے لگنے والا درد۔  
کروکس (Crocus): آنکھوں میں ہتھوڑے لگیں اور جھٹکے لگیں۔  
تھوجا (Thuja): کپنیوں میں ڈنک لگنے جیسے درد۔  
سنا (Serina): آنکھ کے عدسہ کے زائد مواد کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔  
سٹرانیشیا (Strontia): چیزیں خون میں تھنزی ہوئی محسوس ہوں۔

## آنکھ کے بلائی پوٹوں کا فالج

(Ptosis or Paralysis of the Upperlids)

جلسی میم (Gelsemium): آنکھ کے بلائی چمپر کا فالج، آنکھوں کے پوٹے بھاری ہوں۔

مریض مشکل ہی سے انہیں کھول سکے۔ آنکھوں کے ڈمیلوں میں دھکن محسوس ہو۔ حرکت سے ابتری ہو۔ خنق کے باعث آنکھوں کے عضلات کا فالج ہو نیز اس کا باعث گردن توڑ بخار، جذباتیت یا ٹھنڈ میں جسم کھولنے یا مرطوب موسم ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): گنٹھیاوی مریضوں میں، گیلے رہنے کے باعث۔

سپیا (Sepia): جب اس مرض کا تعلق حیض کی بے قاعدگی سے ہو۔

کالمیا ایل (Kalmia L): گنٹھیاوی مریضوں میں، جب پپوٹے سخت محسوس ہوں۔

کاسٹیکم (Causticum): گنٹھیاوی مریضوں میں، جب آنکھ کے عضلات کا فالج، درد سر کا

باعث بنے۔ جس کی وجہ خشک سردی میں جسم کھولنا ہو۔ یہ دالا فالج جلی میم سے کم اور رشاکس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

الیومنا (Alumina): جب اس مرض کا تعلق بڑی آنت کی سستی اور بعد ازاں قبض کے ساتھ ہو۔

کوکبولس (Cocculus): آنکھ کے چھیر کا فالج جو خنق کے بعد لاحق ہو۔ جب جلی میم ناکام ہو جائے تو اسے استعمال کریں۔

## پردہ شبکی اور عصب بصارت کے امراض

(Retina and Optic Nerve Diseases of)

ڈیوبوئیسیا (Duboisia): پردہ شبکی (آنکھ کا شفاف پردہ) میں اجتماع خون۔ پردہ شبکی کی سوزش، پردہ شبکی کی ٹالیاں خصوصاً وریدیں لمبی ہو جائیں اور تکلیف دیں۔ آنکھ کے پھوٹے ابھار سوج جائیں۔ پردہ شبکی میں سیلان خون، آنکھ کے ڈھیلے کے بالائی حصہ میں درد۔

فاسفورس (Phosphorus): پردہ شبکی میں اجتماع خون، آنکھیں روشنی سے حساس ہوں، شبکی روشنی میں بصارت میں بہتری ہو۔ روشنی کے گرد ہالہ نظر آئے۔ پردہ شبکی کی سوزش۔

پلساٹیل (Pulsatilla): عصب بصارت اور پردہ شبکی میں سوزش و اجتماع خون۔ جس کے ساتھ شدید درد سر ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں درد سر دور ہوتا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): نظر کے سامنے نیلاہٹ مائل دھند کے ساتھ، پردہ شبکی کی ساتھ سوزش یا اجتماع خون جس کے ساتھ آنکھ میں اور آنکھ کے اوپر شدید اور تیز درد ہو، حرکت سے ابتری ہو۔

مرکیوریس کور (Mercurius Cor): پردہ شبکی کی سوزش جس کے ساتھ رات کے وقت مرض میں واضح زیادتی پائی جائے۔ آگ کی چمک سے حساسیت ہو۔ ایومن (انڈے کی سفیدی)

والی پردہ شبکی کی سوزش کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ پکٹائی کی تنزی (یا بگاڑ) کمزور نالیوں سے خون کے ضیاع اور آنکھ کی دیگر تمام مرضیاتی تبدیلیوں کو اور اس طرح گردوں کے امراض کو بھی یہ دوا درست کرتی ہے۔

**اگیریکس ایم (Agaricus M):** عصب بصارت کی کمزوری کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔

ایک قابل لحاظ عرصہ تک یہ دوا دن میں چھ مرتبہ روزانہ دی جائے۔  
**اپیس میل (Apis Mel):** البیومن (انڈے کی سفیدی) والی پردہ شبکی کی سوزش جس کے ساتھ آنکھ کے پپلوں میں درم ہو نیز عمومی استحقائی حالت ہو۔ مریض کو خودگی ہو۔ جس کے ساتھ پیاس کم اور پیشاب قلیل مقدار میں ہو۔ پردہ شب کے نیچے سیال مادہ ہوتا ہے۔ آنکھ کے ذیلے کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے پپلوں کے سوچ جانے کے ساتھ ڈنک لگنے جیسے درد آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ پردہ شبکی کا بے تعلق ہوتا۔

**آرسنک البم (Arsenic Alb):** البیومن والی سوزش پردہ شبکی میں ہو جبکہ مریض بے چین ہوتا ہے۔ خصوصاً آدھی رات کے بعد کم مقدار میں پانی کی پیاس کے ساتھ 'پیشاب کم مقدار میں ہو جس کے ساتھ البیومن (انڈے کی سفیدی) ملی ہوئی ہو۔

**جلی میم (Gelsemium):** پردہ شبکی کی البیومن والی سوزش حمل کے دوران ہوتی ہے۔ سفید دھبیاں اور پردہ شبکی میں سیلان خون، اچانک بصارت میں دھندلاہٹ ظاہر ہو، زخم یا دور کی نظر کی کمزوری کے باعث پردہ شبکی کی بے تعلقی۔ 200 طاقت کی خوراک ہر ہفتہ دیجئے اور دو مہینے کے بعد طاقت کو بڑھا کر 1000 کر دیجئے اور ہر چندہ دن کے بعد ایک خوراک دیجئے۔

**لکس (Lachesis):** پردہ شبکی میں سیلان خون کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ اس دوا کے استعمال سے سوزش کے ساتھ سیلان خون بھی بہت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ عصب بصارت اور پردہ شبکی کی سوزش اور اجتماع خون۔

**کروٹیل (Crotalus):** سانپ کے زہر میں پردہ شبکی کے اندر سیلان خون کو یہ دوا تیزی سے جذب کر لیتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوا پردہ شبکی کی سوزش کو بھی آرام دیتی ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** پردہ شبکی کی مرگی خصوصاً جب اجتماع خون کے باعث درد سر کے باعث لاحق ہو۔ آنکھوں اور پردہ شبکی میں دھکن والا درد ہوتا ہے۔ آنکھ کے پردہ شبکی کے امراض سوزش کے ساتھ۔ روشنی کے خوف کا مرض 'چکن والا درد۔

**اورم میٹ (Aurum Met):** پردہ شبکی کی لاشعلی 'بصارت کا اوپر والا آدھا حصہ کالے جسم سے ڈھکا ہوتا ہے اور نیچے والا آدھا حصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پردہ شبکی میں سوزش ہوتی

ہے اور نظر میں دھندلاہٹ ہوتی ہے۔  
چائنا فیرم فاس (China, Ferrum Phos): پردہ شبکی کا قلت دم والا عارضہ جو پینائی کے  
 کمودینے کا باعث ہوتا ہے۔  
کونیم: (Conium): روشنی سے پردہ شبکی کو بے انتہا حساسیت ہوتی ہے خصوصاً اگر آنکھوں  
 میں گہرے درد کے ساتھ نظر کی کمزوری کی علامات بھی اس کے ساتھ پائی جائیں۔  
آرنیکا ایم: (Arnica M): زخم کے باعث یا چوٹ کے باعث پردہ شبکی کی لاطعلق پردہ شبکی  
 میں سیلان خون۔  
نیفتھالین: (Napthalin): پردہ شبکی کی لاطعلق نرم موتیا بند پردہ شبکی میں رطوبت کا اخراج  
 نیز آنکھ کے کالے پردہ اور پلکوں کے جسم سے رطوبت کا اخراج۔ قرنیہ کا دھندلا پن پردہ شبکی  
 سے مواد رستل ہے اور اس کے اوپر جم جاتا ہے۔  
نیرم سلی سیلیکم: (Natrurn Salicylicum): پردہ شبکی میں سیلان خون، سیلان خون کے  
 ساتھ ایبوسن والے پردہ شبکی کے امراض۔

تشنجی جھٹکے (Spasms) —  
 (دیکھئے ”پھزکن“)

آنکھ کا بھیجنگا پن

(Squint "Strabismus")

جلسی میم (Gelsimium): یہ بھیجنگا پن کی چوٹی کی دوا ہے۔  
سائیکل من (Cyclamen): اگر جلسی میم ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔  
ہایوسکیمس (Hyoscyamus): جب دماغی امراض کے باعث بھیجنگا پن ہو۔  
ڈیپتھیرینم (Diphtherinum): جب تریاق زہر ادویات کے استعمال کے بعد اثرات کے  
 باعث بھیجنگا پن لاحق ہو، سی۔ ایم طاقت کی دوا دیجئے۔  
گنیشیا فاس (Magnesia Phos): آنکھ کے ڈھیلے کی متوازن حرکت بھیجنگا پن، تشنجی بھیجنگا  
 پن۔

## آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھار

(Staphyloma)

کاسٹیکم (Causticum): آنکھ کا ڈھیلہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا حجم بڑھ کر قرنیہ سے باہر کو نکل آتا ہے اور نظر دھندلی ہو جاتی ہے۔  
ایلیکس اکوئی فولیئم (Ilex Aquifolium): قرنیہ کی سوزش، آنکھوں کے ڈھیلے گوشت کے ٹوٹنے کی طرح نظر آئیں، حلقہ ہائے چشم میں جلن دار درد ہو رات کے وقت اتھری ہوتی ہے آنکھ کی 'مدر منچر' یا 1x طاقت کی دوا دیجئے۔  
ایپس ایم (Apis M): قرنیہ یا آنکھ کے سکورا کے حجم کا بڑھ جانا۔

## گوبانجینیاں — (Styes)

پلساٹیلہ (Pulsatilla): گوبانجینیاں، خصوصاً اوپر والے پونے پر۔  
سٹیفیسگریا (Staphisagria): یہ گوبانجینوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے جو عموماً پلساٹیلہ کے ناکام ہو جانے پر دی جاتی ہے۔ میرے اپنے تجربے کے مطابق یہ دوا میں نے تمام اقسام کے گوبانجینوں کے امراض میں مؤثر پائی ہے۔ خواہ یہ گوبانجینیاں مزمن ہوں یا دوسری قسم کی یا اوپر والے پونے پر ہوں یا نیچے والے پونے پر۔ بار بار ہونے والی گوبانجینیاں، پونوں کے کناروں پر بھوسی ہو۔

ہیپرسلفر (Hepar Sulphur): جب گوبانجینوں کے بار بار ہو جانے کا رجحان ہو اور جب سٹیفیسگریا ناکام ہو جائے۔

الیومنا سلیکیٹ (Alumina Silicate): ورم آلود پونوں کے ساتھ گوبانجینیاں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، دکھن اور درد ہوتا ہے جیسا کہ آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی ہو (نیز دیکھئے "تھیلی" جب گوبانجینیاں سخت ہو جائیں۔)

## آنسو (Tears)

(نیز دیکھئے "آنکھوں سے پانی کا اخراج")

یوفریزیا (Euphrasia): جب تیزابی آنسو، ہمیں اور آنکھوں میں بیجان پیدا کر دیں۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): آنسوؤں کا اخراج آسانی کے ساتھ ہو۔

مرک کار (Merc Cor): سوزش کے باعث آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔



رشاکس (Rhus Tox): ناک کی رطوبت بند ہو جانے کے باعث بے تحاشہ آنسو ہمیں آنکھوں میں جلن ہوتی ہو۔

سلیشیا (Silicea): آنسوؤں والی ٹالی کے بند ہو جانے میں جب جب رشاکس ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): آنسوؤں والے سوراخ کی سوزش جس کے ساتھ پیپ بھی ہو۔

فلورک ایسڈ (Flouric Acid): آنسوؤں والے سوراخ کی رکاوٹ یا پھوڑا۔

### مکڑے (Trachoma)

(نیز دیکھیے "سوزش")

### رسولیاں (Tumors)

زنگم میٹ (Zincum Met): آنکھوں کے اوپر والے یا نیچے والے پپٹوں پر رسولیاں، رگوں والی رسولیاں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): تھیلیوں والی رسولیاں۔

کونیم، سٹیفیسیگیا (Conium, Staphisagria): پپٹوں پر دانے۔

کالی یا سیکرام (Kali Bi): ہموار نرم رسولیاں پپٹوں کے نیچے۔

تھوجا (Thuja): آنکھوں کے پپٹوں پر تھیلیاں اس وقت ہوتی ہیں جب حفاظتی ٹیکوں کے اثرات دب جانے کی ہسٹری موجود ہو یا جب حفاظتی ٹیکے نہ لگوائے گئے ہوں۔

کیلڈیم (Caladium): بے انتہا سگریٹ نوشی کرنے والوں میں جب سگریٹ نوشی کے باعث غیر حاضر دماغی لاحق ہو اور یادداشت کھو جائے یہ دوا تھیلیوں کو تندرست کرتی ہے اور سگریٹ نوشی کی طلب کو ختم کرتی ہے۔

### پھڑکن (Twitching)

اگیریکس ایم (Agaricus M): آنکھوں کی جمھکن اور پھڑکن۔ یہ دوا آنکھوں کے ڈھیلوں کی گھڑی کے پنڈولم جیسی حرکت کو بھی درست کرتی ہے۔ یہ تمام حرکات نیند کے دوران رک جاتی ہیں (1000 طاقت کی ایک ہی ٹوراک دیتے)۔

ریفٹس (Raphanus): آنکھوں کے پپٹوں کی مسلسل پھڑکن ہو بصارت کو تقریباً روک دیتی ہے۔ اس کے ساتھ آنکھوں کے ڈھیلے گوالی میں حرکت کرتے ہیں۔

مزیریم (Mezereum): آنکھوں کے ڈھیلوں کی پھڑکن دائیں رخسار کے عضلات اور معدے کے پیندے کے عضلات کی پھڑکن، تکلیف دہ پھڑکن۔  
مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): آنکھوں کا تشنج اور جھٹکے جیسا بہت زیادہ دیر تک پنوں کا تشنج جس کے باعث بینکاین لاحق ہو۔

### قرنیہ کے ناسور (یا پھوڑے)

(Ulcers of the Cornea)

ہیپیر سلف (Hepar Sulphur): قرنیہ اور اگلے طبق کا پھوڑا، چکن والے شدید درد کے ساتھ پھوڑے کا گلنا سڑنا، روشنی کے خوف کا شدید مرض۔  
مرکیورس سول (Mercurius Sol): اوپر والی سطح یا گہرائی میں ناسور کے لئے قابل لحاظ حد تک رسنے کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں چھیلنے والا مواد ہوتا ہے۔  
سیلیشیا (Silicea): قرنیہ کا گلنے سڑنے والا ناسور، مزمن پھوڑے، قرنیہ کے درم کے بعد نظر کی دھندلاہٹ۔  
گرافٹائٹس (Graphites): گاڑھی کریم کی طرح کی پیپ کے ساتھ پھوڑے ہوتے ہیں۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): آنکھ کے نیلے حصے میں پھوڑے نرم طبیعت والے مریضوں میں نکیس کی تکلیف کے ساتھ۔

### بصارت (Vision)

(نیز دیکھئے ”دور کی نظر کی کمزوری“ اور ”اندھا پن“)

فاسفورس (Phosphorus): ٹائیفائیڈ بخار کے بعد اندھا پن، جنسی بے احتدائیوں رطوبات کے ضائع ہو جانے کے بعد اندھا پن، یہ دوا آسمانی بجلی گرنے کے اثرات کے بعد لاحق ہونے والے اندھے پن کو بھی شفا دیتی ہے۔ عصب بصارت کے قلع کے باعث اندھا پن۔  
فائیسو سٹگما (Physostigma): رات کا اندھا پن، سبزموتیا اور دور کی نظر کی کمزوری۔  
پائیلو کارپس (Pilocarpus): اس دوا سے دور کی نظر کی کمزوری درست ہوتی ہے۔ معمولی استعمال سے آنکھیں تھک جاتی ہیں، آنکھوں میں گرمی اور جلن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پونے پھڑکتے ہیں، روشنی سے آنکھوں میں سختی اور بیچان پیدا ہوتا ہے۔  
رینن کولس نی (Ranunculus B): دن اور رات کا اندھا پن جو مستورات میں ہوتا ہے حمل کے دوران۔

سائیکلے من (Cyclamen): خارش کے دب جانے کے باعث بصارت کم ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے بادل یا چلمن آ جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھواں یا دھند آ جاتی ہے بصارت کا آدھا حصہ دائیں طرف والا متاثر ہوتا ہے۔

آیوڈیم (Iodum): نظر کا اچانک چلے جانا۔

کوکیولس انڈ (Cocculus Ind): بصارت کا دھیمپڑ جانا اور بصارت میں خلل آنکھ کے عضلات کی فالجی کمزوری نیز عضلات کی مطابقت (تطبیق) میں کمزوری۔

بووشا (Bovista): عصب بصارت کے فالج کے باعث اندھا پن۔

امبر اگریسیا (Ambra Grisea): آنکھ کی حالت میں کسی بھی ظاہری خرابی کے بغیر بصارت میں اعصابی کمزوری آ جاتی ہے۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں کے سامنے بادل یا چلمن آ جاتی ہے۔ دھواں یا دھند چھا جاتی ہے صبح کے وقت چلنے پر ابتری ہو۔

نیٹرم میور، چائنا سلف (Natrium Mur, China Sulph): کسی بھی جانب کے نصف حصے کی عدم بصارت۔

اگریکس ایم (Agaricus M): نظر بہت قریب کی رہ جائے، نظر دھندلی ہو جائے، نظر غیر واضح ہو جائے، ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے۔ آنکھوں میں جھٹکے لگتے ہیں اور پھر کن ہوتی ہے جو کہ اس مرض کی واضح علامت ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند اور مکڑی کے جالے کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے رنگوں اور اعداد کا دھوکا ہوتا ہے۔

گرے شیولا (Gratiola): نظر غائب ہو جاتی ہے جو کہ سر میں خون کے اڑدھام کے باعث ہو۔

میفاٹینس (Mephites): دور کی نظر کی کمزوری، حروف پڑھتے وقت گڈمڈ ہو جاتے ہیں، لاریک چھپائی پڑھنے کی ناقابلیت۔

لیتھیم کارب (Lithium Carb): دائیں جانب کا بصارت کا آدھا حصہ نظر نہیں آتا۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): دایاں یا بایاں آدھا حصہ نظر نہ آئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بصارت کا نصف زیریں نصف بالائی حصہ نظر نہ آئے اوپر والا آدھا حصہ سیاہ جسم سے ڈھکا ہو اور نچلا آدھا بصارت کے قابل ہو، بڑے حروف میں امتیاز نہ ہو سکے، آنکھوں کے سامنے زرد اجسام تیرتے ہوئے نظر آئیں۔

سپیا (Sepia): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد بصارت میں دھندلاہٹ آجائے، آنکھوں کی پتلیاں سبز جانے کے ساتھ بصارت جاتی رہے، بصارت کا کوئی سا آدھا حصہ نظر سے اوچھل

ہو۔  
گرافائٹس (Graphites): عام فالج کے باعث اندھا پن، جیٹہ نظر سے باہر آگ کے  
نمٹاتے ہوئے ٹیڑھے میڑھے راستے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): رات کا اندھا پن کسی بھی چیز کا صرف آدھا حصہ نظر آتا  
ہے، سونے کے دوران آنکھیں آدمی کھلی رہتی ہیں۔

چائنا (China): پردہ بیکہ میں قلت دم کے باعث رات کا اندھا پن، آنکھوں کے گرد نیلا  
رنگ ہو، آنکھوں میں دباؤ ہوتا ہے۔

بو تھ روپس لنسیولیس (Bothrops Lanciolatus): دن کا اندھا پن، سیلان خون کے  
باعث اندھا پن سورج طلوع ہونے کے بعد مشکل ہی سے پردہ کھلی اپنا راستہ دیکھ سکے۔

اکونائٹ نیپ (Acconite Nap): اجتماع خون کے باعث اچانک اندھے پن کا حملہ، اس  
دوا کو مرض کے ابتدائی مراحل میں آزمانا چاہئے۔

کاسٹیکم (Causticum): اچانک اور متواتر بصارت کا کھو جانا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے  
آنکھوں کے اوپر باریک پردہ تپا ہوا ہے، نظر دھندلی ہو جاتی ہے جیسا کہ آنکھوں کے سامنے  
دھند ہوا یا چٹکھن ہو۔

جلیسیم (Gelsimium): یہ دوا غنودگی کے ساتھ اچانک اور مکمل اندھے پن کی نشاندہی  
کرتی ہے۔ آنکھیں بھاری ہوتی ہیں اور نظر مدہم ہوتی ہے، جلق کے باعث چٹائی کا جاتے رہتا،  
بصارت کا نصف بالائی علاقہ متاثر ہوتا ہے۔

لیک لائنٹھس (Lachnanthes): جب کھٹکی باندھ کر دیکھنے سے نظر دھندلا جائے، جب  
بھورے جیسے ہوئے دائرے نظر آئیں، آنکھیں چمک دار ہوتی ہیں اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلی  
ہوتی ہوتی ہیں۔ رخسار سرخ ہونے کے ساتھ۔

مرکیورس (Mercurius): اندھے پن کے چند لمحاتی دورے، آنکھیں روشنی اور آگ کی  
چمک سے حساس ہوتی ہیں۔

سکیوٹا وروسا (Cicuta Virosa): بہت زیادہ غنودگی کے ساتھ نیز غیر حاضر دماغی کے باعث  
بصارت کا متواتر غائب ہوتے رہنا خصوصاً جب چل رہا ہو۔ جب خطوط پڑھ رہا ہو تو بے قاعدگی  
کے ساتھ آگے پیچھے کو جھولے۔

ٹائٹینیئم (Titanium): شروع میں چیز کا صرف آدھا حصہ نظر آ سکتا ہے۔ زکام کا رجحان ہواؤ  
میں سرعت انزال کے ساتھ نامردی۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): یہ احساس کہ نظر کی دھندلاہٹ دور ہو سکتی ہے۔ آنسو آنکھوں

کی چٹلیاں سکڑی ہوئی ہوں۔ پرانے کیسوں میں۔  
سیلیسیا (Silicea): اس دوا کی نشاندہی ہو سکتی ہے یا جہاں بظاہر معلوم ہو کہ مستقل ایسے  
 اثرات کے سلسلے میں دوا ناکام ہے۔

الیومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate): بصارت دھندلی۔ رات کے وقت مصنوعی روشنی  
 سے اور بصارت کی تھکان سے اجترہ ہوتی ہے۔ بصارت دھندلی اور کمزور ہوتی ہے۔  
ڈوبوسیا (Duboisia): آنکھیں ٹھنڈی اور خشکی ہوئی محسوس ہوں۔ چیزیں اوپر کو اٹھی ہوئی  
 دکھائی دیں۔ چہرے تمام اطراف میں بار بار نظر آتے ہیں۔ فریب نظر، مریض کو لگتا ہے کہ اس  
 کے لئے ایک نشست خالی ہے حالانکہ وہاں کوئی نشست نہیں ہوتی، تصور کرے کہ اندھیرا ہے  
 جبکہ بالکل چمک دار روشنی ہو، اپنے سر کے اوپر ہوا میں اپنی گھڑی پر ہاتھ ڈالے۔ جو گھڑی اس  
 سے کھو چکی ہو۔ دفن کے فاصلے سے عمارت پڑھنے سے قاصر ہو اور یہ اسے کئی رنگوں میں  
 دکھائی دیتی ہے مثلاً نیلا، مالٹا رنگ اور سرخی مائل بھورا، عصب بصارت میں اجتماع خون، عصب  
 بصارت مفلوج ہو شریانیں سکڑی ہوئی ہوں۔

سنا (Cina): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جالی میں دیکھ رہا ہو۔ آنکھیں پونچھنے سے افادہ ہوتا  
 ہے۔

ورینٹرم (Veratrum): عصب بصارت میں اجتماع خون یا ہیجان کے باعث نظر جاتی رہے۔  
 موم جی کے گرد سبز دائرے ظاہر ہو جاتے ہوں جو بعد میں سرخ ہو جاتے ہوں اگر چکر آئیں۔  
روٹا (Ruta): دوران مطالعہ آنکھیں آسانی سے تھک جائیں۔ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے  
 باعث نظر دھندلا جاتی ہے۔ جب پڑھتا ہے تو آنکھوں میں جلن اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔  
 پڑھتے وقت آنکھوں کے ذہیلوں میں درد ہوتا ہے۔ پڑھنے کے بعد نظر دھندلا جاتی ہے یا کسی  
 باریک اور عمدہ کام کو کرتے ہوئے نظر کو بھانسنے کے بعد نظر دھندلا جاتی ہے۔

میڈورینم (Medorrhinum): آنکھوں کے سامنے بھلاہٹ ہوتی ہے۔ حیض بصارت میں  
 سیاہ اور بھورے دھبے ہوتے ہیں اور بصارت دھندلا جاتی ہے۔ چیزیں دوگنا یا پھوٹی نظر آتی  
 ہیں۔ آنکھوں میں ریت پڑنے یا ٹپکنے پڑنے کا احساس۔

کونیئم (Conium): جتنی دیر تک نظر چیزوں پر جمی رہے۔ چیزیں خواہ کتنی ہی پھوٹی ہوں نظر  
 قائم رہتی ہے لیکن نظر ہٹا کر جیسے ہی کسی دوسری چیز پر ڈالی جاتی ہے آنکھوں کے سامنے  
 دھندلاہٹ آ جاتی ہے اور نظر میں گڑبڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے البتہ دوسری چیز پر نظر بھانسنے کے  
 بعد بصارت پھر سے درست ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کو گھمانے سے غنودگی ہوتی ہے اور گڑبڑاہٹ  
 ہوتی ہے لیکن نظر بھانسنے ہی یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ پڑھتے وقت سطریں حرکت کرتی نظر

آئیں۔ چیزیں سرخ نظر آتی ہیں۔

کیوپریم میٹھ (Cuprum Met): پیشاب کے اخراج یا خارش یا پھوڑے پھنسی کے دب جانے سے اندھا پن لاحق ہو۔ اس کے ساتھ جھٹکے بھی ہو سکتے ہیں۔

فیرم میٹھ (Ferrum Met): رات کے اندھیرے میں چیزیں دیکھ سکنے کی اہلیت۔

کاربونیم سلف (Carboneum Sulph): ہر چیز دھند کے اندر دکھائی دیتی ہے یوں محسوس

ہوتا ہے جیسے چیزوں کے اوپر کٹڑی کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ سبز یا سرخ دائیں آنکھ کا اندھا پن اور بائیں آنکھ کی بصارت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ عصب بصارت کا ضعف۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): دور کی نظر کی کمزوری، آنکھوں کے سامنے کالی پٹیاں دکھائی دیں۔

قریب پڑی ہوئی چیزیں مریض کو حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

نوٹ (Note): اندرونی استعمال کی مندرجہ بالا ادویات میں اضافے کے طور پر مندرجہ ذیل چند ورزشوں کی سفارش کی جاتی ہے۔ جن سے نظر میں بہتری ہوگی۔

- 1- حوانگ ضروریہ سے فراغت کے بعد ٹھنڈے پانی کے نیچے آنکھوں کو کھولنا اور بند کرنا۔
- 2- دن میں کسی وقت اراداً آنکھوں کو بھپکانا خصوصاً آنکھوں پر دیر تک دباؤ پڑنے کے بعد۔
- 3- دن کے اختتام پر آنکھوں کو پونوں کے نیچے آہستہ آہستہ دبانایا بھینچنا۔
- 4- حلقہ ہائے چشم میں آنکھوں کو تواتر کے ساتھ گھماں۔ یہ آنکھوں کی تندیب کے لئے چند طریقے ہیں جو آپ کی آنکھوں کی حفاظت جوانی سے بڑھاپے تک کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی عینک چھڑانے کا ذریعہ بن جائیں۔

## دوہری بصارت — (Vision- Double)

(ایک کے دو نظر آتا)

کاشیکم (Causticum): آنکھوں کو دائیں طرف موڑنے پر بصارت دوہری ہو جائے۔ (ہر چیز دو دو نظر آتی ہے۔)

جلسیم (Gelsemium): کسی بھی جانب آنکھوں کو گھمانے سے بصارت دوہری ہو جاتی ہے لیکن سر کو اگڑائے رکھنے پر بصارت اکری ہوتی ہے۔ (یعنی ایک چیز ایک ہی نظر آتی ہے۔) آنکھوں کے چھیر کا فالج بھی ہو سکتا ہے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): قریب نظر جس میں ایک کی بجائے چیزیں دو دو نظر آتی ہیں۔

الیومن (Alumen): موم بتی کی روشنی میں چیزیں دو دو نظر آتی ہیں۔ پیپ والا آشوب چشم

لاحق ہو۔ آنکھوں کی مزمن دکھن۔

سینیگا (Senega): دوہری بصارت۔ صرف سر کو پیچھے کی طرف جھکانے سے ہی بہتری ہوتی ہے۔ جب دونوں آنکھوں سے دیکھے تو چیزیں دو دو نظر آئیں لیکن ایک آنکھ سے دیکھنے پر ٹھیک نظر آتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): لکھتے وقت حروف دوہرے نظر آتے ہیں۔ پڑھتے وقت حروف بھاگنے لگتے ہیں۔

پلمبم (Plumbum): دونوں آنکھوں سے دیکھنے پر بصارت دوہری ہو جبکہ ایک آنکھ سے دیکھنے پر درست ہو جائے۔

سٹرامونیم (Stramonium): حروف اور چیزیں دوہری دکھائی دیتی ہیں۔

ورٹروم وائر (Veratrum Vir): اجتمع خون والے درد سر کے ساتھ بصارت کا دوہرا ہو جانا۔

اورم فولیٹم (Aurum Foliatum): ہر چیز دوہری نظر آتی ہے چنانچہ مریض کے سامنے ایک چیز دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہو کر پیش ہوتی ہے جس کے ساتھ آنکھوں میں شدید دباؤ ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بصارت دوہری ہو اور چیزیں ایک دوسرے کی جانب گھومتی ہوئی دکھائی دیں۔

### بصارت، فریب نظر — (Vision- illusion)

(نیز دیکھئے ”رتکین بصارت“)

ہائیپوسائیمس (Hycyamus): آنکھوں کے سامنے سرخ دھبے ہوتے ہیں۔

روٹا (Ruta): موسمِ بہار کی روشنی کے گرد سرخ ہالہ دکھائی دیتا ہے۔

تھوجا (Thuja): آنکھوں کے سامنے پٹیاں تھرتھرتی ہیں۔

ایٹروپین (Atropin): جدھر بھی دیکھے سائے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دوا فریب نظر کو بھی درست کرتی ہے۔ ہر چیز بڑھی نظر آتی ہے۔

سائیکلے من (Cyclamen): آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے اور چمکتے ہوئے شرارے ہوتے ہیں۔ جلن اور جھللاہٹ کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا۔ بصارت مدھم ہو جاتی ہے۔ چیزیں دھواں اور دھند میں سے نظر آتی ہیں۔ ایک کی دو دو چیزیں نظر آئیں۔

امونیئم کارب (Ammonium Carb): آنکھوں کے سامنے پیلے دھبے ہوتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں کے سامنے کالے دھبے تیرتے ہیں۔ قریب کی چیزیں لمبے فاصلے پر نظر آئیں۔

فاسفورس (Phosphorus): آنکھوں کو بند کرنے پر آگ کا سمندر نظر آتا ہے۔ حروف سرخ نظر آتے ہیں، جب مریض پڑھتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سے کالے دھبے گزرتے ہیں۔ موم بتی کے گرد ہلا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ عکس یا چنگاریاں نظر آتی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): آنکھوں کے سامنے شعلے ہوں۔ آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کے جھماکے ہوں، چیزیں لمبی یا الٹی نظر آتی ہوں، چیزیں سرخ نظر آئیں۔

سینڈرون (Cedron): چیزیں رات کے وقت سرخ نظر آتی ہیں جبکہ دن کو پیلی نظر آئیں۔

سٹرامونیم (Stramonium): سیاہ کی بجائے چیزیں سرخ نظر آتی ہیں۔ چیزیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ چیزیں سیاہ ٹیڑھی میڑھی اور ترچھی نظر آتی ہیں۔

ایلن ٹھس (Ailanthus): رات کے وقت پونے بند کرنے پر آنکھوں کے سامنے روشنی کے جھماکے ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): آنکھوں کے سامنے سلیٹی رنگ کے دھبے اور سانپ کی صورت سے اجسام حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔

اورم میٹ (Aurum Met): دوہری بصارت اور چیزیں ایک دوسرے میں بھاگتی نظر آئیں۔ جب رات کے وقت دیکھے تو کھچاؤ والا درد ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر شدت میں کمی ہو۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے ناپتے ہیں۔

وریٹرم وائر (Veratrum Vir): موم بتی کے گرد بڑے بڑے سبز دائرے ظاہر ہوں۔ جو کہ جیسے ہی چکر آتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں۔

البومینا (Alumina): موم بتی کے گرد پیلا دائرہ، آگ کے دھبے اور سفید ستارے نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مریض دھند میں سے یا پروں میں سے دیکھ رہا ہو۔

کالی بائیکرام (Kali-Bi): آنکھوں کے سامنے کئی رنگ اور چمک دار دھبے ہوتے ہیں۔ چیزیں پیلے پردے سے ڈھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔

مرکیوریس (Mercurius): دائیں آنکھ کے سامنے بیٹہ کالے کیڑے کوڑے یا کھیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھند ہوتی ہے۔ نظردھم ہو جاتی ہے۔ آگ کی روشنی جس میں چکاچوند ہو برداشت نہیں ہو سکتی۔

سپیا (Sepia): آنکھوں کے سامنے آگ کی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ روشنی دیکھنے پر، آنکھوں کی چمک ہو۔ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ آگ کے ٹیڑھے میڑھے شعلے رنگوں کا




پر چچ ممکنہ۔

سنا (Cina): بصارت پیلی۔

گرافائٹس: (Graphites): جب لکھے تو حروف دہرے نظر آئیں۔ پڑتے وقت حروف بھاکیں۔

میڈورنیم (Medorrhinum): آنکھوں کے سامنے جھللاہٹ، بصارت دھندلی۔ آنکھوں کے سامنے کالے اور بھورے دھبے ہوں، چیزیں دہری نظر آتی ہیں۔

آنکھوں سے پانی بہے (Watering of) \_\_\_\_\_  
(دیکھئے ”آنسو“)



## باب چہارم

# کانوں کے اور سماعت کے امراض

(Diseases of Ears & Hearing)

## جلن — (Burning)

اورم میٹ (Aurum Met): جب ٹھنڈی ہوا میں چلے تو کانوں میں جلن ہو۔  
 سینگوئی نیریا (Sanguinaria): کانوں میں جلن ہو جس کے ساتھ رخسار سرخ ہوں۔  
 مرکوریس سول (Mercurius Sol): گرمی جلن، بائیں کان میں اتھری ہو۔  
 امونیا میور (Ammonia Mur): کانوں میں جلن سرخی اور خارش ہو جیسا کہ ٹھنڈے کے کانٹے سے ہوتا ہے۔  
 اگیڑیکس مس (Agaricus Mus): جلن، سرخی اور خارش کانوں میں ہوتی ہے جیسا کہ برف کے کانٹے سے ہو۔

## بہرا پن — (Deafness)

(نیز دیکھئے ”چکر“)

کالی میور (Kali Mur): یہ بہرے پن کی عام دوائی ہے۔  
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): کان میں سوراخ یا پھوڑے کے باعث بہرا پن۔  
 فیرم پکریکیم (Ferrum Picricum): لمبوں کے شور والے علاقے میں رہنے کی وجہ سے یا کسی بھی شور والے کوارٹروں میں رہنے سے بہرا پن لاحق ہو۔ اعصابی بہرا پن جو بغیر خون کی نالیوں میں کسی تبدیلی کے واقع ہو۔  
 مرک ڈولس (Merc Dulcis): عمر رسیدہ لوگوں میں نزلاوی بہرا پن نیز کان اور حلق کے درمیان نالی میں رکاوٹ ہو۔ مرطوب موسم میں اتھری ہوتی ہے۔  
 سکیوٹاوی 200: ہائیڈروسائٹک ایسڈ 200 (Hydrocyanic Acid.200)  
 (Cicuta V. 200): دماغ کی بھلیوں کے درم (گردن توڑ بخار) کے باعث بہرا پن لاحق ہو۔  
 ہر ہفتہ بدل بدل کر دوائی لیے عرصہ تک دیجئے۔

پائیکلو کارمینم (Pilocarpinum): جب کان کے اندرونی خلا (جوف) میں خرابی کے باعث بہراپن ہو۔ شور میں بہتر سنانی دیتا ہو۔ جیسا کہ ریل گاڑی کا شور ہوتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): ایسے بہراپن کے لئے جس میں شور کے اندر بہتر سنانی دے۔

میکسیریئم (Mexerium): کان میں انگلیزیمیا کے بعد یا مزمین نزلے کے باعث جب بہراپن لاحق ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کان اور حلق کے درمیان والی ٹالی میں رکاوٹ کے باعث ہو۔ کان کا پردہ زخم آلود یا کھنچا ہوا ہوتا ہے۔ پردہ کی جھلی موٹی ہو جاتی ہے۔ ہر مرتبہ کھانے سے پہلے 30 طاقت کی دوا دیجئے۔ جب بہراپن انگلیزیمیا کے دب جانے کے باعث ہو تو 30 طاقت کی خوراک روزانہ ایک مرتبہ تھارمہ دی جائے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): ٹھنڈ لگ جانے یا خسرو کے بعد یا سرخ بخار کے باعث بہراپن لاحق ہو۔ مرطوب موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ نزلے کے باعث حلق اور کان کی ٹالی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ کونین کے غلط استعمال کے باعث۔

آئیوڈیم (Iodium): گلے اور کانوں کی ٹالی میں رکاوٹ کے باعث بہراپن جس کے ساتھ گلے کا بڑھ جانا اور خنجرہ میں درد ہوتا ہے۔

برٹاکارب (Baryta Carb): قوت سماعت کمزور پڑ جائے اور جھنجھنے کی آوازیں شور کی طرح آتی ہیں۔

کالی آرسنک (Kali Ars): برسوں پرانا بہراپن۔

می فائینس (Mephites): مزمین بہراپن یا پیدائشی بہراپن اس سے دوا سے درست ہوتا ہے۔ 30 طاقت والی خوراک سے علاج شروع کیجئے اور ادنیٰ طاقتوں تک یہ دوا لمبے عرصہ تک دینی چاہئے مثلاً چھ ماہ تک یا ایک سال تک لے جائیے۔ نیویرکولینم 200 کی ایک خوراک ہر ماہ عمل انگیز دوا کے طور پر دے دینی چاہئے۔ اس دوا سے پہلے یا بعد میں دو دن تک کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

وربسکلم (Verbascum): کان میں رکاوٹ کے باعث بہراپن، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو۔

کاسٹیکلم (Causticum): جب قوت سماعت مرطوب موسم میں بہتر ہو۔ سمعی عصب کے قلع کے باعث بہراپن۔

سلیشیا (Silicea): مرطوب موسم میں بہراپن کے مرض میں ابتری ہو۔

لیڈم (Ledum): کان سے بننے والے مواد کے دب جانے کے باعث بہراپن لاحق ہو۔

وسکم البم (Viscum Alb): نزلاوی بہراپن جس کے ساتھ کانوں میں شور ہو۔

آرسنک آئیوڈ (Arsenic Iod): ہراپن کے ساتھ افسردگی کا مرض بھی ہو۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

میگنیشیم کارب (Mag Carb): خوف یا ٹھنڈ کے باعث ہراپن ہو جائے۔

میڈوررہیم (Medorrhinum): دونوں کانوں کا مکمل ہراپن، جزوی ہراپن یا غیر مستقل ہراپن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دائیں کان میں کوئی کیزا چل رہا ہے اور سمعی نالی کی اندرونی دیوار کو کھود رہا ہے۔

سیلی سلک ایسڈ (Salicylic Acid): کانوں میں شور کے ساتھ ہراپن جس کے ساتھ سمعی عصب کے پکر ہوں۔

فاسفورس (Phosphorus): ہراپن خصوصاً انسانی آواز کے لئے۔

چینوپوڈیم اینتھ (Chenopodium Anth): بلند آہنگ آوازیں سنائی دیں لیکن باتیں کرنے کی آواز کے لئے قریب قریب ہراپن ہو۔ گلیوں میں چلنے والی کار یا شور والے سکوتر یا رکشہ پر سوار ہونے کے دوران انسانی آوازیں بہتر سنائی دیں۔ خاموش جمجموں میں کچھ سنائی نہ دے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): کان سے بننے والے سواد کے دب جانے یا ایگزیمہ کے باعث ہراپن، گلے میں گولی لگنے جیسا درد ہو۔

وربٹرم البم (Veratrum Alb): مریض ہراپن ظاہر کرے۔ (یعنی مصنوعی ہراپن)

## اخراج — (Discharge)

(دیکھئے ”کان بہنا“)

## کان کا درد — (Earache)

اکونائٹ (Aconite): ٹھنڈے کان کا درد ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب اکونائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ نیز کان سے گاڑھا مواد (پیلاہٹ مائل یا سبزی مائل) بہتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): کھودنے والے سوراخ کرنے جیسے اور پھاڑنے والے درد ہوں جو اچانک آتے ہیں اور بہت شدید ہوتے ہیں۔ یہ دوا پلساٹیلہ کی نسبت زیادہ شدید دردوں کے لئے ہے۔

سیلیشیا (Silicea): کان سے بدبودار پیپ کا اخراج ہو۔ جس کے ساتھ ہڈیوں کا گھٹنا سڑنا ہوتا ہے۔

ہے۔ نیز بدبودار مادوں کے اخراج کے ساتھ ہڈیوں کے پھوٹے پھوٹے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔

ہیپیر سلفر (Hepar Sulphur): جب کان میں پھوڑا ہو یا کان میں آبلے ہوں۔ پھوڑا کان کے سوراخ کو بند کر دیتا ہے۔ پھر جب پھٹ جاتا ہے تو مواد کان کے اندر کی طرف بہتا ہے اور کان کے پردے میں سوراخ کر دیتا ہے۔

اکٹیا سپکٹا (Act- Spic): کانوں میں پھڑکن والا درد جبکہ ٹاک بہہ رہی ہو یا جھینگیں آ رہی ہوں۔

کیمومیلا (Chamomilla): بدترین ناقابل برداشت درد ہوتا ہے جو کہ گرمی کے باعث رات کے وقت لاحق ہوتا ہے۔ یہ دوا بچوں کے کان کے درد کے لئے قریب قریب خصوصیت کی حامل ہے۔

جلی میم (Gelsemium): حیض کے موقوف ہو جانے کے دوران کان کا درد، کان گرم اور بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

ٹیرن ٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): جب بھگی کے ساتھ کان کی بھپٹ والی زنائے دار درد۔

کالی میور (Kali Mur): کان کا درد ہو جس کے ساتھ کان کا غدود سو جا ہوا ہو اور کان میں زنائے دار شور والی آوازیں ہوں جبکہ کان میں سو جن ہوں۔

مینگانم (Manganum): جب درد کان سے دانتوں تک مار کرے۔

سپائی جیلیا (Spigelia): کان کا درد، جب کان کا میل جمع ہو کر اعصابی عضلات کو دباتا ہے۔

کپسیکم (Capsicum): کان کا درد، جس میں رات کے وقت ابتری ہو، چٹکی دار پھوڑا، کان کے درمیانے حصہ کی سو جن، کپٹی کی ہڈی کے درمیانے حصے کی دکھن جس کے ساتھ پھٹنے والے درد سر اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کان گرم ہوتے ہیں اور درد گلے تک جاتا ہے۔

اوسمیم (Osmium): ٹاک نکتے پر کان میں درد ہو۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): یہ دوا خالصتاً کان کے اعصابی درد کی نشاندہی کرتی ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): متفق بدبودار پیپ والا گاڑھا و پیلا مواد کان سے خارج ہوتا ہے۔ درد کان کے اندر کان کے پیچھے کان کی اندرونی جانب ہوتا ہے نیز جلن دار اور ٹانگے لگنے کا سادہ درد ہوتا ہے۔ پہلے پل شور میں سنائی دیتا ہے پھر کم سنائی دیتا ہے اور آخر کار قوت سماعت جاتی رہتی ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): کان کا درد کان میں انگلی ڈالنے یا کان کو انگلیوں سے چوڑا کرنے سے

بہتر ہوتا ہے۔

### شور — (Noises)

کالی میور (Kali Mur): کانوں میں شور کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں کانوں میں ریل گاڑی کا شور، پردے کی آوازیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ننگے پر ناک بھگنے پر بھپشن والا اور زناٹے دار شور ہوتا ہے۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): کانوں میں گنگناٹے اور سنسنائے جیسی آوازیں آتی ہیں۔ جیسا کہ چست پر بارش ہو رہی ہو یا دریا بہہ رہا ہو۔

کالی سلف (Kali Sulph, Baryta Mur): جب چہائے تو کانوں میں شور ہو۔  
کریوزوٹ (Kreosote, Petroleum): حیض کے دوران کانوں میں شور محسوس ہوتا ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met, Veratrum Alb): حیض سے پہلے شور سنائی دیتا ہے۔

لیڈم پال (Ledum Pal): کانوں میں شور ہو جیسے کہ گھنٹیاں بج رہی ہیں یا آندھی چل رہی ہے۔ کانوں میں گرجن ہو یوں لگے جیسے آندھی چل رہی ہو۔

الیومینا (Alumina): چہاتے وقت کانوں میں گڑگڑاہٹ والا شور۔

الیو (Aloe): اچانک جیسے کوئی چیز دھماکے سے پھٹے اور تصادم ہو۔ بہتر میں جانے سے پہلے یہ کیفیت بائیں کان میں ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شیشہ ٹوٹ گیا ہو یہ اس دوا کی عجیب علامت ہے۔

وسکم الیم (Viscum Alb): نزلاوی بہرا پن کے ساتھ کانوں میں شور۔

نائیٹرک الیمڈ (Nitric Alb): کانوں میں گرجن، چہاتے ہوئے کانوں میں گڑگڑاہٹ۔

مینسی نیلا (Mancinella): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کان بند ہو چکے ہوں۔ گھنٹیاں بجتے جیسا گرجنے جیسا اور ڈھول بجتے جیسا شور کانوں میں ہوتا ہے۔ نیز کانوں میں آوازیں آتی ہیں۔

میوری اسکیم الیمڈ (Muriaticum Acidum): کانوں میں سنسنائے جیسا شور۔

گرافائٹس (Graphites): زناٹے دار شور یا بندوق چلنے جیسا شور۔

برٹا کارب (Baryta Carb): ناک بھگنے پر شور کی گونج سنائی دے۔ قوت سماعت میں کمزوری کے ساتھ زناٹے والا شور۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): کانوں میں شور ہو۔

**ڈلکامارا (Dulcamara):** کانوں میں جھنجھٹاہٹ والا شور ہوتا ہے۔ جو کہ رات کے وقت آتا ہے۔

**کاسٹیکم، لائیکو پوڈیم، فاسفورس، سپیا**

(Cacusticum, Lycopodium, Phosphorus, Sepia): صدائے بازگشت اور پھر اس کی بازگشت اپنی ہی آواز کی بازگشت اور پھر اس کی بازگشت ہے۔

**کان درد — (Otalgia)**

(دیکھئے ”کان کا درد“)

**کان بہنا**

**Otorrhoea (Discharge From the Ears)**

**کالی بائیکرو میکم (Kali Bich):** جب کانوں سے چپکنے والا مواد خارج ہو۔

**ہیپیر سلف (Hepar Sulph):** جب کان سے مادہ خارج ہونے کی وجہ سے کان کے اندر پھوڑا ہو۔ کان میں سوراخ کو بھی یہ دوا درست کرتی ہے۔

**سورینم (Psorinum):** جب اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں اور عمل نہ کریں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ کان سے متعفن مادہ خارج ہو۔

**اورم میٹ (Aurum Met):** جب کان کا پردہ مکمل طور پر ضائع ہو جائے اور ہڈیاں نکلنے لگیں۔ بدبودار مادوں کا اخراج ہو۔ ضدی اخراج کانوں میں جھنجھٹاہٹ اور سرسراہٹ ہو۔

**ٹیلیوریم (Tellurium):** بہت عرصہ سے لاحق اخراج مواد کے مرض کو یہ دوا سترست کرتی ہے۔ چھٹی طاقت دی جائے اونچے درجے کے ڈائی لیوشن ناکام ہو جاتے ہیں۔ متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔ جس سے خون آلود مچھلی کے چورے کی سی بو آتی ہو، پتلا اور پانی کی طرح کا مواد خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ جلن اور چھلین ہوتی ہے۔

**پلساٹیل (Pulsatilla):** جبکہ مواد کریم کی طرح کا گاڑھا ہو اور اس کا رنگ پیلاہٹ مائل یا سبز مائل ہو۔

**گرافائٹس (Graphites):** چپکن والا متعفن چھٹنے والا شمد کے رنگ کا مواد بہتا ہے۔ جو جلد کے جس حصے کو چھوتا ہے اسے چھیل دیتا ہے۔ مریض کے لئے ٹھنڈا اور جسم کو تنگ کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس کے باعث کان کے اخراج میں زیادتی ہو جاتی ہے اور گلے کے غدود

بڑھ جاتے ہیں۔

سکارلینی ٹینم (Scarlatinum): جب سرخ بخار کے بعد کان سے مواد خارج ہو۔  
سٹریپٹوکوکس (Streptococcin): جب سترچہٹو کوکس کے بد اثرات کے باعث کانوں سے  
 مواد خارج ہو۔ 200 طاقت کی دوا دیکھئے۔

گیرٹنر (Gaertner): جراثیمی ماحول میں جب بچہ دبلا پتلا اور کمزور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ  
 اس کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ذہنی بے چینی ہوتی ہے اور  
 اندھیرے سے اور تھمائی سے ڈرتا ہے۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): جھنچھاہٹ والا پیپ دار مواد خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ یا  
 جس سے پہلے تمام ہلکی ہملیوں کا عمومی نزلہ ہوتا ہے۔

وایولا اوڈوراٹا (Viola Odorata): کانوں کے آگے جھنجھناہٹ اور بڑبڑاہٹ ہوتی ہے۔ یہ  
 دوا رکے ہوئے مواد کو خارج کرتی ہے یا چند روز میں اخراج کو رفع کر دیتی ہے۔ (Q کی ایک  
 خوراک سے دونوں کانوں کے اخراج کو جس کے ساتھ بہرا پن بھی ہوتا ہے 'آرام آ جاتا ہے۔  
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): سفید رنگ کا باغی کریم کی طرح کا پیپ دار گاڑھا مواد  
 خارج ہو۔

سلیشیا (Silicea): ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے باعث بدبودار مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ جس کے  
 ساتھ ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی خارج ہوتے ہیں۔

مرکیورس (Mercurius): کان کی آتش کی حالت میں خصوصاً کان کے درمیانی حصہ سے پتلی  
 اور تیزابی پیپ خارج ہوتی ہے۔ ناسلز کی سوزش کے باعث سماعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔  
 کانوں سے سبز گاڑھا تیزابی اور متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔

ایٹھوزا (Aethusa): دائیں کان سے پہلے رنگ کا مواد خارج ہو۔ جس کے ساتھ ٹانگے لگنے  
 جیسا درد ہوتا ہے۔ جو کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے اور ہلانے سے کم ہوتا ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): آنکھوں سے آنسو بننے کے ساتھ کان سے زردی مائل سفید  
 مواد خارج ہوتا ہے۔ چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے اور پیشاب کی بو ایسی ہوتی ہے جیسے گھوڑے کے  
 پیشاب کی ہوتی ہے۔

سینی کیولا (Sanicula): کان سے مچھلی کے چورے کی طرح کا مواد خارج ہو۔

ایلیپس کورالینس (Elaps Corallinus): کانوں سے پیلا اور سبز مواد خارج ہوتا ہے۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sulph): بدبودار اور پیپ دار مواد خارج ہو۔ جس کے ساتھ  
 گاڑھی اور خون والی پیپ ہوتی ہے۔



کاربونیم سلف (Carbonium Sulph): کانوں سے خون والا متعفن بدبودار اور پیپ والا مواد خارج ہو۔ کان سرخ ہوتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے پھسیاں ہوتی ہیں۔ کانوں میں شور ہوتا ہے۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): گاڑھا سبز مواد کان سے باافراط خارج ہوتا ہے۔ مریض گرم مزاج ہوتا ہے۔ جسے ٹھنڈ میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔


## کان کے پردہ کا سوراخ

(Perforation of the Drum)

سیلیسیا 200 (Silicea 200): یہ ہر چند روز کے بعد دی جانی چاہئے۔  
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): یہ دوا روزانہ دن میں چار مرتبہ چار وقتوں کے ساتھ دی جانی چاہئے۔ سوائے اس روز کے جب سیلیسیا دی گئی ہو، یہ قائل لحاظ مدت تک دی جانی چاہئے مثلاً چھ مہینے سے لے کر آٹھ مہینے تک۔

میل — (Wax)

کونیم (Conium): کانوں میں میل جمع ہو جاتا ہے۔



# ناک، گلے، حلق اور حنجرہ کے امراض

(Diseases of Nose, Throat,  
Pharynx & Larynx)

## حصہ اول — ناک

### ناک کی اسفنجی سوزش — (Adenoids)

بیسی لینم (Bacillinum): اس دوا سے علاج کا آغاز کرنا چاہئے اور 200 طاقت کی دوا ہر پندرہ روز بعد دینی چاہئے۔ نیز اس کے ساتھ دیگر ادویات جن کی نشاندہی کی گئی ہے دینی چاہئیں۔ اس دوا کے استعمال والے دن سے دو دن قبل اور دو دن بعد کوئی دوا نہیں دینی چاہئے۔

اگر نفس نیوٹینسز (Agraphia Nutans): یہ ناک کی اسفنجی سوزش کے لئے بہترین دوا ہے۔ یہ دوا 3x طاقت میں دی جاسکتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پہلے اور موٹے بچوں میں "ٹھنڈے" (لحمیہ) پاؤں رات کو سر پر پیوند آتا ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phas): دہلے پتلے اور کمزور بچوں میں جن کا چہرہ پیلا ہوتا ہے۔ اس دوا کی ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے۔ بچہ چڑچڑا اور ضدی ہوتا ہے بغیر زکام کے جھینگیں آتی ہیں۔

کلکیریا آیوڈ (Calcarea Iod): بعض مخصوص کیسوں میں یہ دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مرک آیوڈ (Merc Iod): ناک کی اسفنجی سوزش کے علاج میں اس دوا کو بھی نہیں بھولنا چاہئے۔

ہائیڈراستس کین (Hydrastis Can): ناک کی اسفنجی سوزش کے لئے مخصوص دوا ہے۔ بلغمی جھلی چلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

برشا آیوڈائٹ (Baryta Iodide): ناک کی اسفنجی سوزش کے لئے یہ بہت مفید دوا ہے۔  
بشرطیکہ پچھڑا ہنی طور پر کمزور ہو۔

سس ٹس کین (Cistus Can): کٹھ مالا یا جھڑہ یا خنازیر کی سوزش اور گلے کے غدود سے  
پیپ کا آنا۔ حلق کے کٹے کے پیچھے جلن ہوتی ہے۔ گلے کی خشکی دور کرنے کے لئے ضرور ہی  
تھوک نکلنا پڑے۔

بیرونی علاج: ہائیڈرائشس اور ٹنگر۔۔۔ 10 گرام  
خالص گلیسرین۔۔۔ 60 گرام

رات کو بستر پر لیٹتے وقت مندرجہ بالا ادویات کے آمیزے میں روٹی کو اچھی طرح بھگو کر  
ناک کے اندر لگایا جائے۔ اس سے بہت زیادہ آرام ہو گا اور ناک کی اسفنجی سوزش کو درست  
کر دے گا۔

## ناک سے سیلان خون

(Bleeding From the Nose)

برائی اونیا (Bryonia): یہ بہت عمدہ دوا ہے اور اسے سب سے پہلے آزمانا چاہئے۔ 9th ڈائی  
لشن دیجئے۔

ملی فولیم (Millefolium): یہ نکسیر کی عمومی دوا ہے۔ اسے نکسیر کی وجہ جانے بغیر دیجئے اور  
جب برا یونیا ناکام ہو جائے تب دیجئے۔

ٹریلیم (Trillium): ناک سے خون بننے کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔ اس میں ناک سے بننے والا  
خون چمک دار سرخ یا گہرا سرخ اور لو تھڑے دار ہوتا ہے۔ اس کے مدد ٹنگر کو متاثرہ حصے پر  
لگانے سے خون رک جاتا ہے مثلاً دانت ناک وغیرہ سے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): جب چوٹ کی وجہ سے خون بے۔ ناک ٹھنڈا ہوتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): ناک سے خون بے۔ جب صبح کے وقت چہرہ  
دھوئے۔

گریفائٹس (Graphites): جب خون نکلنے سے پہلے یا ساتھ چہرہ اور گردن خون کی زیادتی  
سے سرخ ہو۔ ناک سے خون بننے کے ساتھ سر کی جانب اٹو دھام خون ہوتا ہے۔

کروکس (Crocus): گہرا تار دار خون۔

ہیمامیلس (Hamamelis): جب خون گہرے رنگ کا ہو۔

میلی لٹس (Melilotus): چہرے کی شدید سرخی کے ساتھ۔

فاسفورس (Phosphorus): متواتر اور افراط کے ساتھ خون کا بہنا۔ سیلان خون کا رہنا۔  
 آرم ٹریپ (Arum Trip): مسلسل ناک کو چھیڑتے رہنا۔ یہاں تک کہ خون بہنے لگے۔  
 وائپرا (Vipera): ناک سے خون بہنے کے لئے عظیم دوا ہے۔ حتیٰ کہ مدت العمر والے  
 کیسوں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrurn Sulph): حیض سے پہلے دوران یا بعد ناک سے خون کا بہنا۔  
 کروٹالیس ہور (Crotalus Hor): بوڑھے افراد میں اور جن کی صحت چاہ ہو چکی ہو، ایسے  
 افراد میں ناک سے خون کا سیلان ہوتا ہے۔ جب تمام دیگر دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جا  
 سکتی ہے۔ چہرہ کی خون والی سرخی کے ساتھ خون کی حالت میں نقص ہو چکر آئیں یا بے ہوشی ہو  
 جائے۔

امونیم میور (Ammonium Mur): نشتوں سے خون کے پھلکے نکلتے ہیں۔  
 اگیریکس (Agaricus): ناک نکلتے وقت ناک سے خون کا آنا۔  
 یوپٹی اونم (Eupionum): جب حیض میں خون کا آنا بند ہو جائے تو ناک سے خون کا سیلان  
 ہو۔

آر سینیکم البم (Arsenicum Alb): ناک سے شدید سیلان خون، جس کے ساتھ جلن دار  
 درد ہوتا ہے اور ہیجان ہوتا ہے۔

اریگرون (Erigeron): چمک دار سرخ خون کے سیلان کے لئے یہ مخصوص دوا ہے۔ نیز جسم  
 کے تمام حصوں میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): حیض کے دب جانے کے ساتھ ناک سے خون بہنے کے لئے یہ ایک  
 مفید دوا ہے۔ ناک سوج جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ ذائقہ اور بو والی حس کھو جاتی ہے۔

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): ناک کی پر درد سوزش۔ گندے ناک والے بچے۔  
 متواتر اور باافراط نکسیر۔

تھلاپی برسا (Thlaspi Bursa): ناک سے کم مقدار میں خون بہتا ہے۔ ناک کی جڑ میں  
 مدہم درد ہوتا ہے۔ خون اور بلغم کا آزادانہ اخراج۔

بویوشا (Bovista): صبح سویرے ناک سے خون بہتا ہے۔ سر میں انتشار ہو۔  
 رشاکس (Rhus Tox): ناک سے خون بہتا ہے۔ رات کے وقت نیز آگے کو جھکنے پر خون  
 گہرا سرخ ہوتا ہے۔

نزله — (Catarrh)

(دیکھئے ”زکام“)

ٹھنڈ (نزله) — (Cold)

(دیکھئے ”زکام“)

زکام (نزله) — (Coryza)

(حاد و مزمن)

(نیز دیکھئے ”تپ کلتی اور آنکھ“)

ایگریکس (Agaricus): زکام کے بغیر ہی ناک سے پانی بہتا ہے۔  
نیٹرم میور (Natrur Mur): پانی کی طرح کاشفای مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔ جس کے باعث آبلوں کی طرح کی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈانٹے اور سوکھنے کی حس ذائقہ ہو جاتی ہے۔

اکونائٹ (Aconite): مرض کے اچانک حملہ کے وقت یہ بہترین دوا ہے لیکن یہ مرحلہ عموماً بغیر علاج کے گزر جاتا ہے۔ شروع کے مرحلہ میں مریض کو بخار ہوتا ہے جس کے ساتھ نشتوں میں خشکی اور جھنجھناہٹ ہوتی ہے نیز بے چینی بھی ہوتی ہے۔

برائیونیا (Bryonia): سر میں اجتماع خون کے ساتھ ناک بند ہو جاتی ہے۔ مریض ناک کے ذریعے سانس نہیں لے سکتا۔ چھاتی میں درد کے ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ یہ قلو کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): یہ زکام کے ابتدائی مراحل کے لئے مخصوص دوا ہے اور 30 ڈائیکوشن کی خوراک دینا چاہئے۔

جلسی میم (Gelsemium): ناک سے گاڑھا مادہ خارج ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں چھینکیں آتی ہیں۔ سر درد ہوتا ہے۔ کمر میں جاڑا لگتا ہے اور دکھن والے درد ہوتے ہیں۔ مریض نڈھال اور کمزور ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): پانی کی طرح کا مواد ناک سے بہتا ہے جو کہ تیزابی اور پتلا ہوتا ہے۔ یہ اس دوا کی علامات ہیں۔ چھینکیں آتی ہیں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے جیسا کہ جلسی میم میں ہوتا ہے۔ قلو کے لئے یہ بہترین دوا ثابت ہو چکی ہے۔

کاربودیج (Carbo Veg): معدہ کی خرابی کے باعث زکام لاحق ہو جاتا ہے۔ جب مریض

زیادہ گرم کمرے میں جائے تو چھینکوں کے ساتھ زکام ہو۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): آنکھوں سے نرم مادہ خارج ہونے کے ساتھ ناک سے تیزابی مادہ خارج ہو تو ایسی صورت میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ عضلات میں دکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر ہو تو بہتری ہو جبکہ گرم کمرے میں بہتری ہو۔ پھولوں کی خوشبو اور حسیناؤں کی جلد سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔

یوفرزیا (Euphrasia): یہ ایلیئم سیپا کے بالکل برعکس ہے۔ آنکھوں سے اور ناک دونوں سے مواد خارج ہوتا ہے لیکن یوفرزیا میں آنکھوں سے خارج ہونے والا مواد تیزابی ہوتا ہے جبکہ ناک سے خارج ہونے والا مواد نرم ہوتا ہے۔

سورینم (Psorinum): مزمن نزلوں میں اس دور کے متعلق سوچنا چاہئے اور IM طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ اگر اس سے بہتری ہو تو کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پانی کی طرح کا مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔ دھول اور تمباکو کی خوشبو سے بہتری ہوتی ہے۔ ناک میں گدگداری اور خارش ہوتی ہے۔

لائکوپرسیکم (Lycopersicum): گھر سے باہر زکام میں بہتری ہو۔

ایپکاک (Ipec): دم گھٹنے والے دوروں کے بعد زکام ہوتا ہے۔ زکام کے باعث آواز بالکل جالی رہتی ہے۔ جھگرہ کی آواز کی بھلیوں میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

لیمنا مائنر (Lemna Minor): ناک کے پچھلے حصہ میں مواد کے گرنے کے ساتھ مزمن نزلہ فتنوں کا گوڑا ناک کی بندش کو کم کرتا ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): خشک زکام ذرا سا کپڑے اتارنے سے تازہ ہو جائے۔ گیلا ہونے سے یا مرطوب تہ خانے میں رہنے سے یا کھلی ہوا میں اور رات کے وقت بہتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے نم دار موسم میں ناک بند ہو جاتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب ناک سے گاڑھا زردی مائل سبز مادہ خارج ہو۔ بے غام طور پر پکا ہوا زکام کہتے ہیں۔ اس مرض کے لئے یہ مفید دوا ہے۔ پیاس کی غیر موجودگی اس دوا کی خاص علامت ہے۔ زکام ہو جس کے نتیجے میں سوتھکینے کی اور ذائقے کی حس کھو جائے۔

آرسنک آیوڈ (Arsenic Iod): یہ آرسنک الیم کے بعد والے مراحل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان دونوں دواؤں میں کمی اور زیادتی کا فرق ہوتا ہے۔ آرسنک الیم کا مریض گرمی میں یا گرم چیزیں لگانے سے بہتر ہوتا ہے۔ جبکہ آرسنک آیوڈ کا مریض گرمی سے بہتری محسوس کرتا ہے۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): اس دور کے ذیل میں خارج ہونے والا مادہ گاڑھا نہ بنے والا

رسی دار' زرد' خون ملا اور تیزابی ہوتا ہے۔ ناک میں ناسور بھی ہو سکتا ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔ ناک بند ہو جائے۔ ناک کے پچھلی جانب سے رسی دار بلغم حلق میں گرتا ہے۔

سناپیرس (Cinnabaris): مرغن زکام کے لئے۔

سببل (Sumbul): ناک اور حلق کا زکام۔

سینگونی تیریا نائٹ (Sanguinaria): ناک کے پچھلے حصے کا زکام سانس کی نالیوں کا (برونکائٹس) اور غجرہ کا مزمن زکام۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sul): راسخ ہو چکے ہوئے پرانے زکام والے کیسوں میں 'کھلی ہوا میں بہتری ہو' خشک زکام۔ ناک سے خون آمیز 'پھیلنے والا' بدبو دار 'چھپ دار' گاڑھا' پیلا یا سبزی مائل مواد خارج ہوتا ہے۔ ناک سے چھلکے خارج ہوتے ہیں۔ ناک سے گندی بدبو آتی ہے۔

مرک کار (Merc Car): گاڑھا' تیزابی' لیس دار اور پھیلنے والا مواد' ناک سے خارج ہوتا ہے۔

تھیرائیڈین (Theridion): گاڑھا' پیلا یا سبزی مائل' پیلے رنگ کا مواد خارج ہونے کے ساتھ خدی قسم کا زکام۔ پھینکوں کے شدید قسم کے دورے ہوتے ہیں۔

سلیشیا (Silicea): پاؤں کا پھیند دب جانے کے باعث ناک کا زکام لاحق ہو۔

سائی پلس ناگرا (Sinapis Nigra): حاد زکام' جس کے ساتھ چھینگیں آئیں' پانی بے' خارج ہو اور ناک اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ ناک میں خشکی ہو یا تیزابی مواد خارج ہو۔

آئیوڈیم (Iodium): ناک سے گاڑھا زردی مائل سبز مواد خارج ہو۔ اس سے جلن ہوتی ہے نیز گھٹیلن ہوتی ہے۔ جیسے ہی تکلیف شروع ہوتی ہے۔ مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے نیز بھوک لگتی ہے۔ ناک کی نالی میں سوزش ہو۔ قوت شامہ جاتی رہے۔ حلق اور ناک کی نالی کے بند ہو جانے کے باعث بہرا پن لاحق ہو۔ گلا بٹھ جاتا ہے۔ ناسلز کا مرض لاحق ہو۔ آرا چلنے کی آواز کا سانس تنفس ہونے کے ساتھ 'خشک' پھوٹی اور بھونکنے کی سی کھانسی۔ جلن ہو اور دم ٹھکے۔

کالی ہائیڈ (Kali Hyd): گاڑھا پیلا ہٹ مائل مواد خارج ہوتا ہے۔ ناک میں کچے پن اور جلن کے ساتھ گرم کمرے میں بہتری ہوتی ہے۔ بیرونی ناک دبانے سے بہت دکھتا ہے۔ تمام چہرے میں درد ہوتا ہے اور مرض انتہا درجے کا بے چین ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں چلنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جس سے وہ ٹھکنا نہیں ہے۔

کاجوپٹم (Cajuput): مسلسل تھوکنے کا راجحان' غلیظ بلغم کی بہت زیادہ مقدار تھوکے جسے مریض محسوس کرتا ہے کہ ناک کی نالی سے گلے میں گر رہا ہے۔

**نکس وامیکا (Nux Vom):** گرم کمرہ میں ناک کا بند ہو جانا۔  
**ناٹریک الیڈ (Nitric Acid):** شدید خارش اور ناک کے بند ہو جانے کے ساتھ ناک کا نزلہ۔ رات کے وقت ناک سے تیزابی پانی جیسا مواد خارج ہو۔ یہ مواد پٹا 'بدبودار' تیزابی ہوتا ہے جو بالائی ہونٹ پر سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ ہر موسم سرما میں زکام لاحق ہو۔ ابھی ایک زکام سے آرام ہوتا ہے کہ دوسرا لاحق ہو جاتا ہے۔

**کافیا (Coffea):** درد اور رونے کے رجحان کے بعد زکام لاحق ہو۔  
**سٹس کین (Cistus Can):** ناک کا مزمن نزلہ جس کے ساتھ متواتر اور شدید چھینکیں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے اتھری ہوتی ہے۔ پتھر کی طلب ہوتی ہے۔ باغی جھلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ گاڑھا زرد اور بدبودار بلغم ہوتا ہے۔ پرانا اور تکلیف دہ نزلہ لاحق ہو۔ کچا پن محسوس ہوتا ہے 'سینہ اور ناک خالی جانے کے بعد۔ اس کچا پن کو اس وقت آرام ہوتا ہے۔ جب ناک اور سینہ دوبارہ بلغم سے بھر جاتا ہے۔

**سیدیا (Sepia):** خشک زکام 'ناک میں دکھن ہو۔ ناک میں سوزش ہو اور ناک میں زخم (ناسور وغیرہ) ہوں۔ نیز کھرنڈ ہوتے ہیں۔ ڈاٹ دار 'لبے اور سبز مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ مریض شور مچاتی اور خوشبوؤں سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کی خوشبو سے منکلی ہوتی ہے۔  
**انٹیم ٹارٹ (Antim Tart):** سرد موسم کے دوران سینے کا نزلہ لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سفید بلغم ہوتا ہے اور شدید نقاہٹ ہوتی ہے۔ پلیند آتا ہے۔ ٹھنڈ لگتی ہے۔ چہرے پر پیلاہٹ اور نیلاہٹ ہوتی ہے۔

**ہیپیر سلف (Hepar Sul):** ناک 'کان' گلے 'طلق اور سینے کا نزلہ 'باغی جھلیاں بھی اس سے بہا نہیں ہوتیں۔ ناک چلنے کے ساتھ اور چھینکوں کے ساتھ زکام ہوتا ہے 'جب کہ مریض ٹھنڈی ہوا میں جاتا ہے۔ پانی کا سا مواد شروع میں ناک سے بہنا شروع ہوتا ہے اور آخر میں گاڑھا زرد 'بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ نکلنے وقت گلے میں درد ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گلے میں کرپیں بھری ہوئی ہیں۔ بستر سے قدم باہر نکالتے ہی تمام تکلیفات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**میڈورینم (Medorrhinum 200):** مندی قسم کا ناک کا نزلہ 'قوت شامہ کے جاتے رہنے کے ساتھ۔ ناک کا پیچھے والا حصہ بند ہو جاتا ہے۔ بلغم سفید اور پیلا ہوتا ہے۔ جب دیگر ادویات جن کی نشاندہی کی گئی ہے 'ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمائیں۔

**مرکیوریس سول (Mercurius Sol):** گاڑھا 'سبزی مائل' تیزابی 'متعفن مواد خارج ہونے کے ساتھ زکام کا لاحق ہونا۔ جس کے ساتھ ناک کی ہڈیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ناک سے خون



بہتا ہے اور خون آلود مواد خارج ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے اور دن میں بہتری ہوتی ہے۔

اورم آرسنک (Arum Ars): پرانے سخت قسم کے زکام کے لئے یہ سب سے زیادہ مفید دوا ہے۔ ناک کی ہڈیوں کا گھٹنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ زکام متواتر بنے والا بھی ہو سکتا ہے اور خشک بھی۔ خارج ہونے والا مادہ خون آلود، بدبدار، متعفن، سبزی مائل، پیپ دار، گاڑھا یا پانی کی طرح کا اور پتلا ہوتا ہے۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): خشک زکام جس کے باعث سانس منہ کے ذریعہ لینا پڑے۔

امونیا کارب (Ammonica Carb): خشک، بندش والا زکام، جو رات کے وقت ابتر ہو جاتا

لیفٹھے لین (Naphthaline): حاد زکام جس کے ساتھ چھیننے والا مواد متواتر خارج ہو نیز بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): سب سے زیادہ پریشان کن اور بہت دیر تک رہنے والا نزلہ۔ پرلے درجے کا سخت پرانا اور طویل مدت تک رہنے والا نزلہ جس کے ساتھ ناک کی ہڈیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ناک کی مکمل تباہی و بربادی۔ جب سواری کرے تو یقینی طور پر منہ کے ذریعہ سانس لینا پڑے۔

ایلن تھس جی (Ailanthus G): تلخ اور خراش دار، جلن والا زکام، جس جگہ لگتا ہے جلن پیدا کر دیتا ہے اور چھیل دیتا ہے۔ نحتوں میں دھکن پیدا کرتا ہے اور خراشیں ڈال دیتا ہے۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): آنکھوں، ناک اور گلے کا مزمن نزلہ۔ جس کے ساتھ سبز رنگ کا پیپ دار، بانی مواد خارج ہوتا ہے۔ جو بعض اوقات بہت زیادہ متعفن ہوتا ہے۔ معمولی ٹھنڈ سے زکام دوبارہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ناک سرخ ہو جاتا ہے اور سوج جاتا ہے۔ ہڈی میں سوراخ ہوں۔ آواز ناک سے آتی ہے یا آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ گرمی سے اور بستر کی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): کھلی ہوا میں ناک کھل جاتی ہے۔ جس کے ساتھ جلن اور درد سر ہوتا ہے جو کہ بہت شدید ہوتا ہے۔ گرم کمرے میں ناک بند ہو جاتی ہے۔ جب مریض ناک سے مواد خارج کرتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے جیسا کہ اخراج کے ساتھ درد سر بھی رفع ہو گیا ہے۔

کیڈمیم سلف (Cadmium): ناک کا نزلہ جو کہ اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے کہ ہڈیوں کے کھٹے

سڑنے کے باعث ناک کی ہڈیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کا ٹاسور 'ہڈیوں میں درد ہو' چھینکیں  
آئیں 'زکام ہو۔ آبلے ہوں اور پھوڑے پھنسیاں ہوں۔

برومیم (Bromium): حاد زکام 'چھینکوں اور ناک کے اندر جلن کے ساتھ نیز ٹھنڈی ہوا میں  
سانس لینے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ناک سے خون بہتا ہے۔ ناک میں ٹاسور ہوتا ہے۔  
جون 'جولائی کے نزلہ وغیرہ میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ گرم موسم کے زکام کے لئے یہ مفید دوا  
ہے۔

الیومن (Alumen): زکام کا رجحان جو گلے میں جگہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان لوگوں میں یہ  
مرض ہوتا ہے جنہیں زکام ہونے کی عادت ہو نیز جن کے ٹانسوز بڑھے ہوئے ہوں اور سخت  
ہوں۔

باسم بیرو (Balsamum): سانس کی نالیوں کا نزلہ جس کے ساتھ پیپ دار بلغم افراط کے  
ساتھ خارج ہوتی ہے۔ نقابت ہوتی ہے 'سرخ نقار ہوتا ہے۔

سنا (Senna): بار بار کی چھینکیں ہوں۔ جن کے باعث حرارت ہوتی ہے۔ خصوصاً ہاتھوں میں  
تھکوت ہوتی ہے اور تنفس میں دقت ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): مسلسل نزلاوی حالت 'ناک اور گلا خشک ہوتا ہے اور بندش ہوتی ہے۔  
آنکھوں کے اوپر پیشانی میں درد ہوتا ہے۔ ناک میں لمبے 'سبزیدار چھلکے ہوتے ہیں۔ مزمن  
نزلہ ہوتا ہے۔ بصارت 'دھندلا جاتی ہے۔ جیسا کہ دھند میں سے دیکھ رہا ہو۔

### تپ کاہی — (Hay Fever)

(نیز دیکھئے "زکام")

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): تپ کاہی کا علاج اس دوا سے شروع کرنا ہمیشہ سے مفید ہوتا  
ہے۔ یہ مرض کے حملے کو توڑ دیتی ہے اور بعض اوقات بالکل ہی تندرست کر دیتی ہے۔ یہ دوا  
پندرہ روز میں صرف ایک خوراک دینی چاہئے۔ اس طرح سے صرف چار خوراکیں دی جائیں  
اور پھر ہر چھ ماہ کے بعد ہی صرف اسے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تقریباً دو سال تک  
ایسا کرنا چاہئے۔ خوراک 200 ڈائی یوشن ہے۔

سورینم (Psorinum): یہ دوا ایسے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ جو سردی سے حساس ہوتے  
ہیں۔ 200 ڈائی یوشن کی ایک خوراک عمل انگیز دوا کے طور پر دی جائے 'دیگر نشاندہی کی گئی  
دواؤں کے ساتھ۔

سبادیلا (Sabadilla): متواتر بننے والے زکام اور شدید چھینکوں کے لئے۔ جن کے متعلق

مریض نہیں جانتا کہ ان کا اختتام کب ہو گا۔ ٹھنڈ سے ابتری ہو۔ تپ کھلی کی دسے والی صورت۔

سٹیکٹا پلمونیریا (Sticta Pulmonaria): جب ورم زرخہ (بروٹکائینس) کا رجحان بھی ہو۔  
سکیم 3x (Succinum 3x): ایک یا دو گرین دوا 12 چائے کے چمچوں میں حل کر لیں اور ایک چائے کا چمچ ہر دو گھنٹے کے بعد لیا جائے۔

آرسنک آئیوڈ (Ars. Iod): متواتر چھینکیں اور پانی کی طرح کا مواد ناک سے افراط کے ساتھ خارج ہو۔ جو بالائی ہونٹ کو جلانے پانی کی طرح کا جلانے والا مواد آنکھوں سے خارج ہو جیسا کہ آرسنک البم میں ہوتا ہے۔ لیکن آرسنک البم کے مریض گرم اشیاء لگانے سے بہتر ہوتے ہیں اور گرم پانی ناک میں کھینچنے سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ آرسنک آئیوڈ کے مریض گرم کمرے میں ابتر ہوتے ہیں اور کھلی ہوا میں اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتر ہوتے ہیں۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): پتلا پانی جیسا مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بیجان ہوتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں۔ بے چینی ہوتی ہے۔

کورنیکو کالی سلف (Chornico Kali Sul): متواتر چھینکوں کے ساتھ 'پانی بننے کے ساتھ' پانی کا سا ٹنم خارج ہونے کے ساتھ 'ناک سرخ ہو جانے کے ساتھ' بعض اوقات ورم زرخہ والے دمہ کے ساتھ۔ تپ کھلی لاحق ہو۔

مرک کالی آئیوڈ (Merc. Kali Iod): چھینکوں 'کھانسی اور آنکھوں سے پانی بننے کے ساتھ ناک سے پانی جیسے بلغم کا سیلان ہوتا ہے۔

سناپس نائیگرا (Sinapis Nigra): تپ کھلی جس کے ساتھ زکام 'چھینکوں کا آنا اور پانی کا بہنا ہوتا ہے نیز آنکھوں میں خارش اور جلن ہوتی ہے۔ ناک کی خشکی یا تیزابی اخراج ہو۔

کاربووج (Carboveg): بیجان کے ساتھ جو بڑھ کر چھاتی تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کے ساتھ آواز بیٹھ جاتی ہے اور کچا پن ہوتا ہے۔ پانی کا سامادہ ناک سے خارج ہوتا ہے۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): جب ناک سے چھیلنے والا مواد خارج ہو جبکہ آنکھوں سے سادہ اور نرم مواد خارج ہو۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ حنجرہ میں یا حنجرہ سے نیچے 'آنکڑے پھنسنے ہوئے ہوں۔ یہ بھی گرم کمرے میں ابتر ہو جاتا ہے۔

لیفٹھالین (Naphthaline): تپ کھلی کو روکنے اور دور کرنے کے لئے تقریباً یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ آنکھوں اور ناک سے چھیلنے والا مواد خارج ہو۔ آنکھوں کے پونے سو بچے ہوں۔ دمہ کا رجحان ہو۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں سے 'کھن سے' جانوروں کے گوشت سے اور مچھلی وغیرہ سے

الرجی کے باعث تپ کاہی یا دمہ لاحق ہو۔ جب اچھی منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پروں سے یا پروں والے نکیہ سے تپ کاہی لاحق ہو۔

سپیا (Sepia): صبح کی چھینکیں بستر میں آتی ہیں۔ ابر آورد موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ رفاقت کے وقت یا جب ہمدردی ظاہر کی جائے تو ابتری ہو۔ رشتوں سے بے تعلقی ہو جائے۔ مریض باصول ہوتا ہے۔ اسے پیاس نہیں لگتی۔ سردی سے ابتری ہوتی ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔ چہرہ زردی مائل ہوتا ہے۔

یوفرزیا (Euphrasia): آنکھوں سے جلن دار مواد باقراط خارج ہو اور ناک سے سادہ نرم مواد خارج ہو۔

آئیڈیم (Iodum): ناک سے گاڑھا زردی مائل سبز مواد خارج ہوتا ہے۔ یہ جلن اور چھین پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی تکلیفات کا آغاز ہوتا ہے۔ مریض فوری طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تپ کاہی کی دسے والی صورت۔

سینگونی نیریا (Sanguinaria): پھولوں کو سونگھنے اور خوشبوؤں سے تپ کاہی لاحق ہو۔ مریض پھولوں سے حساس ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں، مریض انہیں بستر سے باہر ہی رکھتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): زکام کے ساتھ یا زکام کے بغیر چھینکیں آئیں۔ آغاز میں گاڑھا بھم ناک سے خارج ہو اور بعد میں پتلا مواد خارج ہو۔ خارش ہو، چھاتی کی ہڈیوں میں تیز باریک پچاسیں چھین، سینہ میں تنگی ہو۔

کلکیریا فاس (Calcareo Phos): زکام کے بغیر چھینکیں۔

کالی ہائیڈ (Kali Hyd): گاڑھا زردی مائل مواد خارج ہو، گرم کمرے میں کچے پن اور ناک میں جلن کے ساتھ ابتری ہوتی ہے۔ ناک کی بیرونی سطح دبانے سے بہت زیادہ دکھتی ہے۔ تمام چہرے میں درد ہوتا ہے اور مریض انتہا درجہ کا بے چین ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں چلنا چاہتا ہے جو اسے بالکل بھی نہیں تھکاتا، تپ کاہی کی دمہ والی صورت۔

اوزینا (Ozena)

(یہ دیکھئے ”آتشک“)

(ناک کا مزمن مرض جس میں متعفن مواد کا اخراج ہوتا ہے جو کہ ناک کے ناسور یا ناک کی ہڈیوں کے گلنے سڑنے پر منحصر ہو۔)

اورم میٹ (Aurum Met): یہ رہنما کن دوا ہے 'عضلات و ریشوں کی گہری تباہی چڑ پکڑ جاتی ہے' ناک کی ہڈی کا گلنا سونا، متعفن مواد خارج ہوتا ہے 'سورخ کرنے والے یا کھودنے والے درد ہوں' رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

اورم آر سٹیکلم (Aurum Ars): ناک کی بندش اور خارش کے ساتھ مرض "اوزینا" لاحق ہو 'ناک کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے' جلن دار اور کھودنے والا درد 'ناسوری درد' متواتر چھینگیں 'ناک سوجی ہوئی ہو۔

ہیپوزائی نیچم (Hippozaenium): یہ دوا ناک کی کڑی ہڈی کے ناسور میں جھٹا ہونے والے مزمن کیسوں کی نشاندہی کرتی ہے 'نیز ہڈیوں کا ناسور ناک کی درمیانی ہڈی کو تنگا کرتا ہے اور تالو کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔

تھوجا (Thuja): سبزی مائل پیلے مواد کے اخراج کے ساتھ اوزینا لاحق ہو۔

مرک کار (Merc Cor): ناک میں ناسور ہو 'چھیلنے والا مواد خارج ہو' خصوصاً ناک سے گاڑھا چھیلنے والا مواد خارج ہوتا ہے 'جس کے ساتھ بیش جلن دار درد ہوتا ہے۔

مرک ویر (Merc Vir): ہڈیوں میں دکھن کے ساتھ۔

مزریم (Mezerium): ناک اور چہرے کی ہڈیوں میں جلن دار درد کے ساتھ۔

پٹرولیم (Petroleum): ناک کے پتنگھوں میں کھرٹڑ بنتے ہیں اور چہرے آتے ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): زرد رنگ کا سادہ مواد خارج ہونے کے ساتھ شام ہوتے ہوتے اتری ہو۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): خون آلود 'بافراط مواد خارج ہونے کے ساتھ ناسور ہونے کے رجحان کے ساتھ۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): گاڑھا 'پہیپ دار' متعفن مواد خارج ہونے کے ساتھ ناک کی جڑ میں سوجن اور زخم ہونے کے ساتھ۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): عمل انگیز دوا کے طور پر دی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض اوقات مرض کی بنیاد ناک کی ٹی بی پر ہوتی ہے۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): آشکی مزمن "اوزینا" ناک کی ہڈیاں گلتی مڑتی ہیں جس کے باعث ناک چھٹی ہو جاتی ہے 'سبز رنگ کا مادہ بافراط خارج ہوتا ہے۔

ناک کی رسولی (Polypus)

لیمنا مینر (Lemna Minor): ناک کی رسولی کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ 1x ذاتی یوشن

دیتے۔

ٹیوکریم (Teucrium): پہلو پر لیٹنے سے ناک بند ہو جانے کے ساتھ۔  
سنگوئی نیریا سی (Sanguinaria C): جب یہ مرض حلی کے ساتھ درد سر کے ہمراہ ہو۔  
تھوجا (Thuja): ناک کی نالی میں سوزش کے ساتھ ناک کی رسولی گندی ہو آتی ہے، قوت  
 شامہ کے کھوجانے کے ساتھ ناک سے سبزی مائل پتلا مواد خارج ہوتا ہے۔  
کلکیریا کارب، نائیٹرک ایسڈ (Calcarea Carb, Nitric Acid): یہ دونوں دوائیں  
 بھی ناک کی رسولی کے لئے مفید ہیں۔  
الیومن (Alumen): دائیں جانب کی ناک کی رسولی۔

### ناک کی نالی کا پھوڑا (Sinus)

کالی ہائی، سیلیشا (Kali Bi, Silicea): سیلیشا 200 طاقت کی خوراک ہر پندرہ روز کے بعد  
 دیتے اور یہ دوا دینے سے دو دن پہلے اور دو دن بعد تک کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ بیچ  
 والے وقفہ کے دوران کالی ہائی 30 طاقت کی خوراک روزانہ چار مرتبہ ہر چار گھنٹے کے بعد دی  
 جائے۔

آئیوڈیم (Iodium): ناک کی نالی کا پھوڑا، گولی لگتے جیسے اور ہتھوڑا لگنے جیسے درد سر کے  
 ساتھ، نیز یہ درد نچلے جڑے میں بھی ہوتے ہیں۔ خصوصاً نزلے کے حملے کے دوران یہ درد  
 ہوتے ہیں۔ آگے کو جھٹکنے سے ابتری ہوتی ہے، یہ دائیں جانب کے سر، کان اور نچلے جڑے کو  
 متاثر کرتے ہیں۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): ناک کی نالی میں پھاڑنے والا یا جھٹکنے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ کھودنے  
 والا اور درد کرنے والا زکام بار بار لاحق ہوتا ہے۔ ناک سرخ اور نرم آلود ہوتا ہے۔ گاڑھا، سبز  
 اور بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔

### بو (متعفن) — Smell (Fetid)

اناکارڈیم (Anacardium): سونگھنے کی حس غلط ہو جاتی ہے۔

سیلیشا (Silicea): ناک کے نزلہ میں۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulp): پرانے پتھر کی الرج کی بو محسوس ہوتی ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): حلق کے نزلہ و زکام میں۔ پرانے زکام میں۔

کالی ہائی (Kali Bi): سخت گندی بو محسوس ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پانی کا سا مواد ناک سے

ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب ناک چھیکا جائے تو گندی بو آتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): گندی بوؤں کا شکار، سانس گندا، پانخانہ شدید متعفن بو والا ہوتا ہے۔  
 اعضائے تناسل کی گندی بو جسے کمرے میں مریض کے کپڑوں کی بو کی بجائے سونگھا جاسکتا ہے۔  
 تمام خارج ہونے والے ماوے متعفن اور پھیلنے والے ہوتے ہیں۔ جن سے سخت بدبوئیں آتی ہیں۔ باوجود دھونے کے مریض کی بغلوں سے تیز چپٹنے والی بو آتی ہے۔

### قوت شامہ (دھیمی یا کھو جائے)

#### Smell (Diminished or Lost)

الیومنا (Alumina): حس شامہ گھٹ جائے۔ متواتر زکام ہو، ناک کی ٹوک چر جائے۔ نتھنے دھکیں اور سرخ ہوں۔ پھونکنے سے ابتری ہو۔ گاڑھے پیلے مواد کے ساتھ کھرنڈ جھتے ہیں۔  
اورم میٹ (Aurum Met): دہنی ہوئی آتشک کے باعث ناک کی بدوضعی کی وجہ سے حس شامہ جاتی رہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ٹائیفائیڈ بخار میں سونگھنے کی حس مدہم پڑ جائے۔

مزیریم (Mezerium): ناک کی خشکی کے باعث حس شامہ کمزور ہو۔

مرک کور (Merc Cor): گلا خراب ہونے کے ساتھ حس شامہ میں کمزوری۔

پلساٹیل (Pulsatilla): نزلہ کے باعث حس شامہ جاتی رہے۔

نیٹرم میور (Natrur Mur): گاڑھے مواد میں اگر پلساٹیل ناکام ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

کیوپرم میٹ (Cup Met): ناک کی آگے کی ٹالی کے نزلہ و زکام میں۔

ایلیپس (Elaps): ناک کی جھلی کی مزمن سوزش میں، اوزینا میں۔

تھوجا (Thuja): ناک کی ٹالی کی سوزش جس کے ساتھ ناک سے سبزی مائل بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ قوت شامہ جاتی رہتی ہے اور ٹھنڈ سے الرجی ہوتی ہے۔

بنیزوئیک ایسڈ (Benzoic Acid): حس شامہ مدہم پڑ جاتی ہے۔ بو درست نہیں ہوتی، بہت زیادہ گاڑھا پیشاب، انتہائی گندی بو کے ساتھ۔

کالی آیوڈیم (Kali lodatum): سونگھنے کی حس نہ رہے۔ یوں محسوس ہو کہ کوئی کیزا ناک کی جڑ میں رینگ رہا ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): نزلہ کے بعد سونگھنے کی حس اور ذائقہ کی حس کھو جائے۔

## بو کی حساسیت — Smell (Hypersensitive)

گریفائٹس (Graphites): پھولوں سے بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے 'بو بہت تیز آتی

کاچیکم (Colchicum): خوراک سے حساسیت ہوتی ہے 'خوراک کی خوشبو سے آپے میں نہ رہے۔ انڈوں کی خوشبو سے مٹلی اور تے ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): تمباکو سے حساسیت ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): زیادہ حساسیت کے لئے یہ ایک عمومی عمل انگیز دوا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): تیز خوشبوؤں سے کھانسی لاحق ہو۔ پھولوں کی خوشبو سے بے ہوشی ہو جائے۔

سیپا (Sepia): کھانا پکانے کی خوشبو سے مٹلی ہوتی ہے۔

سلفر ایسڈ (Sulphur Acid): کافی کی خوشبو سے زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): پھولوں کی خوشبو سے چکر آتے ہیں۔

## بو کا وہم — Smell (Illusion of)

سلفر (Sulphur): بو کے وہم والے مرض کا علاج اس دوا سے شروع کیا جائے۔ اگر یہ دوا کام نہ کرے تو نیچے دی گئی ادویات ان کی علامات کے لحاظ سے استعمال کی جائیں۔

گریفائٹس (Graphites): جلتے ہوئے بالوں کی بو کا وہم۔

اناکارڈیم (Anacardium): جلتے ہوئے اسفنج کی بو کا اور مرغیوں کی بیٹوں کا وہم۔

کروٹن ٹک (Croton Tig): پاخانے کی بو کا وہم۔

چائنا (China): لاش کی بو کا وہم۔

بیلادونا (Belladonna): سڑے ہوئے انڈوں کی بو کا وہم نیز مچھلی کے چورے کی بو کا وہم۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پرانے متعفن نزلہ کی بو کا وہم۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): کھانک کی بو کا وہم۔

یوفوربیم (Euphorbium): چوہے کی بو کا وہم۔

سینی کولا (Sanicula): بچے کے اعضائے ناسل سے مچھلی کے چورے کی بو آنے کا وہم۔

بچے کے اعضاء سے نسلانے کے باوجود مچھلی کے چورے کی بو آئے۔



چھینکیں — (Sneezing)

(دیکھئے ”تپ کاہی“)

خراٹے — (Snoring)

لیمنا مائنر (Lemna Minor): ناک بند ہو جانے کے باعث مریض خراٹے لے۔ ناک کی ہڈیوں کا لمبا ہو جانا۔

ہیپوزائیم (Hippozaenium): ناک کی سوجن اور ناک کے سرخ ہو جانے کے ساتھ خراٹے ہوں۔ نیز اس کے ساتھ ضدی قسم کا نزلہ بھی ہوتا ہے۔ ناک کی کڑی ہڈی تنگی ہو جائے۔ ریزہ کی ہڈی کا ناسور یا اس کا بڑھ جانا۔

اوپیم (Opium): دمہ میں خراٹے ہوں۔ مرگی میں، غشی میں، زہکی کے تشنج میں، خراٹے ہوتے ہیں۔ مریض کھلے منہ کے ساتھ خراٹے لیتا ہے۔ سینے میں اجتماع خون کے ساتھ خراٹوں کا آنا۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): بے قاعدہ قسم کے دروزہ کے ساتھ تشنج کے بعد خراٹے۔

دھبے (ناک پر) — (Spots)

سلفر (Sulphur): ناک پر بھورے اور سیاہ دھبے ہوں۔

سیپیا (Sepia): ناک پر پچیلی ہوئی پیلے رنگ کی کاٹھی۔

حصہ دوم — گلا (حلق)

دم گھٹنا — (Choking)

(نیز دیکھئے ”ضیق النفسی“ اور ”گھلے کی دکھن“)

کیمومیلہ (Chamomilla): جب مریض محسوس کرے کہ کوئی چیز گھلے کی جانب اوپر کو چڑھ رہی ہے جس سے اس کا گلاب کر دم گھٹ جائے گا۔

سپائیگیلیا (Spigelia): ناک کے پچیلی جانب کی ٹالی سے افراط کے ساتھ بلغم آنے کے باعث دم گھٹنا۔

لیکس (Lachesis): یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اس سے اس کا دم گھٹ جاتی گا۔ صبح کو جاگنے پر اتھری ہو۔ دورے والا دم گھٹنے کا مرض، گرم سیال

مادہ نگنے سے دم گھٹنے، گرم چائے نگنے سے یا گرم مشروبات نگنے سے دم گھٹتا ہے۔  
 میسٹیکس (Cactus): دل کی تکالیف کے ساتھ دم کا گھٹنا۔

میفاٹیس (Mephites): دم گھٹنے جبکہ مریض کھا رہا ہو یا پی رہا ہو۔  
 ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): یوں محسوس ہوتا ہے کہ کھانے کے دوران ایک لقمہ حلق کے ساتھ چپک گیا ہے۔ جس کے باعث حلق میں انقباض محسوس ہو۔ دم گھٹنا، گھٹنا بہت مشکل ہو، چہرے کو بگاڑ دے اور سر کو نیچے کو گرا دے۔

سکیوٹاوائروسا (Cicuta Vir): ہڈی کا کوئی ٹوکیلا کلزا نگل لینے کے بعد یا حلق کے کسی دوسرے زخم کے باعث حلق بند ہو جاتا ہے اور گلا دبے اور دم گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔  
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phas): دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ دوروں والا انقباض حلق۔ پہلے ٹانسز بڑھ جاتے ہیں اور پھر تالو کی سرخی ظاہر ہوتی ہے۔ خشکی ہوتی ہے اور نگنے میں دقت ہوتی ہے۔

میڈوررینم (Medorrhinum): سانس کی نالی کے تشنج کے ساتھ جھڑے میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے۔ سانس خارج کرنا مشکل ہوتا ہے البتہ سانس اندر کو کھینچنا آسان ہوتا ہے۔  
 برومین (Bromine): سانس کی نالی کا تشنج یا انقباض۔

## کروپ کھانسی (غیر خنثی)

Croup (Non Diphtherie)

(نیز دیکھئے "ورم جھڑے")

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): یہ دوا مرض کے آغاز میں دی جائے۔ گلا میں درد ہوتا ہے اور نگنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بھاری آواز والی، خشک، گہری، بھونکنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ تیز بخار ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ مریض خوف زدہ ہوتا ہے۔ حلق اور گلے میں جلن ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے جسے بہت مشکل سے نگلا جاتا ہے۔

سپونجیا (Spongia): ورم جھڑے کے ساتھ بیٹھی ہوئی آواز والی کروپ کھانسی، کھانسی کی آواز ایسی ہوتی ہے جسے لکڑی کو کسی آگ سے کاٹا جا رہا ہو۔

کالی بایک (Kali Bich): ضیق، تنفس، بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ کھردری کھانسی۔ سانس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی دھات کی ٹلی میں ہوا گزر رہی ہو۔

بیلادونا (Belladonna): جب بھونکنے والی کھانسی ہو (کھانسی کی آواز ایسی ہوتی ہے) جیسے کتے کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے (اور کھانستے وقت ہنرہ سرخ ہو جاتا ہے)۔ جلد گرم اور خشک ہوتی

ہے۔ نبض بھرپور تیز ہوتی ہے۔ ٹانسز ورم دار اور سرخ ہوتے ہیں۔  
 سینٹوکائی نیریاسی (Sanguinaria C): جب حنجرہ میں جلن اور خشکی ہو۔ سٹی دار آواز کے  
 ساتھ، بیٹھی ہوئی آواز والی کروپ کھانسی ہوتی ہے۔  
 ہیمپیر سلف (Hepar Sulphur): کروپ کھانسی اور ورم حنجرہ کے متواتر حملے جن کی وجہ  
 ٹھنڈی ہوا میں کپڑے اتارنا ہو۔ بیٹھی ہوئی آواز والی، خشک، بھونکنے والی کھانسی ہوتی ہے، تنفس  
 کی آواز سٹی دار ہوتی ہے۔ کھڑکھڑاہٹ والی اور دم گھٹنے والی کھانسی، صبح کے وقت بہتری ہوتی  
 ہے۔ بچہ کا دم کھانسی کے دورے کے دوران گھٹتا ہے۔  
 فاسفورس (Phosphorus): جبکہ آواز مستقل بیٹھی رہے اور مرض کے عود کر آنے کے  
 آثار ظاہر ہوں۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): چہرہ ٹھنڈا نیلاہٹ مائل اور ٹھنڈے پینے سے بھرا ہوتا ہے۔  
 نبض آہستہ چلتی ہے۔ آواز بالکل نہیں نکلتی۔ تنفس آرا چلنے کی سی آواز والا ہوتا ہے۔ نیز  
 سانس کی آواز میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سانس کی ہوا خارج نہ  
 ہونے والے ٹنم میں سے ہو کر آ رہی ہو۔

سمبوکس (Sambucus): آدمی رات کو ہونے والے کروپ کھانسی کے شدید دورے۔  
 نر خرے والی، مرے کی آواز والی اور دم گھونٹنے والی کھانسی۔  
 لیکسیس (Lachesis): سرخ، نیلا، گہرا، سیاہی مائل گلے کا زخم (تاسور)، نفوس اشیاء کی  
 نسبت خالی تھوک لگنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ حنجرہ کو پھونکنے سے درد ہوتا ہے۔ بہت زیادہ  
 نفاہت ہوتی ہے۔

### خناق — (Diphtheria)

لیکسیس (Lachesis): ناک سے پتلا مواد خارج ہوتا ہے جو کہ تیزابی ہوتا ہے۔ گلا گہرا  
 سرخ، گہرا، بھورا، نیلاہٹ مائل جھلک والا ہوتا ہے۔ گلے کی جھلی زیادہ تر بائیں جانب سے متاثر  
 ہوتی ہے اور پھر مرض کا اثر دائیں جانب کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ گردن کے حدود سوج جاتے ہیں۔  
 اونگھ آتی ہے اور نبض باریک ہو جاتی ہے۔ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سونے کے بعد  
 بہتری ہوتی ہے۔ مانتحات اور تھوک لگنے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ 200 طاقت ڈائی لیوشن  
 کی خوراک ہر دو گھنٹے کے بعد دیجئے۔

لیک کینیم (Lac Canium): لیکسیس کے برعکس اس میں اطراف تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔  
 ایک جانب سے مرض شروع ہوتا ہے۔ متواتر بائیں جانب رہتا ہے پھر دکن اور سوزش اچانک

مخالف جانب کو تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر چند گھنٹوں کے بعد واپس نکتہ آغاز پر لوٹ آتی ہے۔  
جملی سبزی مائل، پیلی اور دسی کی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر ناسور بن چکے ہوں تو وہ چاندی کے شیشے  
کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ گھافالچ سے متاثر ہو جانا ہی چنانچہ جو مائعات پئے جاتے ہیں۔ واپس  
ناک کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): گلے کی سوزشی کیفیت، درد سر اور اینٹھن کے ساتھ شدید چکن والا  
درد ہوتا ہے۔

کروٹیل (Crotalus): جب ناک سے خون مستقل بہتا ہو۔ جوف دہن کی باقی مہلیوں  
سے رس رس کر خون ناک اور منہ کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔

ناجا (Naja): جب حملہ حنجرہ پر ہوا ہو۔ مریض دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ گھافالچ لیتا ہے۔  
سانس متعفن ہوتا ہے اور کھانسی بیٹھی ہوئی آواز والی چھوٹی ہوتی ہے۔ کچے پن کا احساس حنجرہ  
میں یا اوپر والے حصہ میں ہونے کے ساتھ۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): 4 سے 8 بجے شام سے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دائیں  
جانب سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ بچہ خوف کے ساتھ، فصد کے ساتھ یا ناراضگی کے ساتھ  
غیند سے جاگ جاتا ہے۔ ناک کے تھنوں کے پتھروں کی سی حرکت اس مرض کی نمایاں ترین  
علامت ہے۔ گلے میں خشکی کا احساس پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز گلے سے نیچے نہیں اترتی۔  
خوراک اور مشروبات ناک کے ذریعہ واپس باہر آ جاتے ہیں۔

ایپس (Apis): جب گلے میں سوزش ہو۔ ڈنگ لگنے جیسے درد کے ساتھ یا تو یہ شدید ہو سکتی  
ہے یا پھر یہ بغیر درد کے ہو سکتی ہے۔ گرمی سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کے کناروں پر  
آبلے ہوتے ہیں۔ غنودگی اور افسردگی ہوتی ہے۔ حلق کا کوا بڑھ جاتا ہے۔ اعضاء پھولے  
ہوئے، شیشے کی مانند، چمک دار سرخ ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت کم آتا ہے۔ آنکھوں میں پھیلاوٹ  
(سوجن) ہوتی ہے۔

کاربالک ایسڈ (Carbolic Acid): حنجرہ بخار کے ساتھ، بہت زیادہ جلن ہوتی ہے لیکن حلق  
میں درد نہیں ہوتا جو کہ آگ کی طرح کا سرخ ہوتا ہے اور ڈھیریا (خلاق) قطعات سے ڈھکا ہوتا  
ہے۔ نبض انتہاء درجہ کی تیز ہوتی ہے۔

مرک سائی نیٹس (Merc Cyanatus): بہت برے جان لیوا کیسوں میں یہ دوا استعمال  
ہوتی ہے۔ اچانک حملے کے ساتھ خلاق لاحق ہو۔ انتہاء درجہ کی نقاہت اور خوف زدہ کر دینے والا  
ضعف (دھڑن تختہ)، پھوٹی تیز اور بے ترتیب نبض، جملی سبزی مائل ہوتی ہے اور ناک تک  
پھیل جاتی ہے اور ایک طویل سطح کو متاثر کرتی ہے۔ IM کی صرف ایک خوراک دیجئے یا CM

ڈائی لیوشن دیجئے۔

برومیم (Bromium): زیادہ گرمی لگ جانے کے باعث یا بچے کو موسم سرما میں یا زات کے وقت کپینے کے باعث خناق لاحق ہو۔

ڈیپتھیرینم (Diphtherinum): عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے۔ 200 طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ انتہا درجہ کی کمزوری کے ساتھ ناک سے خون کا اخراج ہو۔ تقریباً آغاز ہی میں انتہا درجہ کی نفاہت ہو جاتی ہے۔ نبض کمزور ہوتی ہے اور تیز چلتی ہے۔ قوت حیات کا رد عمل کمزور ہوتا ہے۔ لگنا بغیر درد کے ہوتا ہے لیکن مانتات تے ہو جاتے ہیں یا ناک کے راستہ واپس باہر آ جاتے ہیں۔ سانس اور مادوں کا اخراج بہت متعفن ہوتا ہے۔

فائی ٹولا کا (Phytolacca): جب نکلنے وقت درد گلے سے کان تک مار کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جب کچھ لگلا جائے۔ جلن ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی کوئلہ رکھا ہو یا آگ ہو یا گرم سرخ لوہا ہو۔ خشکی ہوتی ہے۔ نکلنے میں دقت ہوتی ہے۔ ہاتھوں میں رعشہ ہونے کے ساتھ 'گلے میں ڈھیلا اٹکا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نکلنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ گرمی سرخ، نیلی یا راکھ کے رنگ والی جھلی ہوتی ہے۔ گرم مانتات نہیں پی سکتا۔

جلیسی میم (Gelsemium): خناقِ قلع کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ تکلیف کہیں بھی ہو یہ دوا استعمال کی جاسکتی ہے۔ خناق کے نتیجہ میں جھگرہ کا قلع۔

اورم ٹرائی ٹیلیم (Arum Triph): حلق اور منہ کی جلن، خشکی اور کچا پن ہوتا ہے۔ تیزابی مواد کے اخراج کے ساتھ جو ناک سے ہوتا ہے اور جو قھنوں کو اور بالائی ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔

کینتھرس (Cantharis): یہ دوا نشاندہی کرتی ہے اس مرض کی جس میں پیشاب متواتر آتا ہے اور جس سے پسلے دوران اور آخر میں پھیلن (جلن) ہوتی ہے۔ پیشاب میں ایلیومن خون اور / یا چھلکے ہوتے ہیں۔

کالی بانیک (Kali Bich): اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے ایسے ڈیپتھیریا کے لئے جس میں چھینے والے وقفہ دار درد ہوتے ہیں اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ہر مرتبہ چھوٹی جگہ تک محدود ہوتے ہیں۔ زبان پر گاڑھا پیلاہٹ مائل بھورا پشیم کا سامع ہوتا ہے۔ حلق کا کوا ڈھیلا ہوتا ہے 'گلے میں ذات کے احساس کے ساتھ۔

میورٹیک ایسڈ (Muriatic Acid): حلق کی پھیلی ہوئی گرمی سرخی، حلق کا کوا سو جا ہوا ہو۔ ٹائٹلز بھی متورم ہوتے ہیں۔ نکلنے کی نااہلیت ہوتی ہے۔ آواز ٹنسی ہوئی ہوتی ہے۔ نچلے جڑے کے غدد سو جے ہوتے ہیں۔ گمرا سزا ہوا خون ناک سے خارج ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بخار

میں ہوتا لیکن بہت زیادہ نقابت ہوتی ہے۔  
 نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): کھانا اور پینا عملاً ناممکن ہوتا ہے۔ حلق کا کوارسنے والے مواد سے چسپا ہوتا ہے۔ جہن ہوتی ہے۔ جیسے کہ نوک دار لکڑی سے، شیشے کے گڑے سے یا گرم تار سے ہو۔ تھوک آتا ہے، بخار ہوتا ہے۔ نقابت ہوتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے۔ پیشاب کی بہت تیز ہوتی ہے جیسا کہ گھوڑے کے پیشاب کی ہوتی ہے۔

### آواز کا بیٹھ جانا (حاد) — Hoarsness (Acute)

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): بے تحاشہ بولنے کے باعث آواز کا بیٹھ جانا جیسا کہ مبلغین حضرات گلوں اور مقررین میں ہوتا ہے۔

آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): تھکاوٹ اور ٹھنڈ لگ جانے کے باعث۔ عوام الناس کے ساتھ باتیں کرنے والوں (بیان کرنے والوں) میں، نیلامی کی بولی لینے والوں میں، اداکاروں اور گلوکاروں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ جنہیں تقریبات میں اس قسم کا کام (کرتب) پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہی جھوٹے سے انہیں ٹھنڈ لگ رہ جاتی ہے اور گلا بیٹھ جاتا ہے جسے اس دوا سے فوری افادہ ہوتا ہے۔

سپونجیا (Spongia): جیسا آرم ٹرائی قلم میں ہوتا ہے۔ حنفیہ حساس ہو جاتا ہے اور ٹکٹا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان علامات کے ساتھ سپونجیا اور آرم ٹرائی قلم ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ ہوا گئے سے آواز جاتی رہے۔

جلسی میم (Gelsemium): جب ہشیر یا کسی دوسرے مرض کے ساتھ حنفیہ کا مکمل فالج لاحق ہو۔ گلے کا اعصابی طور پر بیٹھ جانا، حیض کے عرصہ کے دوران آواز کا جاتے رہنا۔

پلمبم (Plumbum): جب جلسی میم ناکام ہو جائے یا کاسٹیکم زیادہ مدد نہ کرے تو اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ آواز کی ٹالی کے فالج کے باعث، آواز بیٹھ جانے کے پرانے کیسوں میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): حلق میں اجتماع خون کے باعث، گمڈ آوازیں نکلتی ہیں، درد کے ساتھ۔

کاسٹیکم (Causticum): آواز والی ٹالی کی کمزوری کے باعث، گلا بیٹھنے میں صبح کے وقت ابتری ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): سوزش اور ہلیم کا اثر دہام جو کہ آواز میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گہرا آواز کے باعث آواز کا جاتے رہنا۔ چیچا پینہ یا افراط ہونے کے ساتھ آواز کا کھو جانا،

جس کے ساتھ جلد کا بہت تیزی والا بھجان ہو۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ گلے کا بیٹھنا شام کے وقت ابتر ہوتا ہے۔

ریومکس (Rumex): سخت چپکنے والے بلغم کے اجتماع اور حنجرہ کی مسلسل پھیلنے کے باعث۔

برومیم (Bromium): ضرورت سے زیادہ گرمی کے باعث۔

مرک سول (Merc Sol): یہ دوا گلا بیٹھ جانے کے لئے مخصوص دوا ہے۔

ایپیکاک (Ipecac): زکام کے باعث آواز کا مکمل طور پر بیٹھ جانا یا آواز والی ٹالی میں اجتماع خون کے باعث۔

بریشا آئیوڈ (Baryta lod): حنجرہ میں رکاوٹ یا کسی چیز کے اگنے کے باعث آواز بیٹھ جائے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): گرمی میں جسم کھولنے کے باعث آواز بیٹھ جائے۔

اگنیشیا (Ignatia): ہسٹریائی کیسوں میں گلا بیٹھ جائے۔

کالی میور (Kali Mur): (ٹھنڈا) زکام کے باعث آواز کا بیٹھ جانا، چپکنے والا سخت بلغم ہو، کھانسی سخت، خشک، کروب اور بھونکنے والی ہو۔

سینگا (Senega): ایلیومن والے بلغم کے بہت زیادہ اجتماع کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا۔ سینے میں جلن، دکھن اور ٹانگے لگنے کا سا احساس ہوتا ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): آواز کی ٹالی کے فالج کے باعث۔

مینٹھاپیرٹا (Mentha Piperita): بلند آواز سے بڑھنے کے باعث آواز کا کمزور ہو جانا، یہ دوا گلوکاروں کی مدد کرتی ہے۔ آواز کو قائم رکھنے کے لئے۔

الیومینا (Alumina): گلوکاروں اور بیان کرنے والوں (زیادہ بولنے والوں) میں آواز کا بیٹھ جانا

جو کہ نزلہ کے گلے میں گرنے کے ساتھ ہو۔ جب کہ باتیں کریں۔ گلوکاروں میں آواز کی تھڑکی (آواز کا بیٹھ جانا) جو کہ فالج یا زیادہ گانے کے باعث ہو۔

الیومن (Alumen): آواز مکمل طور پر جاتی رہے۔ آواز کھو جانے کا مزمن مرض، یہ سب تازہ ٹھنڈے مشروبات پینے کے باعث ہو۔

رشاکس (Rhus Tox): آواز کا بیٹھ جانا بولنے سے درست ہو۔ چھاتی میں پھیلنے کا احساس۔

سانس میں گھٹن اور شدید چھینکے۔ اس دوا کے استعمال سے تھوڑی دیر میں ہی آواز درست ہو جاتی ہے۔ آواز کا بیٹھنا ٹھنڈے کا شروع کرتے وقت یا گھٹنگو کے آغاز میں ہو۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): تپ کالی کے باعث آواز بیٹھ جائے اور کچا پین ہو۔ پانی کی طرح کا مواد خارج ہو۔ بھجان کے ساتھ جو چھاتی تک پھیل جائے۔

سمبوسکس نائیگرا (Sambucus Nig): گرمی کھوکھلی کھانسی کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا سینے میں گھٹن ہو، متواتر جمائیاں آتی رہیں۔ بے چینی ہو اور پیاس لگے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): ذیلی کھانسی یا گاڑھے زرد مواد کے ناک سے اخراج کے ساتھ آواز کا مکمل طور پر جاتے رہنا۔

کوکا (Coca): آواز جاتی رہے۔ بولنے کے بعد آواز بیٹھ جائے۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد درختچہ کے پانچ یا چھ قطرے دیئے جائیں اور جب متوقع آواز کی طلب ہو تو بولنے سے دو گھنٹے قبل پانچ چھ قطرے لئے جائیں۔

میلینڈرینم (Malandrinum): چیچک یا خسرہ کے باعث آواز کا بیٹھ جانا۔

اکونائٹ این (Aconite N): خشک اور سرد ہوا میں جانے سے آواز کھو جائے۔

سنا (Cina): ٹھنڈی ہوا لگنے سے آواز کا بیٹھ جانا لاحق ہو۔ جب اکونائٹ این 'فاسفورس اور سپونجیا تاکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جائے۔

سٹرامونیم (Stramonium): قوت گویائی کھو جائے۔ صرف بیٹھی ہوئی اور بچھی ہوئی آواز میں بول سکے۔ جس کے بدلے میں دکھن ہو۔ بھونکنے والی کڑپ کھانسی ہو۔ شدید تشنہ دوروں کے باعث لگنے کی نااہلیت ہو۔

ایبروٹانم (Abrotanum): گھٹیا کے باعث جوڑوں کی گانٹھوں میں التوائی دردوں کے باعث آواز کا بیٹھ جانا، IM طاقت کی خوراک دیجئے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): عوام الناس کے اندر تقریریں کرنے والوں میں آواز کا بیٹھ جانا یا پیشہ ور گویوں میں آواز کا بیٹھ جانا۔ گویوں کے حلقوم کی مزمن سوزش۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phas): آواز بیٹھ جائے۔ مریض گانے یا بولنے سے قبل حلق سے بلغم کھٹکھار کر نکالتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): گویوں میں حلق کی مزمن سوزش، آواز بلند کرنے پر کھانسی ہوتی ہے۔

مینگانم (Manganum): مقررین حضرات اور گلوکاروں کے لئے یہ ایک حیران کن دوا کہلاتی ہے اگر ارجنٹم نائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ گلے میں بلغم جمع ہوتا بھی اس دوا کی علامت ہو سکتی ہے جیسے ہی مریض گلا صاف کرے مزید بلغم جمع ہو جائے۔

اوگزالیک ایسڈ (Oxalic Acid): دل کی تکلیفات کے ساتھ آواز کا کھو جانا، آواز کے نقصان کے ساتھ دل کی دھڑکن کا تبادلہ ہوتا ہے۔



### آواز کا بیٹھ جانا (مزمن) — Hoarseness (Chronic)

برٹا کارب (Baryta Carb): کھانسی اور ہوا کی نالی میں بلغم کے باعث آواز بیٹھ جائے اور آواز کھو جائے، زبان کا فالج، مزمن کیسوں میں۔

کاربو ویج (Carbo Veg): خمدی قسم کے کیسوں میں صبح کے وقت اور شام کے وقت بات کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): مزمن آواز کے بیٹھ جانے کے مرض کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً جب مریض کی ہسٹری میں دوران علاج پارہ کا زیادہ استعمال ہوا ہو۔ بڑوں میں آواز کا کھو جانا اور خشک بھونکتی ہوئی اور بیٹھی ہوئی آواز ہوتی ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت اور شام کے وقت یا جب ٹھنڈی ہوا میں چلا جائے۔

سلفر، کلکیریا کارب، سیلیشیا (Sulphur, Calcarea Carb, Silicea): علاج کی تکمیل میں ان ادویات کو آزمانا چاہئے۔ مخصوص کیسوں میں یہ دوائیں ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ انہیں یکے بعد دیگرے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سنی شیو اور نیس (Senecio Aureus): حیض کے دب جانے کے باعث آواز بیٹھ جائے۔

### فالج (گلے کا) — (Paralysis)

لیک کینٹم (Lac Can): ذہنی یا کے ساتھ گلے کا فالج، جب مریض کوئی چیز پے تو ناک کے راستے واپس باہر آ جائے۔

### ورم حلق — (Pharyngitis)

بیلادونا (Belladonna): عضلات اور حلق کے کوئے کا ڈھیلا پڑ جانے کوئے کی سوزش، گلے میں مریضیں لگنے کا احساس۔

سینگوئی نیریا نائٹ (Sanguinaria Nit): دائیں جانب کی حلق کی سوزش اتر ہو۔ سوزش حلقوم کا مزمن مرض۔

گواکیم (Guaiaecum): یہ بعض اوقات درد کو رفع کرتی ہے۔

زینک میٹ (Zincum Met): جب سوزش، شراب، تمباکو یا کسی دیگر مہلک کے باعث ہو۔

فانی ٹولا کا (Phytolacca): حلق گہرا سرخ یا نیلا ہٹ مائل سرخ ہوتا ہے۔ حلق کھردرا، خشک اور گرم محسوس ہوتا ہے۔ کانوں میں گولی لگنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ کچھ بھی لگلا نہیں جاسکتا حتیٰ کہ پانی بھی۔ یہ کنٹریاوی دردوں کو بھی آرام پہنچاتی ہے۔

سٹس کین (Cistus Can): ناک اور حلق سے سانس اندر کھینچنے کے مرض کے ساتھ یہ دوا خاص تعلق رکھتی ہے۔ تلخ ذائقے والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ گدگدی ہو اور کھرچن ہو۔ بعض اوقات حلق میں ریت کا احساس ہوتا ہے۔ گلے کی خشکی اور گرمی مریض کو متواتر پانی پینے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے حلق میں درد ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے حساسیت اس دوا کی عظیم علامت ہے۔

سینگوئی نیرا کین (Sanguinaria Can): باغی جھلی سرخ ہو اور ہموار ہو۔ نیز تھوک کے فقدان کے ساتھ جھلی کی سطح دودھیا اور وارنش کی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جن علامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان علامات کے ساتھ حلقوم کے حاد اور مزمن ورم کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

کالی میور (Kali Mur): مٹیالے اور سفید رنگ کے مواد کے رسنے کے ساتھ حلقوم کی سوزش کے لئے بہترین ادویات میں سے یہ ایک دوا ہے۔ ٹانسز کی سوجن اور سوزش جس کے ساتھ ٹانسز پر خاکستری رنگ کے ناسوری دھبے ہوتے ہیں۔

الیومینا الیومن (Alumina, Alumen): تھوک کے فقدان کے ساتھ یہ دوا خشک نزلاوی حلقوم کی سوزش کی نشاندہی کرتی ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): خشک نزلے کے لئے بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ ناک رات کے وقت بند ہو جاتی ہے۔ تھوک نہیں ہوتا۔

سٹیکٹا پل (Sticta Pul): ناک کی جڑ میں دباؤ اور بھراؤ کے احساس کے ساتھ 'خشک' حاد و مزمن زکام کے لئے۔ ناک چھینکنے کی مستقل خواہش۔

ویتھیا (Wyethia): حلق اور تجڑہ کی مزمن سوزش کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اس میں صاف بولنے کے لئے مریض کو مسلسل گلا صاف کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ 30 طاقت ذاتی لیون کی خوراک دیجئے۔

سپیا (Sepia): نگلتے وقت گلا تنگ ہو اور گلے میں کھرچن ہو۔ بولنے اور گاتے وقت آواز بیٹھ جائے۔ بلغم کے اخراج کے ساتھ متواتر کھانسی ہو۔

کالی بائی (Kali Bi): یہ ایک بہترین دوا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے گلے میں مچھلی کی ہڈی پھنس گئی ہو جسے نکالنے کے لئے مریض "ہاک ہاک" کی آواز نکالتا ہے۔

### ورم حلق (مزمن) — Pharyngitis (Chronic)

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): گلا دکھے، گلے میں کپا پن ہو، گلا تنگ ہو اور گلے میں جلن ہو۔ موسم کی تبدیلی پر گلے میں زخم اور سوزش ظاہر ہوتی ہے۔ مسلسل نگلنے کی خواہش

ہوتی ہے۔ آواز کھو جاتی ہے۔ سانس متعفن ہوتا ہے۔  
 مرکوریس کور (Mercurius Cor): گلا، سرخ، سوزشی، خشک، سخت ہو جس کے ساتھ  
 سکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ حلق کا کوا متورم ہوتا ہے اور نکلنے میں درد ہوتا ہے۔  
 آرسینکیم آیوڈ (Arsenicum Iod): جب غیر موافق پس منظر تپ دق کی جانب رجحان کا  
 باعث ہوتا ہو۔

کالی بروم (Kali Brom): جب حلقوم کی ناطاقتی کی کیفیت ہو۔  
 کالی آیوڈ (Kali Iod): حلقوم میں بہت زیادہ تھکان میں۔  
 ار جٹم میٹ (Argentum Met): گویوں کے حلق کی سوزش کا مزمن مرض۔  
 کالی بایک (Kali Bich): حلقوم کا مزمن ناسور۔

### ورم حلق (نزلاوی) — Pharyngitis (Catarrhal)

ار جٹم نائٹ الیومینا (Argentum Nit, Alumina): دی گئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں  
 آزمائی جاسکتی ہیں:  
 کلکیریا آیوڈ (Calcaria Iod): خنازیری اور سوکھا مسان والے لوگوں میں۔

### ورم حلق (اعصابی) — Pharyngitis (Nervous)

بپٹیشیا (Baptisia): بہت عرصہ پہلے ایک گولی نکلنے، ہڈی یا کنکری وغیرہ نکلنے کا احساس ہو۔  
 مریض کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ گلے میں کوئی ہڈی، پھلی کا کاٹھا پھنسا ہوا ہے حالانکہ وہاں  
 کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بپٹیشیا اس احساس کو ختم کرتی ہے لیکن اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل  
 ادویات استعمال کی جائیں۔

اگنیشیا (Ignatia): گلے میں رکاوٹ کے اعصابی احساس کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔  
 سٹس کین (Citrus Can): حلقوم، گلے اور ناک میں ٹھنڈک کا احساس۔

### ورم حلق (گنٹھیاوی) — Pharyngitis (Rhaumatic)

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): حلق کے چھوٹے عضلات کا گٹھیا، نکلنے میں دقت ہوتی ہے  
 اور حلق کو ذرا سا سکیڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہانسی جھلی چلی ہوتی ہے لیکن سوجن نہیں ہوتی۔  
 گلے میں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی لیکن گٹھیا کی ہسٹری تشخیص کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

## دکھن (گلے کی) — (Sore)

**بیلادونا (Belladonna):** حلق میں اجتماع خون اور سرخی کے ساتھ حلو کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ نگلنے میں وقت ہو۔ حلق خشک ہو۔ ٹانسلز سو جے ہوئے اور بڑھے ہوئے ہوں۔ حلق کی دائیں جانب میں دکھن ہو۔ درد کے ساتھ جو دائیں کان تک بڑھ جائے۔  
**سیباڈیلا (Sabadilla):** مسائل نگلنے کے رتخان کے ساتھ اس بات کا خیال ہے کہ کوئی ڈھیلا حلق میں موجود ہے یا کوئی بیرونی جسم حلق میں موجود ہے۔ گرم مشروبات پیئے سے بہتری ہوتی ہے۔

**مگنیشیا کارب (Magnesia Carb):** حیض کے وقت گلے میں زخم ہوں۔ سوجن اور زخم بائیں سے دائیں جانب منتقل ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے برعکس دائیں سے بائیں منتقل ہوتے ہیں اور حیض کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔

**لیکیس (Lachesis):** گلے میں دکھن والی سوجن ہو۔ ٹانسلز ہوں، خناق ہو، جن میں ٹھوس غذا نگلنے سے بہتری ہو لیکن مائعات نگلنے میں وقت پائی جاتی ہے۔ گرم مشروبات سے بہتری ہو۔ گلے میں ڈھیلا ہونے کا احساس۔

**سٹس کین (Cistus Can):** ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے بہتری ہو۔ گاڑھا، زرد رنگ کا چمڑے کی طرح کا پلغم صرف مقامی ذرائع سے ہی صاف ہو۔

**مرک ہائیوڈ (Merc Biniod):** جب مرض کا اثر بائیں جانب سے شروع ہو۔ خالی نگلنے یا خوراک نگلنے سے بہتری ہو۔

**کالی آیوڈ (Kali Iod):** پرانا ناسور گلے میں گہرا ہوتا ہے۔ جو تمام نرم ریشوں کو حلق کے کوا کو اور نرم تالو کو تباہ کر دیتا ہے۔

**لیک نٹھس (Lachnanthes):** گردن کے اکڑاؤ کے ساتھ گلے میں دکھن۔  
**فالی ٹولا کا (Phytolacca):** جب درد کان کی طرف جائے۔ حلق کا کوا بڑا ہو جائے۔ جھلی گہری سرخ یا خاکستری رنگ کی ہوتی ہے۔ گرم مشروبات سے بہتری ہو۔ دائیں جانب گلے میں دکھن ہو جس کے ساتھ درد دائیں کان تک پھیل جاتا ہے۔ نگلنا مشکل ہوتا ہے۔

**گوالیکم (Gualacum):** اعضاء کی حساسیت کے ساتھ گلے میں سوزشی دکھن ہو۔ گرمی سے زیادتی ہوتی ہے۔

**اگیڑیکس مس (Agaricus Mus):** گلے میں تشنج ہو اور بے اختیارانہ عجیب قسم کی دم گھٹنے جیسی آواز آئے۔

**ایپس مل (Apis Mel):** ٹائیفائیڈ میں یا ڈیفٹیریا کے بعد عضلات کی طاقت کھو جائے۔ حلق کی

کرسٹ ہڈی کے بیجان کے باعث، حلق میں ڈبک گئے جیسے درد ہوں۔

اوپیم (Opium): فالج میں حلق کی دکھن۔

ہیپیر سلف (Hepar Sul): گلے میں تیز درد ہو جیسا کہ گلے میں کرج (چھٹی) لگی ہو۔ ٹانسلز میں پیپ ہو اور پھوڑے ہوں۔

نکس وامیکا (Nux Vom): سگریٹ نوشوں میں، شرابیوں میں اور مبلغین میں گلے کے بیجان کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ گلے میں کچا پن اور کھرچن ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا تبلیغ کرنا (یعنی دوران تبلیغ بہت زیادہ بولنے سے) ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): یوں محسوس ہو جیسے مریض ہڈی نکل رہا ہے۔ جو مسلسل گھوم رہی ہے، زچگی میں۔

سٹرامونیم (Stramonium): عضلات کی کھن سے یا عضلات کی تشفی سکڑن سے، تشفی کے ساتھ۔ گلے کی خشکی میں، نچلے جڑے کے غدود میں درد کے ساتھ۔ گردن توڑ بخار میں، سوزشی دکھن کے بدلے میں صرف پھنی ہوئی اور بیضی ہوئی آواز میں ہی بول سکے۔

لیکیسس (Lachesis): خناق (ڈھیریا) میں، ٹانسلز کی تکلیف میں، حلق کی خشکی میں، ہر دوسرے روز گلا بند ہو جائے۔ آغاز دائیں جانب سے ہوتا ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia In): کوئی چیز دل سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جو خوراک سے جا کر ملتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے۔

لائی سین (Lyssin): گلے کی سوزشی دکھن میں مائع ناک کے راستے واپس آجاتے ہیں۔ کالی کارب (Kali Carb): خوراک آدھے راستے میں رک جاتی ہے۔ جس کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے۔ (خوراک کی نالی کی گھٹن)

آرم ٹی (Arum T): اداکاروں، دلالوں اور مقرروں یا با آواز بلند پڑھ کر سنانے والوں میں گلے کی سوزشی دکھن۔

برٹاکارب (Baryta Carb): سٹانسلز کے پرانے (مزمن) امراض میں۔

آئیوڈیم (Iodium): حنجرہ میں کھن، بھراؤ یا دباؤ کے ساتھ گلے کی دکھن۔

### نگلنا (Swallowing)

ڈیفٹھیرینم (Diphtherinum): مائع ناک کے راستے واپس ہو جائیں۔ جب کہ مریض انہیں نکل رہا ہو۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): جب خوراک اور مشروبات ناک میں آجائیں۔

لیک کینیم (Lac Can): پیٹے ہوئے مائعات ناک کے راستہ واپس نکل آئیں۔ نگلے میں دقت ہو۔ تقریباً نگلنا ممکن ہی نہ ہو اور درد کانوں تک جائیں۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): نگلنا بہت مشکل ہو۔ چہرہ گہڑ جائے اور مریض اپنا سر نیچے کی جانب گرا لے۔ مریض کوئی چیز نگل نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ ایک چمچ بھر پیچ (پانی وغیرہ) بھی نہیں نگلی جاسکتی کیونکہ کانوں میں شدید درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): نگلنا مشکل ہو یہاں تک کہ کھاتے وقت مریض اپنی گردن کے پشت والے حصے کو اپنے ہاتھ سے دباتا ہے۔ گردن میں جلن اور درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): تھوک نگلنے میں دقت ہو۔ پیچک میں 'سرخ بخار' میں 'ذقیصیر' میں تقریباً ناممکن ہو۔ (یعنی نگلنا)

سٹرامونیم (Stramonium): گلے کے شدید تشنج کے باعث نگلنا مشکل ہو۔

لیکسیس (Lachesis): ٹھوس چیزیں 'مائعات کی نسبت زیادہ آسانی سے نگل سکے۔ گرم مشروبات گلا گھونٹ دیں۔

بیلادونا (Belladonna): گلے کی سوزشی دکن کے باعث مائعات یا ٹھوس غذا نگلنے میں دقت پیدا ہو جاتی ہے اور غذا ناک میں چلی جاتی ہے اور بعض اوقات ناک کے راستے باہر نکل آتی ہے۔

ہائیوسکامس (Hyoscamus): گلے 'زبان' حلق اور غذا کی نالی کے پھوں میں اکڑن کے باعث نگلنے میں دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مائعات ناک کے ذریعے باہر نکل آتے ہیں یا پھر سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں۔

جلمی میم (Gelsemium): خوراک کی نالی کا فالج، جس کے باعث نگلنے کی قوت جاتی رہے۔

کاسٹیک (Causticum): حلق اور خوراک کی نالی کے فالج کے باعث خوراک غلط راستے پر چلی جاتی ہے مثلاً سانس کی نالی میں گھس جاتی ہے یا ناک کی پچھلی جانب کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے۔

سکیوٹاوائروسا (Cicuta Vir): خوراک کی نالی کا تشنج جو نگلنے کی طاقت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔

### ورم اوزتین (ٹانسلز کاوم) — (Tonsillitis)

اکونائٹ این (Aconite N): مرض کے آغاز میں ہی اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ پریشانی، بے چینی اور سوزشی دکن اس دوا کی رہنما کن علامات ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): یہ دوا نشاندہی کرتی ہے۔ اس کیفیت کی جب ٹانسلز میں ہوا لگنے کے باعث سوزش ہو۔ وہ سرخ اور خون سے پُر معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن والا درد ہوتا ہے جو کانوں تک پھیل جاتا ہے۔

سیلیسا (Silicea): شدید ورم لوز تین، چھین والے درد ہوں۔ جب پھوڑا پھٹ جائے اور درست نہ ہو تو اس کیفیت کی نشاندہی یہ دوا کرتی ہے۔

مرک آئیوڈ (Merc lod): ٹانسلز کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً جب درد بائیں جانب ہو۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): تیز بخار کے ساتھ ٹانسلز کے ورم میں اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کیا جائے۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): جب درد کانوں میں گولی لگنے کی مانند ہو۔ بائیں بھلیوں اور حنجرہ میں دھبوں کی طرح پھنسیاں ہوں۔ ٹھنڈے مشروبات گوارہ ہو جائیں لیکن گرم مشروبات کو لگنا ناممکن ہو۔ گلے میں سوزش ہو یا ورم ہو جس کا رنگ گہرا سرخ یا تقریباً نیلا ہوتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے اور خشک کھانسی ہو۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ ناگزیر ہو۔ گلے میں ٹامور ہوں۔ گلے میں کھچیاں ہونے کا یا پھلی کا کاٹنا ہونے کا احساس ہو۔ گرم مشروبات سے بہتری ہو۔

اپیس مل (Apis Mel): ڈسنے جیسے اور جلن دار دردوں کے ساتھ گلے میں سوجن ہو۔ ٹھنڈک سے بہتری ہو۔ زبان اور حلق کا کوا سوج جائے اور پھول جائے۔ حلق کا کوا نیچے کو لٹک جاتا ہے اور جس کے باعث دم گھٹ جاتا ہے۔ موت کے خطرے کے ساتھ۔

بریشا کارب (Baryta Carb): مزمن طور پر ٹانسلز کے بڑھ جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ پس ماندہ ذہنیت کے ساتھ بچوں کی نشوونما بہت آہستہ ہوتی ہے۔ ناک سے متواتر خون بہنے کے ساتھ ناک کے پچھلے حصے کا نزلہ لاحق ہو۔ ٹھنڈ لگ جانے کے باعث ٹانسلز میں پیپ پڑ جائے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہو۔ نیز خشک موسم میں بھی بہتری ہو۔ مزمن امراض میں 200 ڈائی لیوشن کی خوراک استعمال کی جائے جبکہ حاد امراض میں 6 ڈائی لیوشن کی خوراک دیں۔

لاروسیراسس (Laurocerasus): گلے اور خوراک کی نالی کی تشنجی کھینچن۔ مشروب خوراک کی نالی اور معدہ کی نالی میں آواز کے ساتھ چکر کھاتا ہوا گزرتا ہے۔

اوپیم (Opium): جب بچے جانے والے مائع نیچے جانے کی بجائے ناک کے راستے باہر آ جائیں۔ خوراک کی نالی کا فالج، مائعات لاپرواہ راستے پر چلے جاتے ہیں۔

برومائن (Bromine): سانس کی نالی کا تشنج اور کھنچاؤ۔

انگیشیا (Ignatia): درد اور تکلیف ہو کہ گلے میں ہو، نگلنے سے اس میں افادہ ہو یا ابتری ہو، نگلنے کے عمل کے دوران۔

بپتیشیا (Baptisia): صرف مائع چیز ہی نگل سکے۔ معمولی ٹھوس چیز بھی گلے کو بند کر دے۔  
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): یہ عمل انگلیز دوا ہے اور ہر ماہ 200 ڈال کی لیوشن کی خوراک دینی چاہئے۔

تھوجا (Thuja): یہ دوا بریٹاکارب کی جگہ دینی چاہئے۔ ٹانسز پڑھنے کے مزمین مرض میں ہر ہفتہ 200 کی خوراک دینی چاہئے۔ جس ہفتہ ٹیوبرکولینم دینی ہو۔ اس ہفتہ کے دوران ان ادویات کو ہرگز نہ دیا جائے۔

آئیوڈم (Iodum): بہت زیادہ بھوک کے ساتھ وزن میں کمی واقع ہو جائے۔ بہت زیادہ پیاس کے ساتھ فوری بھوک لاحق ہو۔ معمولی محنت سے نفاہت ہو جائے نیز ساتھ میں پسینہ بھی آتا ہے۔ ٹانسز اور تھائی رائیڈ گینڈ (سپر نماغده) کا بڑھ جانے گرم اور مرطوب موسم میں ابتری ہو۔ کھلی ہوا اور کھانے سے ابتری ہو۔ کان اور حلق کی الحاقی نالی کے بند ہو جانے سے بہرہ پن لاحق ہو۔

مرک پروٹو آئیوڈ (Merc Proto Iod): ناک کی نالی کے پچھلے حصہ کے مزمین نزلہ کے ساتھ ٹانسز کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا مرض۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): جب مرض کا اثر دائیں سے بائیں جانب جائے اور گرم مشروبات سے ابتری ہو۔ تھوک لمبی تاروں والا ہو۔ گرے رنگ والے مشتعل دکھائی دینے والے حصوں کے لئے خاص دوا ہے۔

گن پاؤڈر (Gunpowder): جراثیمی ٹانسز میں۔

رشاکس (Rhus Tox): گلے کا گھٹیا جو ٹانسز پر اثر انداز ہو۔ گلے کی استقلالی سو جن 'دم' کھنکھنے کے احساس کے ساتھ جب کہ مانتات نگلے جائیں۔

انگیشیا (Ignatia): خوراک کے بغیر جب مانتات نگلے جائیں تو درد خصوصاً بڑھ جائے۔

مرکیوریس (Mercurius): ٹانسز دائیں جانب سے شرع ہوں جب کہ ٹھنڈے مشروبات سے بہتری ہو۔ زبان پر گاڑھا طبع ہو۔ جس کے ساتھ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ناک میں کھنکھنے والی کندی بو ہوتی ہے۔ قبض لاحق ہو۔

مرکیوریس بن آئیوڈ (Mercurius Biniod): خناق، گلے میں زہر باد کے باعث زہر پھیل جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ زہر کا اثر بائیں جانب سے دائیں جانب سفر کرتا ہے۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Iod): جب بریٹاکارب اور ٹیوبرکولینم کے کورس مرض کو دفع



کرنے میں ناکام ہو جائیں، تب اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ نیز جب کہ تھائیرائڈ والا غدہ بھی بڑھا ہوا ہو۔

**برٹا میور (Baryta Mur):** یہ دوا بھی اس وقت کارآمد ہوتی ہے۔ جب نگلتے وقت درد ہو اور یوں محسوس ہو جیسے گلے میں ڈاٹ لگا ہو۔ (اور گلابند ہو۔)

**کلکیریا فاس (Calcarea Phas):** جب ٹانسلز پر پہلی لمبی سوجن ہو۔

**کلکیریا کارب IM اور ٹیوبرکولینم IM (IM and Tuberculinum IM)**

**(Calcarea Carb. IM):** ہر پندرہ روز کے بعد بدل بدل کر دوا دینا بچوں میں مزمن ٹانسلز کے مرض کو رفع کرتا ہے۔ جب کہ اس کے ساتھ چربی کی نشوونما کا رجحان ہو نیز مٹی کھانے، پلستر، کانڈ وغیرہ کھانے کا رجحان ہو۔ IM طاقت کی دوا میں استعمال کرنے سے دو ماہ قبل یہی ادویات 200 طاقت کی خوراکیوں میں آزمائی جائیں۔ اگر یہ ادویات ناکام ہو جائیں تو انہیں برٹا کارب 200 اور تھوجا 200 سے بدل دیا جائے جو کہ ٹیوبرکولینم 200 کے ہمراہ ہر ہفتہ استعمال کی جائیں۔ البتہ ٹیوبرکولینم ہر ماہ دینی چاہئے۔ (یعنی مینے بعد دی جائے۔ یہ مذکورہ دونوں ادویات کے ساتھ ہر ہفتہ نہ دی جائے۔)

## ٹانسلز دور کرنے کے بعد کی تکالیف

(Tonsillectomy)

(Ailment after Removal of Tonsils)

**سٹرپٹوکوکین (Streptococcin):** ٹانسلز دور کرنے کے بعد لاحق ہونے والے تمام امراض کے لئے جب کہ مریض پیلا پڑ جاتا ہے۔ دبلا چلا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک نہیں رہتی، لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ لمبے عرصہ تک IM ڈائی لیوشن ہر ماہ دیجئے۔

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** ٹانسلز دور کرنے کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے لئے جیسا کہ ناک کی نالی کے پچھلے حصہ کا نزلہ اور پروٹکائٹس (سانس کی نالیوں کی تکالیف) 200 طاقت کی خوراک ہر ہفتہ دیجئے۔

**سلفر (Sulphur):** دل میں جلن ہو۔ منھائیوں کی طلب ہوتی ہے۔ سارے دن کے دوران بھوک نہیں لگتی البتہ پھر رات گئے بہت زیادہ بھوک ظاہر ہوتی ہے۔ موسم تبدیل ہونے پر اور طوفان آنے سے قبل علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ خارش ہوتی ہے۔

## حلق کا کوا (Uvula)

ایپس ایم (Apis M): حلق کے کوا کے بڑھ جانے کے لئے یہ مخصوص اور چوٹی کی دوا ہے۔  
 مینسی نیلا (Mancinella): حلق بری طرح سوج جانے کے ساتھ حلق کا کوا بڑھ جاتا ہے۔  
 مرک کار (Merc Car): پھوٹی طاقت کی مرک کار دوا حلق کے کوا پر لگائیے۔ فوری اور مستقل طور پر آرام ہو جائے گا۔  
 ہائوسکیمس (Hyoscyamus): گدگدی والی کھانسی کے ساتھ حلق کے کوا کا بڑھ جانا لاحق ہو، نیچے لیٹنے میں ابتری ہو۔  
 ایومن (Alumen): جب گلے میں کھرچن یا چھیلن کے ساتھ حلق کا کوا ڈھیلا پڑ جائے۔

## حصہ سوم — حنجرہ، نرخرہ

### ورم حنجرہ (Laryngitis)

(نیز دیکھئے کروپ کھانسی)

اکونائٹ این (Aconite N): جب نر پیچان خشک کھانسی ہو۔ بے چینی اور پریشانی کے ساتھ بخار ہو۔ جلد خشک اور گرم ہو اور آواز ٹھنسی ہوئی ہو۔  
 سپونجیا (Spongia): عموماً اکونائٹ دینے کے 6 گھنٹہ بعد دی جاتی چاہئے یا پھر جیسے ہی حنص تیز ہو جائے اور بھونکنے والی کھانسی ہو۔ آواز ٹھنسی ہوئی ہو اور آواز جاتی رہے۔ جس کے ساتھ ہوا کی نالی کے بالائی حصہ میں درد ہو تو یہ دوا دی جائے۔  
 ایلیم سیپا (Allium Capa): ٹھنسی ہوئی آواز والی، شدت والی، گھنٹیاں بچنے والی اور تشنہ دوروں والی کھانسی جو حنجرہ میں مستقل گدگدی (سر سرائٹ) کے باعث ہو۔ جس کے ساتھ خام طور پر پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ حنجرہ کی شدید کھانسی۔  
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): یہ جاننا چاہئے کہ جب جلد مسلسل جلتی رہے حتیٰ کہ اکونائٹ دینے کے باوجود جلن باقی رہے تو یہ دوا دینی چاہئے۔ کروپ کھانسی ہو اور آواز بٹھ جائے۔ صبح کے وقت ابتری ہوتی ہے۔  
 لیکسیس (Lachesis): حلق حساس ہوتا ہے۔ ٹکنا مشکل ہوتا ہے۔ گرم مشروبات سے زیادتی ہوتی ہے۔ جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دینی چاہئے۔  
 کالی بالی (Kali Bl): جب گاڑھا، لیس دار اور تار دار بلغم خارج ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

کاشٹیک (Cauticum): جب آواز کے عضلات میں کمزوری واقع ہو جائے۔ سخت قسم کی کھانسی ہوتی ہے جو پیشاب کی اکسماٹ کا باعث بنتی ہے۔

فسفورس (Phosphorus): خشک، بیجانی، پیلے اور قلت دم والے حنجرہ میں آواز کا بیٹھ جانا جو کہ حملے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

مینگانم (Manganum): خشک بیٹھی ہوئی آواز والی کھانسی میں یہ دوا استعمال کریں۔

کلورم (Chlorum): اگر 12 اور 30 کی طاقت میں دی جائے تو یہ بھی کار آمد ہوتی ہے۔

سیلیسیم، نیٹرم میور (Selenium, Nat Mur): تپ دق والے حنجرہ کے امراض میں۔

سمبوکس نائگرا (Sambucus Nigra): لیس دار بلغم کا حنجرہ میں اجتماع۔ آواز بیٹھ جائے گا، گھونٹنے والی، خالی، کھری کھانسی، اضطراب اور پیاس کے ساتھ سانس سے سوں سوں کی آواز آتی ہے۔

کاربووتج (Carbo Veg): تپ دق والی یا علاوہ ازیں جب نزلہ، زکام، ناک سے شروع ہو اور آخر کار نیچے چھاتی اور حنجرہ میں جم کر بیٹھ جائے۔

بل سیرولیٹا (Sabal Serrulata): حنجرہ کی دق۔

ریومیکس (Rumex): پڑھان، مسلسل سرسراہٹ۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے ابتری ہو۔

## حنجرہ کے تشنجی جھٹکے


(Laryngo-Spasm)

برومیم (Bromium): سینے کی ہڈیوں کے نیچے سرسراہٹ اور جلن کے ساتھ تشنجی کھنچاؤ۔ سانس اندر لے جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، سانس باہر نکالنے کی نسبت، کیونکہ سانس کھینچتے ہوئے کھانسی آتی ہے۔ غدد بڑھ جاتے ہیں۔ خصوصاً کان کے قریب کے غدد اور غدد ورقیہ (تھائی رائیڈ)۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): سانس کی نالی کے اوپر کے سرے والا تشنج جس کے ساتھ چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے کھینچ جاتے ہیں اور ہتھیلیوں میں گھس جاتے ہیں جبکہ انگلیاں ان کے اوپر بھینچ جاتی ہیں۔

کلورم (Chlorum): سانس کی نالی کے اوپر والے سرے کا تشنج۔ بھجان کے باعث نر خرے کی ہڈی کا تشنج نیز ہوا کی نالی کا تشنج، آواز کے پنوں کے تشنج کے باعث شیق النفسی ہوتی ہے۔ چہرہ نیلا پڑ جانے کے ساتھ آنکھیں وحشیانہ طور پر کھل جائیں۔ گھورنے والی کیفیت ہو اور

آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ برومیم کے برعکس کلورم کا مریض سانس آسانی سے اندر کو کھینچ سکتا ہے لیکن سانس خارج کرنا مشکل ہوتا ہے۔  
گلکیریا کارب (Calcarea Carb): حنجرہ کا تشنج جبکہ یہ تشنج اعصابی تکلیف کے باعث نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی دوا ہے۔



# مسوڑھوں، منہ، دانتوں اور زبان کے امراض

(Diseases of Gums, Mouth, Teeth & Tongue)

(حصہ اول --- مسوڑھے)

پھوڑے اور سوزش

(Abscess and Inflammation)

مرکیورس (Mercurius): پیپ دار مسوڑھوں کے آبلے، مسوڑھے سوچے ہوتے ہیں۔ اسٹنٹی اور ان سے خون بہتا ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔ بستر کی گرمی سے اور رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ مسوڑھوں سے بہنا شروع ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔ یہ دوا پھوڑے کو بخانے کا اور ختم کرنے کا دہرا عمل کرتی ہے۔ 3x طاقت کی خوراک دیجئے۔

سلیشیا (Silicea): جب ہیپیر سلف ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمانی چاہئے۔ ہیکلا لانا (Hecla Lava): مسوڑھوں کے پھوڑوں کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً بوسیدہ دانتوں کے پھوڑوں کے لئے۔ 3 ایکس طاقت کی دوا دیجئے۔

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے لئے جبکہ مسوڑھوں میں چکن والا درد ہو۔ مرک آئیوڈ (Merc id): یہ دوا بیلادونا کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ دردوں والے کیسوں میں۔

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ جب کیشیم کی قلت ہو اور دانتوں کا انیل ضائع ہو جائے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): غلط دانت لگانے کے بعد مسوڑھوں میں درد ہو اور مسوڑھے سوج جائیں۔

## سیلان خون — (Bleeding)

(نیز دیکھئے پائو ریا)

مرکیورئیس سول (Mercurius Sol): مسوڑھوں میں ناسور ہو اور مسوڑھوں سے خون نکلے۔ مسوڑھوں میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے اور مسوڑھے سرخ ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا مسوڑھوں سے خون بہنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔ علاج دوا سے شروع ہونا چاہئے۔ یہاں تک کہ دیگر ادویات کی علامت واضح ہو جائیں۔

کلکیریا فلور (calcareia Fluor): یہ دوا بھی مفید ثابت ہوئی ہے جبکہ مسوڑھوں سے خون بہنے کے ساتھ دانتوں کا گلنا سڑنا بھی ہو۔

کاربوووج (Cabo Veg): جب دانت ڈھیلے پڑ جائیں اور مسوڑھوں سے الگ ہو جائیں۔ دانت تیزی سے گلنے لگتے ہیں یا گرنے لگتے ہیں۔ دانت صاف کرتے وقت یا دانت کو معمولی سا چونے سے خون بہہ لگتا ہے۔ گرمی اور سردی یا نمکین غذا سے درد ہوتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): گل سے نکلنے والے پانی کی بے انتہا پیاس کے ساتھ مسوڑھوں سے خون کا بہنا۔ گنتھیا میں مبتلا ہونے کا رجحان، دانتوں کے ارد گرد سے خون رستا ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان سے بڑی آسانی سے خون بہتا ہے۔

سٹیفیسیگیا (Staphisagria): مسوڑھے اسفنجی ہوتے ہیں۔ جن سے خوراک گلنے سے یا انگلی گلنے سے خون بڑی آسانی سے بہنے لگتا ہے۔

ٹیریبتھ (Terebinth): البیومن کے اخراج کے ساتھ مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): دانتوں کے ناسور میں مسوڑھوں سے آسانی سے خون بہتا ہے۔

سڈرون (Cedron): دوران حیض مسوڑھوں سے خون نکلے۔

کلکیریا کارب (Calcareia Carb): حیض دہ جانے میں مسوڑھوں سے سیلان خون ہو۔

سلفر (Sulphur): تھائیرائیڈ کے مریض میں مسوڑھوں سے سیلان خون ہوتا ہے۔

ایومن (Alumen): دانتوں سے پیچھے ہٹے ہوئے مسوڑھوں سے خون نکلے۔ دانتوں کا گلنا یا گرنا۔

## منہ کی دکھن و زخم — (Canker-Sores)

آرس البم (Ars Alb): منہ اور زبان میں جلن و گرمی اور بہت زیادہ خشکی کے ساتھ۔  
 ہائیڈروکوٹائل (Hydrocotyle): پوٹاشیم کلورائیٹ کے غلط استعمال کے بعد۔  
 لیکسیس (Lachesis): بلیغی بھلی سے ملحقہ جگہ کمرے اور غوانی رنگ کے ساتھ۔  
 مرک سول (Merc Sol): جب منہ سے تھوک آئے اور منہ میں دکھن ہو۔  
 نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): تیز چبھنے والے درد، بہت زیادہ مٹھائیاں کھانے کے بعد  
 خصوصاً اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

## گر جانا (مسوڑھوں کا)

(Falling Away)

مرک سول (Merc Sol): مسوڑھے گر جاتے ہیں یا لنگ جاتے ہیں۔

## پائیوریا (Pyorrhoea)

(نیز دیکھئے ”سیلان خون“ اور ”مسوڑھے“)

کیلنڈولا (Calendula): پائیوریا کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ 30 طاقت کی خوراک کچھ  
 عرصہ کے لئے دینی چاہئے۔

کلکیریا رینالس (Calcarea Renalis): یہ ایک عمدہ دوا کہلاتی ہے۔

مرکوریس (Mercurius): سفید اسٹغنی مسوڑھے ہوتے ہیں۔ منہ سے گندی بو آتی ہے۔ 6  
 طاقت کی دوا استعمال کیجئے۔

سیلیشا (Silicea): پردرد ورم، مسوڑھوں میں پیپ پیدا ہوتی ہے۔ مسوڑھوں پر آبلے ہوتے  
 ہیں۔

گن پاؤڈر (Gunpowder): جب مسوڑھوں میں پیپ ہوتی ہے اور یہ پیپ ہستی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): منہ سے اور ڈھیلے دانتوں سے گندی بو کے ساتھ پائیوریا۔

پلانٹے گویہجر (Plantago Major): دانت چھوٹے سے حساس ہوتے ہیں اور دکھتے ہیں۔  
 چاقو مارنے جیسے اور سوراخ کرنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

کریوزوٹم (Kerosotum): گندی بو کے ساتھ بیمار دانت، کھینچنے والے اور تپکن والے  
 درد، مسوڑھوں میں ناسور ہوتے ہیں اور جلد جلد خون بہتا ہے۔

ہنیشیا (Baptisia): مسوڑھے گھرے سرخ اور بدبودار ہوتے ہیں۔ مسوڑھوں سے خون رستا ہے۔ تھوک متعفن ہوتا ہے۔

### اعصابی درد (مسوڑھوں کا) — (Neuralgia)

(نیز دیکھئے ”دماغ“ کے ذیل میں ”اعصابی درد“)

ٹیفنی سیکریا (Staphisagria): یہ بہترین دوا ہے اور اسے سب سے پہلے آزمانا چاہئے۔

کوکلی نیلا (Coccinella): اوپر دی گئی دوا کے بعد اسے آزمانا چاہئے۔

### رسولی — (Tumor)

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): داڑھ کی ہڈی کی رسولی۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): اخروٹ جتنی جسامت کی رسولی مسوڑھوں پر ہو۔

سیلیشیا (Silicea): جب رسولی دودانتوں کے درمیان ہو۔

### ناسوری کیفیت (پھوڑے وغیرہ) — (Ulceration)

مرک کار (Merc Cor): جب ناسور کے ساتھ بہت زیادہ پانی جیسا تھوک ہو۔

کریوزوٹم (Kreosotum): جب مسوڑھے نیلاہٹ مائل سرخ، نرم، اسٹیفٹی ہوں۔ جن سے

خون نکلے اور سوزش ہو۔

نیٹرم میور، نائٹریک ایسڈ (Natrum Mur, Nitric Acid): یہ دوائیں بھی مسوڑھوں کے

ناسور کے لئے مفید ہیں۔

### حصہ دوم — جبراً

#### کڑکڑاہٹ (جبرے کی) (Cracking)

رشاکس (Rhus Tox): جبرے میں کڑکڑاہٹ ہو۔ گنیشیا کے ساتھ یا گنیشیا کے بغیر۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): اگر رشاکس ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

گھرے نیٹم (Granatum): جبرے میں پرورد کڑکڑاہٹ ہو۔

آرم ٹرائی فلم (Arum Triph): نگلتے وقت جبرے کے جوڑے میں درد ہوتا ہے جیسا کہ موج

آئی ہو۔



## بوسیدگی (گلنا، سڑنا) — (Decay)

(دیکھئے ”جڑے کا گلنا سڑنا“)

### جڑے کی ریشہ دار رسولی (Epulis)

تھوجا (Thuja): یہ دوا ایکولس (جڑے کی ریشوں والی رسولی) کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔  
 کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب تھوجا ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔  
 دوا کی طاقت 200 یا CM استعمال کرنی چاہئے۔  
 پلیم ایسی فیکم، لیک کینیم (Plumbum Acet, Lac Can): اگر اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں تو انہیں بھی آزما سکتے ہیں۔  
 برائیونیا (Bryonia): نچلے جڑے کے بائیں زاویے کی رسولی یا سوجن۔  
 میگنٹیس پولس آرک (Magnetis YPolus Acid): جڑوں میں سوجن اور درد  
 خصوصاً بائیں جڑے میں۔ ٹھنڈک سے حساسیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

### جڑے کا بند ہو جانا — (Lock Jaw)

اکٹیا سپائی کانا (Actea Spicata): جب بالائی جڑے میں درد ہو۔  
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): جڑے بند ہو جائیں۔ یہ تکلیف ٹھنڈے پانی میں کھڑے  
 ہونے کے باعث ہوتی ہے۔  
 انگوچرا (Angustura): جڑے بند ہو جائیں، ہونٹ پیچھے کو گر جاتے ہیں۔ جس سے دانت  
 نظر آتے ہیں۔

### جڑے کا گلنا سڑنا — (Necrosis)

#### (Decay of the Jaw)

انگوچرا ویرا (Angustura Vera): یہ دوا 200 طاقت کی دینی چاہئے۔  
 فاسفورس (Phosphorus): بائیں جانب کے زیریں جڑے کا گلنا سڑنا۔  
 سیلیشیا (Silicea): یہ دوا مختلف طاقتوں میں آزمائی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ اوپر والی ادویات ناکام  
 ہو جائیں۔  
 اگریکس ایم (Agaricus M): بالائی جڑے کی ہڈی اور دانتوں میں درد ہو۔

## حصہ سوم۔۔۔ ہونٹ

### سیلان خون — (Bleeding)

آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): ٹائیفائیڈ بخار وغیرہ میں ہونٹوں سے خون نکلے۔ مریض ہونٹ چباتا ہے۔ یہاں تک کہ خون جاری ہو جاتا ہے۔  
 برومیم (Bromium): کالی کھانسی میں ہونٹوں سے خون نکلے۔  
 لیکسیس (Lachesis): بخاروں میں نیو خناق میں ہونٹوں سے خون بہتا ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrum Mur): ہونٹوں سے خون نکلے۔

### آبلے (چھالے ہونٹوں کے) — (Blisters)

(دیکھئے ”بخار“ کے ذیل میں)

### ہونٹوں کا ناسور — (Cancer of Lips)

(دیکھئے ”ناسور“ ”متفرقات“ کے ذیل میں)

### پھٹنا (ہونٹوں کا) (Cracked)

اورم سلفیوریم (Aurum Sulphuratum): ہونٹوں میں دراڑیں پڑ جائیں یعنی ہونٹ پھٹ جائیں۔  
 آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): ٹھنڈی ہوا سے ہونٹ پھٹ جائیں۔  
 برونیا (Bryonia): ٹائیفائیڈ بخار کے دوران اسہال میں۔  
 نیٹرم میور (Natrum Mur): لمبے بخار کے بعد ہونٹ پھٹ جائیں۔  
 سیدا (Sepia): داء میں ہونٹ پھٹ جائیں۔  
 انٹیم کروڈ، کونڈورا انگو، زنک میٹ (Antim Crud, Condurango, Zincum Met): منہ کے کنارے پر پڑ درد دراڑیں۔

### کھینچنا (ہونٹوں کا) — (Drawn Back)

انگو سچرا (Angustia): ہونٹ پیچھے کو خم کھا کر گر جائیں یعنی کھینچ جائیں جس سے دانت نظر آئیں۔

سوجن — (Swelling)

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): ہونٹوں کی سوجن۔

رسولی — (Tumor)

کوینڈوراٹگو، کوئیم، کاربووج، ٹیفنی سیکریا

Veg.

Staphisagria)

(Condurango, Conium, Carbo): یہ دوائیں مریض کی حالت کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔ کوئیم سخت رسولیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور ایسے کیسوں میں سب سے پہلے یہی دوا استعمال ہوتی ہے۔ نرم رسولیوں میں سب سے پہلے ٹیفنی سیکریا آزمائی جاسکتی ہے۔

فاسفورس، سلفر، سیلیشیا (Phosphorus, Sulphur, Silicea): سخت قسم کی رسولیوں کے علاج میں اس دوا کی مانگ کی جاسکتی ہے نیز علاج کے شروع میں بھی اسے دیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً جب عمومی حالت کی نشاندہی ہو یا گزشتہ دی جانے والی ایک دوا یا ایک سے زائد ادویات کے بعد بھی اس دوا کو دیا جاسکتا ہے جبکہ پہلی دوائیں مرض کو دور کرنے میں ناکام ہو چکی ہوں۔

پھڑکن (ہونٹوں کی) — (Twitching)

اولیم انیل (Oleum Ani): ہونٹوں کی پھڑکن۔

حصہ چہارم — (منہ)

خشکی (منہ کی) (Dryness)

آر سینکیم البم (Ars Alb): پھوٹے پھوٹے وقفوں سے تھوڑے پانی کی پیاس کے ساتھ منہ کا خشک ہونا۔

برائی اونیا (Bronia): لمبے وقفوں سے زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس کے ساتھ منہ کا خشک ہونا۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): منہ کی بہت زیادہ خشکی، زبان اتنی خشک ہوتی ہے کہ منہ کی چھت کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ تھوک روئی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ حلق خشک ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔

لیکے سس (Lachesis): منہ کی خشکی، مریض اپنی زبان کو باہر نکالنے کے قابل نہ ہو۔  
 ایومین (Alumen): منہ، حلق اور زبان کی خشکی جس کے ساتھ برف والے ٹھنڈے پانی کی  
 پیاس ہو۔ منہ میں جلن ہوتی ہے نیز منہ میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ منہ گندا اور اسفنجی ہوتا  
 ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): کھانے کے بعد یا صبح کے وقت سانس بدبودار ہوتا ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): شام کے وقت یا رات کو سانس بدبودار ہوتا ہے۔

آورم میٹ (Aurum M): لڑکیوں میں بلوغت کے وقت سانس کا بدبودار ہونا۔

آرم ٹرایپلم (Arum-Trip): منہ سے متعفن بو آتی ہے۔

کیپسکیم (Capsicum): گرم چبھتی ہوئی اور بدبودار ہوا بچھڑوں سے آتی ہے اور گلے کا  
 ذائقہ گندا ہوتا ہے جب کہ مریض کھانسی رہا ہوتا ہے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscamus): منہ کی خشکی، زبان جلے ہوئے چمڑے کی طرح خشک ہوتی  
 ہے اور زبان کا ذائقہ چمڑے کی طرح کا ہوتا ہے۔ منہ میں اتنی خشکی ہوتی ہے کہ کھڑکھڑاہٹ  
 ہوتی ہے۔

برٹامیور (Baryta Mur): منہ کی خشکی، زبان پر دراڑیں ہوں۔ مسوڑھوں سے خون بہتا  
 ہے۔ لیس دار بلغم منہ کو بھر دیتا ہے۔ منہ سے گندی بو آتی ہے۔ جلد میں کانٹے کی سی کیفیت  
 ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔

مرکیوری ایلیس پیرنس (Mercurialis Perennis): منہ اور گلے کی خشکی، یہاں تک کہ  
 کھانڈ بھی منہ میں گھلنے سے انکار کر دے۔ کھانے سے خشکی میں اضافہ ہو۔ سانس گرم ہوتا ہے  
 اور ہونٹوں کو خشک کر دیتا ہے۔

ایپس (Apis): یہ دوا بھی منہ کی خشکی میں مفید ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ذیابیطس والے مریضوں میں منہ کا خشک ہو جانا۔

یورینیم فاس، فاسفورس (Uranium Nit, Phosphorus): یہ دوا میں بھی ذیابیطس والے  
 مریضوں میں منہ کی خشکی کے لئے مفید ہوتی ہیں۔

سیلی سیلک ایسڈ (Salicylic Acid): زبان کی جلن کے ساتھ منہ کی خشکی، جلن، دکھن اور  
 متعفن سانس کے ساتھ منہ کے پداثرات اور سوزشی دکھن۔

ورہٹرم الیم (Veratrum Alb): پینہ آنے کے دوران بڑھی ہوئی بے انتہا پیاس۔

### کھلنا (منہ کا) — (Open)

لیسیس، کاسٹیکم (Lachesis, Causticum): منہ کھولنا دشوار ہو۔  
 اوپیم (Opium): سونے کے دوران منہ کھلا رہے۔ منہ بند نہ کر سکے۔  
 بیوفو (Bufo): مرگی کے حملہ سے قبل منہ کھلا ہو۔  
 سلفر، لائیگوپوڈیم (Sulphur, Lycopodium): منہ بند نہ کر سکے۔

### تندوا (زبان کے نیچے والی تھیلی دار رسولی) (Ranula)

(A Cystic Tumor Beneath the tongue)

تھوجا (Thuja): زبان پر یا منہ میں نیلا ہٹ مائل یا گانٹھ دار وریدیں ہوں۔  
 امبرا گریسیا (Ambra G): متعفن سانس کے ساتھ۔  
 ہائیڈروفوبینم (Hydrophobinum): جب اعادہ کا خدشہ ہو یا جب تندوا کا اعادہ وقفہ وقفہ سے ہو۔  
 کلکیریا کارب (Calcarea Carb): اگر اوپر والے تمام علاج ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔  
 مرک سول (Merc Sol): تندوا سخت اور لمبا ہو۔ یہ دوا تھوجا کے متبادل کے طور پر دی جاسکتی ہے۔

### تھوک — (Salnation)

مرک سول (Merc Sol): مسوڑھوں اور منہ میں دکھن کے ساتھ عام تھوک، حمل کے دوران بھی سونے کے دوران تھوک کو تھوک سے گیل کر دے۔  
 نیٹرم میور (Natrum Mur): زبان پر ناسور کے ساتھ خمدی قسم کا تھوک آنے کا مرض۔  
 ہونٹوں کے زاویوں اور منہ کی اندرونی دیواروں میں زخم (ناسور) ہوں۔ جن کے ساتھ مسلسل اور باافراط شفاف قسم کا تھوک آئے۔  
 ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): جلن دار پانی کی منہ بھر الٹی اور دن رات تھوک کا باافراط اخراج، کھٹی ڈکاریں آئیں۔  
 آئیوڈیم، نائٹرک ایسڈ (Iodium, Nitric Acid): پارے والے تھوک میں اگر پہلی دوا ناکام ہو جائے تو دوسری دوا دینی چاہئے۔  
 آئرس وی (Iris V): جب تھوک آنے کے ساتھ اعصابی درد سر ہو۔ تار دار تھوک۔

ایلیٹیم سیڈوا (Ali Sat): کھانے کے بعد بہت زیادہ مقدار میں تھوک آئے۔ بات چیت کے دوران تھوک کے قطرے گرتے ہیں۔

جیہوراندی (Jaborandi): جب تھوک آنے کی وجہ اعصابیت ہو۔ حمل کے دوران۔  
مرکیوریس، نائٹریک ایسڈ (Mercurius, Nitric Acid): بدبودار اور متعفن تھوک آتا ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): سفید بھاگ دار تھوک جس کے ہمارے فرش تک لٹک جاتے ہیں۔

کالی بانگکرام (Kali Bich): رسی دار تھوک۔

سائیکلے من (Cyclamen): نمکین تھوک۔

اگنیشیا (Ignatia): کھٹا تھوک۔

وریٹرم البم (Veratrum Alb): بے ذائقہ تھوک، عظیم کمزوری، جسم ٹھنڈا ہو، غشی کا رجحان۔

سینچریس کون (Cenchrus Con): سونے کے دوران بہت زیادہ مقدار میں تھوک منہ سے نکلے رہتا رہتا ہے۔

انی فیکس (Epiphegus): لیس دار تھوک، درد سر میں تقریباً مستقل کھولنے کی خواہش ہو۔

آرسنک البم (Ars Alb): نحیف و زار، کمزور، لاغر اور زرد رواسفاس میں، متلی، دل کی جلن اور خوراک کی قے کے ساتھ تھوک آئے۔ حمل کے دوران۔

سلفر (Sulphur): خون کی آمیزش کے ساتھ تھوک آتا ہے۔ جس کے ساتھ ہوا سیرکار، تھان ہو۔

پلساتیل (Pulsatilla): جب متلی اور غذا سے نفرت کے ساتھ تھوک آئے۔ حمل کے دوران۔

کیمومیل (Chamomilla): محاس و لا تھوک آئے۔

کریوزوٹم (Kreosotum): دوران حمل تھوک آئے۔

کالچیکم (Colchicum): سوزش دار منہ میں تھوک بھر جائے۔ جس کے باعث متلی ہو۔

برٹامیور (Baryta Mur): منہ سے گندی بو آنے کے ساتھ تھوک آئے۔

برٹا کارب (Baryta Carb): سونے کے دوران منہ سے تھوک بہتا رہتا ہے۔

## دکھن (منہ کی) — (Stomalitis)

### (Sore)

بیلادونا (Belladonna): منہ خشک و سرخ ہو نیز منہ میں جلن ہو۔ پیاس نہ ہو۔

کپسکیم (Capsicum): منہ کی سادہ سوزش، جلن کے ساتھ۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): منہ کی سادہ سوزش، زبان پر نقشے جیسے نشانات اور جزیروں کی طرح کی سرخ دھبوں کے ساتھ۔ منہ اور زبان خشک، گرم اور جلتے ہوئے محسوس ہوں۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): منہ کے کناروں پر بھوسی دار دھبیاں، ٹھوڑی پر پھنسیاں ہوں۔ نرم تالو کا تاسور جو حلق کے کوئے کو کھالیتا ہے اور نرم تالو کو تباہ کر دیتا ہے اور بعد ازاں منہ کی چھت کی ہڈیوں والے حصے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اشتداد سے کی گندی بو منہ سے آتی ہے جیسا کہ سڑے ہوئے پیر کی ہوتی ہے۔ پارے کے غلط استعمال کے باعث۔

مرک کار (Merc Cor): منہ کی تاسوری سوزش۔

میورٹیک ایسڈ (Mur Acid): منہ میں چھالے ہوں، زبان میں کھلی یا خارش ہو، تاسوروں کا اعادہ ہو۔

آرم ٹرائی قلم (Anum Trip): منہ میں بہت زیادہ سوزشی دکھن ہو۔ زبان سرخ ہو۔ دانوں کا ابھار، ہونٹ اور منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں، ناک میں پھڑکن ہو۔

ریوم (Rheum): سونے کے بعد بدبودار بلغم سے منہ بھر جائے۔

بوریکس (Borax): باغی جھلی جھریوں دار دکھائی دیتی ہے جیسا کہ جل گئی ہو۔ منہ کی خشکی، پیاس اور قے کے ساتھ منہ کی سوزش، پچھالوں کو چھونے سے ان کے اندر سے آسانی کے ساتھ خون بہتا ہے۔

ہائیڈروکوتائل (Hydrocotyle): زبان ذیلی ہوتی ہے۔ دانتوں کے نشانات اس پر نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جل گئی ہو۔ خصوصاً زبان کا سامنے والا حصہ۔

سینگوئینیریا (Sanguinaria): منہ کی چھت اور تالو جلتے ہوئے یا گرم پانی سے دھوئے ہوئے محسوس ہوں۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): پچھالوں والے دکھتے ہوئے منہ کے لئے خاص طور پر فائدہ مند دوا ہے۔ زبان پر بھاری قسم کا طبع ہوتا ہے۔ منہ میں نسکی تاسور ہوتے ہیں۔ منہ سے چیچا بلغم خارج ہوتا ہے۔

بپٹسیا (Baptisia): گرمے سرخ یا ارغوانی رنگ کا غدودوں کا تاسور، گندہ اور بدبودار تھوک

زیادہ مقدار میں بتا ہے۔ زبان دکھتی ہے۔ اس میں شکاف ہوتے ہیں اور زخم ہوتے ہیں۔  
(سل والے پارے کی اصل والے)

آرسینکیم البم (Arsenic Alb): نیلے اور نیلگوں چھالوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔  
جو کہ منہ میں اور زبان پر ہوتے ہیں۔ بخار کے ساتھ گلوں اور مسوڑھوں کی ناسوری سوزش  
ناسوری حصہ کے درمیان میں کالا دھبہ ہوتا ہے۔ شدید بے چینی اور نقاہت ہوتی ہے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): پارے کے غلط استعمال کے باعث یا آتشک کے باعث ناسور۔  
تھوک تیزابی اور بدبودار ہوتا ہے۔ جو منہ کے کناروں کو چھیل دیتا ہے۔ دانت پیلے اور ڈھیلے  
اور گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دوا ناسور اور گنگرین والے زخموں کو درست کرتی ہے۔  
منہ سے گندی بو آتی ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): منہ اور گلے کی سادہ چھالوں والی حالت جس کے ساتھ انگلے میں دقت  
ہوتی ہے۔ معدے کی خرابی کے باعث بچہ دہی کی طرح جما ہوا دودھ منہ سے نکالتا ہے۔ اس دوا  
کی علامات میں تے اور نقاہت شامل ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مسوڑھوں سے خون بننے کے ساتھ منہ کا ناسور مسوڑھوں پر  
نہ یا پیلی لکیریں ہوتی ہیں۔ عام نقاہت۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): منہ کے زخموں میں یہ دوا بہت مفید ہے جبکہ مریض  
کی ہسٹری میں پارے کا غلط استعمال نہ ہو۔ بہت زیادہ تھوک کے ساتھ مسوڑھوں کے ناسوری  
زخم۔ سانس متعفن ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادتی ہو جاتی ہے۔

سپیا (Sepia): زبان میں درد ہوتا ہے۔ جیسا کہ جل کئی ہو۔  
ایومین (Alumen): منہ کا ناسور اور منہ کی خشکی ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

سفی لینم (Syphilinum): رات کے وقت سوتے ہوئے بہت زیادہ مقدار میں تھوک پینے  
کے ساتھ منہ کا ناسور اور مرکیورس کی طرح اس میں تکیہ گیلا ہو جاتا ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): جب منہ میں چھوٹے چھوٹے چھالے ہوں یا استدار بے کی  
حسایت والے ناسوری زخم جن میں منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے آرام ملتا ہے۔

ہیلی بوریس ناگمر (Helleborus Niger): بہت زیادہ تھوک کے ساتھ منہ کے چھالوں کے  
لئے مفید دوا ہے نیز اس میں پیلاہٹ ماکل سرخ کناروں والے زخم ہوتے ہیں۔ زبان سن ہو  
جاتی ہے اور سوج جاتی ہے۔ حلق میں کڑوا ذائقہ ہوتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): منہ میں چھالے زبان بہت زیادہ سوجی ہوئی ہوتی  
ہے۔ تھوک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سانس متعفن ہوتی ہے۔ منہ سے خون بہتا ہے۔



**لیکیس (Lachesis):** جلن اور کچے پن کے ساتھ منہ میں چھالے ہوتے ہیں اور ننگے داغ ہوتے ہیں۔ سوڑھے سوچے ہوئے اسٹیفنی اور سیلان خون والے ہوتے ہیں۔ زبان سوچی ہوئی ہوتی ہے۔ جلتی ہے، کپکپاتی ہے۔ سرخ اور خشک ہوتی ہے اور زبان کی نوک پر شکاف ہوتے ہیں۔

### بولنے میں دقت — (Speech- Difficult)

**سڈرون (Cedron):** دوران حیض بولنے میں دقت ہو۔  
**جلسی میم (Gelsemium):** زبان کے بھاری پن کے باعث بولنے میں دقت ہو۔  
**امونیا کارب (Ammonia Carb):** بولنے میں دقت درد کے ساتھ ہو۔  
**کیورم میٹ (Cuprum Met):** جب گلے میں تشنج کے باعث بولنے میں دقت ہو۔  
**مرکیوریس (Mercurius):** منہ اور زبان کی کپکپاہٹ کے باعث بولنے میں دقت ہوتی ہے۔  
**مریض ہکا کر بولتا ہے۔**  
**اگیریکس ایم، روتا، سٹرامونیم (Argarsicus M, Ruta, Stram):** جب زبان کے تشنج کے باعث بولنے میں دقت ہو۔  
**ڈلکامارا (Dulcamara):** جب زبان کی سوجن کے باعث بولنے میں دقت ہو۔  
**لیکیس (Lachesis):** ٹائیفائیڈ بخار میں۔  
**ارجنٹم میٹ (Argentum Met):** جب لیس دار تھوک کے باعث بولنے میں دقت ہو۔  
**سٹینم (Stannum):** جب چھاتی یا گلے کی کمزوری کے باعث بولنے میں دقت ہو۔  
**کالی بروم (Kali Brom):** بولنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔  
**ہائپرکیم (Hypericum):** بولنے میں جھٹکے لگتے ہوں۔  
**کیمومیللا (Chamomilla):** بولنے میں دقت کے ساتھ الفاظ چھوڑ جائے۔  
**نکس دامیکا (Nux Vom):** الفاظ اور الفاظ کے حصص چھوڑ جائے۔  
**لائیکوپوڈیم (Lycopodium):** مریض غلط الفاظ اور الفاظ کے غلط حصص استعمال کرتا ہے۔  
**گلونائین (Glonoine):** بولنے میں دقت ہو اور گفتگو غیر واضح ہو۔ مشکل ہی سے بول سکے۔  
**یوفو (Bufo):** زبان میں لڑکھڑاہٹ اور ہکا ہٹ، جب اس کی غیر مربوط گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو مریض غصے میں آ جاتا ہے  
**کوکولس (Cocculus):** غیر واضح گفتگو۔  
**امونیا میور (Ammonia Mur):** درست گفتگو نہیں کر سکتا۔

تھوچا (Thuja): الفاظ کے چھوٹے چھوٹے حصے استعمال کرے۔  
 اکوناٹ این (Aconite N): گفتگو میں کپکپاہٹ اور ہکلاہٹ ہوتی ہے۔

### قوت گویائی جاتی رہے — (Loss of Speech)

#### (Speech Wanting)

لیکیس (Lacheis): زبان منہ سے باہر نکلنے میں دقت کے ساتھ مکمل طور پر قوت گویائی کا جاتے رہتا۔  
 ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): خوف کے باعث قوت گویائی جاتی رہے۔ سن ہو جانے اور بڑکھڑاہٹ کے ساتھ زبان کی حرکت کرنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔  
 سٹرانٹیم کارب (Strontium Carb): ٹائیفائیڈ، خار کے باعث۔  
 کاسٹیکم (Causticum): جب عضو کے فالج کے باعث قوت گویائی جاتی رہے۔  
 ناکس وامیکا (Nux Vom): مرگی کے حملے کے بعد۔  
 اکتیاریس (Actea Race): مریضہ ایک لفظ کا حصہ بھی نہیں بول سکتی۔ گو وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے۔  
 فیرم پیکریکیم (Ferrum Picricum): عوام الناس میں تقریریں کرنے والوں میں آواز کا بند ہو جاتا۔

#### تھوکننا — (Spitting)

کوکولس (Cocculus): مسلسل تھوکنے کی خواہش۔  
 کروٹیلس ایچ (Crotalus H): کالا خون تھوکنے۔  
 ایپی فیکس (Epiphegus): اعصابی درد سر کے ساتھ مسلسل تھوکننا، تھوک لیس دار ہوتا ہے۔  
 سٹرامونیم (Stramonium): منہ میں بھاگ کے ساتھ مسلسل تھوکننا۔  
 کاجوپٹم (Cajuputam): مسلسل تھوکنے کا رتھان۔

#### ہکلاہٹ — (Stammering)

سٹرامونیم (Stramonium): ہکلاہٹ کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ ایک لفظ ادا کرنے سے پہلے وہ لمبے وقت کے لئے خود کو تھکاتا ہے۔ قابل لحاظ عرصہ تک اس دوا کو استعمال کیا جائے۔

چہرہ بگڑ جاتا ہے اور بولنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔

بووٹا (Bovista): بچوں میں ہکلاہٹ۔

کالی بروم (Kali Brom): ہکلاہٹ ہو، آہستہ اور دقت کے ساتھ بولے۔

کلییریا کارب (Calcarea Carb): زبان کے لمبا ہونے، بھاری ہونے اور تالو کے سخت

ہو جانے کے ساتھ ہکلاہٹ ہو۔ CM طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): جب شراب منہم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): زبان کے بھاری پن کے باعث ہکلاہٹ۔

سیکونڈاواروسا (Cicuta Vir): جب اپنے الفاظ نکل جائے۔

کاسٹیکم (Causticum): جب جوش یا انتہائی ناراضگی کے باعث ہو یا اس سے ہکلاہٹ میں

زیادتی ہو۔ فالجی کیفیت کے باعث ہکلاہٹ۔

ارجنٹم نائٹ، لائیو پوڈیم، وریٹرم البم (Arg Nit, Lycopodium, Veratrum Alb):

جب ٹائیفائیڈ بخار کے باعث ہکلاہٹ ہو۔

لیکیسیس (Lachesis): اس قسم کے حروف مثلاً (X, S, V, T, A, P) س، و، ت، ا، پ

وغیرہ پر ہکلائے۔

سیڈرون (Cedron): عورتوں میں مباشرت کے بعد ہکلاہٹ ہو۔

یوفو (Bufo): ہکلاہٹ اور لڑکھاہٹ جب بے ربط گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو مریض غصے میں

آجائے۔

## منہ کی دکھن (سوزشی) — (Stomatitis)

(دیکھئے ”دکھن“)

## ذاائقہ (Taste)

چائنا (China): ہر چیز بشمول پانی کا ذائقہ کڑوا ہو۔

براہیونیا، نیٹرم میور، پلساٹیلہ، سلفر (Bryonia, Natrium Mur, Pulsatilla, Sulphur):

جب غذا کا ذائقہ کڑوا ہو تو دی ہوئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں آزمائی جاسکتی ہیں۔ یہاں

تک کہ کسی مخصوص دوا کی علامات ظاہر ہو جائیں۔

ایکونائٹ این (Aconite N): پانی کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ کڑوا ہو۔

کریو زوم (Kreosotum): پینے کے بعد غذا کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔

کاربوونج، بوریکس (Carboveg, Borax): کھانے سے پہلے ذائقہ کڑوا محسوس ہو۔  
 سائیکے من (Cyclamen): ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ ذائقہ مدہم پڑ جاتا ہے یا گھڑ جاتا ہے۔  
 کیمفر (Camphor): ہر قسم کی غذا کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔  
 وریٹرم ویر (Veratrum Vir): پانی کا ذائقہ میٹھا محسوس ہو۔ مٹھائیوں سے نفرت ہوتی ہے۔  
 مرک سول (Merc Sol): روٹی میٹھی محسوس ہوتی ہے۔  
 کیورم میٹھ (Cup Met): دھات کا ذائقہ پکٹنا اور میٹھا۔  
 رشائکس (Rhus Tox): ذائقہ ترش دھات کا سا اور گریس کی طرح کا سا۔  
 نکس وامیکا (Nux Vom): ذائقہ برا ہو اور ترش ہو۔ جس کے ساتھ تمام اقسام کے ذائقے بدل بدل کر آئیں۔ دودھ کا ذائقہ دل خراب کر دینے والا ہو۔ جیسا کہ پھنے ہوئے دودھ کا ہوتا ہے۔

بوویشا (Bovista): خون کا ذائقہ۔  
 لائیو پوڈیم (Lycopodium): ہر چیز کھنی محسوس ہوتی ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrur Mur): کھانے کے لمبے عرصے بعد تک غذا کا ذائقہ باقی رہے، نمکین ذائقہ۔  
 کیپسکیم (Capsicum): سڑے ہوئے پانی کی طرح کا خراب ذائقہ جب کھانے تو منہ سے تیز پھمکتا ہوا بدبودار ذائقہ آئے۔  
 ہائیڈراستیس (Hydrastis): غذا کا ذائقہ عجیب ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دیر تک ذائقہ باقی رہتا ہے۔  
 آیوڈیم (Iodium): برا ذائقہ جیسا کہ صابن کا ہو۔ زبان کی نوک پر نمک والا ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ مٹھایا نمکین ہو سکتا ہے۔  
 کوکولس (Cocculus): مسلسل تھوکنے کی خواہش کے ساتھ مٹھا دھات والا ذائقہ۔  
 میڈورہینم (Medorrhinum): طبع والی زبان کے ساتھ تانبے کا ذائقہ، رخساروں اور ہونٹوں کی اندرونی سطح پر پھالے ہوتے ہیں۔  
 مرکوریس (Mercurius): ذائقہ نمکین، مٹھا، دھات والا، لٹپٹا یا سڑے ہوئے انڈوں جیسا ہوتا ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): قے کے رجحان کے ساتھ گلے سڑے گوشت کا سا ذائقہ، منہ میں جلنے کا ذائقہ، کڑوا ذائقہ، تمام غذاؤں کا ذائقہ مدہم ہو جائے۔  
 سٹرامونیم (Stramonium): ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ تمام غذا میں کڑوی محسوس ہوں۔ قوت

ذائقہ کھو بھی سکتی ہے۔  
وریرٹرم البم (Veratrum Alb): منہ میں ذائقے کا نہ ہونا، بے ذائقہ تھوک، پیٹنے آنے کے  
 دوران امتداد رجبے کی پیاس۔

### ناسوری کیفیت — (Ulceration)

(دیکھئے ”دکھن“)

### حصہ پنجم۔۔۔ دانت

### بوسیدگی (دانتوں کی) — (Caries)

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): دانتوں کی بوسیدگی اور گلنے سڑنے کے لئے یہ دوا چوٹی  
 کی ہے جبکہ ساتھ میں دانتوں کا انیمل بھی جاتا رہے۔ درد یا درد کے بغیر دانتوں کا غیر قدرتی طور  
 پر ڈھیلا ہو جانا۔ دانت اپنی جگہوں پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جب دانت کالے ہو جائیں اور ان میں گہرے رنگ کی  
 دھاریاں ہوں اور گلنے سڑنے لگیں۔ معمولی چھونے سے دانتوں میں حساسیت ہو۔ کھانے یا پینے  
 کے بعد دانت درد کریں۔ دودھ کے دانت مکمل طور پر نشوونما نہ پائیں اور کالے ہو جائیں اور  
 ریزہ ریزہ ہو جائیں۔

مرک سول (Merc Sol): دانتوں کا گلنا سڑنا اور ڈھیلا پڑ جانا۔ مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔  
 بچوں کے معاملہ میں جبکہ دانت میخوں کی طرح سے ہوں۔ یہ دوا ہلکی طاقت میں مثلاً 6 طاقت  
 مستقلاً تین ماہ تک دینی چاہئے۔ پھر ایک ماہ یا کچھ عرصہ کے بعد یہ کورس دہرانا چاہئے۔

پلانٹیکو (Plantago): تیزی کے ساتھ دانتوں کا گلنا سڑنا اور گرنا۔ دانتوں میں ”دکھن“ ہو  
 مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔

کریو زونٹم (Kreosotum): جب دانت جیسے ہی وہ ظاہر ہوں، سیاہ ہو جائیں اور گل سڑ  
 جائیں۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): دانتوں کا تیزی کے ساتھ بوسیدہ ہونا، دانتوں کا ناسور۔  
تھوجا (Acid Phos): دانت جڑوں سے گل سڑ جائیں۔ جبکہ دانتوں کے اوپر والے حصے  
 مضبوط ہوں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): دانت زرد ہوں، مسوڑھوں سے خون بہے اور مسوڑھے سوج

جائیں اور دانتوں سے الگ ہو جائیں۔ مسوڑھوں میں پردرد گانٹھیں ہوں۔  
سفلیئم (Syphilinum): دانت ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹیں اور پیلے پڑ جائیں۔ دانت مسوڑھوں  
کے کناروں سے گل سڑ جائیں اور ٹوٹ جائیں۔

ٹیوبرکولینم بویو (Tuberculinum Bov): جب دانتوں کی نشوونما نہ ہو یا وہ ظاہر ہی نہ  
ہوں۔ یہ دوا دانت پیدا کرتی ہے۔ بچوں میں دانت گندے اور تقریباً سبز رنگ کے نظر آتے  
ہیں۔ اس دوا کی ایک، خوراک دانت صاف کر دے گی۔

چیرانٹھس (Cheiranthus): عقل دائرہ کے نکلنے وقت کی تکالیف کے لئے۔

آرنیکا مونت (Arnica Mount): دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہر آدمی گھٹنے کے  
بعد اس دوا کی ایک یا دو خوراکیں لی جائیں۔ یہ جراحی کے صدمات کو روک دے گی۔ جراحی  
کے بعد دوا تین خوراکیں ہر ایک گھنٹے کے بعد لی جائیں۔

ایپیکاک (Ipec): دانت نکالنے کے بعد خون کا بہنا اگر خون چمک دار سرخ ہو اور زیادہ مقدار  
میں بنے تو یہ دوا دی جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): جراحی کے بعد دانتوں کی خلاؤں سے خون کا بہنا ہر چندہ صحت  
کے بعد اس دوا کی دو یا تین خوراکیں دیجئے۔ دانت بے رنگ ہو جائیں، نیلے ہو جائیں،  
کھوکھلے ہو جائیں، مسوڑھوں سے خون بنے، دانتوں کی خلاؤں سے خون کا اخراج ہو، جڑے کا  
گنا سڑا۔

مزیمریم (Mezerium): دانت تیزی سے نکلیں سڑیں اور دانت لمبے محسوس ہوں۔

سلیشیا (Silicea): سوکھا مسان (Rickety) کے مریض بچوں کے دانتوں کی بوسیدگی۔

کلکیریا فاس (Silicea): دانت دیر سے نکلیں اور جلد بوسیدہ ہو جائیں۔ دانت پھوٹنے سے  
اور دباؤ سے حساس ہوں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): موٹاپے والے بچوں میں دانتوں کی بوسیدگی۔ دانت  
ظاہر ہی نہیں ہوتے یا جہاں ظاہر ہوتے ہیں وہیں تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کے اوپر پھوٹے  
بد صورت تاج ہوں، نوک سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی خون کو روکنے والی دوا ہے کیونکہ دانت نکالنے  
کے بعد بننے والے خون کو منجمد کرنے میں یہ بہت زود اثر دوا ہے۔

کاربوونج (Carbo Veg): دانت بہت تیزی سے بوسیدہ ہوں۔ مسوڑھے اسٹیفی ہوتے  
ہیں۔ جن سے خون، آسانی کے ساتھ بہتا ہے۔ گرم، ٹھنڈی اور نمکین غذا سے دانتوں میں کھینچنے  
والے اور پھاڑنے والے درد ہوں۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): دانت ڈھیلے پڑ جائیں اور گر جائیں۔ مسوڑھے دانتوں سے

جدا ہو جاتے ہیں۔ دانتوں میں درد ہو جو گرم چیزوں سے اتر ہو جائے اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر ہو۔

### بدنمائی (دانتوں کی) — (Deformity)

(نیز دیکھئے ”بوسیدگی (دانتوں کی)“)

سفلیئم (Syphilinum): دانت بدنما ہو جائیں۔ مڑنا کر ان کی شکل بگڑ جائے۔ دانتوں پر دھبے ہوں۔ جلد بوسیدہ ہو جائیں۔ بچوں میں کپ کی شکل کے دانت۔ شدید درد ہو۔ دانتوں کی جڑوں میں رنگین ہو جیسا کہ وہاں کوئی کیزا ہو۔

### گرنا (دانتوں کا) — (Falling Out)

(نیز دیکھئے ”سوڑھے“ کے ذیل میں ادویات)

مرک وائیو (Merc Viv): سادہ قسم کے کیسوں میں۔  
فاسفورس (Phosphorus): سوڑھوں میں پیپ کے ساتھ دانتوں کا گرنا۔

### دانتوں کا ناسور — (Fistula Dentalis)

سلیشیا (Silicea): دانت کا ناسور، سوڑھوں میں ابلے ہوں۔ دانتوں کی جڑوں میں پھوڑے ہوں۔ سوڑھے ٹھنڈی ہوا سے حساس ہوں۔  
ایسڈ فلورکیم (Acid Fluoricum): دانتوں کا ناسور جس سے مسلسل خون والا، نمکین مواد خارج ہوتا رہے۔ دانت گرم محسوس ہوتے ہیں۔ بالائی جبڑے کے دانت اور ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔

### الگ ہونا — (Separation)

کاربو ویج (Carbo Veg): دانتوں سے سوڑھوں کا جدا ہو جانا۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اسٹنٹی سوڑھے، دانت تیزی سے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ سوڑھوں سے خون بہتا ہے۔ گرمی اور ٹھنڈک دونوں سے درد ہوتا ہے۔  
ایومین (Alumen): دانت ڈھیلے پڑ جائیں اور بوسیدہ ہو جائیں۔ سوڑھے دانتوں سے جدا ہو جائیں۔ سوڑھوں سے خون جاری ہو۔

## دانت کا درد — (Toothache)

آرم ٹرائی قلم 200 (Arum Triph 200): زیریں جڑے کی بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی داڑھ میں درد ہو، خصوصاً بائیں جانب۔

چینوپوڈیم (Chenopodium): جب درد میں ٹھنکے سے افادہ ہو۔

کافیا کروڈ (Coffea Crud): جب درد کو ٹھنڈے یا برف والے پانی کو منہ میں لینے سے افادہ ہو۔ 200 ڈالکی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): دوران حمل دانت کا درد جس میں ٹھنڈک اور آرام سے اضافہ ہو۔ چمچل قدمی سے افادہ ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے یا کھلی ہوا میں چمچل قدمی سے درد میں افادہ ہو۔ حاملہ عورتوں میں اعصابی دانت کا درد، مریض کو پیاس نہیں لگتی جبکہ پسینہ بہت آتا ہے۔ گرم چیزوں سے اور گرم کمروں میں ابتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): جب ہاتھ پانی میں ڈبوئے سے درووں میں اضافہ ہو جائے۔ برتن یا کپڑے دھونے والی مستورات میں دانت کا درد۔

ہیکلا لاوا (Hecle Lava 3x): دانت کا درد، مسوڑھوں کے پھوڑے، جڑوں میں سوجن، دانتوں کے نکلنے میں دقت ہو۔

کریوٹوٹم (Kreosotum): بوسیدہ دانتوں اور سکریوٹی مسوڑھوں کی وجہ سے دانت کا درد لاحق ہو۔ دودھ کے دانتوں کا وقت سے پہلے ہی بوسیدہ ہو جانا، وہ پیلے اور گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور پھر بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): جب درد میں بہتری ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی سے کھلی کرنے سے ہوتی ہو۔ دانتوں میں خلال کرنے سے اور انہیں چوسنے سے بھی درد میں افادہ ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): دانتوں میں ٹپکن والے درد کے ساتھ دانتوں کے لمبے ہو جانے کے احساس کو یہ دوا درست کرتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrum Mur): دانت کا درد، دانت بہت زیادہ حساس ہوں۔ دانتوں کو ہوا دینے سے اور دانتوں پر زبان کا یا خوراک کا دباؤ ڈالنے سے دانتوں میں درد ہو۔ دانت ڈھیلے پڑ جائیں۔ کھینچنے والا درد دانتوں سے آگے بڑھ کر کان تک چلا جائے۔

میگ نیٹس پولس آرس (Magnatis Polus Arc): دانتوں میں اور بائیں جانب کے زیریں جڑے میں درد ہو جس کے ساتھ ایک رخسار میں سوجن، حرارت اور سرخی ہو۔ جسم میں ٹھنڈک ہو۔



اگیریکس ایم (Agaricux M): دانتوں اور بالائی جڑے کی ہڈی میں درد ہو۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): سوزھے سوئے ہوئے، گرم اور نرم ہوں، اچھلنے والا  
 دانتوں کا درد گرم مشروبات سے بہتر ہو جبکہ چھونے سے یا دانتوں پر دباؤ ڈالنے سے بہتر ہو۔  
سیدیا (Sepia): دوران حمل دانت کا درد ہو۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): کھوکھلے دانتوں میں دانت کا درد ہو۔ درد بعض اوقات سر تک  
 گھستا چلا جائے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد اور ٹھنڈے پانی سے بہتری ہو۔ زبان کے ساتھ  
 دانت کو چھونے سے درد پیدا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اعصاب کو پھاڑا جا رہا ہو۔  
 کھلی ہوا میں چھل قدمی سے بہتری ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ کھانے کے بعد بوسیدہ دانتوں میں کترنے  
 جیسا درد ہو۔

نایٹرم کارب (Natrurn Carb): مٹھائیاں کھانے سے یا میٹھے پھل کھانے سے دانتوں میں  
 درد ہو۔

بسمتھ (Bismuth): ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے سے درد میں افادہ ہو۔  
چائنا آف (China Off): بچے کو دودھ پلاتے وقت دانت کا درد ہو۔  
کلیمٹس (Clematis): گلنے سڑنے والی دائرہ میں درد ہو۔ روئی کا ریزہ کھوڑ میں چلے جانے  
 سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی سے بھی  
 درد میں اضافہ ہوتا ہے۔

مرک سول (Mero Sol): جب گلنے سڑنے والے دانتوں کی جڑوں میں سوزش ہو۔ دانت  
 کالے اور گندے ہوں اور جلد گل سڑ جائیں۔ دھڑکن والے درد جن میں رات کے وقت یا  
 مرطوب موسم میں بہتری ہو۔ دانت لمبے اور دکھتے ہوئے محسوس ہوں۔ گرم یا ٹھنڈی چیزوں  
 کے گلنے سے بہتری ہو۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): گرم غذا یا مشروبات سے دانت کا درد لاحق ہو۔  
ہائیوسایامیلا (Hyoscyamilla): دانت بہت لمبے، بہت ڈھیلے محسوس ہونے کے ساتھ درد  
 کریں۔

کیمومیلا (Chamomilla): جب دانت کے درد میں گرم غذا یا گرم مشروبات کے باعث  
 بہتری ہو۔ یہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ برداشت نہ ہونے والا درد جو دانتوں کی پوری قطار  
 کو متاثر کرے اور اس کی لہریں کانوں اور چہرے تک جائیں۔ دن کے دوران درد غائب ہو جاتا  
 ہے جبکہ رات کے وقت جب مریض گرم بستر میں جاتا ہے تو درد دوبارہ آ جاتا ہے۔  
سٹیفیسیگریا (Staphisagria): دانت کا درد آنکھوں تک پھیل جاتا ہے۔ کالے، سڑے

ترے 'بوسیدہ' پرت والے دانت۔ چھونے سے اور ٹھنڈے مشروبات سے بہت زیادہ حساس۔ دوران حیض دانت کا درد ہو۔ گلے سڑنے والے دانتوں کی جڑوں میں کترن 'گلے سڑنے والے دانتوں میں درد' معمولی چھونے سے ابتری ہو۔

**کلکیریا فلور (Calcarea Flour):** دانت کے درد کے لئے ایک عمدہ دوا ہے جبکہ عیشیم کی قلت ہو اور دانتوں کی پالش (انیل) اتر جائے۔ دانتوں کے ساتھ اگر کوئی غذا چھو جائے تو دانت کا درد شروع ہو جائے۔

**پلانٹے گو میجر (Plantago Major):** دانتوں کا درد کانوں تک پھیل جاتا ہے۔ اس دوا کا استخراج بیرونی طور پر لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے فوری افادہ ہوتا ہے۔

**کوکی نیلا (Coccinella):** دانتوں 'مسوڑھوں اور منہ کا اعصابی درد جس میں رات کو ابتری ہو۔

**اولیم انیلس (Oleum Ani):** دانتوں کو آپس میں دبائے سے دانت کا درد بہتر ہو۔  
**مگنیشیا کارب (Magnesia Carb):** حیض سے پہلے اور حیض کے دوران نیز حمل کے دوران دانت کا درد ہوتا ہے۔ پھرے کے بائیں جانب درد ہو حالانکہ دانتوں کی جڑیں مکمل طور پر ٹھیک ہوں۔

**نیٹرم سلف (Natrum Sulph):** دانت کا درد گرمی سے ابتر ہو اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے بہتر ہو۔ مسوڑھے دانتوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔

**کاربو ووج (Carbo Veg):** دانتوں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد 'گرمی ٹھنڈک اور تمکین غذا سے ہوں۔ مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔ مسوڑھے اسفنجی ہوتے ہیں۔ جب دانت صاف کئے جائیں تو خون بہتا ہے۔ دانتوں سے مسوڑھے جدا ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی تمام قطار لمبی اور نرم محسوس ہوتی ہے۔

**ریفانوس (Raphanus):** حمل کے ابتدائی مراحل کے دوران دانت کا درد۔  
**روڈوڈینڈرون (Rhododendron):** طوفان بادوباراں سے پہلے یا طوفان بادوباراں کے دوران دانتوں کا درد ظاہر ہوتا ہے۔

**آرنیکا ایم (Arnica M):** دانت نکالنے کے بعد دانتوں سے خون بہتا ہے۔ دانت بھروانے یا دانتوں میں سوراخ کرانے سے ہونے والا درد۔

**سپاگی جیلیا (Spigelia):** بوسیدہ دانتوں میں پھاڑنے والے درد ہوں جو متاثرہ جانب دائرہ کی بڑی تک پھیل جاتے ہیں۔ گلے سڑنے والے دانتوں میں ٹھنڈا یا ٹھنڈے پانی سے دردوں والے

جھٹکے ہوں۔ نیکیے پر سر رکھ کر آرام کرنے سے دردوں میں اتھری ہوتی ہے اور سر اٹھانے سے اتفاق ہوتا ہے۔

الیومن (Alumen): دانتوں سے خون بہتا ہے جو کہ نکلنے سڑتے ہوں اور مسوڑھے بھی نکل جائیں۔ دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ دانت نکلوانے کے بعد خون بہتا ہے۔

## حصہ ششم --- زبان

کاٹنا — (Biting)

(دیکھئے ”کاٹنا“ ”متفرقات“ کے ذیل میں)

## سرطان (Cancer)

الیومن (Alumen): شام کے وقت جلن دار درد کے ساتھ زبان خشک اور کالی ہو۔ دھن ہو اور ٹانگے نکلنے کا احساس ہو۔ زبان کی نوک میں اتھری ہوتی ہے۔ جب کبھی سوزش ہوتی ہی تو زبان میں ختی کار جھان ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): زبان کا سرطان یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سونی ہوئی زبان کے مرکز میں سوراخ ہو۔ زبان کے کنارے اوپر کو ابھرے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں۔ شدید سیلان خون کے ساتھ زبان کا سرطان۔ ایسے کیس میں 200 طاقت کی ایک خوراک ہر ہفتہ دی جائے۔

اپیس ایم (Apis M): رسولیاں، زبان کی ختی، زبان کا سخت سرطان یا کھلا ہوا سرطان جس کے ساتھ ڈنک نکلنے جیسے جلن دار درد ہوں۔ زبان خشک ہوتی ہے اور سونی ہوئی ہوتی ہے نیز سوزش ہوتی ہے جس کے ساتھ نکلنے کی نااہلیت ہوتی ہے۔ زبان پر شکاف ہوتے ہیں۔ دھن ہوتی ہے۔ زبان زخم آلود ہوتی ہے یا زخم کے دھبوں سے بھری ہوتی ہے۔ زبان کا سرطان۔

آر سینک البم (Ars Alb): زبان نیلاہٹ مائل رنگ والی یا سفید ہوتی ہے۔ زبان پر ناسوری زخم ہوتے ہیں۔ نیلے رنگ کے ساتھ جب آر سینک البم والی علامت نمایاں ہوں تو اس کا علاج دوا کی طاقتوں سے کیا جائے گا۔ جب علاج بالشل زیادہ سادہ ہو تو چھوٹی طاقتیں درکار ہوتی ہیں۔ اس کیس میں آر سینک سرطانی ریشوں اور سرطانی عناصر کے نظام پر براہ راست عمل کرتی ہے۔ آر سینک ہائیڈرائڈ (Ars Hydrs): زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ بے قاعدہ اور گہرے ناسور ہوتے ہیں۔ گرہ دار سوجن ہوتی ہے۔ منہ گرم اور خشک ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی پیاس ہوتی ہے۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): زبان کا سرطان، زبان پر دانٹوں کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ زبان کے کناروں کی جانب کٹاؤ یا شکاف ہوتے ہیں۔

کونڈورا نگو (Condurango): زبان کا سرطان، منہ کے کونوں میں شکاف پر درد ہوتے ہیں۔ زبان کی بالائی سطح پر زبان کی نوک کی دائیں جانب پر درد گومڑیا پھنسیا ہوں۔

کالی سائی نیٹم (Kali Cyanatum): زبان کی دائیں جانب سرطانی ناسور ہونٹ اور منہ کی بائیں جھلی پھلی ہوتی ہے۔ زبان کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ جس پر سفید طبع ہوتا ہے۔

آرم میٹ (Arum Met): منہ میں دھات کا ذائقہ ہوتا ہے۔ زبان پر بھورے مائل قر کا ہلکا سا طبع ہوتا ہے۔ ذائقہ کی قوت جاتی رہتی ہے۔ بالٹھو لیا ہوتا ہے۔ منہ میں کڑوا ذائقہ ہوتا ہے۔ خشکی کا احساس ہوتا ہے۔ ذائقہ کی حس نہیں رہتی۔ زبان چمڑے کی طرح سخت اور ناقابل حرکت ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے سے سورج طلوع ہونے تک مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ خود کشی کا رجحان ہوتا ہے۔ آتشک اور / یا پارے کے بد اثر کے باعث شخصیت میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔

اورم میور (Arum Met): زبان جھٹی یا سپاٹ ہوتی ہے۔ منہ میں برا ذائقہ ہوتا ہے۔ قریب قریب حس ذائقہ کھو جاتی ہے۔ سرطان لاحق ہو۔ زبان چمڑے کی طرح سخت ہوتی ہے۔ مشکل ہی سے زبان کو حرکت ہوتی ہے۔ زبان پر سرخی، خشکی اور ناسوری زخم ہوتے ہیں۔

بیمینز الیمڈ (Benz Acid): ہلکے نیلے رنگ کی زبان، پیشاب تیز بو والا اور تیز رنگ والا ہوتا ہے۔ گہرے شکافوں اور پھیلے ہوئے زخموں کے ساتھ زبان کی سطح افسنجی ہوتی ہے۔ ناسوری رسولی منہ کے بائیں جانب ہوتی ہے۔ جیزوں کے ملنے والی نرم جگہ پر اور دائرہ کے پیچھے ناسوری رسولی ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calc Carb): دردوں والی اور شکافوں والی زبان، پارے کے غلط استعمال کے بعد زبان کی سوزش، سفید طبع دار زبان، گندی، برے ذائقے والی زبان، ہونٹ اور ہاتھ سفید اور ٹھنڈے ہو جائیں۔ زبان کی ہڈی کے پیچھے دائیں جانب ٹگتے وقت زبان کے نیچے درد ہوتا ہے۔ زبان کے نیچے والے غدود سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ زبان اوپر کی طرف دھکیلی جاتی ہے نیز بائیں جانب دھکیلی جاتی ہے۔ گول نیم شفاف اتار چڑھاؤ والی کیوتر کے انڈے کی جسامت کی رسولی کے ذریعے، تیندوا، کینسر زبان کا یا زبان کے آتشکی گومڑ، پھوڑے، شکاف یا درزیں زبان کے نصف پہلو کی سوجن۔

کلکیریا فلور (Calc Fluor): پیپ دار ابھار، پیدائشی آتشک جو خود کو منہ اور حلق کے ناسوری زخموں کی حیثیت سے ظاہر کرتے ہیں۔ اعضاء میں سوراخ کھودنے جیسے درد ہوں اور

حرارت کے ساتھ بوسیدگی اور گلنا 'سزنا' زبان پر خشک ظاہر ہوتے ہیں۔ سوزش کے بعد سختی آ جاتی ہے۔

**کاربو انیل (Carbo An):** زبان کی نوک پر جلن اور منہ میں کچا پن ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور زبان کے کناروں پر چھالے ہوتے ہیں۔ تالو اور زبان خشک ہوتے ہیں۔ زبان پر ابھار ہوتا ہے۔ غدد گرہ دار ابھار والے سو جے ہوئے 'سوزشی' ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ بھالے لگنے پیسے کانٹے جیسے یا جلن دار درد ہوتے ہیں۔ زخموں والے ابھار ہوتے ہیں۔

**کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid):** بدبودار مادوں کا اخراج ہو۔ ہونٹوں کی اندرونی جانب اور رخساروں کی اندرونی سطح پر ناسوری زخموں کے قطعات ہوتے ہیں 'منہ اور معدے میں جلن کا احساس ہوتا ہے' متعفن مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔

**کاسٹیکم (Causticum):** زبان کی ناقابل برداشت دکھن جیسا کہ گرم اچلتے ہوئے پانی سے دھوئی گئی ہو۔ زبان کی نوک پر پردرد دانے 'زبان کا قالج' زبان میں درد ہو جیسا کہ مریض نے اپنی زبان کو کاٹ لیا ہو۔ منہ میں جلن دار درد ہو۔ نیز تالو اور زبان کی نوک پر جلن دار درد۔

**کرومیکم (Cromicum Ac):** علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں اور اچانک چلی جاتی ہیں اور پھر دوبارہ دورے کی صورت میں آتی ہیں۔ ناک کے پچھلے حصے کی رسولیاں۔

**سائٹرس (Citrus):** زبان کے کینسر والے درد میں سرک ایسڈ بیرونی طور پر لگایا جاتا ہے۔

**کونیم (Conium):** بولنا مشکل ہوتا ہے۔ زبان اور منہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ زبان اور ہونٹ خشک اور چپچپے ہوتے ہیں۔ زبان سوچی ہوئی پردرد اور اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ غدد سو جے ہوئے اور ابھار والے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ سمجھنا ہٹ اور ٹانگے لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ بگی مار یا کیت مار اور خراشیں لگنے کے بعد۔ ناسوروں سے خون بہتا ہے۔ جس کے ساتھ متعفن رطوبت خارج ہوتی ہے۔ ایک حصے میں منکرین ہو جاتی ہے۔ بڑیوں کا چھپا ہوا سرطان۔ غددوں کی سرطانی سو جہن اور ابھار۔ ہونٹوں کا سرطان 'چہرے پر پھیلتے ہوئے ناسور' بگی مار یا اندرونی چونٹوں کے بعد جلنے ٹانگے لگنے کے بعد سرطان اور سرطانی ناسور ہوتے ہیں۔ متاثرہ حصوں میں ڈنک لگتے ہیں۔

**کروٹیلس ہور (Crotalus Hor):** زبان سرخ اور سوزشی دکھن والی ہوتی ہے۔ زبان پیلی سخت اکڑی ہوئی اور من ہوتی ہے۔ سوزش کے باعث زبان اتنی زیادہ سو ج جاتی ہے کہ منہ میں جگہ باقی نہیں رہتی۔ زبان اپنی جسامت سے دو گنا زیادہ سو ج کر موٹی ہو جاتی ہے۔ زبان باہر نکل آتی ہے۔ آنٹک 'سیلان خون کے رتخان کے ساتھ زبان کا سرطان۔

## رنگینی (زبان کی) — (Colouration)

رشاکس (Rhus Tox): زبان کے کناروں کے علاوہ بلفم کے ساتھ زبان پر نقشے بنے ہوتے ہیں۔

وربٹرم ویر (Veratrum Vir): منہ اور ہونٹوں کے خشک ہونے کے ساتھ زبان کے مرکز میں سرخ دھاری ہوتی ہے۔ زبان پر طبع چڑھا ہوتا ہے۔

ٹربینٹھینا (Terbinthina): زبان ہموار، شفاف، سرخ ہوتی ہے۔ نقشے والی زبان۔

کاربو ووج (Carbo Veg): زبان کالی ہوتی ہے۔

مرک سول (Merc Sol): سرخ کناروں کے ساتھ۔

آرسینک اہم، ہائپوسائیمس (Arsenic Alb, Hyoscyamus): زبان بھوری ہوتی ہے۔

نیزم سلف (Natrurn Sulph): زبان پر سرخ دھجیاں ہوتی ہیں۔

ٹاراکسیکم (Taraxacum): نقشے والی زبان جو گہرے سرخ، نرم دھبوں والے ٹکڑوں کو چھوڑ دیتی ہے جبکہ صاف ہو۔ یہ نرم دھبے حساس ہوتے ہیں۔

کالی میور (Kali Mur): نقشہ دار زبان، بھورا ہونے کی طرف مائل سفید رنگ کا طبع زبان پر ہوتا ہے۔

## دراڑیس (زبان کی) — (Cracks)

بیلادونا (Belladonna): زبان شکاف دار خشک اور جھلسی ہوئی ہوتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): شکاف دار خشک زبان، زبان کی نوک میں جھنجھٹا ہٹ ہوتی ہے۔ جبکہ زبان کی نوک سخت ہوتی ہے۔

رینن کولس ایس (Ranunculus): چھلی ہوئی اور شکاف دار زبان۔

آرم ٹرائی فلم (Arum Trip): زبان میں شکاف ہو۔ درد ہوتا ہو اور خون بہتا ہو۔ ناک سے تیزابی مواد خارج ہونے کے ساتھ زبان کی سوزش، زبان اور حلق کی خارجی کمزوری جو نکلنے کو ناممکن بنا دے اور غذا و مائع ناک کے راستے باہر دھکیل دے۔ زبان سرخ ہو جس پر سرخ دانے نکلے ہوئے ہوں۔ زبان تقریباً نیکی نظر آتی ہے۔

رہس وی (Rhus V): زبان درمیان سے شکاف دار ہوتی ہے۔

کالی بانی (Kali Bi): زبان شکاف دار ہوتی ہے اور گلاس کے پینڈے کی طرح چمکتی ہے۔

کونڈوراگو (Condurango): پردرد شکاف ہوتے ہیں۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): زبان سخت خشک دار ہوتی ہے۔ جس سے خون بہتا ہے۔ بولنے میں دقت ہو یا قوت گویائی جاتی رہے۔ زبان اطاعت نہ کرے۔

### خشک (زبان) — (Dry)

ہائیوسائیمس (Hymoscyamus): زبان منہ میں لڑکھڑاتی ہے اور جلے ہوئے چمڑے کی طرح خشک ہوتی ہے۔

میورینک ایسڈ (Muriatic Acid): ٹائیفائیڈ بخار میں زبان چمڑے کی طرح خشک ہو جائے۔

کیمفر (Camphor): پیشاب کی بندش کے ساتھ ٹائیفائیڈ بخار میں زبان خشک ہوتی ہے۔  
فاسفورس، مرک سول (Phosphorus, Merc Sol): اسہال میں زبان خشک ہو۔ دی گئی ترتیب کے مطابق دوائیں استعمال کی جائیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): رات کے وقت زبان خشک ہوتی ہے۔ جیسا کہ پاؤڈر بن کر گر جائے گی۔ زبان منہ کی چھت کے ساتھ چپک جاتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): زبان کسی ککڑے یا قاش کی طرح منہ میں لڑکھڑاتی ہے۔

برا یونیا (Bryonia): پیاس کے ساتھ زبان خشک ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پیاس کے بغیر زبان خشک ہو۔

سیکل کور (Secale Cor): زبان خشک اور خشک دار ہوتی ہے۔ خون کی طرح کی روشنائی زبان سے نکلتی ہے۔ گاڑھا طبع ہوتا ہے۔ زبان کی نوک میں جو کہ سخت ہوتی ہے، جھنجھٹا ہٹ ہو۔

### سوزش (زبان کی) — (Inflammation)

مرکیوریس (Mercurius): زبان بہت زیادہ سوجی ہوئی اور باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ منہ میں مٹھا ذائقہ ہوتا ہے۔ زبان ڈھیلی ہوتی ہے جس کے ساتھ زبان پر دانٹوں کے نشان ہوتے ہیں۔ رات کے وقت منہ کی تمام جگہ کو گھیرے ہوئے مڑ جائے گی۔

اکونائٹ این (Aconite N): اگر بہت زیادہ بخار ہو تو یہ دوا مرکیوریس کے بعد دی جانی چاہئے۔  
کینتھرس (Cantharis): اگر زبان کی سوزش جلنے یا گرم ابلنے ہوئے پانی سے دھونے کے باعث ہو۔

ایپس ایم (Apis M): حاد سوزش خشک زبان جس کے ساتھ ڈنک لگنے جیسے اور جلنے جیسے درد ہوتے ہوں جو حلق تک جاتے ہوں۔

ایسڈ آکزالک (Acid Oxal): اگر زبان سوچی ہوئی، دکھتی ہوئی، جلن دار اور / یا جھاگ دار ہو۔

بیمنزونک ایسڈ (Benzoic Acid): زبان کی سوجن اور زبان کی ناموری کیفیت جبکہ جوڑوں میں درد ہو۔ جو طوفانی موسم اور ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اچانک رک جاتے ہوں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب سیلان خون کی بندش اور گنٹھیاوی تکلیف کے باعث ہو۔  
بیلادونا (Belladonna): جب تکلیف مرکوریس سے تیزی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو یا جب سرخ باد دانی سوزش ہو۔

آرسینک الیم، لیکیس (Ars Alb, Lachesis): جب تنگبین کی علامات ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو ان دواؤں کے متعلق سوچنا چاہئے۔

کروٹیل (Crotalus Hor): زبان اتنی سوج جاتی ہے کہ معمول کی جسامت سے تقریباً دوگنی ہو جاتی ہے۔ زبان کا اتنا سوج جانا کہ منہ میں جگہ باقی نہ رہے۔

### بیرونی استعمال کے لئے — (For Local Application)

آرنیکا (Arnica): آرنیکا کے مدد فچر کے 20 قطرے 6 کھانے کے بچوں کے بقدر پانی میں ملا کر دن میں 3 مرتبہ اس پانی کے غرارے کرنے چاہئیں۔

ارٹیکا یورس (Urtica Urens): آرنیکا کی طرح سے لوشن تیار کیا جائے۔ جو ایسے مخصوص کیسوں میں مفید ہے جبکہ جلن کا احساس ہو۔ معمولی تبدیلی کے ساتھ یا جب تکلیف جلنے یا گرم پانی سے زبان کو دھونے کے باعث لاحق ہوں۔

### اعصابی درد (زبان کا) — (Neuralgia)

منگانم (Manganum): زبان کا اعصابی درد۔

اگیریکس الیم، آرسینک الیم (Agaricus M, Arsenic Alb): جلن کے ساتھ زبان کے اعصابی درد کے لئے یہ دوا گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جائیں۔

### فلج (زبان کا) — (Paralysis)

کاسٹیکم (Causticum): زبان کے فلج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ زبان کے فلج کے نتیجے میں ہکلاہٹ ہوتی ہے۔ یہ دوا سب سے پہلے آزمائی جائے۔

ڈاکامارا (Dulcamara): زبان سوچی ہوئی اور سخت ہوتی ہے۔ فلج زدہ محسوس ہوتا ہے۔



زبان باہر نہیں نکلی جاسکتی۔

جلسی میم (Gelsemium): زبان بہت موٹی محسوس ہوتی ہے اور مریض مشکل ہی سے بول سکتا ہے۔

پلمبم (Plumbum): یہ ایک اور اہم دوا ہے جو کہ دیگر دواؤں کے ناکام ہو جانے تک ہرگز نہیں دینی چاہئے۔

لیکسیس (Lachesis): جب مریض ساری زبان کو باہر نکالنے کے قابل نہ رہے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ زبان یوں محسوس ہوتی ہو جیسے منہ میں چمڑا ہو۔ بولنا مشکل ہوتا ہے۔

برٹا کارب (Baryta Carb): بوڑھے لوگوں میں زبان کا قلع 'بوڑھے لوگوں میں زبان کی سختی' وقت سے پہلے بوڑھے ہو جانے والے لوگوں میں اور جن کے ننھے جواب دے جائیں۔

### تندوا (زبان کا) — (Ranula)

(دیکھئے منہ کے ذیل میں تندوا)

### ناسوری کیفیت (زخم وغیرہ) (Ulcertion)

(نیز دیکھئے منہ کے ذیل میں دکھن)

ایسڈ میور (Acid Mur): بار بار عود کر آنے والے ناسور اور ٹھکس۔ زبان کی سوجن ابھار اور قلع۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): ناسور زبان کے نیچے ہو۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): کالی کھانسی میں زبان کے نیچے ناسور ہو۔

مرکیوریس (Mercurius): جب ناسوری کیفیت آتشک کے باعث ہو۔

گرافٹائٹس (Graphites): غلط اور لمبی ناسوری کیفیت 'آتشکی زخم'۔

کاربو ویتج (Carbo Veg): جلن دار دردوں کے ساتھ بہت بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔

شام کے وقت اور رات کے دوران اتری ہوتی ہے۔

کالی بائی (Kali Bi): زبان میں ناسور ہوتے ہیں۔ زبان موٹی خشک ہموار سرخ اور شکاف دار


ہوتی ہے اور شیشے کی طرح چمکتی ہے۔

بپٹیشیا (Baptisia): زبان سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان میں درد ہوتا ہے اور بدبو آتی ہے۔

کالے خون سے ڈھکی ہوتی ہے۔ خشکی اور خشک ہوتی ہے۔ جیسا کہ چمڑا ہوا یا جیسا کہ لکڑی

کی بنی ہوئی ہو۔ لکڑوں لکڑوں میں چھالے ہوتے ہیں۔ اسر ہوتے ہیں۔ جو پن کے سرے

بڑے نہیں ہوتے۔ یہ ناسور کالے اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔  
 امونیم میور (Amm Mur): زبان کی نوک پر جلن دار پھالے ہوتے ہیں۔  
 یوپلونم (Euplionum): زبان ابھری ہوئی گانٹھوں سے چھپی ہوتی ہے۔  
 کونڈور انگو (Condurango): زبان پر بند منہ والے ناسور۔  
 سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): سوزشی زبان پر ناسور ہوں۔ منہ میں پھالے ہوتے  
 ہیں۔ تھوک بہتات کے ساتھ آتا ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔



# سینہ، پھیپھڑے اور کھانسی کے امراض

(Diseases of Chest, Lungs & Cough)

حصہ اول۔۔۔ سینہ اور پھیپھڑے  
ہوا کی نالیوں کی سوزش (حاد)

Bronchitis (Acute)

**اکونائٹ اس (Aconite N):** یہ دوا ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے جبکہ بخار تیز ہوتا ہے اور پھیپھڑوں میں خشکی کے ساتھ جاڑا گلنے سے لاحق ہوتا ہے نیز یہ کیفیت پسینے کے رک جانے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے نکلنے بدن پر گلنے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ پانی جیسا خون کی دھاری والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی گاڑھا اور خون کی دھاری والا نہیں ہوتا۔ غیر ضروری پریشانی اور عظیم پریشانی ہوتی ہے۔

**برائیونیا (Bryonia):** خشک کھانسی ہو جو سر کو اور جسم کے فاصلے والے اعضاء کو تکلیف دیتی ہے۔ جس کے ساتھ بخار ہوتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں پانی کی شدید پیاس لےے وقفوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مریض خاموشی سے نیچے لیٹ جانا چاہتا ہے اور خلل اندازی کو پسند نہیں کرتا۔

**ایپیکاک (Ipec):** تیز سنناہٹ کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے۔ بلغم ساری چھاتی میں بھرا ہوتا ہے جس کے ساتھ شدید کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی ہوتی ہے۔ تے آتی ہے اور گلا کھونٹے جانے کا احساس ہوتا ہے۔

**انٹیم ٹارٹ (Antim Tart):** اس دوا کی علامات ہو ہو اپیکاک کی طرح ہوتی ہیں۔ سوائے اس کے کہ اس میں زیادہ نقاہت اور ٹھنڈا لہیہ آتا ہے۔ بلغم ساری چھاتی میں کھڑکھڑاتا ہے۔ سنناہٹ ہوتی ہے۔ ڈھیلی کھانسی، بلغم خارج نہ ہو۔ سانس کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** سانس چھوٹا ہوتا ہے تیز تیز آتا ہے۔ سانس لینے میں دباؤ ہوتا ہے اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ کھانسی خشک ہوتی ہے اور تشنہ ہوتی ہے۔ آواز بھاری اور

بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مکمل طور پر آواز کھو جاتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا اور کم مقدار میں ہوتا ہے۔ جلد گرم اور خشک ہوتی ہے لیکن ڈھکے ہوئے حصوں پر ہیپہ آتا ہے۔  
**ہائوسکائیامس (Hyoscyamus):** مسلسل خشک کھانسی ہوتی ہے۔ مریض کے لیٹنے پر اتھری ہو جاتی ہے۔ بیٹھنے پر اور آگے کو جھکنے پر بہت زیادہ افاتہ ہوتا ہے۔

**سٹیکٹا پالم (Sticta Pulm):** ناک بند ہو جاتی ہے۔ ناک میں اور حلق میں بلغم ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ہوا کی ٹالیوں میں سوزش ہوتی ہے۔ ہلکے دبے دبے درد آنکھوں کے ڈمیلوں میں ہونے کے ساتھ نیز کانوں کے درد کے ساتھ سر درد لاحق ہو۔

**ریومکس (Rumex):** گلے میں گدگدی کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے جو کہ ٹھنڈی ہوا ہوا کے درجہ حرارت کی تبدیلی بات چیت کرنے اور کھانے سے اتھرو جاتی ہے جیسے ہی مریض اپنے سر کو بستر کے کپڑوں سے ڈھانپتا ہے اور اسی ہوا میں بار بار سانس لیتا ہے تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے اور کھانسی بھی نہیں ہوتی۔ کھڑکی کھولنے پر منہ کو اور ناک کو بچکا کرنے پر گدگدی اور کھانسی میں شدت آ جاتی ہے۔

**ہیپیر سلف (Hepar Sulph):** جب کھانسی کھڑکھڑاہٹ، کھڑوری اور دم گھٹنے کے ساتھ ڈھیلی پڑنا شروع ہو جائے۔ دم گھٹنے میں کھانسی کا ہونا اس دوا کی قابل قدر علامت ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** یہ دوا نیم حار اور دیر تک چلنے والی کھانسی کے کیسوں میں مناسب دوا ہے۔ نیز ایسے مریضوں میں جو نرم مزاج لمبے پتلے دہلے زیادہ بڑھے ہوئے یا تپ دق والے ہوتے ہیں۔ سینے میں جھجھکے کے کھنچاؤ کے ساتھ دم گھٹنے والے درد ہوتے ہیں آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بلغم کھڑکھڑاتا ہے۔ جو کہ خون آلود ہوتا ہے اور بلغم نمکین اور بیٹھے ڈالنے والا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد کھانسی میں اتھری ہو جاتی ہے۔

**کریوٹوٹ (Kreosote):** ہوا کی ٹالیوں کی سوزش جس کے ساتھ خوف زدہ کر دینے والا بدبودار گھٹس اور بلغم ہوتا ہے۔ جس کے باعث کسی بھی آدمی کے لئے مریض کے پاس جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔

**مرکیوریس (Mercurius):** ہوا کی ٹالیوں کی سوزش والا نزلہ جس کے ساتھ چھاتی کے نیچے والے درمیانی حصہ میں کھردرا پن اور دھکن ہوتی ہے۔ خشک کھردری جھکے دار کھانسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ کھپا دینے والی ہوتی ہے۔ بلغم پانی والا ہوتا ہے۔ تھوک پیلا اور پیپ دار ہلتی ہوتا ہے۔

**سلفر (Sulphur):** جب داغ یا قلععات جذب نہ ہوں تو یہ دوا بطور عمل انگیز دی جائے۔ جب اچھی منتخب شدہ دوائیں ناکام ہو جائیں۔ تب ہی اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): یہ ایک اور اہم دوا ہے جسے علاج کے آغاز میں دینا چاہئے یا پھر جب اوپر دی گئی ادویات مرض کو روکنے یا شفا دینے میں ناکام ہو جائیں۔

## ہوا کی نالیوں کی سوزش (مزمن)

### Bronchitis --- (Chronic)

نیفتھالین (Naphthaline): ہوا کی نالیوں کی سوزش جس کے ساتھ بلغم سینے میں دبا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلنے میں تنفس چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت تنفس میں تنگی ہوتی ہے اور سیٹیاں بھتی ہیں۔ پروردہ تنگی کھانسی جس کے ساتھ بلغم خارج کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ دوا دے میں 'کالی کھانسی' میں 'تپ کالی' میں 'پھپھڑوں کے تپ دق' میں اور تنگی کھانسی میں مفید ہوتی ہے۔

گرینڈیلیا (Grindella): یہ دوا پھپھڑے اور معدے کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ پہلے خون کا دباؤ اونچا کر دیتی ہے اور اس طرح نبض کو تیز کر دیتی ہے اور خون کے دباؤ کو کم کر دیتی ہے اور نبض کو دھیمہ کر دیتی ہے۔ اس دوا کی دیگر علامات نیفتھالین کی طرح ہیں۔

نوٹ (Note): اوپر دی گئی ادویات میں عظیم مماثلت کے پیش نظر یہ دونوں دوائیں ایک دوسرے کی جگہ بدل بدل کر ہر ایک دو گھنٹوں کے بعد مریض کی حالت کے مطابق دی جاسکتی ہیں۔ ڈائی لیوٹن 6 طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں ادویات اکثر کیسوں کو نمٹالیں گی اور انہیں علاج کے شروع میں دینا چاہئے۔ یہاں تک کہ دیگر ادویات کی علامات ظاہر ہو جائیں جو کہ ان سے لانا مختلف ہوں۔

کیپسکیم (Capricum): ہوا کی نالیوں کی مزمن سوزش جس کے ساتھ گہرے تنفس کے ساتھ متعفن سانس اور بلغم خارج ہو۔

اویری (Avlaire): بچوں میں ہوا کی نالیوں اور پھپھڑوں کے امراض۔ خسرو میں ادویات لگانے کے باعث ہوا کی نالیوں کی سوزش نیز نمونیہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوٹن کی ایک خوراک ہر ہفتے دیگر نشاندہی کی گئی ادویات کے ساتھ دی جائے۔

بسیلینم (Bacillinum): پیپ دار بلغم کے اخراج کے ساتھ دم گھونٹنے والے مزمن نزلہ کے باعث بیمار ہونے والے اشخاص کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ جس کے ساتھ پیپ دار بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ دیگر نشاندہی کی گئی ادویات کے ہمراہ اس دوا کی ہر ہفتہ 200 طاقت کی ایک خوراک دی جائے۔

ڈروسرا (Drosera): مزمن درم نرخرہ میں یہ دوا مفید ہے۔ جس کے ہمراہ تنگی دوروں

والی کھانسی آدمی رات کے بعد اتر ہو جاتی ہے۔ کھانسی خشک، بلند آواز، گہری آواز والی اور بچہ درد ہوتی ہے۔ جو مریض کو اپنا سینہ پکڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ٹھوس غذا کھانے میں مجبور کر دیتی ہے۔ ٹھوس غذا کھانے پر دقت ہوتی ہے۔ جگرہ میں بلغم کا اجتماع ہوتا ہے۔

۱۔ آنتیم آرسینکیم (Antim Ars): جب 'ٹفنس مشکل'، 'تیز' ساں ساں کی آواز والا اور کھڑکھڑاہٹ والا ہو۔ ضیق النفسی نمایاں ہو، بے چینی ہو۔ جلد خم دار ہو، جلد کبھی گرم اور کبھی سرد ہو۔

۲۔ آنتیم آیوڈ (Antim Iod): گاڑھے، بھاری اور پیلاہٹ مائل پیپ دار بلغم کے اخراج کے ساتھ کھانسی کے متواتر دورے ہوتے ہیں۔

۳۔ کالی بائی کرومیکم (Kali Bich): جگرہ، حلق اور نالیوں میں پیچھے بلغم کے باعث، ڈھیلی کھانسی ہو، بیٹیوں کی آواز کھڑکھڑاہٹ کے ہمراہ، بلغم سخت، تار دار اور چپکنے والا ہوتا ہے۔ بلغم مشکل ہی سے نکلتا ہے چنانچہ اکثر مریض کو کھانسی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ الٹی ہو جاتی ہے۔ اگر بلغم کا اخراج نہ ہو اور اخراج بالکل رک جائے تو گٹھیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔

۴۔ کالی سلف (Kali Sulph): درم زرخہ کے نمونے کے بعد سینہ میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم کے اخراج کے بغیر کھڑکھڑاہٹ ہو۔

۵۔ کاسٹیکم (Causticum): گہری کھوکھلی خشک کھانسی ہو۔ سینے میں درد ہوتا ہے۔ خصوصاً چھاتی کی ہڈیوں کے پیچھے۔ دھکن کے ساتھ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔ چھاتی سخت (اکڑاؤ والی) ہوتی ہے۔ ضرور ہی گھرا سانس لینا پڑے۔ کھانسی وقت بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

۶۔ کاربو ویتج (Carbo Veg): جگرہ اور ہوا کی نالیوں میں کچا پن اور کھرچن کے ساتھ شام کے وقت آواز بیٹھ جاتی ہے۔ سینہ میں دباؤ ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں درم زرخہ، بہتات کے ساتھ پیلے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ درم زرخہ سے سیلان خون ہو۔

۷۔ آنتیم ٹارٹ (Antim Tart): چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ والی آواز کے ساتھ، نبض کمزور اور تیز ہوتی ہے۔ کھچڑے کمزور اور جزدی طور پر مفلوج ہوتے ہیں۔

۸۔ آرسینکیم البم (Ars Alb): آنکھوں، ناک، حلق اور آنتوں سے پتلا تیزابی مادہ درم زرخہ والی نالیوں کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ انتہاء درجہ کی بے چینی اور قہاقت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

۹۔ سکوٹلا (Squilla): باافراط لہلہا اور چپکنے والا بلغم خارج ہوتا ہے چونکہ خارج ہونے والا مادہ لہلہا (کھسکتے والا) اور چپکنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے اسے خارج کرنے کے لئے مریض کو بہت دیر تک کھانسی پڑتا ہے۔ تاکہ وہ بلغم کو اخراج کے لئے اکھاڑ سکے اور باہر نکال سکے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): گلے، ناک اور آنکھوں سے پیلے رنگ کا بلغم بہتات کے ساتھ خارج ہو یا چیپ دار بلغمی مادہ خارج ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں بہتر ہوتا ہے۔ پیشانی میں درد سر بھی ہو سکتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): بلغم کے اخراج کا فقدان اس دوا کی نمایاں علامت ہے اگر بلغم کچھ تھوڑی بہت خارج ہو بھی تو خون کی آمیزش والی ہوتی ہے جو کہ دھاری کی طرح ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، کمزوری اور نبض کی تیزی پائی جاتی ہے۔

لیڈم (Ledum): جب ورم زرخہ کے ساتھ نیبھوں میں ہوا کی موجودگی پائی جائے۔

نارسی سس (Narcissus): مزمن کیسوں میں 1-3 طاقت کی خوراک دیجئے۔

کلورم (Chlorum): جب ورم زرخہ کے بعد سانس رکنے کا مرض لاحق ہو۔

سبل سر (Sabal Serr): زرخہ کی ٹالیوں کی پھلاوٹ کے ساتھ مزمن ورم زرخہ۔

### ورم زرخہ کا نمونیہ — (Broncho-Pneumonia)

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ورم زرخہ کے نمونیہ کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ مرض کے آغاز میں 200 طاقت کی ایک خوراک دینی چاہئے۔ 24 گھنٹوں کے بعد دیگر نشاندہی کی گئی ادویات دی جاسکتی ہیں۔

ایپیکاک (Ipecac): سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہو اور تے و مٹلی کا رجحان ہو۔ گلا گھٹنے کا احساس ہوتا ہے اور چھینکتے ہوئے کھنچاؤ یا سکڑاؤ کا احساس ہوتا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): جب خشک کھانسی ہو اور لمبے وقفوں کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہو۔ مریض خاموش لیٹے رہنا پسند کرتا ہے یا سینے میں درد کے باعث بے چین رہتا ہے۔ تنفس مشکل اور پردرد ہوتا ہے۔

چیلیڈونیم (Chelidonium): دایاں پیچھے متاثر ہوتا ہے۔ تیز اور چھوٹا سانس اندر کی جانب کھینچے وقت ہوتا ہے۔ خشکی تنفس ہو۔ چھوٹی چھوٹی لیکن تھکادینے والی کھانسی، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم کے اخراج میں دقت ہو۔ ٹانگے لگنے کا سادرد۔ دائیں کندھے کے جوڑے کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے۔ ناک کے نتھنے پھڑپھڑاتے ہیں۔

آئیوڈین (Iodine): دائیں جانب کا نمونیہ بہت تیز حرارت کے ساتھ۔ خون کی دھاری والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ چھاتی کا پھیلاؤ مشکل ہو۔ عمل تنفس میں دقت، سانس سانس کی آواز کے ساتھ ہو۔ ذات الجنب (پیچھڑوں کی ہمیلیوں میں سوزش) والا بھاؤ۔ کمروں میں گرمی میں اور مرطوب موسم میں کھانسی میں ابتری ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): کم مقدار میں بلغم کے اخراج اور سینے میں گھٹن (دباؤ) کے ساتھ خشک کھانسی۔ خونی اور پیپ دار بلغم کے ساتھ ڈھیلی کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ 30 طاقت سے نیچے والی طاقتوں میں یہ دوا نہیں دینی چاہئے۔

آرسنک آئیوڈ (Ars Iod): یہ دوا آرسنیکم اہم والی علامات کی حامل دوا ہے لیکن یہ صرف کمی بیشی میں اس سے مختلف ہے۔ آرسنیکم اہم کے مریض گرمی میں بہتر محسوس کرتے ہیں جبکہ آرسنیکم آئیوڈ کے مریض گرم چیزیں لگانے سے اتر ہو جاتے ہیں نیز گرم کمروں میں بھی اتری ہوتی ہے۔

گلیسرین (Glycerine): انفلونزا والا نمونیہ، زکام یا افراط ہوتا ہے اور ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دونوں پھیپڑوں میں انجماد ہوتا ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): بچوں کا درم زرخہ والا نمونیہ۔ سینے کے امراض سے عمل شغلاب نہ ہونے میں خصوصاً جہاں تپ دق کا خطرہ ہو۔

اینٹیم ٹارٹ (Antim Tart): پھیلے ہوئے اور دھوانے ہوئے نچھنے جو کہ ہر سانس کے ساتھ پھڑپھڑاتے ہیں۔ پھیپڑے بلغم سے بھرے ہوتے ہیں جسے اکھاڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ چھاتی سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ عظیم نقاہت ہوتی ہے۔ رد عمل کا فقدان ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): اینٹیم ٹارٹ ہی کی طرح کی علامات اس میں بھی ہوتی ہیں لیکن جب اینٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ نچھتوں کی پھڑپھڑاہٹ ہر سانس کے ساتھ اور تکلیف کا دائیں جانب سے شروع ہوتا۔ اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ جس کے ساتھ اچھا رہ بھی ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): یہ ایک عمل انگیز دوا ہے اور پھیپڑوں میں زائل نہ ہونے والے دھبوں یا قطعات کے لئے اس دوا کو قطعی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ جب اس طرح قطعات ہوں تو یہ دوا بخار کو شفا دیتی ہے۔ نظر انداز کئے گئے کیسوں میں اور سوراخی طبیعت والے کیسوں میں جن کے ساتھ تپ دق کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ بہت مفید دوا ہے۔ کمزوری اور بے ہوشی پائی جاتی ہے۔

### خنازیر — (Bronchocele)

برومیم (Bromium): پھیپڑے کے دائیں حصہ (لوہا پر خنازیر ہو۔ رات کو سوتے وقت 2x کی ایک خوراک روزانہ دی جائے۔



## نزلہ (ورم نرخرہ والا)

Catarrh --- (Bronchial)

برشا کارب (Baryta Carb): بوڑھے لوگوں میں دم گھونٹنے والی کھانسی۔ پھیپھڑوں میں دھوکے کا احساس ہوتا ہے چنانچہ سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔

گلیسرین (Glycerine): انفلوئنزا والا نمونیہ، بافراط زکام ہوتا ہے اور ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دونوں پھیپھڑوں میں انجماد ہو جاتا ہے۔ 200 طالت کی خوراک دیجئے۔

آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): جب خنجرہ والی کھانسی کے ساتھ ہو۔

نایٹرم میور (Natrum Mur): مزمن ورم نرخرہ والا نزلہ۔ سردیوں والی کھانسی اور دم۔ بلغم بافراط خارج ہوتا ہے۔

بالسم پیرو (Balsamum Peru): اورم خنجرہ والے نزلہ کے لئے قابل قدر دوا ہے۔ چھاتی میں بلند آواز والی کھڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم گاڑھا کریم کی طرح کایا پیلاہٹ مائل سفید خارج ہوتا ہے۔

پکس لکویڈا (Pix Liquida): ورم نرخرہ والے نزلہ اور پھیپھڑوں کے سل کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پیپ دار مادے والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ یو اور ذائقہ گندہ ہوتا ہے۔ پائیں جانب کی پبلی کی تیسری ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

(جو ادویات ”نزلہ“ تاک کے ذیل میں دی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی کر لینا چاہئے۔)

## دباؤ (چھاتی میں) — (Oppression)

(نیز دیکھئے ”دمہ“ کھانسی“)

ناجا (Naja): چھاتی میں دباؤ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ دم گھٹنا اور سانس میں رکاوٹ بھی پائی جاتی ہے۔

## سینہ میں درد

Pain in Chest --- (Pleurodynia)

آرنیکا (Arnica): سینہ میں دکھن اور خراش محسوس ہوتی ہے۔

رینن کولس بی (Ranunculus B): پسلیوں کے وجع المفاصل کے لئے یہ سب سے اچھی

دوا ہے۔ چھاتی میں تیز ٹانگے لگتے جیسا درد ہوتا ہے۔ نیز چھاتی میں ایک مقام پر دکن ہوتی ہے۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سانس لینے سے بھی یا دباؤ سے یا موسم کی تبدیلی سے بھی ابتری ہوتی ہے۔ مخصوص اوقات میں تکلیف وہ قسم کی ضیق النفسی ہوتی ہے۔  
گل تھیریا (Gultheria): یہ دوا دونوں پھیپھڑوں کی درمیانی جگہ کے اندرونی حصہ میں درد کی نشاندہی کرتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): جب کندھوں میں گولی لگتے جیسے درد ہوں۔  
سینگا (Senega): ٹانگے لگتے جیسے درد کے ساتھ نزلہ اور زکام میں۔ چھاتی میں سختی اور بہت زیادہ بلغم کا احساس ہوتا ہے۔ آواز ٹینسی ہوئی ہوتی ہے۔ گلے میں دکن ہوتی ہے۔ جو مریض کو بات چیت کے دوران تکلیف دیتی ہے۔ چھتیکیں آنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔  
ریو میکس سی (Rumex C): بائیں پھیپھڑے میں ٹانگے لگتے جیسے اور ڈنک لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ سل کا ابتدائی مرحلہ۔

اسکلی پیاس (Asclepias): چھاتی کے نچلے حصہ میں تیز ٹانگے لگتے جیسا درد ہوتا ہے۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): چھاتی میں ٹانگے لگتے جیسا درد ہوتا ہے۔ خصوصاً بائیں جانب رات کے 2 بجے سے 3 بجے تک ابتری ہوتی ہے۔

ٹرائی فولیم پی (Trifolium P): رات کے وقت کھانسی کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا اور دم کھینچنے کے دورے ہوتے ہیں۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔

اکٹیارسی موسا (Actea Racemosa): دائیں جانب ابتری ہوتی ہے۔ خصوصاً اعصابی کمزوری والی مستورات میں۔

اکلیفانڈ (Acalypha Ind): چھاتی میں مسلسل شدید درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خونیں بلغم آتا ہے۔

### تنگ چھاتی — (Pigeon Chest)

فسفورس (Phosphorus): یہ دوا تنگ چھاتی (جب چھاتی کی ہڈیاں اندر کو مڑ کر چھاتی کو بہت زیادہ تنگ کر دیتی ہیں) کے مرض کے لئے واحد دوا ہے۔ جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ یہ دوا لمبے عرصہ کے لئے دی جاتی ہے مثلاً کم از کم تین ماہ تک جس کے دوران چھاتی اپنی معمولی حالت پر آ جاتی ہے۔

## ذات الجنب — (Pleurisy)

برائی اونیا (Bryonia): یہ دوا نشاندہی کرتی ہے ایسے دردوں کی جو ٹانگے لگنے جیسے 'جلن دار' اور چاقو لگنے جیسے ہوتے ہیں اور جن کا مقام پھیپھڑوں کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ درد حرکت سے ابتر ہو جاتے ہیں۔ دردوں میں کمی اس وقت ہوتی ہے۔ جب مریض آرام کر رہا ہو یا درد والی جانب کروٹ لے کر لیٹا ہو۔

رین کولس بی (Ranunculus B): پھیپھڑوں کے پردہ (یعنی جھلی) میں سوزش، استسقاء اور چپٹاؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سینہ کے عضلات میں درد یا دکن ہوتی ہے۔ ذات الجنب کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ درد والی جانب دباؤ یا چھوٹا برداشت نہیں ہو سکتا۔

آر سینیکم البم (Arsenicum Alb): جب پانی کی تھوڑی مقدار کی چھوٹے چھوٹے وقفوں سے پیاس ہو اور نمایاں نفاہت کے ساتھ بہت زیادہ بے چینی ہو۔ درد جلن دار ہوتے ہیں۔ جنہیں حرارت اور گرمی سے آرام ہوتا ہے۔ دسے والا تنفس ہوتا ہے اور ضیق النفسی ہوتی ہے۔

ارانیڈایا، اپیکاک، نکس وامیکا (Aranea Dia, Ipec, Nux Vom): اس دوا کی سفارش ڈاکٹر کلاڈک نے جسمانی امراض میں کی ہے جب کہ جسم میں پانی بھر جائے اور ذات الجنب کے ساتھ میعاد بخار (وقفوں سے ہونے والا بخار) ہو۔ تیسری طاقت کی دوا دیکھئے۔

کینتھرس (Cantharsis): اتنا درجہ کی حرارت اور چھاتی میں جلن کے ساتھ ذات الجنب کے دوسرے مرحلہ کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں رطوبت خارج ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم اور مقعد میں جلن ہو سکتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): تشنگی جھکوں کے ساتھ بچوں میں ذات الجنب۔ اجتماع خون کی قسم کا۔

امپس مل (Apis Mel): یہ دوا اس حالت کی نشاندہی کرتی ہے جب پسینہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو لیکن سوزش کینتھرس کی نسبت کم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ رطوبت خارج ہو جانے کے باعث ضیق النفسی اور دم گھسنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسکلی پیاس، سنیگا (Asclepias, Senega): جب برائی اونیا ناکام ہو جائے۔ تو ان دواؤں کے متعلق سوچا جاسکتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): مزمن ذات الجنب، سینے میں ٹھنڈک کے ساتھ تیز ٹانگے لگنے جیسے 'پھرنے والے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ کھانسی اور دسے والا تنفس، 3 بجے شب کو ابتری ہوتی ہے۔ حرکت یا درد والی جانب کروٹ لے کر لیٹنے سے درد میں ابتری ہوتی ہے۔

ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی طور پر درد ختم ہو جاتا ہے۔  
شائم (Stannum): چاقو لگنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ آگے کو جھکنے سے اور زیادہ تر ہائیں  
 جانب جھکنے سے ابتری ہوتی ہے۔

آرسنک آئیوڈ (Arsenic Iod): پیپ والا ذات الجنب، جس کے ساتھ بہت زیادہ نقاہت  
 ہوتی ہے۔ جس میں سانس باہر نکالتے وقت ابتری ہوتی ہے۔ تیز دلی ہوئی کھانسی۔  
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ کا اجتماع ہو جائے۔ سرخ بخار اور جاڑے کے  
 بخار کے اور پسینے کے بار بار حملوں کے ساتھ تمہلیاں کمزوری، بہت زیادہ طول پکڑ جانے والی

سلفر سورینم (Sulphur, Psorinum): سانس چھوٹا ہو جانے کے ساتھ، چھاتی میں دباؤ کے  
 ساتھ اور نقاہت کے ساتھ مزمن ذات الجنب والی رطوبات کا اخراج۔ سورنم ایسے وقت میں  
 دی جاتی ہے جب خصوصاً بدبودار سانس اور پیپ زیادہ متعفن ہوتی چلی جائے۔  
سیلیشیا (Silicea): پتلی، بدبودار پیپ ست رفتاری کے ساتھ پھیپھڑوں کے پردوں سے خارج  
 ہوا کرے جو کہ بہت لمبے عرصہ تک چلتی رہے۔ کمزوری آہستہ آہستہ لاحق ہوتی ہے۔

## ذات الجنب سے متعلق (مرض)

(Pleurodynia)

(ذات الجنب کے ذیل میں دی گئی ادویات ملاحظہ کیجئے۔)

### نمونہ (Pneumonia)

اکونائٹ (Aconite): پہلے مرحلہ میں جب بخار اونچے درجہ کا ہو اور جاڑے سے لاحق ہوا  
 ہو۔ پھیپھڑوں میں ٹنگی ہو۔ سخت خشک کھانسی جو قدرے درد والی ہوتی ہے۔ پانی کی طرح کا بلغم  
 خون کی دھاری کے ساتھ خارج ہوتا ہے لیکن کبھی گاڑھا اور خون کی دھاری والا نہیں ہوتا۔  
 غیر ضروری پریشانی۔

وریٹرم ویرائنڈ (Veratrum Viride): پھیپھڑوں میں سخت قسم کی ٹنگی میں دل کا شدید  
 اشتعال (جوش) جس کی نشاندہی نبض کی تیزی سے ہوتی ہے۔ مٹکی ہوتی ہے، اٹھنے پر بے ہوشی  
 ہوتی ہے۔ زبان وسط سے سرخ ہوتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): جب انجماد کی (برقانی) کیفیت کا آغاز ہو چکا ہو۔ کھانسی ابھی تک سخت  
 اور پردرد ہوتی ہے۔ تنفس میں دباؤ ہوتا ہے۔ مریض خاموشی سے لیٹے رہتا چاہے 1x دیجئے

البتہ بعد میں جب افادہ شروع ہو جائے تو 200 طاقت والی دوا دی جائے۔  
 انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): یہ دوا برائی اونیا کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ سینے میں  
 کھڑکھڑاہٹ کی آواز پائی جائے نیز پیچھڑوں کے قلعے کا خطرہ لاحق ہو۔  
 فاسفورس (Phosphorus): اگر برائی اونیا اور انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائیں تو اس دوا کی  
 نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ دوا 200 ذاتی لیوشن میں دینی چاہئے۔  
 سلفر (Sulphur): جب پیسے آنے لگیں تو اس دوا کو ہرگز نہیں بھولنا چاہئے۔ یہ دوا تحلیل نہ  
 ہونے والے دھبوں (سوزشی قلعے) کے بننے کو روکتی ہے نیز انہیں خفا بھی دیتی ہے۔  
 چیلیڈونیم (Chelidonium): صفراوی علامات کے ساتھ نمونیہ لاحق ہو۔  
 ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ساختی خرابیوں اور زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لئے اس  
 دوا کو بطور عمل انگیز دوا استعمال کرنا چاہئے۔  
 نکلس و امیکا 30 آپیکاک 30 اُرے نیا ڈایا ڈیما 30

(Nux Vom 300, Ipecac 30, Aranea Diadema 30): ہائیڈروجن والی ساخت  
 میں۔ (اس اصطلاح سے مراد ایسے مریض ہیں جو مرطوب موسم اور مرطوب رہائش گاہوں سے  
 بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض اپنے نظام میں پانی کی بہت زیادہ مقدار کے حامل  
 ہوتے ہیں۔ اس لئے مرطوب موسم یا مرطوب رہائش گاہوں کو برداشت نہیں کر سکتے) دائیں  
 پیچھڑے میں انجماد کی (برقانی) کیفیت، بلیاں پیچھڑا بالکل صاف ہوتا ہے۔ بدل بدل کر کبھی  
 بہتری محسوس ہوتی ہے اور کبھی ابتری محسوس ہوتی ہے۔ جائز محسوس ہوتا ہے۔ یہ ادویات دی  
 گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔

سینیگا (Senega): نمونیہ جب ذات الجنب کے ساتھ ہو۔ چھاتی میں درد ہوتا ہے جو حرکت  
 سے آرام پاتا ہے۔ کھانسی اور دمہ آرام سے بہتر ہوتا ہے۔  
 آئیوڈیم (Iodine): جب پیچھڑوں کا انجماد شروع ہو چکا ہو اور ضیق النفسی نمایاں ہو۔  
 متاثرہ جانب کے رخسار پر سرخی ہوتی ہے۔

سٹرائکی کنیا فاس (Strychnia Phas): جب انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی  
 کی جاتی ہے۔ اس کی تمام علامات انٹیم ٹارٹ والی ہوتی ہیں مثلاً چھاتی کی کھڑکھڑاہٹ، کمزور تیز  
 نبض، ضیق النفسی، ٹھنڈا پیوند وغیرہ۔ ان سب کے ساتھ ضعف قلب بھی ہوتا ہے۔ اس دوا  
 کی تیسری طاقت دینی چاہئے اور ہر گھنٹے کے بعد دہرائی چاہئے۔ مریض کی حالت کے مطابق۔

سٹانم آئیوڈ (Stannum Iod): یہ دوا نمونیہ کے آخری مرحلہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب  
 نمونیہ انجماد والے حصہ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں استحکام پکڑ لیتا ہے البتہ انجماد سے بچے

ہوئے حصوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تحلیل نہ ہونے والے نمونیہ میں اگر سلفر 200 تکام ہو جائے۔  
گرینڈیلیا (Grindelia): اسٹیم ٹارٹ والی علامات کے ساتھ دل کی پکٹائی کا بگاڑ پایا جائے تو یہ  
 دوا ضروری ہو جاتی ہے۔ سونے کا خوف مہلدا سوتے میں دل رک جائے۔ ضرور ہی لیٹ کر جاگا  
 کرے اور اپنے دل کی دھڑکن پر نگہ رکھے۔

سٹروپھنٹس (Strophanthus): نمونیہ کے دوران دل کے ٹیل ہو جانے کے خدشہ کے  
 لئے یہ بہترین دوا ہے۔ نبض کمزور، تیز اور بے ترتیب ہوتی ہے۔ چوٹی کے قریب ٹٹکے لگنے  
 جیسے اور پھر کن والے درد ہوں۔

### تپ دق۔ (Tuberculosis)

فاسفورس (Phosphorus): تپ دق کے علاج میں یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا پھیپھڑوں اور  
 لمبی ہڈیوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے۔ مریض کھوکھلے سینے والا یا چوزہ چھاتی (چھاتی کی  
 ہڈیاں مڑ کر ایسی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جیسی چوزے کی چھاتی کی ہوتی ہے۔) والا ہوتا ہے  
 اور خون بھی تھوک سکتا ہے۔ بیٹھی ہوئی آواز والی، شدید کھجلی والی کھانسی ہوتی ہے۔ جس میں  
 ہستے اور باتیں کرتے ہوئے سینے کے دباؤ کے ساتھ اٹھتی ہو جاتی ہے۔ اس دوا کو بھی 30  
 طاقت سے نیچے استعمال نہ کیا جائے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): یہ ایک عمل انگیز دوا ہے اور اسے 200 یا اونچی طاقتوں  
 میں ہر ہفتہ یا پندرہ روز کے بعد دینا چاہئے چنانچہ دوا کی طاقت 200 یا 1000 ہونی چاہئے۔ اسے  
 صرف چھوٹی گولیوں کی صورت میں دینا چاہئے چنانچہ 4 یا 5 گولیوں کی ایک خوراک بنائی جائے۔  
 بہتر یہ ہے کہ ایک ڈرام والی شیشی میں گولیاں بھر کر اس میں دوا کے 2 یا 3 قطرے گرائے  
 جائیں اور انہیں خوب ہلا کر تر کر لیا جائے۔

آرسینکیم آئیوڈ (Ars iod): جب اشتعال کے باعث ”ظکو“ یا مروڑ لاحق ہو۔ کمزوری اور  
 قناتہ اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ شدید پیاس ہوتی ہے لیکن سرد پانی معدہ میں تکلیف پیدا  
 کر دیتا ہے۔ اس لئے مریض گرم پانی پینا چاہتا ہے۔

آئیوڈم (Iodum): جب غدد متاثر ہو جائیں تو اس دوا کو طلب کیا جاتا ہے۔ مریض عموماً  
 سیاہ جلد والا ہوتا ہے۔ اس کی جلد خشک اور غیر صحت مند ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرارت  
 اونچا ہوتا ہے۔ قناتہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور کھانسی مسلسل اور جھنجھلا دینے والی ہوتی ہے۔  
کلکیریا آئیوڈ (Calcarea iod): جب سارنیتی (Mesenteric) غدد ملوث ہوں۔ شدید  
 قناتہ ہوتی ہے۔ مریض کے اندر ہڈیوں اور جلد کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ پیٹ بہت زیادہ پھولا

ہوتا ہے۔ غدود لمبے اور گانٹھ دار ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ متواتر آتا ہے۔ جس کا رنگ سبز ہوتا ہے یا پھر کئی رنگوں میں بدلتا رہتا ہے۔ نیز اس کے ہمراہ اچھارہ ہوتا ہے۔

ٹیوبرکولینس بوو (Tuberculinum Bov): اگر یہ دوا 1000 طاقت کی یا سی۔ ایم طاقت کی دی جائے تو کما جاتا ہے کہ یہ مرض کو روکنے والی اور شفا دینے والی بن جاتی ہے۔ زندگی بھر میں صرف ایک یا دو خوراکیں تین یا چار ماہ کے وقفے کے ساتھ دی جائیں۔

کاربو انیملس (Carbo Animals): پھیپھڑوں کے تپ دق کے آخری مرحلہ کے لئے۔ دم کھونٹنے والی اور بیضی ہوئی آواز والی کھانسی ہوتی ہے جو سارے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سبز پیپ دار بلغم اور پس ہوتی ہے۔ بدبو دار تھوک (بھٹکھار) بیٹھا، متعفن نیز ضیق انشی ہوتی ہے۔ سبیل سر (Sabal Serr): حنجرہ والے تپ دق کے لئے مخصوص ہے۔

گلیکیم الیڈ (Gallicum Acid): جب پھیپھڑوں کے سیلان خون کے ساتھ تپ دق ہو۔ بہت زیادہ بلغم کا اخراج ہوتا ہے اور رات کے وقت بلغم بیٹھا ہوتا ہے۔

چائنا سلف (Chin Sulph): دق لاحق ہو جس کے ہمراہ (1) وزن کم ہو جائے۔ (2) برسوں تک کھانسی مسلسل رہے۔ (3) چہرہ میں، دائیں جانب درد ہو جب کہ کھانسی دب جائے۔ (4) مرطوب موسم میں ابتری ہو۔ (5) ہر چوتھے روز ابتری ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ دوا ہائیڈروجنی سائٹ (جن مریضوں کے جسم میں پانی کی زیادتی ہو) والے دق میں بہت عمدہ ہے۔

فاسفورس، کالی نائٹ (Phosphorus, Kali Nit): بخار شام کے وقت جائے کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ وزن کم ہو جاتا ہے۔ رات کو پینہ آتا ہے اور ہلکی کھانسی ہوتی ہے۔ (ان دواؤں کے ہر دو گھنٹے کے بعد بدل بدل کر مسلسل استعمال کے تین ہفتوں کے بعد بخار غائب ہو جاتا ہے لیکن ایک سال کے بعد دوبارہ آ جانے کا خدشہ رہتا ہے چنانچہ ٹکس وامیکا اور آر پینیکیم الیم کے بدل بدل کر استعمال سے اس رجحان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

سٹانم آیوڈ (Stannum Iod 3x): صاف رنگ والی جلد اور لمبی پٹکوں والے اشخاص میں تپ دق کا مرض۔ گلے میں کھلبلی کے باعث مسلسل ہونے والی کھانسی۔

ویکی ٹائی نم 200 (Vaccinium 200): تپ دق میں کھانسی کے لئے عمل انگیز دوا ہے۔

اوسمیم 200 (Osmium 200): جب پیشاب سے ہنشت جیسی بو آئے۔ ذکاروں سے مولی کی بو آئے اور پینہ سے لسن جیسی بو آئے۔ سانس کی ٹالی میں بیجان ہوتا ہے۔

لائکوپس ورگ (Lycopus Virg): پھیپھڑوں کی دق کے ابتدائی مرحلہ میں (پھیپھڑوں کی بائیں چوٹی متاثر ہوتی ہے) جس میں پاخانہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔

کوکبوس انڈ (Cocculus Ind): جنفرہ کا دق ورم نرخرہ کے نزلہ کے بعد۔  
ہیکلس ٹوسٹاسی ایم (Helix Tosta CM): جب تپ دق کے ساتھ پھپھڑوں سے خون  
 آئے، مسلسل آواز بیٹھی رہے، خشک کھجلی والی کھانسی، جو رات کو ابتر ہو جائے اور نیند اڑ  
 جائے۔ ضیق النفسی جس میں میڑھیاں چڑھنے سے ابتری ہو۔

سلفر (Sulphur): پڑمردہ، زرد رنگ والے اور لاغرا شفا میں تپ دق۔ کھانسی شدید سخت  
 اور خشک ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ مرطوب اور ہلکی کھانسی ہو۔ پاؤں اور ہاتھ جلتے ہیں۔  
 اونچی طاقت کی خوراک دینی چاہئے مثلاً 200 طاقت کی اور اسے دہراتا نہیں چاہئے ورنہ ہو سکتا  
 ہے کہ دوسری خوراک تپ دق کی حالت کو تیلی دکھانے کے مصداق ہو جائے۔ (یعنی اس دوا کو  
 دہرانے سے تپ دق میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔)

الستونیا سی (Alstonia C): اسمال کے ساتھ ہلکا بخار۔ 1x خوراک دیجئے۔  
کلیریا فاس (Calcarea Phos): جب مریض بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا جائے تو اس دوا کو  
 آزمایا جاسکتا ہے۔

لیک نٹھس (Lachnanthes): رات کے سینے، خشک کھانسی، کمر یا گردن میں اکڑن اور درد  
 کے ساتھ نیز چہرے پر سرخی کے دائروں کے ساتھ دق لاحق ہو۔ ٹائیفائیڈ بخار یا ٹائیفائیڈ والے  
 نمونہ (ٹائفو نمونیا) میں بھی۔

پکس لکویڈا (Pix Liquida): پیپ دار پانی والے بلغم کے ساتھ، جس کی بوجھندی اور  
 زائقہ گندا ہوتا ہے۔ پھپھڑوں کی دق کے تیسرے مرحلہ میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ اس کے  
 ساتھ پٹی کی تیسری ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

گوائیگم (Guaiacum): ٹی بی کے ترقی یافتہ مرحلہ میں جس کے ساتھ پھپھڑوں کی بائیں  
 چوٹی میں ذات الجنب کے درد ہوتے ہیں نیز جس کے ساتھ بدبودار، پیپ دار بلغم ہوتا ہے۔  
بتین (Betain): مٹھین کے 4 گرین، شوگر ملک کے 96 گرین میں ملا کر دن میں 4 مرتبہ اتنی  
 مقدار میں دیجئے۔ جتنی مقدار کھریلو چاقو کی نوک پر آجائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تپ دق کے لئے  
 مفید دوا ہے۔

یربا سانتا (Yerba Santa): ورم نرخرہ والی ٹی بی جس کے ہمراہ رات کے پینے ہوں اور  
 جسم کھل رہا ہوں۔ جس کا باعث نرخرہ کا متواتر نزلہ ہوتا ہے۔

سکارم لیکٹس (Saccharum Lactis): (مل) دق کے آخری مرحلہ میں اسمال لاحق  
 ہوں۔

سٹانم (Stannum): باافراط سبز رنگ کا بلغم خارج ہونے کے ساتھ قحط لاحق ہو۔ تپ دق



میں بلغم کا ذائقہ میٹھا ہو۔ چھاتی کمزور محسوس ہوتی ہے۔ مشکل ہی سے بات کر سکے۔  
تھوجا (Thuja)۔ سوزاک میں جھلا رہنے والے مریضوں میں یہ دوا بطور عمل انگیز دینی  
 چاہئے۔ IM ڈالٹی لیوشن دیجئے۔  
سنی لینیم (Syphilinum)۔ آتشک میں جھلا رہنے والے مریضوں میں یہ دوا بطور عمل انگیز  
 استعمال ہوتی ہے۔ IM ڈالٹی لیوشن دیجئے۔  
کوٹوبارک (Coto Bark)۔ مزمن تپ دق والے اسہال بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو بہت  
 کمزور کر دیتے ہیں۔ مدر گچھر کی بڑی خوراکیں دی جائیں۔  
ڈروئرا (Drosera)۔ جنہرہ والی دق کے لئے مخصوص ہے۔ گھٹنوں کے جوڑوں کی ٹی بی یا  
 جسم کے دوسرے حصوں کی ٹی بی کے لئے۔  
سلیشیا (Slicea)۔ دھچکوں والی کھانسی جس کے ساتھ بے حد گندی بو والا بلغم ہو۔ جو مائع میں  
 پیندے تک ڈوب جاتا ہے۔ بلغم ڈھیلوں کی طرح کا بیلا یا سبز ہوتا ہے۔ ٹھنڈے مرطوب موسم  
 میں ابتری ہوتی ہے اور ٹھنڈے خشک موسم میں بہتری ہوتی ہے۔ دق کی نزلاوی صورت۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium)۔ غیر صحت مند نشوونما والی گردن اور چھاتی کے ساتھ 'خسرہ'  
 اور کھلی کھانسی کے بچوں کو لاحق ہونے والی دق۔ جیٹ پھول جاتا ہے۔ سبزی مائل بلغم خارج  
 ہوتا ہے اور چھاتی کمزور ہوتی ہے۔  
سنی شیو (Senecio)۔ حیض کی رکاوٹ کے ساتھ دق لاحق ہو۔

## حصہ دوم۔ کھانسی

### دمہ — (Asthma)

دمہ ایسے تکلیف دہ امراض میں سے ایک ہے۔ جن سے آسانی کے ساتھ شفا نہیں ملتی۔  
 مرض کے علاوہ حملہ پر قابو پانے کے لئے مرض میں تخفیف کرنے والی ادویات کے استعمال کے  
 بعد ایک ڈاکٹر کو دستیابی طریقہ علاج کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ مریض کو اس کے مرض  
 سے مستقل نجات دلائی جاسکے۔ دستیابی طریقہ علاج کے لئے اہم ادویات حسب ذیل ہیں۔ ان  
 ادویات کو دیگر شکایات کی گئی۔ ادویات میں اضافے کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ ادویات  
 درج ذیل ہیں:

- 1- ٹیوبرکولینیم
- 2- تھوجا

3- نیرم سلف

4- میڈورینم

5- سفی لینم

1- مندرجہ بالا ادویات بطور عمل انگیز ادویات کے دی جائیں۔ ان کی طاقت 200 سے نیچے نہ ہو۔ (IM یا CM طاقتیں قابل ترجیح ہیں۔) ان ادویات کے استعمال سے دو تین روز قبل اور دو تین روز بعد تک کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ مندرجہ بالا ادویات میں سے اگر کوئی دوا مطلوبہ اثر ظاہر نہ کرے تو پھر مریض کو مزید ادویات دینے سے احتراز کرنا چاہئے۔

2- ایک اشارہ یہ ہے کہ پرہیزی غذا بھی بہت ضروری امر ہے۔ سفید چینی یا اس سے بنی ہوئی مصنوعات (یعنی کھانے کی چیزیں) 'سفید آٹا'، گوشت، 'مچھلی'، دودھ اور حلوة جات (Puddings) کے استعمال سے احتراز کرنا چاہئے۔ سالم گندم کا آٹا، بارباڈوس کی چینی، شہد، سلاد اور تازہ سبزیاں، انڈوں اور پیپر کے ساتھ کھانی چاہئیں۔

اکونائٹ 1x اور اپیکاک 1x (Aconite 1x and Ipec 1x): یہ ادویات حملہ کے دوران مرض میں تخفیف کر دیں گی اور سانس اور کھانسی میں آسانی پیدا کر دیں گی۔ اکونائٹ مل میں کام کرنے والوں کے دمہ کے لئے بھی مفید ہے۔

اپیکاکوانہ (Ipecacuanha): تشنجی دوروں والا دمہ، جس کے ساتھ پریشانی، سنناہٹ، نفس کا چھوٹا پن، دم گھٹنے کا احساس، حرکت سے ابتری اور مسلسل کھانسی جس کے باعث تے ہوتی ہے، کے ساتھ سینے پر بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ چھاتی بلغم سے بھری ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ جلدی امراض کے ساتھ دمہ 200 طاقت میں یہ دوا دیجئے۔

زنگی بر (Zingiber): گھیس کے علاقہ والا دمہ، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ جھجھکے کے نیچے درد ہو۔ نفس میں دقت ہو۔ سینے میں ٹانگے گھٹیں (یعنی ٹانگے گھٹنے کا احساس ہوں یا ٹانگے گھٹنے کا سادرد ہو)۔ جوں جوں صبح ہوتی ہے۔ ابتری میں اضافہ ہوتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): اکثر اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ خصوصاً جب دمہ کا حملہ رات کے وقت آدمی رات گزر جانے کے بعد ہو۔ اس حملہ سے مریض کو لازماً بیٹھ جانا پڑتا چنانچہ یہ حالت مریض کو آرام پہنچاتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں سے حساسیت ہوتی ہے۔ نیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے بھی مریض حساس ہوتا ہے۔ مریض بے چین ہوتا ہے۔ خوف سے اور تصورات سے بھرا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جب دمے والے نفس کے شدید تشنجی دورے ہوتے ہیں۔ جن

میں چھاتی کا انقباض پایا جاتا ہے۔ نیز حلق کے انقباض کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ مریض کا گلہ کھوٹنا جا رہا ہو۔ تشنجی دوروں کو ختم کرنے والی دوا ہے۔

اسکی ڈوس پیرا (Aspidosperma): دقت نفس کے ساتھ دمہ کے لئے یہ ایک مؤثر دوا ہے۔ 2x یا 3x ڈائی لیوشن دیجئے۔

گرینڈیلیا (Grindelia): جب بلغم کا غیر معمولی اجتماع ہو۔ جب مریض سوئے تو سانس رک جائے۔ پھلے ہوئے دل کے ساتھ کیموں میں ہوا ہوتی ہے۔ ورم زرخہ کے مریض بوڑھے اشخاص میں دمہ، ورم زرخہ کے باعث عصب ہوائی (Pneumogastric) کا جزوی فالج لاحق ہوتا ہے۔ بھوک کو واپس لانے کے لئے اور دل کی دھڑکن اور ضیق النفسی میں افادہ کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

کاربونیم سلف (Carboneum Sul): سانس میں دقت اور تیزی کے ساتھ لاحق ہونے والے دمہ میں اس دوا نے بہت اچھی خدمت کی ہے۔ الکوہل کے غلط استعمال کے بعد تباہ شدہ جسمانی ساخت (کے لئے)۔

پلموولپس (Pulmo Volpis): سیٹیوں کی بہت زیادہ آواز اور کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ نیز کھچڑوں کے استقاء کے ساتھ۔

بلاٹا اوری (Blatta Ori): ورم زرخہ کے ساتھ اور ورم زرخہ کے بغیر دمہ کے لئے عمدہ دوا ہے۔ گاڑھے اور پیپ دار بلغم کے ساتھ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دوران حملہ 2x یا 3x ڈائی لیوشن دیا جاسکتا ہے۔

کلورالم (Chloralum): سنناہٹ والے تنفس کے ساتھ دمہ، جب لینے ہوئے سانس ناک کے راستے اندر جاتا ہے لیکن منہ کے راستے ہونٹوں کو پھلاتے ہوئے باہر آتا ہے۔

امبروسیا آرٹ (Ambrosia Art): ریگ ویڈ کے زرگل کو دیکھنے کے باعث تپ کالی کے ساتھ دمہ۔

ارالیارسی موسا (Aralia Racemosa): زکام کے ساتھ ادلنے بدلنے والا دمہ۔ لینے ہوئے یا آدمی رات کے وقت بلند آواز کے ساتھ سنناہٹ اور کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ سانس لینے کے دوران، مختصر نیند کے بعد، بلغم گرم اور نمکین ہوتا ہے۔ حلق میں کھجلی اور سینے میں کھچاؤ کے باعث کھانسی ہوتی ہے۔ دھچکوں سے بچنے کے لئے بیٹھ جانا پڑے۔

کالی پائیک (Kali Bich): جب دمے کا حملہ بملع کے باعث یا بملع کے بعد ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹتی ہوتی ہے۔ رسی دار بلغم کا اخراج اس کی نمایاں علامت ہے جو کہ افراط کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

**کالی فاس (Kali Phos):** اعصابی دمہ میں۔ IM طاقت کی دوا بطور عمل انگیز دیتے۔  
**کالی ٹائٹ (Kali Bich):** بڑھی ہوئی ضیق النفسی، غشی اور متلی جس کے ساتھ مدہم ٹانگے  
 لگنے جیسے اور جلن دار درد چھاتی میں ہوں یا پھر آزادانہ بلغم کا اخراج ہو۔  
**کالی سلف 3 (Kali Sulph 3):** پیلے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ سینے میں کھڑکھراہٹ ہوتی  
 ہے۔ سانس مشقت والا ہوتا ہے۔ بات چیت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔  
**الیومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate):** کھانسی کے باعث تنفس رک جاتا ہے۔ دمہ والا  
 تنفس جس کے ساتھ سینہ میں کھڑکھراہٹ ہوتی ہے۔ کھانسی کے باعث سانس میں دقت ہوتی  
 ہے۔

**سلفر (Sulphur):** جب دمہ پھوڑے پھنسی کے دب جانے کے باعث لاحق ہو یا جب دمہ  
 پھوڑے پھنسی کے تبادلے میں لاحق ہو چنانچہ جب دمہ ظاہر ہوتا ہے تو پھوڑے پھنسی غائب ہو  
 جاتے ہیں۔

**لائیکوپوڈیم (Lycopodium):** غصہ کے جوش کے باعث یا بھجان کے باعث جس میں نتھنے  
 پھولتے پھٹکتے ہیں، دمہ لاحق ہو۔ اعصابی دمہ۔ جازا والے مریضوں میں دمہ کا لاحق ہونا ہمیشہ ہی  
 ان لوگوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ ایسے مریض آسانی کے ساتھ تھک جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی  
 ٹھنڈ لگتی ہے۔ دائیں جانب کے پھیپھڑے میں بلغم جم جاتا ہے۔ معدہ کے گیس والے علاقہ سے  
 جلن اوپر کی جانب کھانے کی ٹالی کے اوپر والے حصہ تک بڑھتی ہے۔ جس کے ساتھ ذکاریں  
 آتی ہیں۔ شام 4 بجے سے 8 بجے تک مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔

**ناجا (Naja):** تنفس میں دقت کے ساتھ لیٹا نہ جاسکے۔ شدید پھیپھڑیں ہوتی ہیں جن کے باعث  
 سانس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی خشکی، تنفس کی دقت کے ساتھ، نبض آہستہ ہوتی  
 ہے۔

**نیٹرم سلف (Natrum Sulph):** مرطوب موسم میں یا برسات میں دمہ کا حملہ ہو۔ جب  
 مریض ہر مرتبہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ حملوں کا شکار ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ حملے  
 صبح سویرے ہوتے ہیں۔ کھانسی ڈھیلی اور بہت زیادہ نمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیس دار بھری  
 مائل پیلا بلغم خارج ہوتا ہے۔ سفید رنگ کا بلغم کھڑکھراہٹ اور شور کے ساتھ بڑی مقدار میں  
 خارج ہوتا ہے۔ یہ بلغم گاڑھا اور رسی دار ہوتا ہے۔ سینے میں دکھن اور دباؤ ہوتا ہے۔ مریض  
 اپنی چھاتی کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتا ہے۔ جس سے کھانسی میں افادہ ہوتا ہے۔ ورم نزعہ کے  
 ساتھ دمہ اور چھاتی کی بناوٹ میں بگاڑ، مزمن گھٹنہ کے ساتھ اگلے بدلنے والا دمہ۔ اگر یہ دوا  
 ناکام ہو جائے تو میڈورینم کو بطور عمل انگیز دوا کے دیا جائے۔

**امبرا گریشیا (Ambra Grisea):** بوڑھے لوگوں میں اور بچوں میں دمہ، سانس لینے کے دوران چھاتی میں سیٹیاں بگتی ہیں۔ معمولی تھکاوٹ کے ساتھ ضیق النفسی ہوتی ہے۔

**امونیا کارب (Ammonia Carb):** ضیق النفسی کے ساتھ جس میں گرم کمرے میں اتھری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے۔ رات کے دو بجے سے پانچ بجے تک کھانسی ہوتی ہے۔ سینے میں بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ کھانسی ہو۔

**می فائینس (Mephites):** شرابیوں میں دمہ، شدید قسم کی خشک کھانسی ہر حملے کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مریض مرجائے گا۔

**ڈروسرا (Drosera):** مدقوق لوگوں میں دمہ، بستر کی گرمی سے تکلیف میں اتھری ہو۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اگر ڈروسرا ناکام ہو جائے تو می فائینس آزمائی جائے۔

**لیکیسیس (Lachesis):** دمہ کے اچانک غلبے سے مریض نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ مریض اپنی گردن یا چھاتی پر معمولی سادھاؤ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار وہ پانی والا بلغم کھانسی کر نکالتا ہے۔ جس کے ساتھ بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔ سونے کے دوران اور سونے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔

**یریبا سانتا (Yerba Santa):** جب بلغم کے اخراج سے افادہ ہو۔

**آر سینک البم (Ars Alb):** حاد اور مزمن کیسوں میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ مشقت والا تنفس، انتہا درجے کے اضطراب، ہائے واسے اور بے چینی کے ساتھ دمہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ اور اذیت ہوتی ہے جیسا کہ جاں کنی کے وقت میں ہو۔ اس کے ساتھ ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں۔ چلنے سے، پہاڑی کے اوپر چڑھنے سے یا میڑھیاں چڑھنے پر سانس کی تکلیف میں اتھری ہو جاتی ہے۔ بستر پر جانے کے وقت یا رات کے پہلے حصے کے دوران حملہ ہوتا ہے۔ یہ دوا آدمی رات کے بعد مرض میں اضافے کو بھی شفا دیتی ہے۔ جب عام دسے کے ساتھ تپ کاہی والا دمہ بھی شریک ہو۔ پھوڑے پھنسی کے دب جانے کے بعد دمہ ظاہر ہو۔

**براکیونیا (Bryonia):** رات کے وقت تنفس میں رکاوٹ یا صبح ہوتے ہوئے تنفس میں رکاوٹ کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ متواتر کھانسی، چھوٹی پسیلوں کے نیچے درد اور دائیں طرف ٹیک لگانے کی نااہلیت ہوتی ہے یا بائیں طرف بہت زیادہ تکلیف کے بغیر چنانچہ مریض پشت پر لیٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بات چیت کرنے سے یا معمولی حرکت سے اتھری ہوتی ہے۔ خوراک کی نالی یا نرخرہ کا ہیجان۔

**نکس وامیکا (Nux Vom):** معدے کے علاقے والا دمہ، غیر خوش کن اور پریشان کن

خواب دیکھنے کے بعد راتوں کو دم گھٹنے والی سختی کے حملے ہوتے ہیں۔ کمر کے بل لیٹنے سے یا کروٹ بدل کر لیٹنے سے یا اٹھ کر بیٹھ جانے سے حملے میں افادہ ہوتا ہے۔ اچھارہ بھی ہوتا ہے۔ گیس والی ٹالی کے سوچ جانے سے تکلیف کا آغاز ہوتا ہے۔

۱۔ انتیم ٹارٹ (Antim Tart): دم گھونٹنے والی کھانسی کے ساتھ تنفس میں دقت کے لئے اس دوا کا استعمال کرنا چاہئے نیز ہوا کی تالیوں میں بہت زیادہ بلغم جم جانے کے باعث چھاتی کے آگے والے حصے میں پریشان کن تکلیف کے لئے بھی اس دوا کو استعمال کرنا چاہئے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں اور بچوں میں اس دوا کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تنفس تیز، پر درد اور پر شور ہوتا ہے۔

۲۔ اوپیم (Opium): رکاوٹ والے تنفس کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ خواہ کچھ پھڑوں میں اجتماع خون یا تشنجی دوروں کے باعث ہو۔ جن کے ساتھ دم گھونٹنے والی کھانسی ہوتی ہے اور چہرے کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ سینے میں بلغم بہت بلند آواز کے ساتھ کھڑکھڑاتا ہے۔ اعتماد رے کی اذیت اور دم گھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ دورانِ فید سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ خوفناک خواب نظر آتے ہیں۔

۳۔ گرافائٹس (Graphites): پھوڑے پھنسی کے ساتھ اولتے بدلتے ہوئے دسے کے

دورے۔

۴۔ سمبوکس نائگرا (Sambucus Nig): تیز اور پر مشقت تنفس جس کے ساتھ بلند آواز والی سنبھاٹ ہوتی ہے۔ وزن کے ساتھ چھاتی کی تکلیف۔ گھاگھٹنے کی اذیت اور خوف کے ساتھ۔ بعض اوقات چہرے اور ہاتھوں پر سوجن ہوتی ہے اور رنگ نیلا پڑ جاتا ہے۔ عام حرارت ہوتی ہے، لرزہ ہوتا ہے۔ کھسر پھسر سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ بولنے کی اہلیت نہیں رہتی۔ دم گھونٹنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ علامات لینے ہونے کی صورت میں بڑھ جاتی ہیں۔ بچوں، ٹیکری کا کام کرنے والوں اور مل میں کام کرنے والوں میں دم، بچے سانس رکھنے کے باعث دھچکا کھنے سے جاگ جاتے ہیں۔ جسم پر پھینک ہوتا ہے۔

۵۔ آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): خصوصاً تپ کاہی، چھینکوں، درد اور حلق میں کھنچاؤ (جس کے ساتھ بعد دوپہر بہت زیادہ زکام بہتا ہے) کے لئے یہ مفید دوا ہے۔

۶۔ موسکس (Moschus): اعصابی علاقے کا دم، خصوصاً ہسٹیریائی مستورات میں یا ٹھنڈے کھنے کے باعث بچوں میں سانس کی ٹالی کے اوپر والے حصے میں کھنچاؤ والے تشنجی دوروں کا احساس نیز اس کے ساتھ حلق میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سلفر کے دھوئیں میں سانس لیا جا رہا ہے۔

۷۔ کیوپرم میٹ (Cuprum Met): یہ دوا موسکس کے مماثل علامات کی نشاندہی کرتی ہے

لیکن اسے موسکس کے ٹاکام ہو جانے کے بعد دینا چاہئے۔ تشنجی دوروں والا دمہ، خوف زدہ کر دینے والے جھٹکے، گلے میں گھجھجھکے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Inflata): سینے کی سختی، سانس کی ٹالی میں کھجلی کا احساس اور سانس لینے میں مشقت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ مریض کو سانس لینے کی خاطر منہ چوڑا کر کے کھولنا پڑتا ہے۔ سینے کے دباؤ کو دور کرنے کے لئے گہرا سانس لینا پڑتا ہے کیونکہ سینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ چھاتی کی ہڈی کے نیچے ہلکی کھجلی ہوتی ہے۔ جبکہ گہرا سانس کھینچا جاتا ہے۔ کھانسی یا بلغم کا اخراج نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ اور تمباکو کے دھوئیں سے جس کی بو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا مرطوبیت والے دمہ کے لئے مفید ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ جو معدے میں جا کر جیسے ہی گرم ہوتا ہے۔ تپ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ انتہا درجے کی تکلیف، البیومن کے ساتھ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جب فاسفورس ٹاکام ہو جائے تو اسے آزمانا چاہئے۔ 3 ایکس طاقت کی دوا سب سے پہلے دینی چاہئے۔ پھر اس کے بعد 200 طاقت کی دوا دی جائے۔ نیٹرم آرسینیکم (Natrums Ars): الرتجی یا خارش کے ساتھ اولٹے بدلتے والا دمہ۔ کونکے کے ذرات سانس کے ذریعے اندر جانے کے باعث دمہ ہو جائے۔

اگریکس ایم (Agaricus M): دبلے پتلے بید کی طرح کی پتلی جسامت والے اعصابی اور بے چین قسم کے اشخاص میں دے کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ ان افراد کے عضلات میں پھڑکن اور کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ اعصاب میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔ بے ڈول اور بھدے اشخاص، ادھر ادھر ڈھیر ہونے والے، چیزوں کو گرائیں اور انہیں توڑیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہو۔ تھکاوٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ رات کے پینے میں چھاتی کا نزلہ ہوتا ہے۔ شدید کھانسی کے دورے چھینکوں سے رک جاتے ہیں۔ سانس رکتی ہے۔ دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں۔ جس کی وجہ انتہا درجے کی تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے جو صبح کے وقت ہوتی ہے لیکن شام ہوتے ہوتے مریض خوش باش اور ہر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

تھو جا (Thuja): جب حفاظتی ٹیکوں کے گلوانے کے بعد دمہ لاحق ہو۔ چہرہ زرد، بیمار، موسم کی طرح کا اور چمک دار ہوتا ہے۔ چہرے پر کیل آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعد دوپہر خشک کھانسی لاحق ہوتی ہے۔ خشک یا ڈھیلی کھانسی کے ساتھ بچوں کا دمہ، گاڑھے سبز مائل پیلے مواد کے اخراج کے ساتھ پرانا نزلہ، جب اچھی منتخب شدہ دوائیں ٹاکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز



دوا کے طور پر دینا چاہئے۔

**ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph):** ٹھنڈی خشک مشرق کی جانب سے آنے والی ہوائی خشک جسم کو گلنے کے بعد دمہ لاحق ہو۔ کسی بھی قسم کی ٹھنڈ سے ابتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں مستحکم قسم کا افادہ ہوتا ہے۔

**کیلڈیم (Caladium):** غار ش والے سرخ یاد کے ساتھ ادلنے بدلنے والا دمہ۔  
**سٹیکٹا (Sticta P):** خشک کھانسی جو شام کو اور رات کے وقت ابتر ہو جاتی ہے۔ مریض سویا لیٹ نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ وہ کھانسا ہے اتنا ہی زیادہ وہ مزید کھانسا چاہتا ہے۔ دودھ میں کمی کے ساتھ عورتوں میں دمہ کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔

**برومائن (Bromine):** ملاحوں کا دمہ جب وہ ساحل پر جائیں۔ جیسے ہی وہ سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں 'افادہ' ہو جاتا ہے۔ گردیا ہوا کے جھونکوں سے دمہ میں ابتری ہو۔

**سلیشیا (Silicea):** یہ دوا سانھونک مزاج کے مریضوں کی نیز جاڑے والے مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ چھاتی کے نزلے کے راسخ ہو جانے والے کیسوں میں دسے کی زوں زوں والی آوازیں چھاتی سے آتی ہیں۔ گھبراہٹ کے ساتھ دم کا گھٹنا 'حرکت کرنے کی نااہلیت۔ یہ حالت زیادہ گرمی گلنے اور زیادہ تھکاوٹ کے باعث' جس کے ساتھ سانس کی ٹالیوں کی مزمن سوزش اور سانس کی ٹالی کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ مرطوب دمہ 'بھدی کھڑکھڑاہٹ سینہ میں ہوتی ہے اور ساری چھاتی بلغم سے بھری لگتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مریض کا دم گھٹ جائے گا۔ یہ کیفیت سوزاک کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ سنبوں میں ہوا کا بھر جانا۔ جہاں چمک دھیمی پڑ گئی ہو اور ریشے اتنے زیادہ پھول جاتے ہیں کہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نئے چاند کے دوران یا پورے چاند کے دوران ابتری ہوتی ہے۔

**اگنیٹیا (Ignatia):** جذبات کے باعث 'تہار داری کے باعث اور بار بار لاحق ہونے والے غموں کے باعث دمہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**میڈورہینم (Medorrhinum):** جب دیگر اچھی منتخب شدہ دوائیں عمل کرنے میں یا مکمل شفا دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر دمہ کے مرض میں دیا جاتا ہے۔ دم ٹھنڈنے والی کھانسی 'خجرہ بند ہو جاتا ہے چنانچہ ہوا اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ صرف چہرے کے بل لیٹنے سے افادہ ہوتا ہے۔ گرمی کھوکھلی کھانسی لیٹنے سے ابتر ہو جائے۔ معدے کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ تنفس میں دقت ہوتی ہے۔ مریض پچکے کی طرح ہلنا چاہتا ہے۔ ٹھنڈ محسوس کرتا ہے لیکن اوڑھنے والے کپڑے اتار پھینکتا ہے۔ گرمی سے بھی ابتری ہوتی ہے۔ مرطوب ہوا کے جھونکوں سے اور گر بنے چمکنے والے طوفانوں سے بھی ابتری ہوتی ہے۔ سورج



طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک اتھری ہوتی ہے۔ بیشہ شام کے وقت بہتری ہوتی ہے۔ سمندر پر یا ساحل سمندر پر بہتری ہوتی ہے۔ خشکی پر اتھری ہو (برومیم کے برعکس) گنتھیا کے تادلے میں یا اس کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔

اکتیار لیس (Actea Race): حیض کے دوران یا بات چیت کرتے ہوئے اور رات کے وقت شدید تشنگی دورے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلغم کا اخراج شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔

ریو میکس (Rumex): درجہ حرارت کی کسی بھی قسم کی تبدیلی سے مثلاً گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانا اور اس کے برعکس نیز بات چیت کرنے سے اور پھنسنے سے شدید کھانسی کے حملے ہوتے ہیں۔ ہنسی کی ہڈی کے نیچے کچے پن والا درد محسوس ہوتا ہے۔ کھانسی چھاتی اور سر کو ہلا دیتی ہے۔ بلغم کا اخراج کم ہوتا ہے اور بلغم مشکل سے اکھڑتا ہے۔

سینیکا (Senega): بلغم کی بلند کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔ بلغم سخت اور رسی دار ہوتا ہے۔ جس کو اکھاڑا نہیں جاسکتا۔ خشک گلے کے ساتھ مریض ہانپتا ہے اور کھانستا ہے۔ مزمن ورم نرخرہ یہ دوا عضو تنفس کی نزلہ وی کیفیت کو بھی درست کرتی ہے۔

ایسڈ سلف (Acid Sulph): چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔ کھانسی مسلسل ہوتی ہے۔ جس کا اختتام ابکائی پر ہوتا ہے جس کے ساتھ مواد منہ تک آ جاتا ہے یا قے کرنے پر ہوتا ہے۔ چھاتی کمزور ہوتی ہے۔ نیز جلن دار اور ٹانگے لگنے جیسے دردوں سے بڑھتی ہے۔ خوف زدہ کر دینے والی تکلیف ہوتی ہے اور چھاتی میں دم گھٹتا ہے۔ جس میں افادہ ٹانگیں نیچے کی جانب لٹکانے سے ہوتا ہے۔

کاربو وےج (Carboveg): معدہ میں گیس کے اجتماع کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔ پوتھوس (Pothis): سانس کے ذریعے گرد اندر جانے کے باعث دمہ لاحق ہو یا دمہ میں اتھری ہو۔ پاخانہ کرنے سے افادہ ہوتا ہے۔

کولوسینتھس (Colocynthis): بد ہضمی اور اچھارہ کے ساتھ دمہ لاحق ہو 'سمندر کے کنارے یا سمندر کی جانب جانے سے اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے کا احساس ہوتا ہے حتیٰ کہ گرم موسم میں بھی ٹھنڈ لگتی ہے۔

سورینم (Psorinum): بازو پھیلا کر لیٹنے سے نمایاں افادہ محسوس ہوتا ہے۔ مریض خود کو بستر پر گرا دیتا ہے۔ تاکہ سانس لینے میں آسانی پیدا ہو۔ بازو جسم کے قریب لانے سے اتھری ہوتی ہے۔ موسم سرما میں اور ٹھنڈے موسم میں تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلغم چپکنے والا اور بدبودار خارج ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمیوں کا دمہ۔

ہائپرکیم (Hypericum): دھند والے موسم میں دمہ میں اتھری ہو۔ زیادہ مقدار میں بلغم کے

اخراج اور افراط کے ساتھ پیٹھ آنے سے دمہ کے حملوں میں افادہ ہوتا ہے۔  
ڈلکامارا (Dulcamara): مرطوب موسم کے دوران دمہ لاحق ہو یا مرطوب تر خانوں میں رہنے سے دمہ لاحق ہو۔

کرومیو کالی سلفیورکیم (Chromic Kali Sulphuricum): جرموں کے کھنسنے کے مطابق یہ دوا دمہ کے لئے مخصوص ہے۔ جس دمہ کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نیز گاڑھا مواد خارج ہوتا ہے جسے اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے۔

سباڈیلا (Sabadilla): کانسی دمہ کے لئے ایک اہم دوا ہے۔ جس دمہ کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ جھینکلیں آتی ہیں اور پانی والا مواد خارج ہوتا ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): چھاتی میں شدید کھچاؤ کے ساتھ اعصابی دمہ کا شدید تملہ۔

سینگوئنی نیریا سی (Sanguinaria C): بوؤں کے باعث لاحق ہونے والا دمہ یا بوؤں کے باعث جس دمہ میں بہتری ہو۔ یہ دوا ایسے دمہ کے لئے خصوصی طور پر موزوں ہوتی ہے۔ بیضی ہوئی آواز والی کھانسی، سخت اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔

سفیلیلیم (Syphilinum): دمہ جو ہر موسم گرما میں عود کر آئے۔ IM طاقت کی دوا دیجئے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): ایسے اشخاص میں دمہ جو بزدل اور بھجائی ہوتے ہیں۔ ایسے اشخاص کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ آسانی سے ہنستے بھی ہیں اور آسانی سے روتے بھی ہیں۔ اندھیرے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ موت سے ڈرتے ہیں۔ خشکی مزاج ہوتے ہیں۔ موٹاپے سے پہلے ناخوش ہوتے ہیں۔ بلیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ IM طاقت کی صرف ایک خوراک دیجئے اور کچھ عرصہ انتظار کیجئے۔

### عارضہ قلب کے ساتھ دمہ — (Cardiac Asthma)

اکونائٹ این (Aconite N): اونچے فشار خون کے ساتھ دمہ، خشک کھانسی ہوتی ہے اور موت کا خوف رہتا ہے۔

ناجا (Naja): شخص میں دقت ہو۔ مریض لیٹ نہیں سکتا، شدید جھینکلیں آتی ہیں۔ جس سے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نبض آہستہ چلتی ہے۔

سبل سر (Sabal Serr): امراض قلب والا دمہ جس کے ساتھ سنسناہٹ اور سخت کھانسی ہوتی ہے۔ ٹھنڈے مرطوب موسم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ طبع خشک ہوتا ہے۔ 2x یا 3x ڈاکی لیوٹن دیجئے۔

بریٹا کارب (Baryta Carb): بلند فشار خون کے ساتھ دم لاحق ہو۔ جس کے ساتھ نبض بھرپور اور سخت ہو۔ غرور کی سوزش کا رجحان ہو۔ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ آنکھ کے ڈھیلوں میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ کانوں میں گونج ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سماعت میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہو جیسے دھواں سانس کے ذریعے اندر چلا گیا ہو۔ چھاتی سے گہری کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔

بریٹا میور (Baryta Mur): بلند فشار خون کے ساتھ دم کے پرانے مریضوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ یادداشت کھو جائے یا یادداشت کمزور پڑ جائے۔ بلغم خارج کر سکنے کی طاقت کی عدم موجودگی کے ساتھ دم گھٹنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ موسم کی ہر قسم کی تبدیلی کے ساتھ ابتری ہوتی ہے۔

وسکم ایلم (Viscum Alb): ایسے اشخاص میں دم کا مرض جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہوں یا جنہیں بلند فشار خون کا مرض لاحق ہو اور ممکن ہے اس کا باعث پیشاب میں البیومن (اندوں کی سفیدی کا سامان) خارج ہوتا ہو۔ جب مریض لیتا ہے تو دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ نبض کمزور اور تار کی طرح کی ہوتی ہے۔ دل میں بھاری پن اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔

کریٹائی گس (Crataegus): دم والے ایسے اشخاص جن میں دل کا ٹیل ہو جانا اور بلند فشار خون پایا جائے۔ انتہا درجے کی ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دل پھیل جاتا ہے۔

آرم میٹ (Arum Met): امراض قلب والا دم، ضیق النفسی کے ساتھ اور جب تنفس دل کے ساتھ ملوث ہو۔

آرم میور (Aurum Mur): دم جس کے ساتھ بلند آواز والی کھانسی اور پیلے رنگ کا بلغم ہوتا ہے۔ دل کے اوپر درد ہوتا ہے۔

سٹرکولیا (Sterculia): یہ ایسے دم کے لئے دوا ہے۔ جس میں دل کمزور ہوتا ہے۔ خصوصاً شرایین میں۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): کمزور دل کے ساتھ، نقاہت کے ساتھ، دل کی دھڑکن کے ساتھ اور حرکت کرنے پر تنفس میں دقت کے ساتھ۔

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): امراض قلب والے دم کے لئے یہ ایک رہنما کن دوا ہے۔ تنفس میں یک دم التواء ہو جائے۔ (یعنی کچھ دیر کے لئے سانس رک جائے) گلے میں موجب پریشانی پسند اپڑ جانے کا احساس (یعنی دم گھٹنے کا احساس) کھانسی کے ساتھ۔ دل میں ٹانکے لگنے (جیسے دردوں) کے ساتھ، بے قاعدہ نبض۔

ایپو سائی نم کین (Apocynum Can): پیشاب میں کھار آنے کے رجحان کے ساتھ دم،

گردوں میں درد اور دل کی کمزوری کے ساتھ استمراتی سوجن ہوتی ہے۔ دل کی تالیوں کی ناکافی چمک، 'غش' پھوٹا، خون کی شریانوں کے کھنچاؤ میں کمی۔  
گیگٹس جی (Cactus G): دم گھٹنے کے میعاد میں 'جن' کے ساتھ غشی ہوتی ہے۔ چہرے پر ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور نبض کھو جاتی ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ سینے کا نچلا حصہ بڑی سختی سے کسی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ دباؤ ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے جو نیچے لیٹ جانے سے رکتی ہے۔ چھاتی میں خون کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے دل اور سینہ کسی ٹکڑے میں رکھ کر بچھپے جا رہے ہیں۔ دن کے گیارہ بجتے بجتے دورہ آ جاتا ہے۔ کھلی ہوا میں افادہ ہوتا ہے۔

### کھانسی — (Cough)

اکونائٹ (Aconite N): خشک، کروب، ٹیلہی ہوئی آواز والی، دم کھونٹنے والی، بلند آواز والی اور کھردروی کھانسی۔ پھندا لگنے والی، سخت، گھنٹیاں بجنے جیسی اور سینیاں بجنے جیسی کھانسی جو خشک ہواؤں یا ہوا کے جھونکوں سے لاحق ہو۔  
بیلادونا (Belladonna): جب حلق میں خون کے اجتماع کے باعث کھانسی لاحق ہو۔ خشک، بھونکنے والی کھانسی، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جب کھانسا جا رہا ہو۔  
برائی اونیا (Bryonia): جب حادثہ زلزلہ، زکام کے حملہ کے بعد خشک کھانسی لاحق ہو۔ منہ کی خشکی پائی جاتی ہے۔ چھاتی کے اطراف میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں (یعنی سونیاں جھپتی ہیں)۔  
کالی بائی (Kali Bi): جب بلغم لیس وار ہو جسے رسی کی طرح کھینچا جاسکے۔ کھانسی ڈھیلی ہوتی ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): خشکی کھانسی جس میں لینے پر اتھری ہوتی ہے اور بیٹھنے پر افادہ ہوتا ہے۔ پینے، کھانے اور بات چیت کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔  
سائیکل من (Cyclamen): رات کے وقت کھانسی ہوتی ہے۔ جب کہ مریض سو رہا ہوتا ہے۔ سوئے سوئے کھانسا ہے، جانتا نہیں۔ خصوصاً بچوں میں۔  
کالی کارب (Kali Carb): خشک، دوروں والی کھانسی ہوتی ہے۔ کھانسی سے لیس وار بلغم یا وہپ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ جسے ضرور ہی لگنا پڑتا ہے۔ رات کے 2 بجے سے 4 بجے کے دوران اتھری ہوتی ہے۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): ڈھیلی کھانسی جب کہ وہ گرم کمروں میں اتھرو جائے اور کھلی ہوا میں

بہتر ہو۔

**فاسفورس (Phosphorus):** گرم کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں جانے سے کھانسی لاحق ہو۔ پینے، بولنے، کھانے اور پینے سے ابتری ہوتی ہے نیز بائیں جانب لیٹنے سے بھی ابتری ہوتی ہے۔

**سپونجیا (Spongia):** خشک کھانسی سانس کی آواز کے ساتھ، آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آرا لکڑی کاٹنے کے لئے چلایا جا رہا ہو۔ پیٹھے اور ٹھنڈے مشروبات، تمباکو نوشی، سرینچے کر کے لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ نیز جب پڑھا جائے، گایا جائے، باتیں کی جائیں اور اگلا جائے تب بھی ابتری ہوتی ہے۔ گرم چیزیں کھانے اور پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ سانس کے دوران کروچی سنناٹ کی آواز ہوتی ہے۔

**ہیمپیر سلف (Hepar Sulph):** جب خشک ٹھنڈی ہوا جسم کو لگنے سے کھانسی ہو۔ چلتے وقت ابتری ہوتی ہے۔ جسم کے نہ ڈھانپنے پر کھانسی ہو۔ سینے کی کمزوری، پریشانی، بیضی ہوئی آواز والا سنناٹ والا شخص۔

**پیترولیئم (Petroleum):** کھانسی رات کے وقت ابتر ہو جائے لیکن دن کے دوران بہتری ہو جب کہ اسال لاحق ہوں۔

**سینگوئی نیریاکین (Sanguinaria Can):** سوزش کے بعد خشک اور مرطوب کھانسی، درم نرخرہ والی کھانسی جو کہ جھجھک میں اور چھاتی کے اوپر والے حصہ میں گدگدی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کھانسی مریض کو رات کے وقت بیدار کر دیتی ہے۔ کھانسی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ مریض اٹھ کر بیٹھ نہ جائے اور ہوا خارج نہ کرے۔

**کیپسکیم (Capsicum):** کھانسی جس کے ساتھ جسم کے فاصلے فاصلے کے حصوں میں درد ہو اور سانس متعفن ہو۔ لوگوں کے لئے کمرے میں بیٹھنا ناممکن بنا دے۔ (سانس کی بدبو کے باعث)۔ گندی بو والی ہوا تیزی کے ساتھ پھیچڑوں سے خارج ہوتی ہے۔ (200 طاقت کی خوراک دیجئے اور ہر بارہ یا چندہ گھنٹوں کے بعد دہرائیے۔)

**میفاٹس (Mephites):** ہر صبح کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی ہو۔ جب بلند آواز میں بولے یا پڑھے تو کھانسی ہو۔ کھانسی کے ہر دورے کے دوران پیشاب اور پاخانہ خطا ہو جائے۔

**اناکارڈیم (Anacardium):** کھانے کے بعد کھانسی، بو اور ذائقہ کھو جائے۔ کھانسی اور تے کے ہر دورے کے بعد زور دار ڈکار آتے ہیں۔

**نیٹرم میور (Natrium Mur):** پیشانی میں درد سر کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے۔ پیشاب بلا ارادہ خطا ہو جاتا ہے۔ نیز جگر کے علاقہ میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ کھانسی کے ساتھ آنسو

ہتے ہیں۔

ایلیم سیپا (Allium Cepa): حنجرہ میں گد گدی کے باعث کھانسی ہو۔ متواتر کھٹکارنے کا رجحان تاکہ گد گدی سے پھٹکارا حاصل ہو۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): انفلوئنزا کے بعد کھانسی جب برائی اونیا اور دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔ آواز بیٹھ جانے کے ساتھ کھانسی، مریض خون تھوکتا ہے۔ گلے میں گد گدی جیسا کہ گلے میں گرد ہو۔ صبح کے 3 بجے کے قریب کھانسی ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): بلغم چھاتی سے اوپر چڑھانے کے لئے زیادہ گہری کھانسی نہ کر سکے یا جزوی طور پر بلغم اوپر چڑھتا ہے لیکن پھر حلق میں واپس پھسل کر چلا جاتا ہے۔ پیشاب کھانسنے کے دوران آٹھیل کر خارج ہو سکتا ہے۔ کھانسی میں بولنے اور نزلے سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ٹھنڈا پانی گھونٹ گھونٹ پینے سے یا چکیوں کے ساتھ پینے سے آفاقہ ہوتا ہے۔

کوکولس (Cocculus): بلند آواز کے ساتھ بولنے یا دانتوں کو برش کرنے سے کھانسی اور تے ہوتی ہے۔

ڈروسرا (Drosera): کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد تشنجی دوروں والی کھانسی۔ کیوپرم میٹ (Cuprum Met): ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کے باعث کھانسی لاحق ہو لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے رک جائے۔ گلے میں غرغرے کی آواز کے ساتھ کھانسی ہو جیسا کہ بولنے سے پانی انڈیلا جا رہا ہو۔

سیلیشا (Silicea): جھٹکے دار کھانسی جس کے ساتھ ناگوار قسم کا مواد تھو کے جو کہ ڈھیلے دار، پیلا یا سبز ہوتا ہے۔ جو مائع کے اندر پیندے تک ڈوب جاتا ہے اور اس کی بو بہت گندی ہوتی ہے۔

چیلیڈونیم (Chelidonium): ہوا کی ٹالیوں میں گرد کے احساس کے باعث کھانسی ہو۔ اکتیار آر (Actea R): خشک پھاڑنے والی کھانسی رات کے وقت اتری ہو نیز بولنے کی ہر کوشش کے ساتھ کھانسی آتی ہے۔

اکلی فائڈیکا (Acalypha Ind): خونی بلغم کے اخراج کے ساتھ شدید خشک کھانسی، کھانسی رات کو سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔

کورلیم رب (Coralium Rub): بچوں کا سانس گرم ہو جاتا ہے اور ان کے چہروں کا رنگ ارغوانی اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ سانس کے لئے جھپٹتے ہیں۔ یہ کیفیت تے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ہوا کی ٹالیوں میں برفانی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اعصابی اور چھوٹی بندوق چلنے جیسی آواز والی کھانسی۔

سٹانم آئیڈو 3x اور سٹیفنی سیکریا 30 (Stannum Iod 3x and Staphisagria 30):

سگریٹ نوشی کرنے والوں میں کھانسی۔  
 سینی گا (Senega): جب کھانسی کا اختتام چھینکوں پر ہو۔  
 ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula H): کھانسی میں افاق سگریٹ نوشی سے ہو۔ رات کے وقت لیٹ جانے پر خشک کھانسی ہوتی ہے اور صبح کے وقت اٹھنے کے بعد چھاتی میں پھاڑنے والے دردوں کے ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے۔  
 بڑائی فولیم پی (Trifolium P): ہنگی گھٹنے کے بعد کھانسی ہو۔  
 نیفتھالینم (Naphthalinum): دم گھٹنے والی یا دھچکے گھٹنے والی کھانسی۔ مریض سانس لینے کے قابل نہ رہے۔ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ پینہ بہہ نکلتا ہے۔  
 انٹیم ٹارٹ (Ant Tart): جب بچہ غصہ میں بھرا ہو۔ اول بدل کر کھانسی اور ہمایاں لے۔  
 کروٹن ٹگ (Croton Tig): جب (ایگزیمیا) کھجلی، خارش کے دب جانے کے باعث کھانسی لاحق ہو۔ یہ دوا اول بدل کر آنے والی کھانسی اور پھوڑے پھنسی کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے مثلاً کھانسی غائب ہو جاتی ہے جب کہ پھوڑے پھنسی ظاہر ہو جائیں اور کھانسی ظاہر ہو جاتی ہے جب کہ پھوڑے پھنسی غائب ہو جائیں۔ دسے والی کھانسی جو رات کے وسط میں یعنی آدمی رات کو آتی ہے جس کے باعث مریض گہری نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔  
 یوفرزیا (Euphrasia): کھانسی جو بعض اوقات خشک ہو لیکن عموماً ذہیلی ہو۔ دن کے دوران کھانسی میں بہتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ خون کا بہاؤ غائب ہو جانے کے بعد کھانسی لاحق ہو۔  
 لیکٹو کا (Lactuca): دوروں میں کھانسی آئے۔ جس کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس ہو۔  
 ٹیوبرکولینم بوو (Tuberculinum Bov): حیض کے بہاؤ کے رک جانے کے ساتھ نوجوان لڑکیوں میں کھانسی لاحق ہو۔  
 سکوٹلا (Squilla): خشک، سخت کھانسی، چھینکوں کے ساتھ، کھانسنے کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ ضیق النفسی، نمکین، چپکے والا باقراطہ بلغم خارج ہو۔  
 ریو میکس (Rumex): کھانستے وقت پیشاب خطا ہو جائے۔ مسلسل خشک، اذیت دینے والی کھانسی، ہوا بدلنے یا کمرہ بدلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ گلے کے گڑھے کو چھونے یا دبانے سے کھانسی میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔  
 مینگانم (Manganum): لیٹ جانے سے کھانسی میں بہتری ہو اور ہڈیوں کی حساسیت پائی جائے۔  
 انٹیم کروڈ (Antim Crud): آگ میں دیکھنے سے کھانسی میں بہتری ہو۔

**کو کس کیکٹائی (Coccus Cacti):** کاڑھے 'رسی دار اور پیپ دار' بلغم کے ساتھ کھانسی ہو۔ یہ موسم گرما کے آخری مہینوں میں شروع ہوتی ہے اور تمام موسم سرما کے دوران جاری رہتی ہے۔ یہ ٹھنڈے موسم میں آتی ہے لیکن حقیقتاً ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کمروں اور گرم مشروبات سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ گلے میں گدگدی یا سرسراہٹ ہوتی ہے۔ تشنگی دوروں والی کھانسی، کالی کھانسی، شرایبوں کی کھانسی۔  
**برومیم (Bromium):** گرم موسم میں لاحق ہونے والی کھانسی، یہ گرد یا گرد آلود چیزوں کو پکڑنے سے اجتر ہو جاتی ہے۔

**بریشا کارب (Baryta Carb):** جگر یا ہوا کی نالی میں ہیجان کے باعث مشتعل ہو جانے والی کھانسی، پیٹ کے بل لینے سے افادہ ہوتا ہے۔  
**آرم ٹرائی فلم (Arum Triph):** سینے میں کچے پن کے احساس کے ساتھ کھانسی ہو۔ پھیپھڑوں میں دھکن محسوس ہو۔ ہوا کی نالی میں اور نرخرہ کی نالیوں کی لمبی شاخوں میں جلن ہوتی ہے۔

**امبرا گریسیا (Ambra Grasea):** جب زیادہ لوگ موجود ہوں تو کھانسی میں اجتری ہو۔ اعصابی مریضوں میں بھی موسیقی سے اجتری ہو جو کہ معدے سے ہوادار ڈکاروں کے بعد ہوتی ہے۔ اس مرض کی دیگر ادویات حسب ذیل ہیں: الینڈ سلف، آرنیکا، سیگلونی نیریا اور وریمٹرم الینڈ۔

**انٹیم ٹارٹ (Antim Tart):** بچک کے نتیجہ میں لاحق ہونے والی کھانسی۔  
**ارلیار لیس موسا (Aralia Racemosa):** رات کے دوران پہلی مختصر نیند کے بعد کھانسی کے دورے کے دوران لیٹ جانے سے اجتری ہوتی ہے۔ یہ کھانسی دوران شب لینے پر فوری طور پر آسکتی ہے۔ یہ مزید عمومیت کے ساتھ رات کے پہلے آدھے حصے کی نیند کے بعد آتی ہے۔

**بسمتھ (Bismuth):** جب معدہ خالی ہو تو کھانسی میں اجتری ہو۔  
**امونیا آرسینیکم (Ammonia Ars):** خونی بلغم کے اخراج کے ساتھ کھانسی ہو۔ بلغم بدبودار ہوتا ہے۔ پیپ دار ہوتا ہے۔ ذائقہ بلغم کا میٹھا ہوتا ہے۔ بلغم سخت اور پیلا ہوتا ہے۔ دم والی کھانسی رات کے وقت ہوتی ہے۔ کھانسی مختصر اور بے قاعدہ ہوتی ہے نیز دم گھونٹنے والی ہوتی ہے۔



## عارضہ قلب والی کھانسی

(Cardiac Cough)

ہائیڈرو سائیک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): امراض قلب والی کھانسی کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سب سے پہلے اسے آزمانا چاہئے۔  
 ڈیجی ٹالس (Digitalis): تنفس میں دقت کے ساتھ کھانسی ہو۔ نبض بے قاعدہ اور وقفہ دار ہوتی ہے۔ چہرہ مردگی والا پیلا پڑا ہو۔  
 سپونجیا (Spongia): خشک، بھونکنے والی کھانسی جو کہ گلے میں ڈاٹ ہونے کے احساس کے باعث ہو۔ خنجرہ میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔  
 ناجا (Naja): دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ، سانس کا پھول جانا، پہلانی خشک کھانسی، دل کی تکلیفات کے باعث، چپکنے والا بلغم اور تھوک ہوتا ہے۔  
 اورم میور (Aurum Mur): دل کی کھانسی۔  
 اوکزالک ایسڈ (Oxalic Acid): امراض قلب والی کھانسی، معمولی سی تھکاوٹ سے لاحق ہو۔ خنجرہ میں دم گھٹنے کا احساس۔

## کالی کھانسی

(Whooping Cough)

پرتوسین (Pertussin): یہ نوسوڈ ہے۔ اسے کالی کھانسی کے علاج کے آغاز میں دینا چاہئے۔ کئی کیسوں میں اس دوا کی ایک ہی خوراک مرض کو رفع کرنے کے لئے کافی ثابت ہو سکتی ہے یا پھر مرض کے دورانیہ کو کم کر دیتی ہے۔  
 ڈروسرا (Drosera): یہ دوا کالی کھانسی کے لئے تقریباً مخصوص دوا ہے۔ یہ 30 طاقت کی دوا دینی چاہئے اور پھر صرف ہر چار روز کے بعد دہرائی چاہئے۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ موقع کے مطابق اس کی 3x طاقت کے 2 قطروں کی خوراک تین تین گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے۔ بھونکنے والی کھانسی کے متواتر دورے آتے ہیں۔ بو مریض کو اپنے سانس پر قابو پانے کا موقع فراہم نہیں کرتے۔ نتیجتاً قے ہوتی ہے اور جی مٹاتا ہے۔ کھانسی بیشی ہوئی آواز والی ہوتی ہے۔ مرنے کی بانگ کی آواز والا تنفس اس دوا کا نشان ہے۔ بہت سے سوراخوں سے سیالان خون ہو مثلاً ناک، گلے، خنجرہ وغیرہ سے۔

بیلادونا (Belladonna): کالی کھانسی کے ابتدائی مرحلہ میں کھانسی خشک ہوتی ہے۔ ہر آدمی گھٹنے یا کم و بیش وقت میں عود کر آتی ہے چنانچہ بیک وقت تین چار کھانسی کے حملے ہوتے ہیں۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بعد والے مراحل میں ناک سے خون کا سیلان بھی ہو سکتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): جب ڈرو سرا ناکام ہو جائے تو یہ دوا کالی کھانسی کے لئے مخصوص ہے۔ اس دوا کو تجویز کرنے کے لئے مخصوص علامت یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر والے پونے اور آنکھ کی پلکوں کے درمیان تھیلی کی صورت کی سوزش ہوتی ہے۔

ایپیکاک (Ipecac): جب تے کے ساتھ شدید کھانسی ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ بچہ کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ چھکیلے بلغم کا اخراج بافراط ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مرض کے آخری مراحل میں جب ناموافق نتیجہ کا خدشہ ہو۔ ایسے کیسوں میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ سخت رنگاری رنگ والا یا چمک دار سرخ اور جھاگ دار بلغم خارج ہوتا ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ آواز کھو جاتی ہے اور حلق میں گدگدی ہوتی ہے۔

میغائٹس (Mephites): سخت کھانسی، تشفی دوروں والی کھانسی کی آواز (کھوں کھوں) کے ساتھ۔ رات کے وقت اور لیٹ جانے پر ابتری ہوتی ہے۔ دم گھٹنے کا احساس، بچہ سانس باہر نہیں نکال سکتا۔ بعض اوقات اس کے بعد جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ بلغم چھاتی کے اوپر والے حصہ میں کھڑکھڑاتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے بعض اوقات مریض ابتر ہو جاتا ہے لیکن حقیقتاً یہ حالت مرض کے دورانیہ کو مختصر کرنے کے لئے ہوتی ہے (کھانسی بہت شدید ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر حملہ مریض کی زندگی کو ختم کر دے گا۔ نزالوی علامات موجود نہیں ہوتیں چنانچہ بہت تھوڑا بلغم خارج ہوتا ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتا۔

کورولیم ریب 6 (Corallium Rub 6): کھانسی شدید ہوتی ہے۔ بچے اپنا سانس ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ ان کے چہرے کا رنگ ارغوانی اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کے لئے جھپٹتے ہیں اور اس کے بعد تے ہو سکتی ہے۔ ہوا کی ٹالیوں میں برفانی ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ اعصابی اور چھوٹی بندوق کی آواز والی کھانسی۔ سانس لینے میں ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ کھانسی سے قبل دم گھٹنا اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جانے یا سانس بند ہو جانے کے ساتھ کھانسی لاحق ہو۔ اس میں چہرے کا نیلا پڑ جانا اور تے پائی جاتی ہے۔ انگلیوں کے ناخن بے رنگ ہو جاتے ہیں اور آنکھیں پلٹ جاتی ہیں۔ بچہ کھانستا ہے حتیٰ کہ اپنے تنفس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور بے ہوشی والی حالت میں لیٹ جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کے باعث

کھانسی ہوتی ہے جبکہ ٹھنڈا پانی پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ شدید دورے ہوتے ہیں۔ جن میں ٹھنڈے پانی سے افادہ ہوتا ہے۔ مریض کو انگوٹھے اور منھیاں بچھنے کے ساتھ تھننی جھکے لگتے ہیں۔

ایلیم سیپا (Allium Cepa): قے کے ساتھ بچوں میں کھانسی 'بد ہضمی' اچھارہ اور بدبودار ہوا کا اخراج ہوتا ہے۔

کوکس کیکٹائی (Coccus Cacti): کالی کھانسی جس میں صبح کی وقت بہتری ہوتی اور جس کا اختتام رسی دار شفاف بلغم کی قے سے ہوتا ہے۔ یہ بلغم منہ سے تاروں کی مشکل میں نکلتا ہے۔ کالی بائی میں بھی تار دار بلغم ہوتا ہے لیکن وہ رنگ میں زرد ہوتا ہے اور اتنا شفاف نہیں ہوتا جتنا کوکس کیکٹائی میں ہوتا ہے۔

سینیکا (Senega): شام ہوتے ہوتے کھانسی آئے جس کے ساتھ انڈے کی سفیدی جیسا سخت اور شفاف بلغم خارج ہوتا ہے۔ مریض سینے پر کھٹنے والا بوجھ محسوس کرتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): جب کھانسی (کالی) کے ساتھ آنسو بہتے ہوں۔  
نیفتھالین (Naphthalin): دھچکوں والی کھانسی 'سانس لینے کے قابل نہ ہو۔ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ حملے اچانک آتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں۔ گلے کی کھچاوت بہت نمایاں ہوتی ہے۔ (مستورات میں اضطرابی کھانسی)۔  
ٹیرنٹولا کیوب (Tarentula Cub): کالی کھانسی کے لئے حیرت انگیز دوا ہے۔

## مستورات میں اضطرابی کھانسی


(Reflex Cough in Females)

سنی شیو اورینس (Seneciq Aurens): حیض کی بندش کے باعث کھانسی ہو۔  
سیپا (Sepia): جب کھانسی پیڑو میں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نمکین بلغم خارج ہو۔  
ملی قویم (Millefolium): حیض دب جانے کے باعث یا سیلان خون کے دب جانے کے باعث کھانسی لاحق ہو۔

اکتیاریس موسا (Actea Racemosa): خشک تھکا دینے والی کھانسی۔ جس میں رات کے وقت بہتری ہو اور جس کے ساتھ اندام نہانی کے اعضاء میں بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔  
امبرا گریسیا (Ambra Grisea): رمی کمزوری کے ساتھ جب معمولی جذبات بھی کھانسی اور حیض کو بڑھا دیں۔

ایپس میل (Apis Mel): سن بلوغ کو بچھنے پر بھونکنے والی کھانسی لاحق ہو۔ دائیں جانب کے

بیضہ دان کی حساسیت کے ساتھ اضطراری کھانسی۔  
 وائی برنم اوپولس (Viburnum Opulus): حمل میں کھانسی لاحق ہو۔ جو اسقاط حمل کا  
 باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ دوا اسقاط حمل کو روکے گی۔  
 کالی یاٹیکرومیگم (Kali Bich): حمل میں کھانسی۔  
 میڈورنیم (Medorrhinum): آتشک کے ساتھ یا آتشک کے باعث کھانسی ہو۔



# دل اور خون کی نالیوں کا مرض

(Disease of Heart & Blood Vessels)

## شریانوں (خون کی نالیوں) کی پھیلاوٹ

Aneurism (Dilatation of Arteries)

**برشا کارب (Baryta Carb):** بائیں جانب لیٹنے سے دل کی دھڑکن شدید ہو جاتی ہے جو دیر تک رہتی ہے۔ چھوٹے سانس کے ساتھ چھاتی میں بھراؤ ہوتا ہے۔ خصوصاً اوپر چڑھتے وقت سانس لیتے ہوئے چھاتی میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ کمر میں تنگیں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے جیسا کہ دوران خون رک گیا ہو۔ نیچے دی گئی دو ادویات کی تکمیل کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ جس سے شفا یقینی اور مکمل ہوتی ہے۔

**کاربو انیمالس (Carbo Animalis):** سینے کا پھیل جانا جس کے باعث آواز کھو جاتی ہے۔ تیز جلن دار ٹانگے لگنے جیسے درد چھاتی میں ہوتے ہیں جو کہ چلنے سے اتر ہو جاتے ہیں۔ IM ڈاک کی لیوشن دیجئے۔

**لائکوپوڈیم (Lycopodium):** خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ جس کے باعث گوشت میں کمی ہوتی ہے۔ ہونٹوں میں دکھن ہوتی ہے۔ اچھارے اور قبض کا رجحان ہوتا ہے۔

## انجائنا (Angina Pectoris)

**ایمل نائٹریٹ (Amyl Nitrate):** حاد حملے میں جبکہ دل کا عمل تیز اور ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دل میں کھنچاؤ ہوتا ہے اور تنفس میں تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ کمزوری اور لرزہ بازوؤں اور ٹانگوں میں ہوتا ہے۔ پریشانی اور تشویش ہوتی ہے۔

**کیکس (Cactus):** دل کے عضوی امراض میں جن کے نتیجے میں پسینے کا انجائنا لاحق ہوتا ہے۔ جبکہ دل میں ایٹھن، کھنچاؤ اور اجتماع خون ہوتا ہے۔ دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے اور

نفاہت ہوتی ہے۔

**گلوٹائین (Glonoine):** جبکہ تمام جسم میں تنگیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ درد کی لہریں دل سے نکلتی ہیں۔ دل کی پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ تنفس میں دقت ہوتی ہے۔

**کراٹائیگس (Crataegus):** چھاتی کی بائیں جانب میں اچانک اور خوفناک قسم کا درد ہوتا ہے۔ جس کی لہریں دل پر اور بائیں بازو میں جاتی ہیں۔ مایوسی ہوتی ہے اور موت کا خوف ہوتا ہے۔ مدر ٹیگر کے پانچ قطرے پانی میں ملا کر ایک خوراک کے طور پر کھانے کے ساتھ یا کھانے کے فوراً بعد دیئے جائیں۔ دل کے تمام امراض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

**لیکیسس (Lachesis):** اکڑن والے درد جن کے ساتھ غشی ہوتی ہے۔ معمولی پریشانی کے ساتھ دل کی دھڑکن اور تنفس میں دھچکے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل ایک دھماکے سے باندھ کر ٹکایا گیا ہو چنانچہ ہر دھڑکن اسے توڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دل کے علاقے میں ٹانگے لگتے ہوں (یعنی ٹانگے لگنے والا درد ہوتا ہے)۔

**ناجا (Naja):** دل کے علاقے میں شدید درد ہوتا ہے جو گردن کے گزھے تک پھیل جاتا ہے نیز بائیں کندھے اور بائیں بازو تک جاتا ہے۔ جس کے ساتھ پریشانی اور موت کا خوف ہوتا ہے۔ پھڑپھڑاہٹ اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ نبض ست اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔

**اکونائٹ (Aconite):** دل کے لئے مفید دوا ہے جبکہ ذہنی پریشانی، موت کا خوف، دل کا دباؤ اور دل کی دھڑکن پائی جائے۔ بائیں بازو میں سن ہو جانے کی کیفیت اور انگلیوں میں گھنجناہٹ ہوتی ہے۔

**آر سینیکم البم (Arsenicum Alb):** انجائنا کے لئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔ شدید اور ناقابل برداشت دل کی تنگیں اس دوا کی نمایاں علامات ہیں جبکہ مریض کمر کے بل لیٹا ہو۔ خصوصاً دن کے بارہ بجے کے بعد دل کی چکنائی کی سخری اور دل کے پردوں میں پانی کا بھر جانا ہے چینی اور استسقاء پائے جاتے ہیں۔

**سپائی جیلیا (Spigelia):** دل کی دھڑکن اور دل میں تیز قسم کے ٹانگے لگنے کے سے درد، نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے یا بھرپور اور چھلانگیں لگانے جیسی ہوتی ہے۔ جس میں حرکت سے اضافہ ہو جاتا ہے۔

**مگنیشیا فاس (Magnesia Phos):** یہ دوا انجائنا کے حملوں میں کمی کرتی ہے اور دردوں کو رفع کرتی ہے۔ 6x کو گرم پانی میں ملا کر دیجئے۔

**کیمی سی فیوگا (Cimicifuga):** شدید قسم کے درد ہوں جبکہ دل کا فعل اچانک رک جائے اور مریض بے ہوش ہو جائے۔ نبض کمزور اور باریک ہوتی ہے۔

## شریانوں کی دیواروں کی سختی

(Arterio - Sclerosis)

برٹا میور (Baryta Mur): جب خون کی بڑی تالی اور طے ملوث ہوں تو یہ چوٹی کی دوا ہوتی ہے۔ رات کے وقت لیٹنے سے شدید درد سر میں ابھرتی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): دماغ کی شریانوں کی دیواروں کی سختی لاحق ہو۔ عمر رسیدہ لوگوں کو چکر آئیں۔ سیان خون کا رجحان۔

پلمبم (Plumbum): بلند پریشر اور شریانوں کی دیواروں کی سختی، نبض تار کی طرح باریک ہو۔ مزمن ورم گرد۔

اورم میور (Aurum Mur): دل کا بڑھ جانا، چھاتی اور سر میں اجتماع خون، مضبوط دل کی دھڑکن۔ یہ دوا سر کی شریانوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): مزمن گنٹھیا کے باعث انجانا کا درد لاحق ہوتا ہے۔ جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ حرکت سے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ دل ہلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کیفیت مریض کو رکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

ارگوٹن (Argotin): شریانوں کی دیواروں کی سختی کے مرض کے آغاز میں جب قلبی بیجان اور دل کی سخت قسم کی آوازیں موجود ہوتی ہیں۔ شریانوں کی دیواروں میں سختی ہوتی ہے اور تنزیل یا تباہی ہوتی ہے۔ نشہی دوروں والی اینٹھن۔ خون کی تالیوں میں ان کی سختی کے ساتھ ہو۔

سٹروفین تھس (Strophanthus): بڑھاپے میں شریانوں کی دیواریں سخت ہو جائیں۔ چکنائی میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور اس کی طافی میں ٹاکامی ہو۔ استسقاء میں اضافے کا رجحان۔

ایڈرینالین (Adrenaline): شریانوں کا بلند فشار خون، بلند فشار خون کے باعث کانوں میں گرجن ہو۔

آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): یہ دوا دل کے تمام امراض کے لئے مخصوص ہے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ نبض ست ہوتی ہے۔ مریض کا سانس گرم ہو جاتا ہے۔ میڑھیاں نہیں

چڑھ سکتے۔ دل کے والوؤں (Valves) کے جوڑے کی خرابی، اذیت ناک درد کے ساتھ، والوؤں کے جوڑوں کی سکڑن، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 3x کی خوراک دن میں دو مرتبہ روزانہ

دینی چاہئے۔ جس کے ساتھ دیگر نشاندہی کی گئی دوا دیجئے۔ دل کے تمام امراض میں اس دوا کو دیگر نشاندہی کی گئی تمام دواؤں کے ساتھ دینا چاہئے۔

سپاکی جیلیا (Spigelia): دل کی سوزش کی نشاندہی کرنے والی یہ ایک دوسری اہم دوا ہے۔

جو دل کی اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی بھیلیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ والوؤں کے جوڑ کی خرابی جو کہ شراب نوشی کے باعث ہو۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑنا اس دوا کی مضبوط علامت ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے، سر میں شور ہوتا ہے اور بڑھی ہوئی اعصابیت ہوتی ہے۔ حلق میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ سونے کی نااہلیت ہوتی ہے۔

### فشار خون — بلند — (Hypertension)

(Blood Pressure - High)

(نیز دیکھئے ”شریانوں کی دیواروں کی سختی“)

لکیسیس (Lachesis): بلند فشار خون کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ مریض چلتے وقت ابتر ہوتا ہے۔ مرض میں اضافے کے باعث سو جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ چست کپڑوں کو ہر داشت نہیں کر سکتا انہیں ڈھیلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوا سب سے پہلے دینی چاہئے اور یہ اکثر کیسوں میں مدد دے گی۔ IM طاقت کی دوا دیتے۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب غصہ بڑھ جانے یا آزدگی کے باعث بلند فشار خون لاحق ہو۔ بہت زیادہ حساسیت، سر میں گر جن ہو، چکر آئیں، شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔ موت کا خوف لاحق ہو، دل کی دھڑکن پائی جائے، ناامیدی اور مایوسی ہوتی ہے۔

اکونائٹ (Aconite): دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جسم گرم ہوتا ہے۔ دل کے علاقے میں گولی لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جھنجھڑاہٹ کے ساتھ بے ہوشی ہوتی ہے۔ نبض بھرپور طاقتور اور سخت ہوتی ہے۔

ایلیئم سیٹی وا (Allium Sativa): پر گوشت مریضوں کے لئے موزوں دوا ہے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ خصوصاً سبزیوں کے علاوہ غذائیں کھاتے ہیں۔ خون کی ٹالیوں کو پھیلانے والی خصوصیات اس مرض میں ہوتی ہیں۔ فشار خون میں تبدیلی پیدا کرنے والی دوا ہے یا خون کے دباؤ کو گرانے والی دوا جو 20 سے 40 قطرہ کی خوراک لینے کے بعد عموماً 30 سے 45 منٹ کے اندر عموماً خون کے دباؤ کو گرا کر شروع کرتی ہے۔

سٹروفین تھس (Strophanthus): عمر رسیدہ لوگوں میں دل کی تکالیف کے لئے یہ ایک مفید دوا ہے۔ ایسے مریضوں میں دل کے امراض کا انحصار گردوں کے امراض پر ہوتا ہے۔ دل میں بیجان ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خون کی شریانیں اکڑ جاتی ہیں اور پیشاب کا آزادانہ اخراج ہوتا ہے۔ سکڑاؤ میں اضافہ کرتی ہے اور دل کی تیزی کو مدہم کرتی ہے۔

پلمبم میٹ (Plumbum Met): قبض اور بزدلی کے ساتھ بلند فشار خون۔



نٹرم میور (Natrum Mur): یہ دوا بلند فشار خون کو گھٹاتی ہے۔ ایسے مریضوں میں جنہیں تنگ کی طلب رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ غصے کے دب جانے کے باعث۔ 200 طاقت کی دوا یا اونچی طاقت کی دوا دیتے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): چاند میں خدیدی قسم کا درد سر ہونے کے ساتھ بلند فشار خون لاحق ہو۔

جلی میم (Celsmium): بری خبر سننے کے باعث اچانک صدمہ پہنچنے سے بلند فشار خون لاحق ہو۔ IM ذاتی لیوشن دیتے۔

اگنیشیا (Ignatia): جذبات کے باعث 'محبت میں ناکامی کے باعث بلند فشار خون لاحق ہوتا ہے۔ نیزر یا غم کے باعث۔ 200 ذاتی لیوشن دیتے۔

گلوٹائین (Glonoine): کاپی و سستی 'کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی' مخالفت کے باعث اور درد سر کے باعث جو سر میں اجتماع خون کے باعث ہوتا ہے۔ بے جان اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ سر اور دل کی طرف خون کا اثر دہام ہوتا ہے۔ تپکن والے درد ہوتے ہیں۔ دل بھڑبھڑاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے جس کے ساتھ خاموش والی بوا سیر ہوتی ہے۔

برٹامیوری ٹیکم (Baryta Muraticum): عمر رسیدہ لوگوں میں شریانوں کی دیواروں کی سختی اور دماغی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ چکر آتے ہیں اور کانوں میں شور ہوتا ہے۔ نبض کا تھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ہریلا ٹھنڈا جسم ہوتا ہے۔ فالج کے ساتھ۔ دل کی ٹالیوں کی پھیلاؤ اور ورم زرخہ کی تکالیف کے ساتھ خون کی شریانیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت بوڑھے اشخاص میں ہوتی ہے۔

ورمٹرم ویرائیڈ (Veratrum Viride): خون سے بھرے ہوئے کثرت دم والے مریضوں میں جو کہ بھڑالو ہوتے ہیں۔ نقاہت ہوتی ہے۔ اجتماع خون کی علامات کے ساتھ نبض سخت اور بھرپور ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): شدید قسم کی دل کی دھڑکن 'سر میں پر مشقت تنفس کے ساتھ طویل گونج دار آواز ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سارے جسم میں تپکن ہوتی ہے۔ جلد خون سے سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ پریشانی یا خوف ہوتا ہے 'پاس نہیں ہوتی۔ بائیں جانب یا پیچھے کی طرف گرنے کے ساتھ چکر آتے ہیں۔ چھوٹے سے 'شور سے' ہلنے سے اور لینے سے ابتری ہوتی ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): آنکھیں پھول جانے کے ساتھ اور پاؤں سوج جانے کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔ تنفس میں دقت ہوتی ہے۔ رات کے وقت لینے پر دم گھٹتا ہے۔

سیڑھیاں پڑھنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**تھوجا (Thuja):** بلند فشار خون لاحق ہو۔ خاص طور سے شریانوں کی کمزور دیواروں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے۔ ذاتی اور خاندانی تاریخ، خون میں لو تھڑوں کو ظاہر کرتی ہے۔  
**ایڈرینالین (Adrenaline):** شریانوں کا بلند فشار خون، بلند فشار خون کے ساتھ کانوں میں گرجن ہوتی ہے۔

**لائیکوپوڈیم (Lycopodium):** یہ دوا ایسے بیجانی اشخاص کی نشاندہی کرتی ہے۔ جو یورک ایسڈ کی تکالیف میں مبتلا ہوں۔ اس کے ساتھ ان کی جلد پر کچلی رنگ کے بھورے دھبے ہوتے ہیں۔ مضامیوں کی طلب ہوتی ہے۔ گیس پیٹ میں گھومتی رہتی ہے۔ جس میں شام 4 بجے سے 8 بجے تک ابتری ہوتی ہے یا پھر صبح سویرے ابتری ہوتی ہے۔ حرکت سے افاقہ ہوتا ہے۔  
**نیٹرم میور (Natrur Mur):** نمک کی طلب کے ساتھ گرم دھوپ میں غشی ہوتی ہے۔  
**چائنا آف (China Off):** غنودگی ہوتی ہے۔ بے ہوشی ہوتی ہے۔ دل ایڑھتا ہے۔ جو چیز بھی کھائے گیس میں بدل جاتی ہے جو اوپر یا نیچے کو حرکت نہیں کرتی۔ کانوں میں شور ہوتا ہے۔ رطوبات زندگی ضائع ہو جاتی ہیں۔

**سپیا (Sepia):** ہلکے زردی مائل رنگ کے ساتھ آنکھوں کے نیچے گہرے قلعے، سارے جسم میں چمکن ہوتی ہے۔ کھٹی چیزوں کی خواہش، شدید ورزش سے افاقہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد معدے کے اوپر والا حصہ بالکل خالی محسوس ہوتا ہے۔ کچلی رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ زندگی سے اور اپنے پیاروں سے یک سو جائے۔

**کاربوووتج (Carbo Veg):** کمزوری ہو اور پیٹ کے اوپر والے حصہ میں اچھارہ ہو۔  
**ٹیوبرکولینم (Tuberculinum):** ایسے اشخاص کے لئے اس دوا کو بطور عمل انگیز دوا کے استعمال کرنے کے متعلق سوچنا چاہئے، جن کی صحت ضائع ہو رہی ہو۔

**کلکیریا فاس (Calcarea Phos):** تیزی سے بڑھتے ہوئے نوجوان اشخاص کے لئے جو تھکن کا شکار ہوں۔ اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

**وسکم البم (Viscum Alb):** نبض ست اور کمزور ہوتی ہے۔ جوڑوں کا درد اور گنٹھیا اور اعصابی درد اور لتکڑی کا درد ہوتا ہے۔ کانوں میں گنگناہٹ اور کان بند ہو جانے کا احساس، چکر مسلسل آتے ہیں۔ دل پر وزن ہوتا ہے اور دباؤ ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دل کو بھیج رہا ہو۔ مریض لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ موسم سرما میں اور ٹھنڈے طوفانی موسم میں ابتری ہوتی ہے۔

**جلسی میم (Gelsemium):** دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ بشرطیکہ مریض حرکت نہ کرے۔ نبض متواتر نرم اور

کمزور ہوتی ہے۔ دم گھٹتا ہے، پھیپھڑوں کا فالج ہوتا ہے۔

## شریانوں میں خون کے لو تھڑوں کا جمنا

(Coronary Thrombosis)

**مرکیوریس (Mercurius):** دل کی کمزوری جیسا کہ مریض مر رہا ہو۔ مریض دل کی کپکپاہٹ کے ساتھ جاگتا ہے اور مضطرب ہوتا ہے جیسے کہ خوف زدہ ہو۔ دل کی چوٹی پر درد ہوتا ہے جو اوپر کی جانب پھیلتا ہے۔ دل کی نالیوں میں دباؤ ہوتا ہے، خوف کے ساتھ دھڑکن ہوتی ہے۔ رات کے وقت اور تھوڑی سی تھکاوٹ کے ساتھ ابتری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے اور خونی بلغم خارج ہوتا ہے۔

**میڈورینم (Medorrhenum):** چھاتی میں دباؤ کے باعث سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ دل میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے اور دل میں ٹپکن والا درد ہوتا ہے۔ دل کی چوٹی پر حاد جلد جلد ہونے والا دھندلا تیز درد ہوتا ہے۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔ جو کمر تک اور بائیں بازو تک پھیل جاتی ہے۔

**لائیکوپوڈیم (Lycopodium):** دھڑکن حتیٰ کہ بستر میں بھی ہو۔ مریض رات کے وقت پریشان ہوتا ہے۔ بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ کھانا ہضم ہونے کے دوران ابتری ہوتی ہے۔ دل کا فعل دبا ہوا اور غیر واضح ہوتا ہے۔ پیشاب میں البیومن (انڈوں کی سفیدی کی طرح کا مادہ) خارج ہوتا ہے۔ سینے میں ایٹشن اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ مریض سانس نہیں لے سکتا۔ چھوٹی پسلیوں کے نیچے ٹانگے گٹنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

**لیلیئم ٹگریری نم (Lillium Tigrinum):** یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل کو کسی ٹکٹے میں جکڑا گیا ہو یا بھینچا گیا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سارا خون دل میں چلا گیا ہو۔ جو کہ مڑ کر دوہرا ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ سیدھا چلنے کی نااہلیت۔ یہ احساس کہ دل کو شدت کے ساتھ منہی میں لیا گیا ہو۔ پھر اچانک چھوڑ دیا گیا ہو۔ دل میں اگلنے بدلنے والی کھنچاؤ، دل میں تقریباً مستقل درد دوڑتا رہتا ہے۔ کھانے سے ابتری ہوتی ہے۔ خواہ بہت تھوڑا ہی کھایا گیا ہو۔ متواتر دھڑکن اور تشویش۔

**آرنیکا (Arnica):** مریض رات کے وقت دہشت کھاتا ہے۔ موت کا خوف اچانک لاحق ہو جائے۔ اُردم، جسم کے اوپر خراشوں والی دکھن کا احساس ہو۔ جارحیت یا ناگواری، آرنیکا کی خصوصیت ہے۔ جسم ٹھنڈا اور سرگرم ہوتا ہے۔ آرنیکا دل کی نالیوں کے امراض کے لئے مفید دوا ہے۔ مریض اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کا تصور کرتا ہے۔ رات کے وقت دہشت

کھاتا ہے۔ مرنے کا اچانک خوف ہوتا ہے۔ جو رات کے وقت اکثر آتا ہے۔ مریض بے چین ہوتا ہے۔ تناؤ اور کھنچاؤ زیادہ مشقت یا تھکاوٹ سے ہوتا ہے۔ آرنیکا متاثرہ حصوں کو افادہ دیتی ہے اور شفا یاب کرتی ہے۔

سیکیل کورنوتوم (Secale Cornutum): سیکیل میں یازدوں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا اور ٹھنڈا پڑ جانا ہوتا ہے۔ انجانا کا درد اور بلند فشار خون ہوتا ہے۔ سینے میں سوراخ کرنے والے درد ہوتے ہیں۔ سینے میں نرمی پائی جاتی ہے۔

### دل کی جھلی کی سوزش — (Endocarditis)

(Inflammation of the Lining Membrane of the Heart)

اکونائٹ این (Aconite N): سینے میں ٹانگے لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ مریض کو پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے نیز بخار آتا ہے۔

سپائی جیلیا (Spelia): دل کے علاقہ میں دھڑکن اور بے چینی کے ساتھ تیز گولی لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔

لیکسیس (Lachesis): دل کے علاقہ میں ناسوری درد ہوتے ہیں۔  
کالمیا لینی فولیا (Kalmia Lat): جوڑوں کے گٹھیا کے ساتھ جب دل کی جھلی کی سوزش لائق ہو۔ جگہ بدلنے والے درد ہوتے ہیں۔

گن پاور (Gunpowder): خون کی سمیت میں 3x ٹرائکی ٹوریشن دیتے۔

ناجا (Naja): حادثہ کے بعد والوں کی تکلیف رہنے کے باعث۔

### امراض قلب (عمومی)

Heart Diseases--- (In General)

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): نبض بھرپور ہوتی ہے۔ بے قاعدہ ہوتی ہے۔ شروع میں بہت سست ہوتی ہے اور ہر تیسری پانچویں اور ساتویں دھڑکن وقفہ دار کمزور ہوتی ہے۔ مریض محسوس کرتی ہے کہ اگر اس نے حرکت کی تو دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ دل کے امراض کے باعث استقامت سانس بھاری ہو۔ جس میں لینے میں اتھری ہوتی ہے۔ خون کی کمی کے ساتھ دل ڈھیل پڑ جاتا ہے۔ سستی، غشی، تھکاوٹ اور استہلا درجہ کی نفاہت ہوتی ہے۔ دہشت ناک خواب آتے ہیں اور معدے میں ڈوبنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ مریض اگر سو گیا تو دم گھٹ جائے گا۔

**سٹورفین تھس (Storphanthus):** یہ دوا دل کے بھیل جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ دھڑکن اور خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ شراب، تمباکو اور چائے کے باعث دل کی فعالیت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ پیچھڑوں کی سوزش کے ہمراہ ضیق النفسی ہوتی ہے نیز ریا پاؤں کی سوزش ہوتی ہے۔ یہ دوائے 'کھانسی' پیچھڑوں سے سیلان خون اور استسقاء کو بھی شفا دیتی ہے۔ بشرطیکہ دل کے امراض کے باعث یا دل کے امراض کے ساتھ۔ دل میں خلی بغیر کھنچاؤ کے ہوتی ہے۔

**لاروسیراسس (Laurocerasus):** ڈیجی ٹیلیس کے غلط استعمال کے باعث دل کا ٹیل ہو جاتا۔

**کولن سونیا (Collinsonia):** غشی کے دوروں کے ساتھ دل کے امراض نیز دباؤ تنفس میں وقت کے دوروں کے ساتھ 'خونی' بواہر بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ جب سیلان خون رک جاتا ہے تو دل کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔

**ایپو سائٹم (Apocynum):**

امراض قلب کے باعث استسقاء Tricuspid, Regurgitation -

**لائیکوپس ویرگ (Lycopus Virg):** دھڑکن، نبض ست، اوپر کو چڑھنا مشکل ہو جیسا کہ سیکڑیوں وغیرہ پر۔

**کیکٹس جی (Cactus G):** دل کے کھنچاؤ اور دل کی عام کمزوری نیز نقاہت کے ساتھ انجانا کا درد ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے دل کو کسی آہنی ہاتھ سے بل دے کر ٹک سے ٹک کر کیا جا رہا ہو۔ دل کا سکڑاؤ اور اجتماع خون جس کے ساتھ سر کی طرف خون کا اثر دھام ہوتا ہے نیز بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ جسم میں 'پھاتی' میں اور دل میں غیر معتدل دوران خون ہوتا ہے۔ دل کی ٹالیوں میں کھنچاؤ کے ساتھ سکڑاؤ ہوتا ہے۔

**بویوٹا (Bovista):** پھاتی میں دباؤ اور دھڑکن کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد یا حیض کے دوران دل بہت بڑا محسوس ہوتا ہے۔ ان تکالیف کے ساتھ دماغ میں گہرا درد سر ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے جیسے سر بہت بڑا اور سو جا ہوا ہے۔

**جلسی میم (Gelsemium):** دل کے عضلات کی کمزوری جس کے ساتھ یہ احساس ہو کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ مریض جب سونے لگتا ہے تو اس احساس کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ مریض کو ضرور ہی حرکت کرتے رہنا پڑتا ہے۔ مبادا دل کی دھڑکن رک جائے۔ نبض متواتر نرم، کمزور اور تقریباً نامعلوم ہوتی ہے۔

**گرینڈولیا (Grindelia):** دل کی اور پیچھڑوں کی کمزوری، مریض جیسے ہی نیند میں جاتا ہے

اچانک اس احساس کے ساتھ بیدار ہو جاتا ہے کہ جیسے سانس رک گئی ہو۔  
**میگنولیا (Magnolia):** بھیچڑوں کے پھیلنے کی نااہلیت کے ساتھ پھیپھائی کا دباؤ۔ کھانا کھانے کے بعد بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ جب تیز چلتا ہے یا بائیں جانب لپٹتا ہے تو دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ ضیق النفسی، دل میں اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ انجانا کا درد لاحق ہوتا ہے۔ دل کی ٹالیوں کی بھیلیوں کی سوزش ہو، بے ہوشی کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ غارش کے ساتھ دل میں درد ہوتے ہیں۔ گٹھیا والا دل۔  
**سکیوٹا وائروسا (Cicuta Vir):** دل کا کانپنا اور دھڑکن۔ یہ احساس کہ جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ بعض اوقات بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔  
**لیکیس (Lachesis):** چلنے پر دل کا کھنچاؤ لاحق ہو۔ چہرے کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ استقاء اور جگر کا بڑھنا لاحق ہوتا ہے۔ سونے کے دوران یا سونے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ تکلیف میں اضافے کی وجہ سے مریض نیند سے خوف زدہ ہوتا ہے۔  
**فاسفورس (Phosphorus):** دل کی چکنائی کی تنزی، دل پھیل جاتا ہے۔ بائیں جانب لینے سے دھڑکن میں اتھری ہوتی ہے۔  
**کریٹاگس (Crataegus):** متوقع دل کے فیل ہو جانے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ غشی ہو اور مریض دھڑام سے گر جائے۔ فشار خون اور دل کے والوں کے امراض۔ دھڑکن اور دل کے فعل کی تیزی ہوتی ہے۔ انجانا کا درد ہوتا ہے۔  
**اورم میٹ (Aurum Met):** گٹھیا والے دل کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے جبکہ درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے کی طرف چلتا پھرتا رہتا ہے اور آخر کار دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ درد دل کے والوں (Valves) پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے ساتھ بائیں بازو میں سن ہو جانے کی کیفیت اور جھنجھناہٹ والا درد ہوتا ہے۔ مزمن ورم شہہ رگ۔  
**آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod):** دل کی ٹالیوں کی بھیلیوں کی سوزش کے لئے اور دل کی استقامتی حالت کے لئے ادویات میں سے ایک دوا یہ بھی ہے۔ آنکھوں اور پاؤں میں سوجن اور عمومی سوزش بھی ساتھ میں ہو۔ دل بے قاعدہ ہوتا ہے اور نبض وقفہ دار ہوتی ہے۔  
**سکٹلیریا (Scutellaria):** تمباکو نوشی کے باعث دل کمزور ہو جائے۔  
**فیرولس (Phaseolus Nana):** کمزور اور غیر مستحکم دل، نبض وقفہ دار اور کمزور ہوتی ہے۔ جب کوئی دوسری دوا مدد نہ دے تو یہ دوا دل کے فیل ہو جانے میں شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔  
**سیریس بون (Cereus Bon):** ازیت دینے والے اور اینٹھن والے درد دل میں ہوتے

ہیں۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): پست فشار خون اور کمزوری کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ منہ سے پانی بہتا ہے، اچھارہ ہوتا ہے اور پیٹ میں تھکاؤ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کمزور دل اور کمزور دوران خون اور پست فشار خون ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے حتیٰ کہ بستر میں بھی۔ کھانے کے بعد اجڑی ہوتی ہے۔

ناجا (Naja): دالعوں کے جوڑوں کا کھنچاؤ جس کے ساتھ انجاننا والا درد ہوتا ہے۔ دل پر وزن محسوس ہوتا ہے۔ انجاننا کے درد گردن کے گڑھے، بائیں کندھے اور بازو تک پھیل جاتے ہیں۔ موت کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ پست فشار خون ہوتا ہے۔

کروکس (Crocus): اس احساس کے ساتھ کہ کوئی چیز اچھل کود کر رہی ہے یا اچھلنے والے درد کی صفت کے ساتھ قابو میں نہ رہنے والے قہقہے۔ چھاتی میں اس احساس کے ساتھ کہ جیسے چھاتی میں کوئی چیز خرخر کر رہی ہے اور اچھل کود کر رہی ہے۔ ٹانگے لگتے ہیں اور صدمات پہنچتے ہیں۔

مرک وائیو (Mere Viv): دل کی ٹالیوں کی بھلیوں کے جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے۔ زبان سفید ہوتی ہے۔ تنفس بھاری ہوتا ہے جس کے ساتھ رات کے دوران علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): فکر مندی کے باعث دل دھڑکتا ہے۔ IM ڈائی لیٹن دیجئے۔  
تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): تھائی رائیڈ غدود کے بڑھ جانے کے ساتھ دل کا درد اور دھڑکن ہوتی ہے۔ مریض سیدھا لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہسٹریا یا مرگی کے دروروں کے ساتھ اعصابیت ہوتی ہے۔ بھینچنے والے دروروں کے ساتھ دل کا گھٹنیا، مریض لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ انجاننا والے دروروں کی شدید قسم۔

کاربو ویج (Carbo Veg): بد ہضمی یا پیٹ کے اوپر والے حصہ میں ہوا کے باعث دل کی تکلیف لاحق ہو۔

تھوجا (Thuja): حفاظتی ٹیکوں کے باعث یا حفاظتی ٹیکوں کی بے اعتدالی کے باعث دل کے امراض لاحق ہوں۔

آئی بیرس (Iberis): معمولی حرکت سے دھڑکن اور عدم تنفسی لاحق ہو۔ نرم اور وقفہ دار نبض، بائیں بازو کے نچلے حصہ میں درد اور بھاری پن ہوتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ حلق میں درم گھٹتا ہے۔ اعصابیت ہوتی ہے رات کے وقت یا صبح ہوتے ہوئے علامات میں اجڑی واقع ہو جاتی ہے۔

آگنہ ملک الیڈکس (Oxalic Acid): دھڑکن آواز کے گم ہو جانے کے ساتھ اولتی بدلتی رہتی ہے۔ کپکپاہٹ ہوتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں۔ ہوش جاتے رہتے ہیں۔ جسم اور بازوؤں اور ٹانگوں، انگلیوں اور ہونٹوں میں سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ دل، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کی تکلیفات کے باعث بازوؤں اور ٹانگوں کا فالج، کانٹے والے گولی لگنے جیسے، ٹانگے لگنے جیسے اور پھاڑنے جیسے شدید درد ہوتے ہیں۔ تمام جسم پر دکھن اور خراشیں ہوتی ہیں۔ سانس لینے میں وقت ہوتی ہے۔

ایڈونس ورنلیس (Adonis Vernalis): خون کی ٹالیوں کے والوں کے جوڑوں اور شہ رگ میں خون کا رگ رگ کر چلنا، شہ رگ کی مزمن سوزش، دھڑکن، شقی النسی، دل کی ٹالیوں کی مصلیوں میں چکنائی کے باعث سوزش۔

ایڈرینلین (Adrenaline 200): دل کا ٹیل ہو جانا۔

کالمیا ایل (Kalmia L.): جب گٹھیا کا درد دل میں چلا جائے یا جب گٹھیا کے ہمراہ دل کی تکلیف ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

کالچیم (Colchicum): جب کالمیا ایل ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

کون ویلریا (Convallaria): رحم کے علاقہ میں دکھن کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ تذکرہ بلا علامت کے حوالے سے ڈاکٹر نائش نے دل کے استسقاء کے ایک کیس کو شفا یاب کیا تھا۔ 30 ڈاکٹی لیوشن کی دوا کے ساتھ۔

کیکٹس جی، اورم میٹ (Cactus G, Aurum Met): بائیں بازو میں سن ہو جانے اور جھنجھناہٹ کے ساتھ دل کے والوں کے امراض میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

مرکیوریس سائی نیٹس (Mercurius Cyanatus): دل کے جان لیوا امراض کے باعث بڑی تیزی سے دل کے ٹیل ہو جانے کے ساتھ، دل کی ٹالیوں کی مصلیوں میں ناسوری سوزش ہوتی ہے۔

لیلیئم ٹیگرینم (Lilium Tigrinum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل کو کسی شکنجہ میں جکڑا جا رہا ہے یا بھینچا جا رہا ہے۔ جس کے ساتھ خون کا دل میں جانا مزکر دوہرا ہونے کے احساس کو پیدا کرتا ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): دل کی شریانوں کی بیماریوں کے لئے جس کے ساتھ جسم ٹھنڈا اور سرگرم ہوتا ہے۔ مریض اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ مریض بد مزاج، چڑچڑا، اداس، خوف زدہ اور جلد ڈر جانے والا ہوتا ہے۔ دوران شب اچانک موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): بازوؤں اور ٹانگوں کے سن ہو جانے اور ٹھنڈا پڑ جانے کے



ساتھ انجاننا والا درد اور بلند فشار خون لاحق ہوتا ہے۔  
میڈورینیم (Medorhenium): چھاتی میں دباؤ کے باعث سانس لینے میں وقت ہو۔ دل کا  
 اچھارہ ہوتا ہے۔ معمولی ورزش سے دل کی دھڑکن لاحق ہو جاتی ہے۔ تیز جلد جلد ہونے  
 والے اور پو بھل درد دل میں ہوتے ہیں۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔

### دل کا بڑھ جانا (Hypertrophy)

#### (Enlargement of the Heart)

کر۔نگس (Crataegus): ضیق النفسی اور استقاء کے ساتھ دل کے والوں کی نااہلیت  
 کے باعث دل کا بڑھ جانا لاحق ہو۔

کالمیا لیٹی فولس (Kalmia Lat): گنٹھیا کے حملے کے بعد یا گنٹھیا لاحق ہونے کے ساتھ دل کا  
 بڑھ جانا اور دل کے والوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دھڑکن اور / یا دل میں گولی گلتے جیسے درد  
 نیچے پیٹ کی طرف جاتے ہیں۔

آرنیکا ایم (Arnica M, Rhus Tox): جب دل کا بڑھ جانا والوں کے  
 صدمات کے باعث ہو اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے باعث ہو جیسا کہ دوڑ لگانے والے کھلاڑیوں  
 میں یا بہت زیادہ تھکنے والے تاجروں میں ہوتی ہے۔ دل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کے  
 ساتھ خطرناک قسم کا تباہ ہوتا ہے۔ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ مریض سیرھیاں نہیں چڑھ سکتا۔  
 دھوئیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خون کی کمی ہوتی ہے۔

لاروسیراس (Laurocerasus): جوڑوں والے والوں میں جب ناکافی رہ جانے کے ساتھ  
 دل کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ مریض سانس کے لئے جھینٹا ہے۔ ناخاقتی ہوتی ہے۔ بلندی پر  
 چڑھنے سے یا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے۔

آئی ہیرس (Iberis): دل کا بڑھ جانا اور دل کا پھیل جانا۔ نرم نبض کے ساتھ دل کا فعل  
 شدید اور تیز ہو جاتا ہے۔ معمولی حرکت یا تھکاوٹ سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں  
 ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ گلے میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ دل کے فعل کی کھیراہٹ 'مدر ٹنگر'  
 کے ایک قطرے کی دوا دیجئے۔

کینیٹس (Canite N): شدید دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ کر کے بل لینے سے ابتری ہوتی ہے۔  
 جوش سے 'جذبات سے' اچانک اٹھنے سے یا جب چل رہا ہو تو علامات میں اضافہ ہو جائے۔ چہرہ  
 سرخ ہو جاتا ہے۔ چاند پر درد سر ہوتا ہے۔ شریانوں میں ٹپکن ہوتی ہے۔ نوجوانوں میں دل کا  
 بڑھ جانا اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): بغیر کسی والو کی بیماری کے دل کا عمومی طور پر بڑھ جاتا۔ جس کے ساتھ انگلیوں کا سن ہو جاتا اور جھنجھناہٹ پائی جاتی ہے۔ (یہ دل کے والو کی بیماریوں (Vulvular Diseases) میں بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔)

اورم میٹ (Aurum Met): بائیں بازو میں سن ہو جانے کی کیفیت کے ساتھ اور جھنجھناہٹ کے ساتھ دل کے والو کی بیماریوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ اورم میٹ میں چربی والا دل بغیر پھیلاؤ کے پایا جاتا ہے۔

نیٹرم میور (Nat Mur): چڑچڑے مریضوں میں جو ہمدردی سے نفرت کرتے ہیں۔ دل کی پھیلاؤ کے ساتھ بلند فشار خون ہوتا ہے۔ ایسے مریض اختیارجہ کے کم آمیز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے غموں اور پریشانیوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ اس حوالہ سے کسی بھی قسم کی ہمدردی انہیں غصہ دلا دیتی ہے۔ خاموشی سے غم سہتے ہیں۔ جلد پیلی، زرد اور چمکیلی ہوتی ہے۔

## شریانوں کی سوزش

(Inflammation of- Arteries)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): شریانوں کی سوزش۔

## وریدوں کی سوزش

Phlebitis--- (Inflammation of Veins)

ہیمامیل (Hamamelis): حساسیت کے ساتھ سادہ اور حاد سوزش۔ وریدیں سخت ہوتی ہیں۔ نیز گانٹھ دار اور پر درد ہوتی ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب بچے کی پیدائش کے بعد۔ جسم کے اعضاء نیاہٹ مائل ہوتے ہیں۔ دیکھن ہوتی ہے اور ڈنگ لگتے ہیں۔

ہیپوزائینم (Hippozaenium): جب پیپ پیدا ہو جائے۔

## دل کی دھڑکن (Palpitation)

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): دل کی دھڑکن جو اس کی طاقت کو برقرار رکھتی ہے۔ بائیں کندھے اور سینے میں درد ہوتا ہے۔ پریشانی اور خوف ہوتا ہے۔ انگلیوں سے جھنجھناہٹ

ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): جب کھانے کے بعد بد ہضمی اور اچھارہ کے باعث ہو۔

وائیپرا (Vipera): وریدوں کی سوزش، متاثرہ بازو کو لٹکانے سے بہتری ہو۔ وریدوں میں بھراؤ، درد اور پھٹن کا احساس ہوتا ہے۔

الیومن (Alumen): دائیں جانب لیٹنے سے دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی عجیب اور مخصوص علامت ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): عورتوں یا سنہرے بالوں والے لوگوں میں بد ہضمی کے باعث دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ تیزابیت ہوتی ہے اور پاخانہ ڈھیلا ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ اچھارہ ہونے کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ جس میں ڈکاروں سے بہتری ہوتی ہے۔

ماسکس (Moschus): غشی کے ساتھ اعصابی دھڑکن۔

تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): دل کی بے اعتدال قسم کی تیز فعالیت کے ساتھ دھڑکن اور غشی۔

کریٹیکس (Crataegus): دل نفل ہو جانے کے خدشہ کے ساتھ دل کی دھڑکن، دل کے علاقہ میں اور بائیں کندھے کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ انتہا درجہ کا چھوٹا اور تیز تنفس۔ نرم اور بے قاعدہ نبض، انگلیاں اور انگوٹھے نیلے پڑ جائیں۔

ڈی جی نیلس (Digitalis): بے قاعدہ اور وقفہ دار نبض کے ساتھ دل کی دھڑکن۔

آر سٹیلیم البم (Ars Alb): دل کی دھڑکن ایسی کہ تمام جسم ہلتا ہے اور سینے کی دیواریں پھولتی ہیں۔ سینے سے آگے کو یا پیچھے کو جھٹکنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کوکا (Coca): تنفس کا چھوٹا پن، دباؤ، ضیق النفسی، شدید آواز دار دل کی دھڑکن پھاڑی چڑھنے سے لاحق ہو۔

کالمیا لیٹ (Kalmia Lat): دھڑکن یا درد، دل میں ہو۔ درد نیچے کی جانب پیٹ میں تیزی سے جاتے ہیں۔ گٹھنیا کے حملہ کے بعد یا گٹھنیا کے تبادلہ میں دل کا بڑھ جانا اور دل کے والوز کی بیماریاں لاحق ہوں۔

لاروسیراسس (Laurocerasus): والوز کے جوڑوں کے ٹھک ہو جانے کے ساتھ دل کا بڑھ جانا۔ مریض سانس کے لئے ہانپتا ہے۔ قوت حیات کی کمی، بلندی پر چڑھنے سے یا چلنے سے سانس گم ہو جائے۔

لائکوپس ورگ (Lycopus Virg): دھڑکن ہو، نبض ست ہو۔ بلند مقام پر جانے میں

دقت ہو مثلاً سیڑھیاں چڑھنا وغیرہ۔

**کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind):** دل کی دھڑکن مریض کو نیند سے بیدار کر دیتی ہے۔  
**آئی بیرس (Iberis):** دل کا بڑھ جانا اور دل کی پھیلاوٹ۔ نرم نبض کے ساتھ دل کی شدید اور تیز فعالیت۔ معمولی حرکت یا تھکاوٹ سے دل اور دھڑکنے لگتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ گلے میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ دل کے فعل میں حساسیت آ جاتی ہے۔ مدد گچھر کے ایک قطرہ کی خوراک دیتے ہیں۔

**اولینڈر (Oleander):** تیز نبض متلی اور تے کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ تمام جسم ٹھنڈا درد ہوتا ہے۔

**کیکٹس (Cactus):** بائیں جانب لیٹنے سے اور حیض کا زمانہ قریب آنے پر شدید دل کی دھڑکن میں مبتلا ہوتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ دل کے گرد لوہے کی پٹی ہے۔ اس کے ساتھ دم گھٹتا ہے اور ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ دل کی چوٹی میں درد ہوتا ہے جو نیچے کی جانب بائیں بازو میں مار کرتا ہے۔ غنودگی اور سانس کے چھوٹے پن کے ساتھ نیز اچھارہ کے ساتھ دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ نبض نرم، بے قاعدہ اور جلد جلد ہوتی ہے۔

**ناجا (Naja):** دل کے گرد وزن محسوس ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹانگے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ جو گردن کے گڑھے، بائیں کندھے اور بازو تک پھیل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پریشانی اور موت کا خوف بھی ہوتا ہے۔ جراثیمی متعدی بیماریوں کے بعد دل کی تکلیف۔

**برومیم (Bromium):** متلی اور درد سر اور اعصابی جوش کے ساتھ دل کی دھڑکن۔ کام سے اور پڑھنے سے نفرت ہو۔ گھر کے کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ مریض لا تعلق، تھکا ہوا اور اداس اور بے ہمت ہوتا ہے۔

**آرنیکا مونٹ، رشاکس (Arnica Mont, Rhustox):** زیادہ تھکن جو کہ دوڑ لگانے والوں میں ہوتی ہے کے باعث نیز بھاری وزن اٹھانے والے آدمیوں میں زیادہ تھکن کے باعث دل کی دھڑکن، بائیں بازو اور کندھے میں من ہو جانا پایا جاتا ہے۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ان دواؤں کو استعمال کیا جائے۔

**سٹانم (Stannum):** معمولی تھکاوٹ کے بعد مثلاً گھریلو کاموں کے متعلق ہدایات دینے سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے باعث دل کی دھڑکن اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔

**کلکیریا آرسینیکم (Calc Ars):** معمولی ساجدہ بھی دل کی دھڑکن کا باعث بن جاتا ہے۔  
**سٹروفینٹس (Strophanthus):** دل کی پھیلاوٹ اور خون کی کمی کے باعث دل کی دھڑکن لاحق ہو۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): دائیں کروٹ لینے پر دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔  
 ارجنٹم میٹ (Argentum Met): کمر کے بل لینے پر دل کی دھڑکن ہوتی ہے جس کے  
 ساتھ ٹھہر ٹھہراہٹ، پھڑپھڑاہٹ اور کپکپاہٹ کا احساس چھاتی میں اور تمام جسم میں ہوتا ہے۔  
 اگنیشیا (Ignatia): بہت زیادہ متاثر ہونے والے اشخاص میں دل کی اعصابی دھڑکن رات  
 کے وقت بستر میں ابتری ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن مریض کو جگائے رکھتی ہے۔  
 لکیسیس (Lachesis): معمولی سے جوش خصوصاً زندگی میں تبدیلی آنے کے باعث دل کی  
 دھڑکن ہوتی ہے۔

امبرا جی، سٹیفنی سیگریا (Ambra G, Staphisagria): موسیقی سننے پر دل کی دھڑکن  
 لاحق ہو جاتی ہے۔  
 انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): پاخانہ کے دوران دل کی دھڑکن ہو۔  
 سلفر، کوئیم (Sulphur, Conium): پاخانہ کے بعد دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔  
 ڈیجی ٹیلس، اوپیم (Digitalis, Opium): غم کے باعث اور خوف کے بعد دل کی دھڑکن  
 ہوتی ہے۔

ڈیجی ٹیلس، سپیا (Digitalis, Sepia): مجامعت کے بعد دل کی دھڑکن لاحق ہو۔  
 امونیا کارب (Ammonia Carb): ضیق النفسی کے ساتھ دل کی دھڑکن ہوتی ہے لیکن  
 اس کے ساتھ دل کا کوئی مرض نہیں ہوتا۔ نہانے سے ابتری ہوتی ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrium Mur): جب مریض بستر میں لیٹا ہو یا کھانا کھانے کے بعد دل کی  
 دھڑکن لاحق ہو جائے۔ کونین کے غلط استعمال کے بعد دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ جب دل کی  
 دھڑکن سارے جسم کو ہلا کر رکھ دے۔ بائیں کروٹ لینے سے ابتری ہوتی ہے۔  
 اکتیاریس (Actea Race): معدے کے گڑھے میں ڈوبنے کے احساس کے ساتھ دل کی  
 دھڑکن لاحق ہو اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بے چینی اور غنودگی ہو۔

سپائی جیلیا (Spigelia): دل کے علاقہ میں گولی کٹنے جیسے اور کانٹے جیسے درد کے ساتھ شدید  
 دھڑکن۔ اس کے ساتھ منہ سے گندی بو آتی ہے۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔  
 اعصابی درد بازوؤں تک پھیل جاتا ہے۔ گرم پانی کی طلب ہوتی ہے۔ جس سے افادہ ہوتا ہے۔  
 بیلاڈونا (Belladonna): معمولی تھکاوٹ سے دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ بھرپور ٹپکن والا درد  
 سر۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ روشنی اور شور سے بے حد حساسیت ہوتی  
 ہے۔

تھیا (Thea): دل کی پھڑپھڑاہٹ اور دل کے فعل کی لمحاتی رکاوٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن

لاحق ہو۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): ہسٹیریائی عورتوں میں دل کی دھڑکن جس میں حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): تمباکو نوشی کے باعث 'تمباکو کے مضر اثرات کے باعث اور جنسی کمزوری کے باعث دل کی دھڑکن لاحق ہو۔

وریٹرم ویر (Veratrum Vir): جب نبض 40 یا اس سے بھی نیچے گر جائے۔ بعض اوقات یہ کلائی میں محسوس نہیں ہو سکتی۔ مریض کی زبان کے وسط میں سرخ رنگ کی دھاری ہوتی ہے۔ یہ دوا دل کی کمزوری والے کیسوں میں استعمال نہیں کرنی چاہئے۔

### نبض — (Pulse)

اولینڈر (Oleander): تے اور متلی کے راجحان کے ساتھ نبض تیز ہوتی ہے۔ تے اور متلی نبض کی رفتار کو کم کرتی ہیں۔

اکونائٹ این (Aconite N): نبض تیز اور جلد اور اچھلتی ہوئی ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): نبض اچھلتی ہوئی چلتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ بھرپور خون والے مریضوں میں 'چپکن والی نبض'۔

کاربو ویتج (Carbo Veg): ناک سے خون پسینے کے ساتھ وقفہ دار نبض۔

میورینک الیمڈ (Muriatic Acid): جب نبض ہر تیسری ضرب کے ساتھ وقفہ پیدا کرے۔

وریٹرم البم (Veratrum Alb): نبض 30 سے 40 ضربات تک گر جاتی ہے لیکن اچانک دوبارہ بلند ہو جاتی ہے اور پھر گر جاتی ہے۔ ٹھنڈے پسینے کے ساتھ نبض معدوم ہو جائے۔

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): نبض بے قاعدہ اور بہت ست اور کمزور ہوتی ہے۔ ہر تیسری 'پانچویں اور ساتویں ضرب کے ساتھ وقفہ پیدا کرے۔

کیکٹس (Cactus): دم گھٹنے کے ساتھ نبض معدوم ہو۔ گنٹھیاوی دل کی وقفہ دار نبض۔

آئی ہیرس (Iberis): جھٹکے دار نبض 'دل کی ہر ضرب دوسری ضرب میں ٹھکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دوہری نبض۔

آر سینک سلف 'قلیوم' (Arsenic Sulph, Flavum): نبض تیز 'بے قاعدہ' وقفہ دار 'پھوٹی اور کمزور ہوتی ہے۔

## وریدیں (پھولی ہوئی) — (Veins)

(Varicose, including Varicocele)

پلساٹیل (Pulsatilla): یہ دوا حفظ ماتقدم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جب متاثرہ حصے دکھن اور ڈنگ لگنے جیسے درد کے ساتھ نیلے پڑ جائیں۔ وریدوں کے پھول جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

فارمیکا (Formica): جب کمزوری ہو۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): پرانے کیسوں میں خندی قسم کا مرض۔ خصوصاً ایسی مستورات میں جنہوں نے بہت زیادہ نیچے پیدا کئے ہوں۔ وریدوں کی پھلاوٹ اور ناسوری کیفیت خصوصاً ٹانگوں میں۔

پائیروجینیئم (Pyrogenium): وریدوں کی ناسوری کیفیت، ٹانگوں پر ناسور ہوتے ہیں۔ جن سے سواد آزادانہ خارج ہوتا ہے اور انتہا درجے کا درد ہوتا ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): جلن آگ کی طرح ہو خصوصاً رات کے وقت۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بلند معیار زندگی کے باعث حمل کے دوران وریدیں پھول جائیں۔

ہیمامیلس (Hamamelis): ڈنگ لگنے جیسے اور چبھنے والے درد (ہیمامیلس کا لوشن بھی وریدوں کی پھلاوٹ کے تمام کیسوں میں بیرونی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔)

وائپرا (Vipera): متاثرہ حصے کو لٹکائے رکھنے پر ابتری ہوتی ہے۔ ہیماساکہ وہ بہت زیادہ بھراؤ کے باعث پھٹ جائیں گے۔ پھن کا احساس اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

بیلادونا، گلوٹائن (Belladonna, Glononie): خون کی زیادتی والے مریضوں میں وریدوں کی پھلاوٹ کا مرض۔ ان میں خون سر کی طرف اثر دہام کرتا ہے۔

میگ نیٹس پولس آسٹ (Magnetis Polus Aust): ٹانگوں میں ٹپکن والا درد جبکہ ٹانگوں کو لٹکایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ گرم پانی متاثرہ حصوں میں نیچے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ چلنے سے غشی ہوتی ہے۔

لکیسیس (Lachesis): حمل کے دوران ٹانگ کی وریدوں میں سوزش۔


ملی فولیم (Millefolium): وریدوں کی پھلاوٹ میں یہ دوا سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ خصوصاً جب شعری نالیاں اسٹنچی اور طویل ہو جاتی ہیں۔ خون کے اجتماع کے باعث وریدیں آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ زخموں سے بہت جلد اور بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ حمل جب پر درد

ہو تو اس کے دوران رگیں پھول جائیں۔ حاملہ عورت میں ٹانگوں کی پھولی ہوئی وریدیں ناسوری ہوتی ہیں اور خون بہتا ہے۔

سلفر (Sulphur): وریدوں میں ناسور ہوتے ہیں۔ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ ٹانگوں کی وریدوں کی پھلاوٹ۔ جب دیگر ادویات صرف جزوی طور پر شفا دیں یا ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر آزمانا چاہئے۔

#### پرہیز — (Diet)

دل کے امراض میں مچھلی، گوشت، پرندوں کا گوشت یا اس سے بنی ہوئی چیزیں، شکر، تیل، جام، مارملیڈ اور مصالحوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نمک کا استعمال بھی کم سے کم کر دینا چاہئے۔





## نظام ہضم کے امراض (Diseases of Digestive System)

### حصہ اول --- پیٹ

زندہ (چیز پیٹ میں محسوس ہو) — (Alive)

کروکس (Crocus): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں یا چھاتی میں کوئی زندہ چیز حرکت کر رہی ہو۔

ایناکارڈیم (Anacardium): پینے وقت مریض کو یقین ہوتا ہے کہ پی جانے والی چیز معدے میں نہیں جا رہی۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر موجود ہے جو ہر نگلی جانے والی چیز کو کھا پی جاتا ہے۔ یہ تمام علامات بعض اوقات پارے والے مرہم کے ذریعے ایگزیمیا کے دب جانے کے باعث لاحق ہوتی ہیں۔

تھوجا (Thuja): یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی زندہ چیز مریض کے پیٹ میں موجود ہے۔ مریض بچے کے ہاتھ کی حرکات محسوس کرتی ہے یا اپنی آنٹوں میں کسی جانور کو محسوس کرتی ہے۔

### ورم زائدہ — (Appendicitis)

برائیوینا (Bryonia): معمولی حرکت سے ٹانگے لگنے جیسے اور جلن دار دروں میں اضافہ ہو جائے۔ درد والی جانب کے بل لیٹنے سے اور دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔ دائیں جانب کے پیٹ کے نچلے حصہ میں نرمی ہوتی ہے۔ مریض اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھائے خاموشی سے لیٹ جاتا ہے تاکہ پیٹ کے عضلات کو سکون ملے۔ چھو جانا نہیں چاہتا اور ہر سانس درد میں ابتری پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ 1x طاقت کی خوراک ہر 4 گھنٹے کے بعد دیجئے۔ یہاں تک کہ درد رک جائے۔

سلفر (Sulphur): اس دوا کو علاج کی تکمیل کے لئے بطور عمل انگلیز دوا استعمال کرنا چاہئے۔

**آئرس ٹینکس (Iris Tenax):** اینڈکس کا علاج شروع کرنے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اندھی آنٹ اور پھوٹی آنٹ کے ملنے کے علاقہ میں خوف زدہ کر دیتے والا درد ہو دبانے سے بہت زیادہ نری ہوتی ہے۔ معدے کے گڑھے میں موت کی سی حسایت ہوتی ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** آئرس ٹینکس کے مماثل علامات اس دوا کی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اسے اس وقت دینا چاہئے جب مذکورہ بالا دوا ناکام ہو جائے۔ اس میں اندھی آنٹ اور پھوٹی آنٹ کے ملنے کے علاقہ میں شدید درد ہوتا ہے۔ ملنے سے اتھری ہوتی ہے۔ معمولی چھوا جانا بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بستر کی چادر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس میں قے بھی ہوتی ہے۔ مریض کو نیند آتی ہوتی ہے لیکن سونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ روشنی اور دیگر بیرونی اثرات سے حسایت ہوتی ہے۔ کمر کے بل لیٹنے سے جبکہ گھٹنے اوپر کو اٹھا رکھے ہوں بہتری ہوتی ہے۔ اعصابیت ہوتی ہے۔ چمکن والا درد سر میں ہوتا ہے۔ جھکنے سے اتھری ہوتی ہے۔ ڈھیلے کپڑے پہننا پڑتے ہیں۔

**ڈائیوسکوریہ (Dioscorea):** جب درد مستقل ہو تو یہ قابل قدر دوا بن جاتی ہے۔ مریض کبھی بھی مکمل طور پر درد سے نجات نہیں پا سکتا۔ آنتیں گیس سے بھری ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ دھکڑلنے والے 'مروڑنے والے' درد ہوتے ہیں۔ جو پیچھے کی طرف جھکنے سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ دوا گرم پانی میں دی جاسکتی ہے۔

**مرکوریس (Mercurius):** جہاں بیرونی علامات حاد ہوں۔ اندرونی یا اسہال والی کیفیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اندھی اور پھوٹی آنٹ کے ملنے کے علاقہ میں سخت سوجن، گرمی اور درد ہوتا ہے۔ آنتوں میں خراش کا احساس ہوتا ہے۔ پسینے میں اتفاق نہیں ہوتا۔ درم زائدہ کے علاقہ میں نرم ڈھیلے محسوس ہوتا ہے۔

**کولوسینتھ (Colocynth):** یہ دوا اونچے درجے کے درد کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ کانٹے والا 'مروڑنے والا' یا اینٹھن والا ہو سکتا ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پاخانہ لعاب دار ہوتا ہے۔ برہمی سے اتھری ہوتی ہے۔ دبانے سے اور چمکنے سے بہتری ہوتی ہے۔

**لیکیسیس (Lachesis):** یہ ایک قابل قدر دوا ہے۔ تمام ہیٹ پر حسایت ہوتی ہے۔ نیز ٹانگے لگنے جیسا درد سوزش کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سوزش کولہوں پر پھیلی جانب اور لیٹنے کی جانب ہوتی ہے۔ مریض کمر کے بل لیٹتا ہے اور اپنے گھٹنے اوپر کو اٹھا لیتا ہے۔ گرمی محسوس کرتا ہے۔ کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ سرد موسم میں بھی۔

**لائکوپوڈیم (Lycopodium):** جب حاد حملہ ختم ہو جائے تو اس دوا کی اونچے درجے کی ڈانگی یوشن مثلاً 1000 کی دینی چاہئے۔ یہ دوا ہر پندرہ دن کے بعد یا سینے کے بعد دینی چاہئے۔

تاکہ حملوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): جب مرض کی حالت جراثیمیت کی طرف اشارہ کرے تو یہ دوا ہو سکتی ہے۔ جاڑا، سرخ بخاروں کی علامات، اسہال، بے چینی اور طاقت کا اچانک ڈوب جانا پایا جاتا ہے۔

رہس ٹاکس (Rhus Tox): اندھی آنت اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ پر بہت زیادہ پھیلاؤ والی سوجن ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو مستقل بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ یہ دوا جراثیمی حالت کو بھی شفا دیتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): ورم زائدہ میں خطرناک قسم کا درد جس کے ساتھ آپریشن یعنی جراحی کا خوف ایک اہم دماغی علامت ہے۔ مریض اتنے زیادہ گھٹنے اٹھا لیتا ہے کہ تھوڑی تک آ جاتے ہیں۔ جسم گرم اور اکڑا ہوتا ہے۔ مریض حساس ہوتا ہے۔ ہوشیار اور اعصابی ہوتا ہے۔ بیک وقت دماغ اور جسم حاد طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ جکڑنے والے اور ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ اعصابی مریضوں میں علاج کا آغاز اس دوا سے کیا جاسکتا ہے۔

فیرم فاس، کالی میور، مگنیشیا فاس (Ferrum Phos, Kali Mur, Mag Phos): اندھی آنت اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ کی سوزش کے لئے یہ مفید دوائیں ہیں۔

### استسقاء (پیٹ کا) — (Ascites)

#### (Dropsy of the abdomen)

اپیس مل (Apis Mel): پیاس کے نہ ہونے کے ساتھ استسقاء۔ یہ بخاروں کے بعد لاحق ہو سکتا ہے۔ خصوصاً خارش والے بخاروں کے بعد، جلد پیلی ہوتی ہے۔ سوجن ہوتی ہے اور شفاف ہوتی ہے۔ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے۔ گرمی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹھنڈ سے بہتری ہوتی ہے۔ 6 یا 12 طاقت کی خوراک دیجئے۔

ایپوسائیم کین (Apocynum Can): ٹائیفائیڈ یا سرخ بخار کے بعد قبض کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ یہ دوا عضوی امراض کے لئے بھی مفید ہے۔ ٹھنڈ سے علامات میں اضافہ ہو۔ نیز ٹھنڈے مشروبات سے حساسیت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے مشروبات سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اپیس میں پیشاب کم ہو جاتا ہے اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیاس کے ساتھ استسقاء ہوتا ہے لیکن پیشاب میں کمی ہوتی ہے۔

آرسینک البم (Ars Alb): یہ دوا استسقاء کی تمام صورتوں میں موزوں ہوتی ہے۔ خصوصاً دل، پیچڑوں اور گردوں کی تکلیفات کے باعث لاحق ہونے والے استسقاء میں، چہرے پر

سوزش ہوتی ہے نیز آنکھوں کے پونے سوجھتے ہیں۔ موی شفاف جلد ہوتی ہے۔ پیاس اور تھکے وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ استسقاء میں خون والا پانی رس رس کر جم جاتا بھی ایک علامت ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم (Lac Defloratum): عضلاتی عارضہ قلب کے باعث استسقاء، جگر کی مزمن شکایت کے باعث استسقاء۔ میعادى بخار کے بعد پیشاب کے ذریعہ زیادہ مقدار میں البیومن خارج ہو۔

ڈی جی ٹیلس (Digitalis): یہ دوا امراض قلب میں لاحق ہونے والے استسقاء کی نشاندہی کرتی ہے۔ دل بہت کمزور اور بے قاعدہ ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رکا ہوا ہو اس خواہش کے ساتھ کہ ایک لمبا سانس لے گا۔ پیشاب کم مقدار میں گاڑھا اور البیومن والا ہوتا ہے۔

میوری ایٹک ایسڈ (Muriatic Acid): جگر کے سرطان کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ ہیلی بوریس (Helleborus): ایسا استسقاء جس کے ساتھ اسال لعاب جیسے ہوتے ہیں اور پیشاب گاڑھا اور کم مقدار میں ہوتا ہے۔

تھلاپی برسا (Thlaspi Bursa): یہ دوا استسقاء میں مفید ہے۔ مدر ٹیچر کے 10 قطروں کی خوراکیں دیجئے۔

یوریا (Urea): گردوں کے استسقاء میں مفید ہے۔ پیشاب میں البیومن، کھار اور شکر آئے جو کہ مخصوص قسم کے گٹھے ہوئے وزن والا ہوتا ہے۔

لیائٹس سپائی کاتا (Liatris Spicata): جگر اور تلی کے بڑھ جانے کے ساتھ استسقاء، کما جاتا ہے کہ اس مرض میں مریض دن میں ڈیڑھ گیلن پیشاب نکالتا ہے۔ آدھا اونس جڑ لے کر اس دوا کا 1/8 گیلن جوشاندہ تیار کیا جائے جسے ایک روز میں پیا جاسکتا ہے یا پھر مدر ٹیچر کے دس قطرے استعمال کئے جائیں۔

ڈلکامارا (Dulcamara): پیوند دب جانے کے باعث اور پھوڑے پھنسی کے دب جانے کے باعث نیز ٹھنڈ لگ جانے کے باعث استسقاء۔

ایسے ٹک ایسڈ (Acetic Acid): گیس کی تکلیفات کے ساتھ پیٹ کا استسقاء، ڈکار، جن میں پانی منہ میں بھرتا ہے اور معدے سے پانی اچھلتا ہے نیز اسال بھی ہوتے ہیں۔

لیکے سس (Lachesis): استسقاء، جس کے ساتھ پیشاب گہرے رنگ کا اور البیومن والا ہوتا ہے، جلد گہرے رنگ کی یا نیلاہٹ مائل سفید ہوتی ہے۔

ٹیری (Terebinth): گردے میں اجتماع خون کے باعث استسقاء لاحق ہو، گردوں کے

علاقہ میں بدہم دکن والا درد ہوتا ہے اور پیشاب کمرے رنگ کا دھواں دار ہوتا ہے۔  
**کالچیکم (Colchicum):** کمرے رنگ کے پیشاب کے ساتھ استسقاء، خصوصاً یہ دوا گھٹیاوی  
 تکلیف کی نشاندہی کرتی ہے۔ کھانے کی خوشبو اور کھانا پکنے کی خوشبو کا ناقابل برداشت ہونا اس  
 دوا کی خصوصی علامت ہے۔

**لائکوپوڈیم (Lycopodium):** جگر کے امراض کے باعث استسقاء کا لاحق ہونا۔ پیٹ کا  
 نصف زیریں حصہ تکا ہوا ہوتا ہے، ٹانگوں پر ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ تلی کے بڑھ جانے کے  
 ساتھ استسقاء، جس میں سہ پہر کے وقت بخار ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیاس نہیں ہوتی، لینے پر  
 سانس میں دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں اور کمرے رنگ کا ہوتا ہے، قبض ہوتی  
 ہے، دل کا فعل کمزور لیکن باقاعدہ ہوتا ہے۔

**پلساٹیل (Pulsatilla):** بلوغت کے وقت حیض میں دقت کے باعث یا حیض کے رک جانے  
 کے باعث استسقاء لاحق ہو، خصوصاً یہ دوا نرم طبیعت والی، شریف اور آسانی سے بات تسلیم کر  
 لینے والی عورتوں کے لئے مناسب ہے۔ کھلی ہوا کی طالب ہوں خواہ سخت سردی ہی کیوں نہ  
 ہو۔

## نیچے کی جانب کھنچاؤ

(Bearing Down)

**لیلیم ٹگ (Lilium Tig):** پیٹ کے تمام اعضاء کا نیچے کی جانب کھنچا، معدے سے اعضاء نیچے  
 کی جانب کھینچے ہیں۔

**مینگانم (Manganum):** آنٹوں کا نیچے کی جانب کھنچا، ڈھیلا پھوڑنے کی حالت میں پورا پیٹ  
 بو جھل محسوس ہوتا ہے۔ رحم اور امعاء مستقیم کے خروج کے ساتھ، جھل ہوتی، خون کی کمی  
 والی مستورات میں۔

## درد قولنج — (Colic)

**نکس وامیکا (Nux Vom):** بدہضمی کے باعث لاحق ہونے والے درد قولنج کے لئے یہ دوا  
 چوبی کی ہے۔ یہ شروع میں گرم پانی میں چھوٹی طاقت میں دینی چاہئے۔ درد پیٹ کے کسی بھی  
 حصہ میں ہو سکتا ہے۔ درد، دکن دار یا اینٹن دار ہو سکتے ہیں جن میں کھانا کھانے کے بعد ابھری  
 ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اچھارہ، قبض اور متلی بھی ہوتی ہے۔ دوران حمل پیٹ میں اینٹن  
 ہو۔

**کالو سنٹھس (Colocynthis):** قبضہ دار، جکڑن دار، ایٹھن والا، کھودنے والا اور چاقو لگنے جیسا درد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انگلیوں سے جکڑا ہوا ہو۔ جھک کر دہرا ہونے سے بہتری ہوتی ہے یا پھر پیٹ کی دیوار پر سخت دباؤ ڈالنے سے بہتری ہو۔ موسم گرما کی تکلیفات اور ہیچس ہوتی ہے، اچھارہ کے باعث درد قونچ ہو، غذا ہضم نہ ہونے کے باعث درد قونچ ہو یا کچے پھلوں کے کھانے سے یا ٹھنڈے کھانے سے یا شدید جذباتی کیفیت مثلاً غصہ کے دورے کے باعث درد قونچ کا لاحق ہونا۔ سوزش والے درد قونچ میں یہ دوا کم استعمال ہوتی ہے۔

**وریرٹرم البم (Veratrum Album):** یہ دوا پیٹ کے دردوں میں دی جاتی ہے جنہیں جھک کر دہرا ہونے سے اور چلنے سے آرام ملتا ہے۔ درد قونچ ایسا ہوتا ہے کہ آنتیں مروڑ کھا کر ایک گروہ کی صورت اختیار کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ پیٹ میں ایٹھن ہوتی ہے۔ چہرے پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ آنتیں آپس میں گڈنڈ ہو جانے کے لئے یہ دوا خصوصاً مفید ہے۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

**بوویشا (Bovista):** جھک کر دہرا ہونے سے اور کھانا کھانے کے بعد درد میں افادہ ہوتا ہے، پیشاب سرخ ہوتا ہے۔

**کروٹن ٹیگ (Croton Tig):** گرفت والا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ پانی والے پاخانے باقرا لگ جاتے ہیں۔ پاخانے اس طرح آتے ہیں جیسے تل سے پانی بہ رہا ہو۔ تھار داری کے بعد اور کھانے کے بعد مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**ڈائیوسکوریا (Dioscorea):** ناف کے علاقہ میں درد ہوتا ہے جو کہ مسلسل اور مستقل ہوتا ہے۔ پیچھے کی جانب جھکنے سے اور جسم کو اکڑانے سے بہتری ہوتی ہے۔ صفراوی، کھسادی اور اعصابی درد قونچ، خوراک کا منہ کو آنا اور کھنے یا کڑوے ڈکار ہوتے ہیں۔

**کیوپرم میٹ (Cuprum Met):** سوزشی درد قونچ کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ پیٹ سخت ہوتا ہے۔ درد قونچ کے شدید دورے ہوتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں خنجر گھونپا جا رہا ہو۔ ٹھنڈے مشروبات سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔

**کیمومیلا (Chamomilla):** دورے والے درد میں یہ دوا مفید ہے۔ اس میں دورے اچانک آتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں۔ غصہ کے باعث درد قونچ لاحق ہوتا ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ ایک دوسری دوا شیمنی سیکریا ہے جو غصہ کے بعد لاحق ہونے والے قونچ کی نشاندہی کرتی ہے نیز پیٹ کی جراحی کے بعد درد قونچ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھارے میں افادہ ڈکاروں سے ہوتا ہے۔

**اکونائٹ این (Aconite N):** جب رحم اور پیٹ میں اجتماع خون کے احساس کے ساتھ درد

قونج ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے اس میں نبض بھرپور اور متواتر ہوتی ہے۔  
کوکولس انڈ (Cocculus Ind): اعصابی درد قونج رات کے وقت بہتری ہو اس کے ساتھ  
 اچھارہ بھی ہوتا ہے۔ اخراج سے کچھ افاتہ نہیں ہوتا، ٹھنڈے مشروبات خصوصاً آب جو (Bear)  
 کی طلب ہوتی ہے۔ کڑوا یا دھات کا سا ذائقہ ہوتا ہے، پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے۔  
الیومن (Alumen): سیدھے والے درد قونج کا رتجان، یہ رتجان ایسے اشخاص میں ہوتا ہے جو  
 سیدھے کا کام کرتے ہیں مثلاً پینٹرز وغیرہ۔

پلمبم (Plumbum): پیٹ کے درد جن کی لہریں کئی سطحوں میں جاتی ہیں۔ پیٹ کی دیواریں  
 اندر گودھنی ہوتی ہیں جیسا کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہو، ٹانگوں میں اینٹھن (کڑل) ہوتی ہے  
 اور ضدی قسم کی قبض لاحق رہتی ہے لیکن اچھارہ نہیں ہوتا، پیٹ پتھر کی مانند سخت ہوتا ہے۔  
 سیدھے والے درد قونج کے لئے یہ خصوصی دوا ہے۔ ناف سے شروع ہو کر درد ریزہ کی ہڈی تک  
 جاتا ہے۔ مریض پیچھے کی طرف جھکتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جائزے کے ساتھ درد قونج جو ثقل اور مرغن غذاؤں کے استعمال  
 سے لاحق ہوتا ہے۔ پیٹ میں بلند آواز کے ساتھ گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ اچھارے والا درد قونج  
 جو کہ ہسٹریائی اور حاملہ مستورات میں ہوتا ہے، پیشاب متواتر آتا رہتا ہے۔ منلی کے ساتھ  
 ٹانگے لگنے جیسے اور اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): شدید منلی اور تھکے کے ساتھ جلن دار اور کانٹے  
 والے درد معدے میں ہوتے ہیں، تھکے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، معمولی سی چیز بھی ہونٹ کو چھو  
 جائے تو تھکے آنے لگتی ہے۔

کیوپرم آرس (Cuprum Ars): پیٹ میں اعصابی درد لاحق ہو، جلن دار، اینٹھن والے  
 اور قونج کے درد ہوتے ہیں۔

ریٹین کولس لی (Ranunculus B): پسلیوں کے نیچے دائیں جانب ٹانگے لگنے جیسے درد  
 ہوتے ہیں، مرانی درد لاحق ہو۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): معدے میں درد ہوتا ہے جس کو کھانے سے آرام ملتا  
 ہے۔ یہ درد مریض کو صبح پانچ بجے ہی کھانے کے لئے بستر سے باہر کھینچ لاتا ہے۔

سنا (Senna): درد قونج، خصوصاً بچوں کا درد قونج جب کہ بچہ ہوا سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ دوا  
 نقاہت اور آنسوؤں کے قبض کو بھی رفع کرتی ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): شدید تشنہ درد جو گرم چیزیں لگانے سے بہتر ہوتا ہے،  
 دائیں جانب درد میں بہتری ہوتی ہے اور دہرا ہو کر جھکنے سے بہتری ہوتی ہے، ڈکاروں سے اور



گیس خارج کرنے سے افادہ نہیں ہوتا۔ دن رات مسلسل ہنسی لگی رہتی ہے۔ ٹانگوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ پتہ کا درد قویٰ ہے۔ پتہ میں پتھری کے باعث لاحق ہو۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): پیٹ کے بالائی حصہ میں تیز درد ہوتا ہے جس کے ساتھ پریشانی اور دباؤ ہوتا ہے۔ پیٹ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رسیوں سے کس کر باندھا گیا ہو۔ درد دائیں کندھے کے جوڑ تک پھیل جاتا ہے۔ ناف کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ حرکت کرنے پر موسم کے بدلنے پر اور صبح سویرے دائیں جانب درد میں ابتری ہوتی ہے۔ رکاوٹ والا پرکانہ سوزش پتہ اور پتہ کی پتھری ہوتی ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں درد جو کہ آنتوں کے پھجان کے باعث لاحق ہو۔

چائنا آف (China Off): پیٹ کے بالائی حصہ میں درد ہو جس کے ساتھ کھانے کے بعد خواہ معمولی مقدار میں خوراک کھائی جائے پیٹ میں گرانی اور بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ رطوبت کے ضائع ہو جانے کے باعث بہت زیادہ نقات ہو جاتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ خوراک کا ذائقہ ممکن محسوس ہوتا ہے۔ بھوک اور غصہ پانی کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ گیس سے بھرا ہوتا ہے۔ بارہ انگلی آنت کا درد ہنسی۔

بیلادونا (Belladonna): پیٹ بہت زیادہ تپتا ہوتا ہے۔ معمولی مقدار میں کچھ پینے سے بھی پی جانے والی چیز فوراً باہر آ جاتی ہے۔ معمولی سا چھوٹا بھی شدید درد کا باعث ہوتا ہے۔ آنتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ پیچھے کی جانب ہلکنے سے آرام ملتا ہے۔

ڈولکامارا (Dulcamara): درد یا پھنسیں ناف والے علاقہ میں ہوتی ہیں خصوصاً ناف کے سوراخ میں۔

پلاٹینم (Platinum): پیٹ کا درد قویٰ درد ناف سے پیچھے کمر تک جاتا ہے۔ مریض چپخا ہے اور درد دور کرنے کے لئے ہر ممکن حالت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

کیسٹوریم (Castoreum): اعصابی درد قویٰ کی ایک قسم یہ درد خاصاً چھوٹی آنت میں بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ درد دبانے سے بہتر ہوتے ہیں مریض کی طاقت اچانک ڈوب جاتی ہے جیسا کہ زندگی کی دور ٹوٹ گئی ہو۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): یہ دوا غصہ کے باعث ہونے والے درد قویٰ کے لئے مفید ہے۔

سٹانم (Stannum): سخت قسم کے دباؤ سے درد قویٰ میں افادہ ہو درد آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں اور پھر متواتر بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔



گریٹیولا (Gratiola): پیٹ میں شدید کانٹے جیسے درد اور اچھارہ و گڑگڑاہٹ جس کے ساتھ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

الیئم سیپا (Allium Cepa): پیٹ کے بائیں جانب کے زیریں حصہ میں شدید کانٹے والا درد جس کے ساتھ متواتر پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے جبکہ پیشاب جلتا ہے۔ بچوں میں درد قونچ جس میں بچے درد سے دوہرے ہو جاتے ہیں نیز بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔

جیہوراندی (Jaborandi): پیڑوں کے اوپر شدید درد جس میں پیڑوں پر پانی بہانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ جس سے مریض کو اتفاقاً محسوس ہوتا ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): معدہ کے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے اور ڈکاروں سے کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔

الیومینا (Alumina): پیٹ کا درد قونچ۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کھانے کے بعد پیٹ کے بالائی حصہ میں درد یا دباؤ ہوتا ہے۔

جس کے ساتھ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پیٹ بہت زیادہ تن جاتا ہے۔ خصوصاً پیٹ کا زیریں

حصہ تن جاتا ہے، زبان پیاس کے بغیر ہی خشک ہوتی ہے۔ بھوک ضرورت سے زیادہ ہو جاتی

ہے۔ گوشت یا روٹی کھانے سے ابتری ہوتی ہے۔ شام کے 4 بجے سے 8 بجے تک ابتری ہوتی

ہے نیز چلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ ڈکاروں سے اور ہوا خارج کرنے سے بھی اتفاق ہوتا ہے۔

کافیا (Coffea): بے خوابی کے ساتھ دورانِ حمل پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے۔

## مزمن پیش

### Colitis (Chronic Dysentery)

سلفر (Sulphur): مزمن پاخانوں میں یہ دوا چوٹی کی ہوتی ہے، علاج اسی دوا سے شروع کرنا

چاہئے۔ یہ دوا بہت سے کیسوں کو درست کرے گی بغیر کسی دوسری دوا کی امداد کے۔ 200 ڈالنی

یوشن استعمال کیجئے۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): پیٹ میں شدید تھکاو کے ساتھ سبز رنگ کا پانی والا مواد

پاخانہ میں بہت تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جیسا کہ قل سے پانی خارج ہو رہا ہو۔

چائنا آف (China Off): جب پاخانے پھل کھانے کے بعد یا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد لگیں۔

پاخانے پیلے رنگ کے پانی والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے اور درد بالکل نہیں

ہوتا۔ ان میں کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

لیکس (Lachesis): پاخانے لاحق ہوں جن کے ساتھ بدبودار اسہال ہوتے ہیں اور یہ

قبض کے ساتھ اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ موسم بہار کے دوران اتھری ہوتی ہے۔  
سیلی نیئم (Selenium): انتڑیوں کی جھلی کا تپ دق، سیب، انگترے یا لیموں کھانے سے پاخانے  
 لاحق ہوتے ہیں۔  
تھوجا (Thuja): پاخانوں یا امیسیائی پچش کے لئے یہ دوا بہت عمدہ ہے۔ TM طاقت کی خوراک  
 دیتے۔

### پیٹ کا بڑھ جانا

(Enlargment of Abdomen)

لیکے س (Lachesis): جوان لڑکیوں میں پیٹ کا بڑھ جانا۔

اچھارہ — (Flatulence)

(نیز دیکھئے ”معدہ“ کے ذیل میں ”درد معدہ“)

چائنا آف (China Off): جب تمام پیٹ میں اچھارہ ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ اچھارہ  
 سے اس قدر تباہ ہو جاتا ہے کہ پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ مچھلی، پھل اور شراب سے  
 اتھری ہوتی ہے۔

کاربو وِج (Carbo Veg): جب اچھارہ پیٹ کے بالائی حصہ میں ہو۔ جس کے باعث خفس  
 میں دباؤ پیدا ہو جاتا ہے یا پھر سینے میں تیز درد ہوتا ہے۔ پاخانے بے قاعدہ یا پتے ہوتے ہیں۔  
 بد ہضمی کے باعث پیٹ ڈھول کی طرح پھول جاتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): جب اچھارہ پیٹ کے زیریں حصہ میں ہو، شام کے 4 بجے  
 سے 8 بجے تک اتھری ہوتی ہے۔ مریض جو چیز بھی کھاتا ہے، ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک  
 لقمہ کھا لینے کے بعد پیٹ میں اچھارہ ہو جاتا ہے نیز پیٹ تن جاتا ہے۔ ہوا اندام نہانی سے خارج  
 ہوتی ہے۔

ریفانٹس (Raphanuns): جب ہوائی کے ارد گرد موجود ہوتی ہے جو کہ مشکل ہی سے  
 خارج ہوتی ہے اور جس کے باعث درد ہوتا ہے۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): اچھارہ کے باعث تباہ ہو۔ جس کے باعث متواتر آہیں  
 بھرنا اور ڈکار لینا پڑتے ہیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): اچھارے والی گیس کی تکلیف جب کہ ہر چیز ہوا میں تبدیل  
 ہو جائے۔

کیو میلا (Chamomilla): اچھارہ جس میں افتادہ ڈکاروں سے ہو۔

ایلو (Aloe): بدبودار ہوا خارج ہو 'جلن ہو اور بہت زیادہ ہوا خارج ہو 'چھوٹے پاخانے کے ساتھ بہت زیادہ ہوا خارج ہو۔ پاخانے سے پہلے اور پاخانے کے دوران پیٹ میں گڑگڑاہٹ اور اینٹھن ہوتی ہے۔ سخت پاخانہ بغیر کسی پیچگی اطلاع کے یک دم خارج ہوتا ہے۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ اس قدر بلند آواز سے ہوتی ہے کہ کمرے میں موجود ہر شخص اس آواز کو سن سکتا ہے۔ بچوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ اچھارے کے باعث پھٹ جائے گا۔

لیک کینیم (Lac Can): ہوا اندام نہانی سے خارج ہو۔

سارس پاریلا (Sarsparilla): مریض جب پیشاب کر رہا ہو تو ہوا خارج ہو جائے۔ پیشاب بلند شور کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

اولینڈر (Oleander): پاخانے کے ساتھ ہوا بھی خارج ہو۔

کلیریا آئیوڈ (Calc lod): ڈکار 'خالی' متعفن 'کڑوے' بساند والے ہوتے ہیں جن کے باعث پیٹ کے بالائی حصہ میں اور سینہ میں دھکن والے درد ہوتے ہیں۔ سانس باہر نکالتے وقت پیٹ کے بالائی حصہ میں سکڑن والا درد ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں ہوا اکٹھی ہو جاتی ہے چنانچہ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔

فیل ٹوری (Fel Tauri): پیٹ میں غرغراہٹ اور گڑگڑاہٹ والی حرکات ہوتی ہیں۔ بے بو اور بے ذائقہ ڈکار آتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونے کا رجحان ہوتا ہے۔

فیوکس ویس (Fucus Ves): اس دوا سے اچھارہ کم ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ مدر نظیر کے 3 قطروں کی خوراک استعمال کیجئے۔

کیسٹوریم (Castoreum): پیٹ اچھارے سے تن جاتا ہے۔ جاتگھ میں کمیچھن ہوتی ہے۔ ناف کے قریب کاسٹخے جیسا درد ہوتا ہے۔ دباؤ سے بہتری ہوتی ہے۔ سبز رنگ کے مواد والا پاخانہ ہوتا ہے جس سے جلن بھی ہوتی ہے۔ اسبابی درد قویج ہوتا ہے۔ بچوں میں موسم سرما میں سبز رنگ کے پاخانے ہوتے ہیں۔

ایلیم سیپا (Allium Cepa): بد ہضمی ہوتی ہے۔ بچوں میں تپ اور اچھارہ ہوتا ہے۔ بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے 'مریض درد سے دہرا ہو جاتا ہے۔ کالی کھانسی ہوتی ہے۔

ہومارس (Homarus): رات کے وقت ہوا خارج ہونے سے مریض بیدار ہو جاتا ہے۔

ارجنٹم ٹائٹ (Argentum Nit): اچھارہ سے پیٹ میں اس قدر تھاد ہوتا ہے کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہوا کے اخراج یا ڈکاروں سے قدرے افتادہ ہوتا ہے۔

کوکولس (Cocculus): ب ہوا خارج نہ ہونے کے باعث پیٹ ڈھول کی طرح پھول

جائے۔  
لائیکوپریسیکم (Lycopersicum): پیٹ میں بہت زیادہ اچھارہ ہوتا ہے خصوصاً صبح 10 بجے سے 11 1/2 بجے کے دوران۔ جس کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔  
لیکسیس (Lachesis): پیٹ گرم اور حساس ہوتا ہے۔ درد والا اچھارہ اور تکاؤ ہوتا ہے۔ دباؤ برداشت نہیں ہو سکتا۔ متواتر ہوا کا اخراج ہوتا ہے۔ ذکاروں سے اتفاق ہوتا ہے۔  
پلساٹیلہ (Pulsatilla): پیٹ میں سخت قسم کا تکاؤ ہوتا ہے۔ درد قویٰ کے ساتھ اکثر تھکے اور اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ کھنچاؤ (انقباض) ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ پتھر مٹانے تک پھیل گیا ہو۔ مرغن غذاؤں کے کھانے سے اور فاسل غذاؤں نیز پھلوں کے کھانے سے برے اثرات کا مرتب ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): شراب کافی اور بیٹھک والی زندگی کے بد اثرات۔ ہوا کا دباؤ اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تنفس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ سینے میں دباؤ ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے معدہ میں پتھر ہوں۔ قبض ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پاخانہ کی لا حاصل کوشش ہوتی ہے۔

### ہرنیا — (Hernia)

(Inguinal or Umbilical)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یہ چوٹی کی دوا ہے۔ علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا بہت زیادہ تعداد میں مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ یہ دوا ہرنیا میں استعمال کی جاتی ہے جب کہ ہرنیا کی چوٹی نہ پھنی جا سکے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): دائیں جانب کا ہرنیا آنٹوں کے الجھاؤ والا ہرنیا ہر پندرہ روز کے بعد 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ پیٹ میں گڑبڑاہٹ کے ساتھ پیٹ کا تکاؤ موجود ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بائیں جانب کا ہرنیا۔ ہر پندرہ روز کے بعد 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ جب لائیکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا دائیں جانب کے ہرنیا کو بھی شفا دیتی ہے۔

کوکولس (Cocculus): جب لائیکوپوڈیم اور نکس وامیکا ناکام ہو جائیں تو یہ دوا 30 طاقت کے ساتھ دیجئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بچوں میں ہرنیا۔ جب درج بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جائے۔

لیکسیس (Lachesis): الجھاؤ والی اور دلدلی آنٹوں والا ہرنیا۔

**پلمبم (Plumbum):** آنتوں کے الجھاؤ والا ہرنیا۔ یہ ہرنیا خواہ ران کا ہو، جاگلہ کا ہو یا ناف کا ہو۔

**سٹیفنی سگریا (Staphisagria):** مثانہ کا ہرنیا۔

**سیلیا (Silicia):** جاگلہ کے غدود کی سوزش اور سوجن۔ پھوٹنے سے درد ہوتا ہے۔ درد والا جاگلہ کا ہرنیا۔

**ایسکولس ہیپو کاسٹیم (Aesculux Hippocastanum):** جاگلہ کا ہرنیا، دائیں جاگلہ کے علاقہ میں کانٹے والا درد۔

## آنتیں (رکاوٹ)

### Intestines (Obstruction)

**بیلادونا (Belladonna):** آنتوں میں رکاوٹ کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیا جائے۔

**اوپیم (Opium):** چھوٹی آنت میں پاخانہ کے باعث تشنجی رکاوٹ ہوتی ہے۔ پیٹ سخت ہوتا ہے۔ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ نیز ذہول کی طرح ہوتا ہے۔ قہقہے کے درد کے دوران پاخانہ کرنے کی اور سخت پاخانہ خارج کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

**پلمبم (Plumbum):** آنتیں سخت پاخانہ سے بھری ہوتی ہیں۔ تشنجی دورے واضح طور پر محسوس کئے جاسکتے ہیں اور دیکھے جاسکتے ہیں۔

**کاسٹیکم (Causticum):** رکے ہوئے سخت پاخانہ کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے۔

**لیکسیس (Lachesis):** پیٹ ذہول کی طرح ہوتا ہے۔ حساس ہوتا ہے اور پُر درد ہوتا ہے۔ کمر کے گرد کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔

## آنتوں کی تکلیف

### (Intussusception of Bowels)

**اکونائٹ این (Aconite N):** صبح کے ساتھ اچانک درد ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم سے خون اور بلغم خارج ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم غبارے کی طرح پھول جاتی ہے۔ پاخانہ کا ٹکڑا آنت کے بالائی حصہ میں اٹک جاتا ہے۔ سرخ لعاب کی طرح کا مواد امعاء مستقیم سے نکلتا ہے۔ ہر چودہ گھنٹہ کے بعد 30 طاقت کا ڈاکہ لیون دیجئے۔ بڑی طاقت

کی خوراک بھی کام کرتی ہے مثلاً 1000 ملاقات کا ڈائی لیوشن۔  
پلمبم (Plumbum): قھلنے پر درد اور پاخانے کی قے ہوتی ہے۔ ناف کی جگہ میں کھنچاؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی رسی کے ذریعے کھینچا جا رہا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ کو اندر کی جانب کھینچا جا رہا ہے۔ اس احساس کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ اور کمر ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہوں۔

اوپیم (Opium): شدید درد قویخ اور مروڑوں کے ساتھ۔  
وریرٹرم ایلم (Veratrum Alb): بہت تیزی ہوتی ہے۔ جھک کر دوہرا ہونے اور پیٹ کو دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔

### ناف — (Navel)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): اچھارے کے باعث ناف کا باہر نکل آتا۔  
نکس موسکاتا (Nux Moxch): نوزائیدہ بچوں کی ناف کی سوزش۔  
ایبروٹانم (Abrotanum): چھوٹے بچوں کی ناف سے خون آلود مواد رستا ہے۔  
ہائوسکیم (Hyoscyamus): چھوٹے بچوں کی ناف سے پیشاب کا رستا۔  
کالکیریا فاس (Calc Phos): چھوٹے بچوں کی ناف سے خون آلود مواد رستا ہے۔  
ڈائسکوریا (Dioscorea): درد ناف سے شروع ہو کر پھیل جاتا ہے۔  
الیومینا (Alumina): ناف کی سکڑن۔

### رکاوٹ (Obstruction)

نکس وامیکا (Nux Vom): بڑی آنت کے زیریں حصہ میں درد کے ساتھ رکاوٹ ہوتی ہے۔ درد والی جانب لیٹ کر دبانے سے تکلیف میں آفاقہ ہوتا ہے۔ مریض پاخانہ یا ہوا خارج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔  
رشاکس (Rhus Tox): غصہ مشروبات کے علاوہ ہر چیز قے ہو جاتی ہے۔ زبان پالش کی ہوئی ہوتی ہے۔ نیز زبان کی نوک تین اطراف سے سرخ ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ مریض اپنی حالت مسلسل تبدیل کرتے رہتا چاہتا ہے۔ مریض جس جانب جس کروٹ لیٹتا ہے اسی جانب درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ جانب سن ہو جاتی ہے۔  
اوپیم (Opium): آنتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

### لبیلہ (Pancreas)

آئرس ویر (Iris Ver): لبیلہ کے علاقہ میں درد اور تکلیف ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹھٹھے پانی کی تے ہوتی ہے اور چکنا تھوک ہوتا ہے۔ پانی والے اسہال لاحق ہوتے ہیں جو غیر منظم چکناکی پر مشتمل ہوتے ہیں۔

آئیوڈین (Iodine): یہ دوا تھوک کے حدود پر عمل کرتی ہے۔ جب کہ تھوک پانی والا باافراط ہوتا ہے۔ پانی والے مواد کی یا کھٹے مواد کی شدید بافراط تے ہوتی ہے۔ نرم پانی والے افراط کے ساتھ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ چکناکی والے جھاگ دار پاخانے ہوتے ہیں۔ خوب کھانے کے باوجود جسم پر گوشت نہیں ہوتا۔

فاسفورس (Phosphorus): کئی اعضاء خصوصاً دل، جگر یا گردوں میں چربی کا بگاڑ لاحق ہو جاتا ہے۔ غیر منظم خوراک کے ٹکڑوں والا پاخانہ ہوتا ہے۔ خوراک کے ٹکڑے ساگودانہ کی طرح کے ہوتے ہیں۔ پاخانہ تیل آلود دکھائی دیتا ہے۔ لبیلہ کی چربی کا بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): لبیلہ کا نزلہ، لبیلہ کا سوزشی سیلان خون۔

### سوزش غشائے مصلیٰ (Peritonitis)

اکونائٹ این (Aconite N): جب ٹھنڈ لگ جانے کے باعث ہو۔ معدے کی جھلی (پیریٹونیم) میں درد کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): ٹھنڈ لگ جانے کے باعث ہونے والی معدے کی جھلی کی سوزش کے لئے یہ ایک دوسری دوا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): تمام جسم پر جلن دار حدت کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ دبانے اور حرکت کرنے سے پیٹ کے درد میں اتھری ہو جاتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): پیٹ سو جا ہوتا ہے اور دھول کی طرح سے تپا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔ معمولی سے ہلانے سے شور سے اور روشنی سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابکائیاں آتی ہیں اور تے ہوتی ہیں۔

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): جب پیپ آنا شروع ہو جائے اور اخراج کے ساتھ پیٹ دھول کی طرح سے بجھنے لگے۔ مریض کو بلا کی سردی لگتی ہے اور پسینے آتے ہیں۔ جاڑے اور بخار کے ساتھ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

لیکیسیس (Lachesis): معدے کی جھلی کی سوزش ہو جبکہ معمولی سا چھوئے جانا بھی برداشت



شہ ہو۔

رسناکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ کے رجحان کے ساتھ معدے کی جھلی کی سوزش ہوتی ہے۔  
تیز بخار ہوتا ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے۔ زبان کی نوک سرخ ہوتی ہے۔ پیٹ میں سوجن ہوتی  
ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ دودھ پینے کی خواہش ہوتی ہے۔  
ورعٹرم البم (Veratrum Album): جب مریض مروگی کی تصویر بن جائے تب اس دوا کی  
نشانہ ہی کی جاتی ہے۔ ٹھنڈک انتہا درجہ کی ہوتی ہے۔ کمزوری بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔  
قے اور جلاب لاحق ہوتے ہیں۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔

### تپ دق (Tuberculosis)

فاسفورس (Phosphorus): ماساریقی غدودوں کا تپ دق۔

### ناسور (Ulceration)

اورنیتھو گیلیم (Ornithogalum): معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت دونوں میں ناسور  
اور سرطان ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ معدہ میں بہت زیادہ تھکاؤ ہوتا ہے۔ ڈکار آتے ہیں۔  
بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ اذیت ناک درد ہوتا ہے۔ کپڑے ضرور ہی ڈھیلے کرتے پڑتے  
ہیں۔ معدہ یا بارہ انگلی آنت کا ناسور۔

ایسٹک الیڈ (Acetic Acid): معدہ کا ناسور، گرم اور دکھن والے ڈکار ہوتے ہیں۔ خون کی  
قے ہوتی ہے اور خوراک ساری قے ہو جاتی ہے۔ کترنے والے درد ہوتے ہیں۔ معدہ میں تھکاؤ  
ہوتا ہے۔ معدہ میں اور پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ جس میں معدہ کے بل لینے سے افادہ ہوتا  
ہے۔ اچھارہ ہوتا ہے اور استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ خالص خون کے اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): آنتوں یا معدہ کا ناسور۔ جس کے ساتھ خون کی قے ہوتی  
ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً درد شروع ہو جاتا ہے۔

کالی بانیکرام (Kali Bich): مزمن اسہال کے ساتھ آنتوں کا ناسور۔

مرک کار (Merc Cor): بڑی آنت کا ناسور جس کے ساتھ خونی پاخانے ہوتے ہیں۔

ٹیر۔ بسمتھ (Terebinth): سیلان خون کے ساتھ آنتوں کا ناسور۔

نائٹرک الیڈ (Nitric Acid): ٹائیفائیڈ بخار میں ناسوری کیفیت۔

فاسفورس، آرسنک البم (Phosphorus, Arsenic Alb): جلن دار درد کے ساتھ

معدے کا ناسور، دی گئی ترتیب کے ساتھ آزمائیں۔



یوفوربیم (Euphorbium): معدہ میں ناسور جو کہ دھکتے ہوئے کوئلہ کی طرح جلتا ہے۔  
 فاسفورس اور آرسنک الیم کے ٹاکام ہو جانے کے ساتھ جلن دار درد ہوتا ہے۔  
لائیکوپوڈیم (Lycopodium): چند لقمے خوراک کھانے پر ہی پیٹ کے سراسر بھرے ہونے  
 کا احساس ہوتا ہے۔ 4 بجے سے 8 بجے تک مرض میں افادہ ہوتا ہے۔ IM ملاقت کی خوراک  
 استعمال کیجئے۔

لیکیسیس (Lachesis): معدہ کا ناسور جب کہ مریض جاگنے پر بہتری محسوس کرے۔ مریض  
 کسی قسم کا انقباض برداشت نہیں کرتا۔ اپنے کپڑے ڈھیلے کرنا چاہتا ہے۔ سورج کی گرمی بھی  
 برداشت نہیں کر سکتا۔

پلساٹیل (Pulsatilla): ایسے مریضوں میں معدے کا ناسور جو چکنائی برداشت نہ کر سکیں۔ کھلی  
 ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): حفاظتی ٹیکوں میں بے اعتدالی کرنے والے مریضوں میں معدے کا ناسور۔  
گریفائٹس (Grphites): معدہ اور بارہ انگلی آنت کے ناسوروں میں اس دوا کی بہت زیادہ  
 اہمیت ہے۔ معدہ کے درد میں گرم مشروبات یا گرم خوراک سے اور لینے سے کمی ہوتی ہے۔  
نیٹرم فاس (Natum Phos): معدہ کا ناسور، کھانا کھانے کے بعد صرف ایک ہی مقام پر درد  
 ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے اور تیزاب منہ کی جانب چڑھتا ہے۔  
میڈوررینم (Medorrhinum): غذا کھانے کے 2 گھنٹہ بعد ہونے والے درد کے ساتھ بارہ  
 انگلی آنت کا ناسور، بہت زیادہ بڑھا ہوا اچھارہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سمندر کے کنارے بہتر ہو جاتا  
 ہے۔ IM ملاقت کی خوراک دیجئے۔

ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip): معدہ میں اجتماع خون اور ناسور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ  
 کھنے مواد والی تے کا رجحان ہوتا ہے۔ کھنے ڈکار آتے ہیں۔ معدہ میں مسلسل تکلیف اور جلن  
 ہوتی ہے۔

یورینیم نائٹریکیم (Uranium Nitricum): پائیلورک اور معدہ کے ناسور کے لئے یہ دوا مفید  
 ہوتی ہے۔ ہلیم کی تے ہوتی ہے جو کہ خون اور پیسی ہوئی کافی کے ملے جلے مواد کی ہوتی ہے۔  
 پاخانہ نارکول کی طرح کا اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔

## حصہ دوم — معدہ

### تیزابیت (Acidity)

(دیکھئے "درد معدہ" اور "ڈکار")

### بھوک بڑھی ہوئی یا پیٹوں والی

#### Appetite (Increased or Ravenous)

سنا (Cina): بڑھی ہوئی بھوک جس کا باعث پیٹ میں کیڑوں کا موجود ہونا ہو۔ بچے کھانے سے آرام محسوس کرتا ہے۔

لیک کینٹیم (Lac Can): مریض بہت بھوکا ہوتا ہے۔ اتنا کھاتا نہیں کھا سکتا کہ مطمئن ہو جائے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): بڑھی ہوئی بھوک، مریض متواتر بھوکا رہتا ہے۔ اسے ٹھنڈے پانی کی طلب رہتی ہے۔ معدہ میں یہ احساس رہتا ہے کہ سب کچھ ہضم ہو چکا ہے۔ بیش کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے۔ جس سے کچھ آرام محسوس ہوتا ہے لیکن یہ آرام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا جلد ہی وہ دوبارہ بھوکا ہو جاتا ہے۔

ایبس کین (Abies Can): کالٹے والی (کترنے والی) بھوک، ضرورت سے زیادہ کھانے کا رجحان۔

گریٹیولا (Gratiola): کھانا کھانے کے بعد بھوک لگے، معدہ خالی ہونے کے احساس کے ساتھ۔

لیکسیس (Lachesis): معدہ میں درد کے ساتھ بڑھی ہوئی بھوک۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): پیٹوں والی بھوک لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کھانا شروع کرتا ہے تو چند لمحوں کے بعد بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مریض شکم سیر ہو جاتا ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): اسہال کے ساتھ بڑھی ہوئی بھوک۔

آئیوڈین (Iodine): کتوں والی (کلبی) بھوک کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ ہر تین یا چار گھنٹوں کے بعد اگر مریض کھانا نہ کھائے تو یوں لگتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ دو کھانوں کے درمیان بھی کھاتا ہے۔ پھر بھی اس کی بھوک دور نہیں ہوتی۔ 3x طاقت کی خوراک دیجئے۔

الیومینا سلی کیٹ، الیومینا فاس (Alumina Silicate, Alumina Phos): کھانے کی

رغبت (شوق) کے بغیر ہی بڑھی ہوئی بھوک۔ کھانا کھانے کے بعد بھی مریض بھوکا ہوتا ہے۔  
پیٹوؤں والی بھوک۔

ایبروٹینم (Abrotanum): دودھ میں اہلی ہوئی روئی کی طلب ہوتی ہے۔ جس سے اس کی  
کترنے والی بھوک مٹی ہے۔ دودھ سے ہزاری ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): کھانے کی خواہش کے بغیر جوع الکلب (کتوں جیسی بھوک)۔  
ارجنٹم میٹالیکم (Argentum Metallicum): مکمل اور بھرپور کھانا کھانے کے بعد بھی  
مریض بھوکا ہوتا ہے۔

آرم ٹرائی قلم (Anum Triphyllum): ناشتہ کرنے کے بعد پیٹ خالی ہونے کا احساس۔  
اینن ٹھیرم (Anantherum): غیر صحت مندانہ بھوک، مریض رات کو جاگ جائے۔ ٹیپ  
والے (یا پیسے) کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): غذا سے سخت نفرت کے ساتھ بھوک ہوتی ہے۔ اس دوا میں  
یہ علامات بنیادی ہے۔ خوراک جذب نہیں ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): کھانے کے عمومی وقت سے ایک گھنٹہ قبل ہی پیٹ خالی ہونے کا احساس  
ہوتا ہے۔ خصوصاً دن کے 11 بجے۔ اگر مریض کو غذا نہ دی جائے تو مریض کمزور ہو جاتا ہے اور  
مٹی ہونے لگتی ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن ہوتی ہے۔ نیز سر میں  
بھی درد ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): شراب (آب جو) کے استعمال کے بعد بھوک لگتی ہے۔ مزمن  
پیش میں بھوک لگتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جوع الکلب سے مریض جاگ جائے۔  
کلیسریا کارب، فیرم میٹ، آئیوڈیم (Calcareo Carb, Ferrum Met, Iodium):

بڑی ہوئی بھوک جو کہ کھانے کی خواہش نہ رہنے کے ساتھ اولتی بدلتی رہے۔ سوکھا مسان میں  
اچھا (خوب) کھانے کے باوجود جسم پر گوشت نہیں ہوتا۔

مرک کار (Merc Cor): معدہ کے سرطان میں بھوک کا گلتا۔  
کافیا (Colfea): جلالت میں کھانا کھانے کے ساتھ۔

آرسنک البم (Ars Alb): کھانا ہی پڑے حالانکہ مریض جانتا ہے کہ جاڑا خود کر آئے گا۔  
ہائیوسائیمس (Hyoscamus): کھانے کی خواہش کے حملہ سے پہلے جوع الکلب۔

یوپیٹوریم پرف (Eup Perf): کونین کے استعمال کے بعد میحادی بخار میں بھوک لگے۔  
زنکم میٹ (Zincum Met): بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری کے احساس کے ساتھ بھوک۔

نیزم کارب (Natrium Carb): معدہ کے گڑھے میں خالی پن کا احساس۔ دوپہر سے پہلے ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے۔

ایلیئم سیٹروا (Allium Sat): بہت زیادہ کھانے کی عادت 'پیٹ'۔

وریٹرم ایلم (Veratrum Alb): دوران حمل بھوک، متواتر پیشاب کرنے کے ساتھ۔

اولیم جیک (Oleum Jec): سوکڑے والے بچوں میں بھوک۔

اگنیشیا (Ignatia): سگریٹ نوشی کی عادت کے ساتھ۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): ایسی بھوک جو کھانا کھانے سے بھی کم نہ ہو۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): بچے دودھ پینے سے انکار کر دیں اگر دودھ پینے تو درد ہونے لگے۔ پاخانہ سبز ہوتا ہے۔ تنفس میں دشمن ہوتی ہے۔

### بھوک، کھو جائے (Appetite- Lost)

نکس وامیکا (Nux Vom): ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ زبان پر پیچھے سے پیلے رنگ کا طبع ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ بد ہضمی ہوتی ہے۔

چائنا (China): بھوک نہیں ہوتی لیکن جب کھایا جائے تو بھوک لوٹ آتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): غذا، مشروبات یا سگریٹ نوشی کی خواہش مکمل طور پر جاتی رہتی ہے حالانکہ ان چیزوں سے نفرت نہیں ہوتی یا ان کا ذائقہ برا نہیں لگتا۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): بھوک مدھم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی رہتی ہے۔ غذا کی رغبت (شوق) نہیں ہو سکتی۔ غذا، دودھ، گوشت وغیرہ سے بے زاری ہوتی ہے۔ پیٹ پھولا ہوتا ہے۔ بگڑ اور تکی بڑھ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ اچھارہ ہوتا ہے۔ مٹکی ہوتی ہے اور قے ہوتی ہے۔

ہومارس (Homarus): بھوک کھو جاتی ہے، ساتھ میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ پیچھے مریضہ میں جلتے جلتے کی طاقت نہ رہی ہو۔ صبح کو جاگنے کے بعد گھلا دکھتا ہے۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vace Defl): بہت زیادہ مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس کے ساتھ بھوک کا جاتے رہنا۔

ایبلز این (Ables N): صبح کے وقت بھوک مکمل طور پر کھو جاتی ہے۔ جبکہ دوپہر کے وقت اور رات غذا کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے۔

جنٹیانالٹ (Gentiana Lut): بھوک کا عمومی طور پر جاتے رہنا یا عادی بیماری کے بعد بھوک کا جاتے رہنا۔ مدر ٹیچریا 3x طاقت کی خوراک کھانے سے آدھا کھنٹ قبل دیتے۔

پرونس ایس (Prunus S): چند لقمے لینے کے بعد پیٹ بھر جائے جیسے بہت زیادہ کھایا ہو۔  
اس علامت کے لئے لائیکو پوڈیم کو بھی آزمائیں۔  
کلیکریا آرسینیکم (Calcarea Ars): غذا کی خواہش نہیں رہتی لیکن ٹھنڈے پانی کی پیاس  
ہوتی ہے۔  
مرکیورس (Mercurius): بچے دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔

### کینسر (Cancer)

اور تھوگالم (Ornithogalum): معدہ کے زیریں حصہ اور اندھنی آنت دونوں کا سرطان۔ یہ  
دوا درختچہ کی صورت میں استعمال کرنی چاہئے اور چائے کے چمچے بھریانی میں ایک قطرہ ڈال کر  
دیتا چاہئے۔ اس دوا سے مریض کالے رنگ کا لعاب دار مادہ نکلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس  
سے بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔ اگر پہلی خوراک عمل نہ کرے تو دوسری خوراک 48 گھنٹوں کے  
بعد دی جاسکتی ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): پیٹ کے بالائی حصہ میں جلن اور اچھارہ کے ساتھ۔  
کونڈورانگو (Condunrango): معدہ کا سرطان، معدہ کے زیریں حصہ میں سخت گانٹھ دار  
سو جن ہوتی ہے۔

آرسنک الیم (Arsenic Alb): جلن اور بے چینی کے ساتھ۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی  
پیاس ہوتی ہے اور گرم چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔

چیلیڈونیم (Chelidonicum): معدہ کا سرطان۔ IM یا CM خوراک دیجئے۔  
فاسفورس (Phosphorus): پس پی ہوئی کافی جیسے مواد کی ترقی کے ساتھ۔ خصوصاً جب  
ناسوری کیفیت میں تبدیلی ہو۔ اونچی طاقت کی خوراک مثلاً IM یا CM دیجئے۔

### ڈکار (Erucations)

(تیز دیکھئے "درو معدہ" اور "پیٹ" کے ذیل میں "اچھارہ")

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): بلند آواز والے 'باغراط اور بغیر درد کے ڈکار ہوتے ہیں۔  
کاربوووج (Carbo Veg): معدہ میں تازہ ہوتا ہے۔ ڈکار آتے ہیں۔ جن کے ساتھ خوراک  
کا ذائقہ ہوتا ہے۔ دل کی جلن کے بغیر۔  
کاربوو انیس (Carbo An): کاربوووج کے بعد دی جائے۔ جب اچھارہ کھانے کی نالی کے منہ  
تک آجائے اور دباؤ اور دم گھٹنے کا باعث بنے۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): اعصابی بد ہضمی کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔  
 ایبیس نائنگ (Abies Nig): پیٹ کے بالائی حصہ میں ابلے ہوئے انڈے کی طرح سخت ڈھیلا  
 ہوتا ہے۔ جس میں درد کے احساس کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): اعصابی مریضوں میں اچھا رہ۔  
 سلفر (Sulphur): خوراک کے ٹکڑوں والے ڈکار آتے ہیں۔ جو بہت کھٹے ہوتے ہیں۔

اوسمیم (Osmium): مولی کے ڈکار۔  
 سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): دل خراب ہونے کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔ جن  
 سے مریض دانت دباتا ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): جو کچھ کھلایا ہوتا ہے۔ اس کے ذائقہ والے ڈکار آتے ہیں۔  
 مٹی ہوتی ہے اور تے کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔  
 بسمتھم (Bismuthum): ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد مٹی ہوتی ہے۔ پانی جیسے ہی معدہ تک  
 پہنچتا ہے تے ہو جاتا ہے۔ مواد منہ کی طرف شدت کے ساتھ اٹھتا ہے اور متعفن بو آتی ہے۔  
 پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ تے آتی ہے اور اسل للاحق ہوتے  
 ہیں۔ معدے کا سرطان۔

ایپی کاکووانہ (Ipecacuanha): مٹی ہوتی ہے۔ خالی ابکائیاں آتی ہیں۔ سوز کا گوشت کھانے  
 کے بد اثرات۔ مشروب اور غیر منضخم غذا کی تے ہوتی ہے۔ اسل کے ساتھ تے للاحق ہو۔  
 خون کی تے ہوتی ہے۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): کھٹے مواد (مائع) والے ڈکار معدہ کا سرطان دودھ کے علاوہ ہر  
 چیز تے ہو جاتی ہے۔ روئی یا سبزیاں تیزابیت کا باعث ہوتی ہیں۔ مزمن پیٹ کا نزلہ۔

فیرم آئیوڈینم (Ferrum Iodatum): غذا اوپر کی جانب دھکا کھاتی محسوس ہوتی ہے۔  
 کیوپرم میٹ (Cuprum Met): پانی پیتے وقت سنائی دی جانے والی آواز آتی ہے۔

برانی اونیا (Bryonia): کڑوے ذائقہ والے ڈکار آتے ہیں۔  
 ہائیڈروسائنگ ایسڈ (Hydrocynic Acid): پانی اس طرح سے لڑھکتا ہے جیسے خالی پیپے

میں ہو۔  
 آرسینیکم ایلبم (Arsenicum Alb): تیزابی (خراش دار) اور کڑوے ڈکاروں کے لئے یہ دوا  
 ہوتی ہے۔

سورینم (Phorinum): مزے انڈوں جیسے ذائقہ والے ڈکار ہوں۔  
 ایٹھوزا (Aethusa): کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ کے بعد غذا معدے سے ڈکاروں کے ساتھ

اور کو آتی ہے۔ قے اس تکلیف کو کم کرتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی اور درد ہوتا ہے۔  
پلساٹیلہ (Pulsatilla): جو کچھ کھایا ہو اس کے ذائقہ کے ساتھ متواتر ڈکار آتے ہیں۔ گریس  
 والے ڈکار۔

کیمومیلہ (Chamomilla): بطور عمل انگیز دوا کے اسے گرم پانی میں ملا کر دیا جاسکتا ہے۔  
 بشرطیکہ نشاندہی کی گئی دوائیں اثر کرنے میں ناکام ہو جائیں۔  
لاروسیرا کس (Laurocerasus): کڑوے باداموں جیسے ذائقے والے ڈکار آتے ہیں۔ مائع  
 معدہ میں آواز کے ساتھ لڑھکتا ہے۔

### غذا کا زہر (Food Poisoning)

نکس وامیکا (Nux Vom): خوراک کے زہر کے لئے یہ دوا چونی کی ہے۔ قے ہوتی ہے۔  
 معدہ میں درد ہوتا ہے۔ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): آکس کریم یا زیادہ پکے ہوئے پھل کھانے کے بعد۔  
ہیپتیشیا کیوپرم (Baptisia, Cuprum): دہائی یا زہریلا کھانا کھانے سے 'علامات کے مطابق  
 دوا کا انتخاب کیجئے۔

کاربووج (Carbo Veg): خراب اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے۔  
ہائوسکیمس (Hyoscyamus): کھانے کا زہر لاحق ہونے کے دوران (جھٹکے لگیں) دورے  
 پڑیں۔

نٹرم میور (Natrium Mur): شمد کھانے کے برے اثرات۔  
پلساٹیلہ (Pulsatilla): سرخ غذا کھانے کے بعد یا چاکلیٹ کھانے کے بعد۔  
ارجنٹم نائٹریکم (Argentum Nitricum): مکمل بے ہوشی لاحق ہو۔ حواس باقی نہ رہیں  
 اور جھٹکے لگیں۔ سیاہ رنگ کی قے ہوتی ہے۔

### درد معدہ (Gastralgia)

(نیز دیکھئے "ڈکار")

نکس وامیکا (Nux Vom): معدے کی اتھری کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ کھانے کی  
 خواہش باقی نہیں رہتی۔ کھانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ بد ہضمی اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔  
 معدہ کے بالائی حصہ سے درد شروع ہو کر اس کی لہریں کئی سمتوں کو جاتی ہیں جس کے ساتھ  
 تشنگی قے ہوتی ہے۔ اعصابی درد شکم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹہ کے بعد بے چینی

شروع ہو جاتی ہے۔ جب تکلیف شراب نوشی کے باعث لاحق ہو۔  
 کاربووٹیج (Carbo Veg): سست اور نامکمل ہاضمہ، معدہ اور انتڑیوں میں وزن ہوتا ہے۔  
 غشی ہوتی ہے اور معدہ خالی ہونے کا احساس رہتا ہے۔ کھانا کھانے سے بھی یہ احساس دور نہیں  
 ہوتا لیکن چند لمحے کھانے کے بعد پیٹ بھرا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ معدہ، سینہ اور پیٹ میں  
 شدید جلن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ جو مریض کو دہرا ہونے پر  
 مجبور کر دیتے ہیں۔ معدہ میں گرانی ہوتی ہے۔ ڈکار تیزابی، کھٹے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ معدہ  
 میں یا پیٹ کے بالائی حصہ میں اچھارہ ہوتا ہے۔

آرئس ویر (Aris Ver): بڑھی ہوئی تیزابیت کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ کھٹے اور کڑوے  
 ڈکار آتے ہیں اور تھمتے ہوتے ہیں۔ جس کے باعث مریض دانتوں کو دبالیٹا ہے۔  
 روبینیا (Robinia): جب آرئس ویر ناکام ہو جائے تو یہ دوا بڑھی ہوئی تیزابیت کے لئے  
 آزمائی چاہئے۔

پٹیلیائی (Ptelia T): درد سر کے ساتھ صغرا ہوتا ہے۔ مزمن سوزش معدہ، معدہ میں  
 مستقل گھٹنے کا احساس نیز مستقل حدت اور جلن ہو۔ قبض ہوتی ہے اور سہ پہر کے وقت بخار  
 ہو جاتا ہے۔ جگر سوج جاتا ہے۔ دبانے سے دکھن ہوتی ہے۔ مدھم اور مسلسل درد رہتا ہے۔  
 جگر میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ مزمن ورم جگر۔

چائنا (China): جب کہ سارے پیٹ میں ہی اچھارہ ہو اور پرورد تھوڑا موجود ہو۔ صرف  
 ڈکاروں سے ایک لمحے کے لئے افادہ ہوتا ہے۔ کھٹے یا کڑوے ڈکار آتے ہیں یا بدبودار ہوا خارج  
 ہوتی ہے۔ ہاضمہ سست ہوتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے پر ابتری ہو جاتی ہے۔ پیلے رنگ  
 کے اسمال لاحق ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت اور کھانا کھانے کے بعد ابتری ہو جاتا اس دوا کی  
 اہم و کلیدی علامت ہے۔ اس دوا میں جلن کے ساتھ بدبودار ڈکار نہیں آتے اور یہی علامت  
 اسے کاربووٹیج سے ممتاز کرتی ہے۔ اس دوائی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ اس میں کھانا ہضم  
 نہیں ہوتا لیکن لمبے عرصہ کے لئے معدہ میں پڑا رہتا ہے۔ جس کے باعث ڈکار آتے رہتے ہیں  
 اور پھر آخر کار غیر ہضم غذا آتے ہو جاتی ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): اسمال، لیس دار، کھٹے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ بچہ ہر بار جب  
 بھی اسے دودھ پلایا جائے یا کھانا کھلایا جائے، تھمتے کر دیتا ہے۔ زبان پر کافی موٹا سفید ملمع ہوتا  
 ہے۔ بچوں کے پیٹ کی مزمن خرابی، مسلسل متلی ہوتی رہتی ہے۔ معدہ میں ڈھیلا ہوتا ہے۔  
 تھوڑا اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): جب پیٹ کے زیریں حصہ میں اچھارہ ہو تو اس دوا کی



نشاندہی کی جاتی ہے۔ کھانے کی خواہش (بھوک) بہت شدید ہوتی ہے لیکن چند لمحے کھانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ بھرا ہوا ہو چنانچہ مریض کو کھانا چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ پلساٹیلہ اور اناکارڈیم کی طرح سے نہیں ہوتا کہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد طبیعت خراب ہو جیسا کہ ان دو ادویات میں ہوتا ہے۔ لائیو پوڈیم میں کھانے کے فوراً بعد ہی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ٹکس موسکاٹا میں بھی طبیعت کھانے کے فوراً بعد خراب ہوتی ہے لیکن اس میں کمر کے قریب دباؤ کی برداشت نہیں رہتی ہر وقت نہیں جیسا کہ ٹیکیس میں ہوتا ہے۔ اس دوا کی ایک اور اہم علامت مٹھائیاں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ دوا تیزابی بد ہضمی کی کیفیت کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ کھٹے ذکار آتے ہیں اور تے ہوتے ہیں۔ جب بھی تے آتی ہے تو یہ کھٹی ہوتی ہے۔ معدہ کے گڑھے میں پردرد سوجن ہوتی ہے۔ گیس والے ذکاروں سے کوئی افادہ نہیں ہوتا۔ پیشاب میں سرخ ریت خارج ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں درد قریح ہو۔

**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** منہ خشک ہوتا ہے۔ صبح جاگنے پر منہ کا ذائقہ متعفن ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ غذا سینے میں بھری ہوئی ہے۔ یہ اس دوا کی بنیادی علامات ہیں۔ زبان پر موٹے، کمزورے اور سفید کانٹے پڑے ہوتے ہیں۔ تیزابیت ہوتی ہے اور دل کی جلن ہوتی ہے۔ غذا کا ذائقہ کڑوا، کھٹا یا بدبودار ہوتا ہے۔ منہ میں بھرنے والے پانی اور ذکاروں کا ذائقہ کھائی ہوئی غذا والا ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔ صرف منہ کو گیلیا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ برا ذائقہ پلساٹیلہ کی خصوصی علامت ہے۔ یہ دوا مرغن غذاؤں، سٹور کا گوشت، پیمٹری یا مشکل غذاؤں (مٹی جلی غذا) کے کھانے سے لاحق ہونے والی بد ہضمی میں خاص طور سے مفید ہوتی ہے۔ مریض کو ٹھنڈ لگتی ہے لیکن گرمی سے مرض میں ابتری واقع ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ ٹکس وامیکا کے برعکس جس میں ابتری صبح کے وقت ہوتی ہے۔

**ڈوری فورہ (Doryphora):** معدہ اور دیگر اعضاء میں جلن ہوتی ہے۔

**اناکارڈیم (Anacardium):** کھانے کے بعد بہت زیادہ افادہ ہو جاتا ہے اور یہی اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ڈوبنے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور معدہ میں بھرم درد ہوتا ہے جو کہ ریزھ تک پھیل جاتا ہے۔ بے ذائقہ ذکار آتے ہیں۔ کبھی کبھی کھٹے بھی ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** خوراک منہ کو آتی ہے۔ ٹھنڈی غذا کی طلب ہوتی ہے جو کہ معدے میں جا کر جیسے ہی گرم ہوتی ہے۔ تے ہو جاتی ہے۔ مٹی کے بغیر خون تھوکتا بھی اس دوا میں عام ہے۔ معدہ میں خالی پن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے جبکہ سلفر اور سیپیا میں ایسی

کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت بڑھ کر آنتوں تک چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات جلن کندھے کی ہڈیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ مزمن بد ہضمی میں تے کا آنا۔ یہ دوا توڑ پھوڑ اور انتشار کے عمل کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتی ہے لہذا یہ دوا سرطانوں، غیر میعادى امراض اور گوشت کو کاٹنے والے امراض وغیرہ کی ادویات میں سے ایک ہے۔ جلن دار کترنے والے اور محدود جگہوں پر ہونے والے وغیرہ کی ادویات میں سے ایک ہے۔ جلن دار کترنے والے اور محدود جگہوں پر ہونے والے درد اس دوا میں بنیادی ہیں۔ گوشت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

**شانم (Stannum):** درد معدہ مریض کو چمک قدمی پر مجبور کر دیتا ہے۔ تاکہ کچھ آرام حاصل کر سکے لیکن کمزوری اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ جلد ہی مریض کو آرام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سخت دباؤ سے دردوں کو افاتہ ہوتا ہے۔

**جیشیاناسی-کیو (Gentiana C.O):** معدہ پر دباؤ پڑتا ہے۔ جیسا کہ پاخانہ کی حاجت ہو۔ اس کے ساتھ تے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔

**اکونائٹ نیپ (Aconite Nap):** معدہ میں اور معدہ کے گڑھے میں دباؤ ہوتا ہے جیسا کہ وہاں سخت پتھر پڑا ہو۔

**ایسکولس ہپ (Acsculus):** معدہ میں بہت زیادہ جلن والی تکلیف ہوتی ہے۔ دباؤ ہوتا ہے جیسا کہ معدہ کے گڑھے میں پتھر پڑا ہو۔ ہوا کے خالی ڈکار آتے ہیں۔

**گرافائٹس (Graphites):** درد معدہ کھانے سے رفع ہو۔ معدہ کے بالائی حصہ میں ہونے والے شدید درد کو دور کرنے کے لئے مریض کھانا کھانے میں غلٹ کرتا ہے۔ خصوصاً شام کا کھانا کھانے میں اور رات کا کھانا کھانے میں۔

**آرسنک البم (Arsenic Alb):** معدہ کی خرابی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پریشان کر دینے والی بد ہضمی اور حاد سوزش ہوتی ہے۔ چیٹ درد اور اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ جلن دار درد جس کے ساتھ متلی اور تے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی علامت ہے۔ معدہ حساس ہو جاتا ہے اور دکھتا ہے۔ مریض کو بہت زیادہ نفاہت ہوتی ہے۔ پھل یا آئس کریم کھانے سے معدہ میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔

**ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum):** بہت زیادہ اچھارہ ہو جاتا ہے۔ جس میں افاتہ ڈکاروں سے ہوتا ہے۔ معدہ کے گڑھے میں کترنے والا اور ناسوری کیفیت والا درد ہوتا ہے۔ اس درد کی لہریں معدہ کے گڑھے سے شروع ہو کر ہر جانب پھیل جاتی ہیں۔ خصوصاً نازک اندام اور اعصابی مستورات میں درد معدہ۔ اس دوا کی نشاندہی ایسی صورت میں بھی کی جاسکتی

ہے جب کہ درد معدہ کا باعث جذبات ہوں، نیند کھو جانا ہو یا حیض کی تکلیف ہو۔ معدہ میں ایک ڈھیلا موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بلغم کی قے ہوتی ہے جو کہ رسی دار ہو سکتا ہے۔ شکر کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ حالانکہ مٹھائیاں تکلیف کو بڑھا دیتی ہیں اور اسہال وغیرہ لاحق کرتی ہیں۔ معدہ کا ناسور کھانے کے بعد درد میں ابتری ہو جاتی ہے۔ نیز دباؤ سے بھی ابتری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خون، بلغم وغیرہ کی قے ہوتی ہے۔ مزمن درد معدہ، نوذائیدہ بچوں میں قوبح کا درد۔

**پشرو سیلینیم (Petroselinum):** معدے اور آنتوں کی تکلیفات کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔  
**کالچیکم (Colchicum):** معدہ میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔  
**ہیپومانس (Hippomanes):** معدہ میں برقی ٹھنڈک ہو۔ چھٹی یا تیسویں طاقت کی خوراک دیتے۔

**گرے شیولا (Gratiola):** معدہ میں تیزابیت گھٹیا کے ساتھ۔  
**نیٹرم سلف (Natrurn Sulph):** نمی کے باعث عمومی صفراوی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**نیٹرم کارب (Natrurn Carb):** دودھ پینے سے اسہال لاحق ہو جائیں۔ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ معدہ میں درد ہو جو کھانے سے رفع ہوتا ہے۔ درد مریض کو صبح سویرے کھانے کے لئے بستر سے نکال لیتا ہے۔

**نیٹرم فاس (Natrurn Phos):** جے ہوئے دودھ کی قے کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ زیادہ تیزابیت ہوتی ہے۔ مٹھائیوں کی بو کھٹی محسوس ہوتی ہے۔ معدہ کی حالت تیزابی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ تیزابی (خراب) مائع کی قے ہوتی ہے اور مٹلی ہوتی ہے۔ کھٹے ذکار آتے ہیں۔ سر کے کی طرح کا کھٹا مواد قے میں نکلتا ہے۔ کھٹے مواد کے منہ کی طرف چڑھنے کے ساتھ معدہ میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

**لیک ویک ڈیفیل (Lac Vace Defl):** معدوی سوزش، مزمن اسہال اور قے۔

**فاسفورس، فیرم میٹ، آرسنک البم، ایسکولس ہیپ (Ferrum Met, Phosphorus, Aesculus Hip, Arsenic Alb):**

بد ہضمی، جیسے ہی خوراک نگلی جائے وہ کھٹی ہو جاتی ہے اور مریض ذکار لینے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد ہی غذا کی کھائی ہوئی اشیائے ہو جاتی ہیں۔ دل جلتا ہے اور معدہ میں مستقل جلن رہتی ہے۔ معدہ کی سوزشی کیفیت۔

**انٹیم کروڈ (Antim Crud):** دماغی علامات کے ساتھ معدہ کی خرابی، مرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ قے اور / یا مٹلی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد غذا منہ کی طرف چڑھتی ہے۔ 200 طاقت

کی یا IM طاقت کی خوراک دیجئے۔

نکٹن تھرس (Nyctanthes): متلی اور تے کے ساتھ معدہ میں جلن ہو۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): آنتوں کی سوزش، معدہ میں جلن ہوتی ہے۔ پیٹ سوچ جاتا ہے اور ذہول کی طرح تن جاتا ہے۔ بھالے لگنے جیسے، کانٹے جیسے اور ٹختر لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ پانی لورس میں درد ہوتا ہے۔ خون والے پیشاب کے ساتھ خون والے اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

برائی اونیا (Bryonia): معدوی بخاروں، نزلے اور جاڑے کے ساتھ معدے کی خرابی لاحق ہو۔ ٹھنڈ اور جاڑے کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے۔

کروٹیلز ہور (Crotalus Hor): یہ صفرا کی حیران کن دوا ہے۔ درد سر کے ساتھ کالے رنگ کے صفراوی مواد کی بڑی مقدار میں تے ہوتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): حمل والا درد معدہ، جب کبھی معدہ خالی ہو تو درد لاحق ہو جائے۔ مسلسل کھانے سے افادہ ہوتا ہے۔

ایسڈ سیل سیک (Acid Salicylic): معدہ کی تیزابیت۔

ویلرین آف (Velariana Off): معدہ کی اعصابی خرابی۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): جب ہائیڈروکلورک ایسڈ کا استعمال اعتدال سے بڑھ جائے۔

الیومن (Alumen): ضدی قسم کی قبض کے ساتھ، درد معدہ لاحق ہو۔ متلی، تے اور مواد کا منہ کی جانب چڑھنا وغیرہ لاحق ہو۔ IM یا CM طاقت کی دوا دیجئے۔

معدہ کے ناسور (Gastric Ulcers)

(دیکھئے "پیٹ" کے ذیل میں "ناسوری کیفیت")

کلیجے کی جلن

Heartburn (Pyrosis)

ایپیکاک (Ipec): متلی یا تے اور بے تحاشہ اچھارے کے ساتھ دل کی جلن (کلیجے کی جلن) لاحق ہو۔ یہ دوا منہ میں بھی موزوں ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): اچھارے اور بہت زیادہ تیزابیت کے ساتھ دل کی جلن ہو لیکن اس کے ساتھ متلی یا تے نہیں ہوتی۔ کریم والی پشیم کا طبع زبان پر ہوتا ہے۔ عمومی طور پر

معدہ خراب رہتا ہے۔ جب اپیکاک ناکام ہو جائے تو یہ دوا کامیاب ہوتی ہے۔ اسے اپیکاک کے تادلے میں بھی دیا جاسکتا ہے۔

گلیکیریا کارب (Calcarea Carb): معدہ میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ خراش دار (تیزانی) ڈکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ڈکاروں کا ذائقہ کھٹا اور بعض اوقات کھاری ہوتا ہے۔ معدہ کے اوپر دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ غذا اور بلغم دلی تے ہوتی ہے۔

سٹیفنی سیکریا (Staphysagria): سگریٹ نوشی کے باعث دل جلتا ہے۔

آرسنک ایلیم (Arsenic Alb): گندا، کڑوا یا کھٹا ذائقہ ہوتا ہے۔ خوراک کی ٹالی میں اور حلق میں گرم جلن کا احساس ہوتا ہے۔ کھٹے، خراش دار مائع والے ڈکار آتے ہیں۔ خون آلود پتلے بلغم کی تے آتی ہے اور ڈکار آتے ہیں۔ معدہ میں درد اور سخت پریشانی کے ساتھ بازو اور ٹانگیں کپکپاتی اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بے قاعدہ اور متواتر نبض ہوتی ہے۔

### ہچکی (Hiccough)

نکس وامیکا (Nux Vomica): بد ہضمی، تے اور اسہال کے ساتھ ہچکی لاحق ہو۔

انیشیا (Ignatia): جب کھانے اور سگریٹ نوشی کے باعث ہچکی میں اضافہ ہو جائے۔ جس کے ساتھ معدہ کا بالائی حصہ خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تمباکو چبانے سے تکلیف دہ ہچکی لاحق ہو۔ خاموش غم، صدمہ یا مایوسی کے باعث بھی ہچکی لاحق ہو سکتی ہے۔ کھانے اور پینے کے بعد ہچکی لاحق ہو۔

رٹانیا (Ratanhia): کھانے کے بعد جلد ہی شدید قسم کی ہچکی لاحق ہو۔ خصوصاً جب طویل عرصہ سے غذا نہ کھائی ہو۔ معدہ میں ہوا بھری ہونے یا پیٹ میں ہوا ہونے کے بعد جس سے پیٹ تن جاتا ہے، ہچکی کا حملہ ہو۔

سٹا (Cina): شدید ہچکی لاحق ہو۔ جب رٹانیا ناکام ہو جائے تو اسے آزما یا جاسکتا ہے۔

کوکولس انڈ (Cocculus Ind): پردہ شکم کے کھینچی دردوں کے ساتھ ہچکی۔

ہائوسائیمس (Hyoscyamus): پیٹ کی جراحی کے بعد لاحق ہونے والی ہچکی۔

ٹیو کریئم (Teucrium): دودھ پلانے کے بعد جھکوں والی ہچکی۔

چائنا آف (China Off): کونین کے غلط استعمال کے بعد ہچکی لاحق ہو۔ ہچکی جس کے باعث درد سر لاحق ہو۔

ایمن میور (Ammon Mur): بھرپور کھانا کھانے کے بعد معدہ میں خالی پن کے ساتھ کترین کا احساس نیز سینہ میں ٹانکے لگنے کے احساس کے ساتھ ہچکی لاحق ہو۔

رینن کولس نی (Ranunculus B): شراب نوشی کے بعد ہجلی لاحق ہو۔ شرابیوں کی ہجلی، متواتر ڈکاروں کے ساتھ شدید ہجلی لاحق ہو نیز جھٹکے لگیں۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): شدید ہجلی کے لئے دوا ہے۔ خواہ مزمن ہو یا حاد۔ خصوصاً زیادہ مقدار میں کونین استعمال کرنے کے باعث ہجلی لاحق ہو۔

سائیکلے من (Cyclamen): حمل کے دوران ہجلی لاحق ہو۔ جس کے ساتھ صبح کے وقت تے آتی ہے یا نہیں آتی۔ کھانے کے بعد ہجلی لگے۔

سٹرامونیم (Stramonium): گرم مشروبات پینے کے بعد تھوک پینے کے ساتھ بہت شدید قسم کی ہجلی لاحق ہو۔

وریٹرم البم (Veratrum Alb): گرم مشروبات کے بعد ہجلی لاحق ہو۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): ٹھنڈے مشروبات پینے کے بعد ہجلی لگے۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): ٹھنڈے مشروب یا سگریٹ پینے کے بعد ہجلی لاحق ہو۔

کاجوچٹم، ایسڈ سلف (Acid Sulph, Cajuputum): معمولی اشتعال سے ہجلی لاحق ہو جائے۔ زبان سوجی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خوراک کی ٹالی میں تکلیف ہوتی ہے۔

وریٹرم ویر (Veratrum Vir): مسلسل ہجلی رہے۔ کھانے کی ٹالی کے بالائی سرے میں تشنجی دورے ہونے کے ساتھ درد ہو۔

### اشتہا (Hunger)

(دیکھئے ”بھوک“ بڑھی ہوئی یا کھو جائے“)

بڑھی ہوئی تیزابیت (Hyper-Acidity)

(دیکھئے ”درد معدہ“)

کم تیزابیت (ہائیدروکلورک ایسڈ کی کمی)

(Hypo-Acidity)

(Deficiency of Hydrochloric Acid)

سٹرائکینینم نائٹ (Strychninum Nit): کم تیزابیت کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا معدے کے رس اور تیزاب کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔

کاربووینج (Carbo Veg): تیزابیت کے نہ ہونے یا کم ہونے کے لئے یہ چوئی کی دوا ہے۔  
 ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): مشروب حلق اور معدہ میں لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا فقدان جب معدہ خالی ہو تو درد معدہ لاحق ہو جائے۔

### متلی (Nausea) (دیکھئے ”قے“)

ناسوری کیفیت (Ulceration)  
 (دیکھئے ”پیٹ“ کے ذیل میں ”ناسوری کیفیت“)

### قے (Vomiting)

ایپیکاوانہ (Ipecacuanha): یہ دوا متلی اور قے کے لئے چوئی کی ہے۔ منہ تر رہتا ہے۔  
 تھوک زیادہ ہوتا ہے۔ غذا، صفرا، خون یا پلغم کی قے ہوتی ہے۔ ہلکی ہوتی ہے۔ زبان صاف ہوتی ہے۔ مریض غش کھا کر کر جاتا ہے۔ معدہ میں منجھڑ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ متلی، قے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ حیض سے قبل دل کی جلن ہوتی ہے اور قے آتی ہے۔  
 انٹیم کروڈ (Antim Crud): زبان پر سفید طبع کے ساتھ قے ہونا اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔ مریض جیسے ہی کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے قے ہو جاتا ہے۔ بدترین قسم کی قے جسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔

ایتھوسا (Aethusa): بچوں کی قے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ بچہ کچھ کھانے یا دودھ پلائے جانے کے بعد فوراً ہی قے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور یہ اس دوا کی کلیدی علامت ہے۔ بچہ تھکاوٹ کے باعث پیچھے کو گر جاتا ہے۔ قے ہتے ہوئے سبز رنگ کے مواد والی ہوتی ہے۔ مریض قے کے فوراً بعد بھوک محسوس کرتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): شخص میں دقت کے ساتھ معدہ کے بالائی علاقہ میں وزن کا احساس ہوتا ہے۔ ایکائیوں کے ساتھ متلی ہوتی ہے۔ پاخانے کی حاجت کے ساتھ جو کہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، تو لمبی درد لاحق ہو۔ ٹھنڈ لگتی ہے، کپکپاہٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): بد ہضمی کی مزمین قے میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی قے میں افادہ پیدا کرتا ہے لیکن جیسے ہی معدہ میں پہنچ کر گرم ہوتا ہے قے ہو جاتی ہے۔ معدہ کے ناسور اور سرطان میں خون والی قے کے لئے

بھی یہ دوا مفید ہے۔

آئرس ویر (Iris Ver): بے انتہا کھٹے مواد کی قے ہوتی ہے۔ یہ مواد اتنا کھٹا ہوتا ہے کہ مریض دانت بھیج لیتا ہے۔ یہ قے طلق کو چسپیل کر رکھ دیتی ہے۔ رسی دار تھوک ہوتا ہے۔  
کروٹیلس ہوری ڈس (Crotalus Horridus): قے اور اسہال لاحق ہوں۔ جن کے ساتھ متلی اور پیشاب کی تکلیف لاحق ہو۔ نیز ان کے ہمراہ اذیت ناک درد بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں سیاہ صفرا والی قے ہوتی ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): کھانا کھانے کے بعد قے لاحق ہو۔ جو کھانا کھایا ہوتا ہے قے ہو جاتا ہے۔ اس میں جھٹکے بھی ہو سکتے ہیں اور اینٹھن بھی۔  
کالچیکم (Colchicum): کچی ہوئی غذا کی بو سے خصوصاً پھلی 'انڈوں اور پکنائی والے گوشت سے متلی اور قے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے کمرے یا باورچی خانہ میں موجود غذا کی بو سے بھی مریض کو متلی ہونے لگتی ہے۔

لاروسیراس (Laurocèrasus): گرم چولے کے قریب آنے سے متلی ہو۔  
یوجینیا جمبوس (Eugenia Jambos): سگریٹ نوشی سے متلی میں بہتری ہو۔  
سینگونیریا (Sanguinaria): معدہ میں جلن کے ساتھ متلی ہوتی ہے۔ تیز روشنی سے اینٹھن والا درد ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): قے ہوتی ہے حتیٰ کہ نگلیہ سے سر اٹھانے پر بھی قے ہو جائے۔ تیز روشنی کے باعث قے ہوتی ہے۔

سٹروفینٹھس (Strophanthus): معدہ اور خوراک کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے اور قے ہوتی ہے۔ اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز دیگر دل کی تکالیف ہوتی ہیں۔  
 استسقاء خصوصاً پاؤں کا۔

نکٹنٹھس (Nyctanthus): معدہ میں جلن کے ساتھ متلی اور قے ہوتی ہے۔  
کالکیریا میور (Calcareia Mur): خمدی قسم کی قے لاحق ہو۔

ایسڈ کاربولک (Acid Carbolic): شرابیوں کی قے پیٹ کے بالائی حصہ میں وزن کے ساتھ عام قسم کی قے ہو۔ معدہ میں جلن ہوتی ہے۔

ٹیباکم (Tabacum): تمباکو کے غلط استعمال کے باعث قے ہو۔  
کیکیور بیٹا پیپو (Cucurbita Pepo): قے اور متلی۔ شدید قسم کی۔۔۔ دوران حمل کھانے کے بعد۔

سائیکلے من (Cyclemen): صبح کے وقت متواتر قے ہو۔ اچھا رہتا ہے۔ معدہ میں درد



ہوتا ہے۔

مزیریم (Mezerium): تے یا مٹلی جو کھانے کے بعد غائب ہو جائے۔ شراب کی (نہ کہ پانی کی) تے جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): کھانے کے بعد مٹلی غائب ہو جائے۔ صبح کے وقت اجڑی ہوتی ہے۔ حیض کے بعد تے ہونے لگے اور دل میں جلن ہو۔

کوکولس (Cocculus): معدہ کی بجائے دماغی تکلیف کے باعث تے ہو۔ درد شقیقہ یا دماغ کی رسولی کے باعث تے لاحق ہو۔ غذا کے خیال سے یا دوسرے کمرے سے یا باورچی خانہ سے آنے والی غذا کی بو سے مریض کو مٹلی ہونے لگتی ہے۔ بلند آواز سے بولنے کے باعث تے لاحق ہو یا کھانسی ہو جائے۔ مٹلی سر یا منہ میں محسوس ہوتی ہے۔

روٹا (Ruta): مٹلی امعاء مستقیم میں محسوس ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): معدہ میں ناسور کے باعث خون کی تے ہو۔

ڈائسکوریا (Dioscorea): مٹلی کانوں میں محسوس ہو۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): حیض کے دنوں میں تے ہوتی ہے اور دل جلتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب تے یا ابکائیاں معدہ کی کمزوری کے باعث ہوں۔ غیر منہضم غذا جسے کھائے ہوئے کچھ گھنٹے گزر جائیں تے ہو جاتی ہے۔ یا پھر تے کی وجہ پاخانہ کی بو یا کسی دوسری گندی شے کی بو ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد غذا کی تے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مسلسل مٹلی ہوتی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد معدہ میں جلن دار درد ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی طاقت کی خوراک ٹاکام ہو جائے تو 200 طاقت کی خوراک آزمائی جائے۔

وےسپا (Vespa): کرم چوڑے کے قریب جانے سے یا کرم کمرے میں جانے سے تے ہوتی ہے اور غش آتا ہے۔ غصہ یا جوش کے باعث بھی تے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): بہت زیادہ پسینہ آنے اور تھوک آنے کے ساتھ تے لاحق ہو۔

تھیرائیڈین (Theridion): بہ شور کے باعث مٹلی ہو۔

ویلرینا (Valeriana): ماں اگر غصہ میں ہو اور بچے کو دودھ پلا دے تو دودھ پلاتے ہی بچہ اٹھیاں کرنے لگ جاتا ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): انیون اور مارفین کے استعمال کے بعد تے اور تکلیف دہ قسم کی مٹلی اور ابکائیاں لاحق ہو جائیں۔

اگنیشیا (Ignatia): قے۔۔۔ افادہ ہوتا ہے ناقابل ہضم اشیاء کھانے سے اور اضافہ ہو جاتا ہے قابل ہضم یا زود ہضم اشیاء مثلاً دودھ وغیرہ کے استعمال سے۔ کچی گوبھی، کترا ہوا پیاز اور آلو قے کو روک دیتے ہیں۔

کروشن ٹنگ (Croton Tig): بصارت کھو جانے کے ساتھ قے اور بڑھی ہوئی متلی لاحق ہوتی ہے۔ چکر آتے ہیں۔ شراب نوشی کے بعد ابتری ہو جائے۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): معدہ جواب دے جائے۔ کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی اور ہر چیز قے ہو جاتی ہے۔ مریض خاموش رہنا چاہتا ہے اور آرام سے مرجانا پسند کرتا ہے۔ وہ بلایا جانا یا بولنا پسند نہیں کرتا۔ سیاہ رنگ کی قے ہوتی ہے۔ جلن دار اور کاٹنے والا درد معدہ میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شدید قسم کی متلی اور قے ہوتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی چیز بھی جیسے ہی ہونٹوں کو چھوتی ہے قے ہونے لگتی ہے۔

بوریکس (Borax): مسلسل قے ہوتی رہے۔ کھٹے مواد کی قے ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد تھوؤ والا اچھارہ ہو جاتا ہے۔

ایسڈ سلفیورک (Acid Sulphuric): کھٹی اور تیزابی قے لاحق ہو۔ بچے کو مکمل طور پر صاف کرنے کے باوجود اس سے کھٹی بو آتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): قے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اس میں صرف غذا کی قے ہوتی ہے۔ کھانے یا پینے کے بعد۔

پلمبم (Plumbum): پاخانے کا مادہ (یعنی پاخانہ) قے ہوتا ہے۔

کروسیلیس ایچ (Crotalus H): سیاہ رنگ کی قے لاحق ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): منہ کڑوا ہونے کے ساتھ نیز عام کھٹاس کے ساتھ سیاہ روشنائی جیسے رنگ کے مادے کی قے لاحق ہو۔

### پانی منہ میں بھرنا (Waterbrash)

مرک سول (Mer Sol): متواتر نکلنے کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا اس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): منہ میں خراش دار (تیزابی) پانی بھر آتا ہے۔ جو منہ میں دھکن پیدا کرتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): دوران حمل، اینٹھن کے ساتھ یا اینٹھن کے بغیر منہ میں پانی کا بھر آنا۔ متلی کے ساتھ یا متلی کے بغیر۔ بد ہضمی میں یہ کیفیت ہو۔

نکس دامیکا (Nux Vomica): دل کی جلن کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا، درد قویخ کے ساتھ، بد ہضمی کے ساتھ، کھانے کے بعد۔

گنیشیا میور (Magnesia Mur): درد سر کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا، دودھ کو ہضم کرنے کی ناقابلیت جس کے باعث پیٹ میں درد ہو جائے۔ بدبودار ڈکار آتے ہیں۔ معدہ خراب ہو جاتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): حیض سے قبل اور حیض کے دوران منہ میں پانی کا بھر آنا لاحق ہو۔ رات کے وقت۔

پٹرولیم (Petroleum): منہ کی جلن کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا۔ صبح کے وقت۔

کاربوائٹیلس (Carbo An): نمکین پانی کا منہ میں بھر آنا، جو منہ سے باہر بہنے لگتا ہے۔

کیورارے (Curare): رحم کے ناسور میں، منہ میں پانی کا بھر آنا لاحق ہو۔

سیلیشیا (Silicea): جاڑے کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا۔

سیپیا (Sepia): شراب نوشی کے بعد منہ میں پانی کا بھر آنا۔

برائی اونیا (Bryonia): تیزابی پانی کا منہ میں بھر آنا، بے ذائقہ پانی منہ میں بھرے، ابکائیوں کے ساتھ۔

چیلیڈونیم (Chelidonium): کڑوے ذائقے والا پانی منہ میں بھرے۔

حصہ سوم۔۔۔ جگر اور تلی

جگر کے امراض

(Ailments of Liver)

چیلیڈونیم (Chelidonium): جب جگر کی لو، دائیں لو (یعنی دایاں پہلو) متاثر ہو۔ مریض دائیں پہلو (یعنی جگر کی دائیں لو) میں درد محسوس کرتا ہے۔ جو پھوٹنے پر نرم محسوس ہوتا ہے۔ یہ دوا یرقان کے لئے مخصوص ہے اور چھٹی طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ یہ دوا جگر کے علاقہ والے درد کو بھی دور کرتی ہے جو کہ پھیل کر دائیں کندھے کی ہڈی اور چھاتی نیز معدہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دوا جگر کے امراض کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ دوا جگر سے پتلا اور زیادہ مقدار میں صفراوی مادہ خارج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ جگر کی پتھری نکالتی ہے اور مزید پتھری بننے سے روکتی ہے۔ اس میں درد تیز اور بھالے لگنے جیسے ہوتے ہیں۔ گرم مشروبات کے باعث تے لاحق ہوتی ہے۔

**کارڈوس ایم (Carduus M):** یہ جگر کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جب کہ جگر کے بائیں پہلو میں سوزش ہو یا پھر وہ متاثر ہو۔ یہ دوا در نچکر کے پانچ سے دس قطروں کی صورت میں دینی چاہئے۔ یہ جگر کے سرطان کے دردوں کو رفع کرتی ہے۔ مدہم درد سر کے ساتھ یرقان ہوتا ہے۔ تے اور متلی ہوتی ہے۔ پیشاب کا رنگ سنہری پیلّا ہوتا ہے۔ جگر کے داغ اس کی مخصوص علامت ہے۔

**مائی ری کاسیری فیرا (Myrica Cerifera):** یہ ایک اہم دوا ہے۔ گو یہ دوا بہت کم استعمال کی گئی ہے۔ یہ دوا نزلاوی یرقان میں مفید ہے۔ مدہم درد سر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت انتہی ہوتی ہے۔ آنکھیں میلی، گندی اور پیلاہٹ مائل رنگت والی ہوتی ہیں۔ زبان پر زرد طبع ہوتا ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے اور عضلات میں دکن، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ نبض ست ہوتی ہے اور گہرے رنگ کا پیشاب ہوتا ہے۔ دائیں جانب میں پیسلوں کے نیچے درد ہوتا ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ تیزابیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ نا آسودہ نیند، یعنی نیند سے بےاشت حاصل نہیں ہوتی۔

**نکس وامیکا (Nux Vomica):** شراب نوشی کے بعد (یعنی شراب کے بد اثرات کے بعد) جگر کی تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ مصالحوں والی غذا، کوئین یا مسبات کے استعمال سے جگر کی تکالیف لاحق ہوں۔ جگر کی خرابی ہو سکتا ہے کہ درد قویٰ بھی موجود ہو۔ مرغن غذاؤں کے استعمال سے یرقان لاحق ہو۔ نظام ہضم آسانی کے ساتھ خراب ہو جائے۔ پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ غصہ کے دورے کے بعد یرقان لاحق ہو۔ مریض عموماً چڑا اور صبح کے وقت غصیلّا ہوتا ہے۔ جگر میں ناموزوں صفرا کے بننے کے باعث دل شکستگی اور یرقان لاحق ہو۔

**کالی آیوڈائیڈ (Kali Iodide):** آشک کے تیسرے درجہ میں جگر کا بڑھ جانا لاحق ہو۔ **ریفٹس (Raphrus):** جگر میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ ابکائیاں آئیں اور تے ہو۔ کھانے کی خواہش نہیں رہتی۔ پیٹ تنا ہوا، ڈھول کی طرح سے بچنے والا اور سخت ہوتا ہے۔ ناف کے قریب جکڑن ہوتی ہے۔

**وائپرا (Vipera):** جگر کے بڑھ جانے میں شدید درد لاحق ہو۔ جس کے ساتھ یرقان اور بخار ہوتا ہے۔ درد جگر سے پھیل کر کندھوں اور کولہوں تک چلا جاتا ہے۔ خون والے پانخانے آتے ہیں۔

**تھیرائیڈین (Theridion):** جگر کی سوزش (یعنی پھوڑا) جگر کے علاقہ میں شدید قسم کا جلن دار درد ہوتا ہے۔ ابکائیاں آتی ہے اور صفراوی تے ہوتی ہے۔

**لکیس (Lachesis):** جگر میں جلن دار اور حاد درد ہوتا ہے۔ جو معدہ تک پھیل جاتا ہے۔

جگر میں سوزش ہوتی ہے اور جگر نرم ہو جاتا ہے۔ جگر کا پھوڑا، جگر کی پتھری ہوتی ہے۔ پیٹ سخت اور تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دباؤ برداشت نہیں ہو سکتا۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): جگر کو چھونے سے حساسیت ہوتی ہے اور جگر میں تھکاو کا احساس ہوتا ہے۔ درد مدہم اور دکھن والے ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ تیز اور بھالے لگنے جیسے ہوں جیسا کہ پیلیڈونیم میں ہوتا ہے۔ تھوڑی مقدار میں کھانے سے معدہ میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): یہ ایک عمل انگیز دوا ہے اور علاج کی تکمیل کے لئے استعمال ہونی چاہئے۔ یہ صفرا کے بہاؤ میں اضافہ کرتی ہے۔ جگر میں درد اور دکھن زیادہ ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): جگر کی چربی کا بگاڑ لاحق ہو۔ جس کے ساتھ نمایاں قسم کی دکھن اور برقان ہوتا ہے۔ پاخانے بھورے مائل سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ دوا جگر کے جان لیوا قسم کے امراض میں مفید ہے۔

پتیلیائی (Ptelia T): جگر کے علاقہ میں دکھن اور بھاری پن ہوتا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث کھچاؤ کا احساس ہوتا ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): جگر کی لاغری جو کہ پیٹ کے تھکاو کے ساتھ ہو یا پیٹ کے تھکاو کے بغیر ہو۔ پیٹ کی جلد میں خارش ہوتی ہے۔

نٹرم سلف (Natrum Sulph): بہت زیادہ بڑھا ہوا جگر، گھٹیا دوی طبیعت، جگر کے علاقہ میں دکھن ہوتی ہے۔ منہ میں برا ذائقہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرو میں درد ہوتا ہے۔

مرک سلف (Merc Sulph): پتہ پر ڈھیلا ہونے کے ساتھ جگر کا بڑھ جانا، بخار ہوتا ہے۔ جگر میں درد ہوتا ہے۔ پاخانے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ قبض ہوتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ جسم میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔

ٹیریکس کم (Taraxacum): جگر کے علاقہ میں درد اور دکھن ہوتی ہے نیز صفراوی اسہال ہوتے ہیں۔ زبان نقشہ دار ہوتی ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد جاڑا ہوتا ہے۔ جگر بڑھا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔ تلی اور جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ انگلیوں کے پورے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

سیلیا (Silicea): پھوٹے بچوں کے جگر کے لئے۔ پاخانہ کرنے میں دقت ہوتی ہے اور اکثر بچے چلاتے یا روتے ہیں۔ سر پر پھیند ہوتا ہے۔ پہلے 200 طاقت کی اور پھر 1000 طاقت کی خوراک دیجئے۔

چیونٹھس (Chionanthus): جگر کا بڑھ جانا اور جگر میں رکاوٹ پیدا ہو جانا۔ قبض ہوتی ہے۔ مٹی کے رنگ کا پاخانہ ہوتا ہے۔ مزمن برقان ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Ars Alb): کونین کے استعمال کے باعث بخار کے دب جانے کے باعث جگر میں درد ہو اور جگر بڑھ جائے۔ 1x طاقت کی ایک ہی خوراک دن میں ایک مرتبہ دیجئے۔ خوراک کھانا کھانے کے بعد دی جائے۔

آرسنک سلف 'ربرم' 200 (Arsenic Sulph, Rubrum 200): بخار کے ساتھ پتہ کی پتھری اور درد قویج ہو۔

مرک آئیوڈ (Merc lod): پتہ پر ڈھیلا ہونے کے ساتھ جگر کا بڑھ جانا۔ رائی کے تیل کی طرح کا پیشاب ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے (دن میں ایک ہی خوراک دیجئے)۔

فیرم آئیوڈ (Ferrum lod): بخار کی بغیر جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

فیرم آرس (Ferrum Ars): بخار کے ساتھ جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

کلییریا آرس (Calcarea Ars): بچوں کے جگر کا مرض (200 طاقت کی یا اونچی طاقت کی دوا استعمال کیجئے)۔

اوپیم (Opium): ست جگر جس کے ساتھ قبض ہو۔

چائنا آف (China Off): جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے جیسا کہ کھال کے نیچے ماسوری کیفیت ہو۔ چھوٹے سے اتھری ہوتی ہے۔ جلد کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے، پتے کی پتھری کے باعث قویج ہو، جگر سو جا ہوا سخت ہوتا ہے۔

پوڈوفائلم (Podophyllum): یہ دوا سن یا مزمن طور پر اجتماع خون والے جگر کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب کہ اس سال موجود ہوں، جگر سو جا ہوا اور حساس ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): جگر سو جا ہوا، اجتماع خون والا اور سوزشی ہوتا ہے، جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے جس میں حرکت سے اتھری ہوتی ہے اور درد والی جانب کروٹ لے کر لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

## پتے کی سوزش (بغیر پتھری کے)

(Cholecystitis "Non- Calculus")

(پتھری والی سوزش کے لئے دیکھئے "پتے کی پتھری")

چیلیڈونیم (Chelidonium): دائیں کندھے میں مسلسل درد رہتا ہے۔ صبح کے وقت مٹتی ہو جس کے ساتھ صفراوی تے ہوتی ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے جو کھانے سے

عارضی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ پھولا ہوتا ہے، سخت اور مٹی کے رنگ کے پاخانہ کے ساتھ قبض ہوتی ہے اور یہ قبض اس سال کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مقعد کی خارش، پیشاب گہرے پیلے رنگ کا اور جھاگ دار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے اور صبح کے وقت، کھلی ہوا میں اور دائیں کروٹ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کارڈوس میور (Gardius Mur): جگر اور صفراء کی ٹالیوں پر انتہائی عمل ہوتا ہے، پائیں جانب پسیلوں کے نیچے درد ہوتا ہے۔ الرجی کا اور م، زخم والا دم، چکر آئیں اور پیچھے کی جانب گرے۔ سخت گانٹھ لگ جانے کے ساتھ قبض ہو، پاخانہ بڑی مشکل سے خارج ہو یا پھر اس سال چمکدار شراب کی طرح کے۔

پوڈوفالیم (Podophyllum): پیٹ کے بالائی حصہ میں درد ہو جس کے ساتھ تھو ہوتا ہے اور پیٹ کی اندرونی جانب خلاء کا احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس کے ساتھ تیزابی غذا کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اس سال پر درد، سبز رنگ والے، پانی کی طرح کے، بہت افراط کے ساتھ، متعفن ہوتے ہیں، پانی کی تیز دھار (جیسے کسی بھری ہوئی تنک سے تیز دھار کے ساتھ پانی خارج ہو) والے اس سال ہوتے ہیں۔ اس سال کا تباہ قبض سے ہوتا ہے جیسا کہ پیلیڈوشیم میں ہوتا ہے۔

چیونٹھس ویر (Chionanthus): لبلبہ کے امراض کے ساتھ جگر کی تکلیفات، جن کے ساتھ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ صفراوی رنگ اور گلوکوز کے ساتھ بہت زیادہ افراط کے ساتھ گہرے رنگ کا پیشاب ہوتا ہے۔ یرقان اور قبض کے ساتھ جگر کے علاقہ میں بھاری پن اور درد ہوتا ہے۔

لیپ ٹینڈرا (Leptandra): لمبیا کے بعد جگر کی تکلیف لاحق ہوں، جگر بڑھ جائے، دل کی دھڑکن سے تکلیف ہو، غنودگی کے ساتھ چکر آتے ہیں، سامنے سے ہتھوڑے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ گہرے رنگ کے خون پر مشتمل باافراط اس سال لاحق ہوں، خونی بوا سیر لاحق ہو، امعاء مستقیم کا خروج۔

مائی ریکاسیری فرا (Myrica Cerifera): وزن کے مسلسل کم ہوتے رہنے کے ساتھ یرقان لاحق ہو، دمہ ہوتا ہے اور نمایاں کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ درد سر کپینوں میں اور سامنے کی حصہ میں۔ بدترین متلی کے ساتھ کڑوا ذائقہ ہوتا ہے، مہانگی کے گہرے رنگ والا پیشاب آتا ہے، صفراوی نمکوں کے باعث جلد میں خارش ہوتی ہے، تیزابی غذا کی شدید خواہش ہوتی ہے، کھانے کے بعد متلی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور چلنے سے آفاقہ ہوتا ہے۔

کولسٹرین (Cholesterin): یہ دوا پتے کی مزمن سوزش کے لئے استعمال ہوتی ہے، جس

کے ساتھ اجتماع خون والی جگر کی سوزش ہو جو کہ سرطان سے قبل یا سرطان والی کیفیت میں ہوتی ہے۔ جگر کے علاقہ میں جلن دار درد ہوتا ہے جو کہ دائیں کندھے تک پھیل جاتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور طاقت جاتی رہتی ہے جس کے ساتھ خون کی کمی بھی لاحق ہوتی ہے۔

### پتے کی پتھری — (Gall- Stone)

**چیلیڈونیم (Chelidonium):** یہ تمام قسم کی پتے کی پتھریوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ اگر لمبے عرصہ کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جائے تو یہ پتھریوں کو پتے سے نکال دیتی ہے اور ان کے بننے کے عمل کو روک دیتی ہے۔

**کولسٹرین (Cholesterin):** اس دوا کو پتے کی پتھری والے قونچ میں آزمانا چاہئے۔ یہ دوا اجتماع خون کو رفع کرتی ہے اور بخار کا علاج کرتی ہے جو کہ پتے کی خرابی کے باعث ہوتا ہے۔  
**نوٹ:** زیتون کا تیل پتے کی پتھری کے لئے ”علاج“ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ روزانہ آدھا پنٹ (ایک پنٹ گیلن کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے) کھانا چاہئے۔ تیل پینے کے فوری بعد لیموں کا شربت پینا چاہئے۔ تین یا چار منٹوں کے بعد پھر تیل میض اور اس کے بعد پھر اسی طرح لیموں کے رس کا شربت میض اسی طرح سے یہ عمل مسلسل جاری رکھیں یہاں تک کہ آدھا پنٹ زیتون کا تیل اور لیموں کے رس کا شربت ختم ہو جائے۔ لیموں کا رس تیل کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور تکلیف کو روکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاج سے پتھری ایک ہی دن میں خارج ہو جاتی ہے لیکن بعض مرتبہ یہ علاج دو سے تین روز تک دہرانا پڑ سکتا ہے۔  
**بربرس و لکریس (Berberis Vul):** پتے کی پتھری کا درد قونچ۔

**چیونانٹھس ورجینیکا (Chionanthus Virginica):** صفراوی درد قونچ، پتے کی پتھری کا درد قونچ یہ صفرا کو مائع میں تبدیل کرتی ہے، پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور جو پہلے سے بنی ہوئی پتھریاں ہوتی ہیں انہیں نکالتی ہے۔ اس مرض میں لمبیا والی جگہوں پر جگر میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے، پاخانے مٹی کے رنگ کے ہوتے ہیں، جلد چلی ہوتی ہے۔ پیشاب قریب قریب سیاہ ہوتا ہے۔

**کارڈوس میریانس (Cardus Marianus):** جگر اور تلی کا بڑھ جانا لاحق ہو، پتے سوج جاتا ہے، پتے کی پتھری والا قونچ کا درد ہوتا ہے، صفراوی بخار ہوتا ہے۔ پاخانہ سخت ہوتا ہے، دقت سے ہوتا ہے اور گانٹھ دار ہوتا ہے۔ قبض، اسہال کے ساتھ بدل جاتی ہے۔

**کلکیریا کارب (Calcareia Carb):** پتے کی پتھری کا درد قونچ۔ پیٹ میں چکنائی بڑھ جاتی



ہے۔ معمولی دباؤ سے حساسیت ہوتی ہے۔ جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جانگھ اور میزٹرک غدود میں سوجن اور درد ہوتا ہے۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): پتے کی پتھری کا درد قویٰ، عضلاتی طاقت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ضدی قسم کی قبض لاحق ہو جاتی ہے۔ جگر ناکارہ ہو جاتا ہے۔

چائنا (China): جگر کے علاقہ میں درد ہو جیسا کہ جلد کے ماسور میں ہوتا ہے، چھوٹے سے اتری ہوتی ہے۔ جلد اور آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، پتے کی پتھری کے باعث درد قویٰ ہوتا ہے۔ جگر سوجا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔ یہ دوا پتے میں پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے۔

مینگانم (Manganum): یہ دوا پتھریوں کو صحت مند صفرا میں تحلیل کر دیتی ہے۔ پتے کی پتھری والا درد قویٰ ہوتا ہے، یہ قان لاحق ہو جاتا ہے، یہ دوا جگر میں اجتماع خون اور رسولیوں کا علاج کرتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sul): بد ہضمی کے بعد پتے کی پتھری والا درد قویٰ لاحق ہوتا ہے۔ پتے کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں، دائیں جانب درد ہوتا ہے جو بعد میں پھیل کر چھاتی تک چلا جاتا ہے۔

### بچوں کا یرقان — (Icterus)

(جلد کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، نو زائیدہ بچوں کا عام مرض ہے)

چیلیڈونیم (Chelidonium): علاج اسی دوا سے شروع کیجئے اور اگر اس دوا سے خاطر خواہ افادہ نہ ہو (اس کا انحصار بچے کی کیفیت پر ہے) تو پھر دیگر دی گئی ادویات آزمائی جائیں جو کہ درج ذیل ہیں:

نکس وامیکا (Nux Vomica): پاخانہ سست اور بند بند سا ہوتا ہے۔ بچہ چڑچڑا اور رونے والا ہوتا ہے۔

کولن سونیا (Collinsonia): نمایاں طور پر رنگ زرد ہوتا ہے، پاخانہ ڈھیلوں کی صورت میں اور جتے ہوئے دی کی طرح کا ہوتا ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): اگر یرقان کے ساتھ ہو، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور تمام اخراجات اور پیشاب وغیرہ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔

چوونٹھس (Chionanthus): جب پیشاب میں بہت زیادہ صفرا ملا ہوا ہو اور زردی بہت زیادہ نمایاں ہو اور پیشاب چمک دار ہو۔

### یرقان — (Jaundice)

**سلفر (Sulphur):** یرقان کا علاج ہمیشہ اسی دوا سے شروع کیا جائے، اسے علاج کی تکمیل کے لئے ذہن میں (یعنی فکر میں) رہنا چاہئے۔ 200 طاقت ڈائی لیوشن استعمال کیجئے۔

**چیلیڈونیم (Chelidonium):** سلفر کے ایک دن کے استعمال کے بعد اس دوا کو دیا جائے، یہ یرقان کے لئے مخصوص دوا ہے اور عموماً چھٹی طاقت ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جاتی ہے۔ آنکھ کی جھلی زرد ہو جاتی ہے۔ جلد پیلی ہو جاتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔ جگر دبانے پر نرم ہوتا ہے، بھورا سرخ پیشاب ہوتا ہے اور ہلکا فیلا پاخانہ کا رنگ ہوتا ہے۔

**مائی ریکاسیری فرا (Myrica Cerifera):** یہ نزلادی یرقان کے لئے ایک اہم دوا ہے۔ سر میں مدہم درد ہوتا ہے جس میں صبح کے وقت اٹھتی ہوتی ہے۔ آنکھیں گندی غلیظ اور پیلے رنگ کی ہوتی ہیں۔ زبان پر زرد رنگ کا طبع ہوتا ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے اور عضلات (پٹھوں) میں دکھن، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتا ہے جس کے ساتھ نبض بھی ست ہوتی ہے اور پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے، پسیلوں کے نیچے دائیں جانب درد ہوتا ہے، بھوک نہیں رہتی، تیزابی غذا کی خواہش ہوتی ہے۔ نیند سکون بخش نہیں ہوتی۔

**ہائیڈراستس (Hydrastis):** نزلادی یرقان، ساتھ میں تیز ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں اور لیس دار بلغمی مواد خارج ہوتا ہے۔ مثلی ہوتی ہے اور تے ہوتی ہے۔ جگر ناکارہ ہو جاتا ہے، زبان سوخ جاتی ہے اور اس پر دائیوں کے نشانات نظر آتے ہیں، ساتھ میں زبان پر سفید یا چملا طبع بھی ہوتا ہے۔

**چیونانتھس (Chionanthus):** نزلادی یرقان جس کے ساتھ گڑبگڑا ہٹ بھی ہو، یہ والا یرقان ہر موسم گرما میں نمودار آتا ہے۔ دکھن ہوتی ہے اور بکڑن ہوتی ہے، زبان اور آنکھیں زرد ہوتی ہیں، پیشاب میں صفرا اور شکر کی آمیزش ہوتی ہے۔ حیض کے دب جانے کے باعث یرقان لاحق ہو، منی کے رنگ والے پاخانہ کے ساتھ قبض لاحق ہوتی ہے۔

**مرکیورس سول (Mercurius Sol):** یرقان کے لئے یہ ایک رہنما کن دوا ہے۔ نبض تیز ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی پر زرد دھاری ہوتی ہے، زبان ہلکی سی طبع شدہ ہوتی ہے، قبض لاحق ہوتی ہے۔ زرد اور خشک پاخانہ آتا ہے یا پھر پاخانہ گہرے زرد رنگ کا ڈھیلا ہوتا ہے۔ پسینہ افراط کے ساتھ آتا ہے جس سے افادہ ہوتا ہے۔ رطوبات زیادہ خارج ہوتی ہیں، خصوصاً تھوک۔ زبان ڈھیلی ہوتی ہے، وہات کا سا ذائقہ ہوتا ہے۔ جگر کے علاقہ کے اوپر حساسیت ہوتی ہے، ڈنک لگنے جیسے اور ٹانگے لگنے جیسے دردوں کے ہمراہ جگر والا علاقہ سو جا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔

ہے۔ پوڈوفائلیم (Podophyllum): جگر کے علاقہ میں تیز اور کاٹنے والے دردوں کے ساتھ بھراؤ اور دھکن ہوتی ہے۔ گاڑھے صفرا اور خون کی تے لاحق ہوتی ہے۔ سڑے ہوئے انڈوں کے ذائقہ والے ذکار آتے ہیں۔ قبض، اسہال کے ساتھ ادلتی بدلتی رہتی ہے۔

ڈی جی ٹیلیس (Digitalis): دل کے کمزور عضلات کے باعث یرقان لاحق ہو، جگر بڑا اور سخت ہو جانے کے ساتھ، ست اور وقفہ دار نبض ہوتی ہے۔ گہرے رنگ کا کم مقدار میں پیشاب آتا ہے، یہ دل کی تکلیف کے ساتھ یرقان کی دوا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بوا سیر اور قبض کے رجحان کے ساتھ، گندا، پھپھوندی جیسا یا کڑوا ذائقہ، غذا سے نفرت ہوتی ہے، جگر کے علاقہ میں ٹپکن والا درد ہوتا ہے، غشی کے دورے ہوتے ہیں۔

پٹیلانی (Ptella T): جگر میں اجتماع خون کے ساتھ یرقان لاحق ہو، منہ خشک ہونے کے ساتھ معدہ میں جکڑن ہوتی ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): غصہ یا اور کسی غیر ضروری جو شیلے پن کے باعث یرقان کا دورہ پڑ جائے۔ جگر میں اجتماع خون ہو جاتا ہے۔ کھانے کی خواہش جاتی رہتی ہے، سہلی ہوتی ہے، گندا اور چکناہٹ والا ذائقہ منہ میں ہوتا ہے۔ چٹکیاں بھرنے جیسے اور مروڑنے والے درد پیٹ میں ہوتے ہیں۔

## یرقان (مملک)

(Jaundice Malignant)

فاسفورس (Phosphorus): مرض کے مملک پن کے ابتدائی مرحلہ میں ہی صرف اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ جگر بڑا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، جگر کا حلو ناکارہ پن، جگر کی شکاف دار سوزش لاحق ہو، مملک یرقان۔

لکس (Lachesis): ایسے اشخاص میں یرقان کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے جن میں خون کی کمی پائی جاتی ہے اور جو اعصابی اور حساس ہوتے ہیں۔ سونے کے بعد گرم مشروبات پینے کے بعد اور گرم کمرے میں اہتری ہو جاتی ہے۔ پیشاب بھاگ دار ہوتا ہے، گہرے رنگ کا اور تقریباً کالا ہوتا ہے۔ سارے جسم میں جلن اور خارش ہوتی ہے۔ تمام دریدوں کے ساتھ ساتھ نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): مملک یرقان کے آخری مراحل میں اس دوا کو استعمال کیا

جاتا ہے۔ بخار ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے وقفوں سے تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

## تلی کے امراض

(Ailments of Spleen)

سینو تھس (Ceanothus): تلی کے بڑھ جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ مدر ٹیگر کے قطرؤں کی صورت میں عموماً استعمال ہوتی ہے۔ تلی کے علاقہ میں گہرے درد ہوتے ہیں، گہرے ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں، مرطوب موسم میں ابتری ہوتی ہے، جاڑا لگتا ہے اور بخار ہوتا ہے۔ تلی تیرتی ہوئی اور اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

چائنا (China): تلی کے بڑھ جانے کے لئے یہ ایک دوسری بہترین دوا ہے جبکہ تلی میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ نیز تلی سوچی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں اور اس کی وجہ شدید بخار ہوتے ہیں۔

ارانیادایا ڈیما (Aranea Diadema): طیریا کے مزمن اثرات کے باعث تلی کا بڑا ہو جانا۔ کالی، سستی اور جاڑا لگنا اس دوا کی مفید علامات ہیں۔

کیپسکیم (Capsicum): تلی کی حساسیت، سوجن اور بڑا ہو جانے کے لئے مفید دوا ہے۔  
سکینم ایسڈ (Succinum Acid): یہ دوا تلی کی حالت اور اس کے فعل میں بہتری پیدا کرتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): تلی میں عمومی اجتماع خون اور سوزش کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے، اس میں ٹانگے لگنے اور پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں۔ ان دردوں میں حرکت سے ابتری ہوتی ہے اور آرام سے بہتری ہوتی ہے۔

لیکسیس (Lachesis): سیلان خون کے رجحان کے ساتھ تلی کی سوزش، کسے ہوئے بند یا کسے ہوئے کپڑے برداشت نہیں ہوتے، تلی کے علاقہ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔

## حصہ چہارم --- امعائے مستقیم اور پاخانہ

سرطان (Cancer)

الیومینا (Alumina): پاخانہ کے بعد درد کے ساتھ امعائے مستقیم میں ناگوری اگڑا ہوتا ہے یعنی سرطان پیدا ہوتا ہے۔ عموماً مریضوں کو قبض رہتا ہے۔

روٹا (Ruta): پاخانہ کے بعد بہت گھنٹوں تک امعاء مستقیم میں درد کے ساتھ امعاء مستقیم کا سرطان۔

ایسڈ نائٹ (Acid Nit): جب ایو مٹا ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔  
سکرینم (Scirrhinum): یہ دوا عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے جبکہ مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔

### ہیضہ — (Cholera)

کیمفرا (Camphora): جب ہیضہ ابتدائی مراحل میں ہو تو اس دوا کے مدد تلچر کا ایک ہی قطرہ ہیضہ کو روکنے اور اسے دور کرنے کے لئے بہترین دوا بن جاتا ہے جبکہ تے اور اسال دونوں موجود ہوں۔ نقاہت، ٹھنڈ اور اچانک پسینے آتے ہوں جن کے باعث لاغری ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہیضہ کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے۔ مریض انتہا درجے کا ٹھنڈا ہوتا ہے اور خارج ہونے والے مادے کم ہو جاتے ہیں (پیشاب وغیرہ) چہرے پر خشکی اور نیلاہٹ ہوتی ہے، تے کرنے کی اور پاخانہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، گرمی سے بہتری ہوتی ہے، معدے اور غذا کی تالی میں جلن ہوتی ہے، پیٹ نہیں آتا لیکن ناختم ہونے والی پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔  
وریمٹرم ایلوم (Veratrum Alb): ہیضہ کا دوسرا مرحلہ جبکہ اسال اور تے لاحق ہو چکے ہوں، پیٹ میں پاخانہ کرنے کے بعد درد ہوتا ہے۔ پاخانے کے بعد بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے۔ جسم پر ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور جسم کی سطح ٹھنڈی ہوتی ہے، اندرونی طور پر جلن کا احساس ہوتا ہے۔ وریمٹرم میں معدے کا درد ضروری علامت ہے۔ مادے بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں (پیشاب پاخانہ وغیرہ)۔

کیپورم میٹ (Cuprum Met): انگلیوں اور انگوٹھوں میں تشنجی کیفیت اور شدید قسم کی اینٹھن کا شروع ہو جانا اس دوا کی نمایاں علامت ہے۔ جسم کی سطح پر ٹھنڈک پائی جاتی ہے، جلد پر نیلاہٹ ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے اور پیاس لگتی ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں شدید قسم کے درد ہوتے ہیں اور مریض بار بار تے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بھی تے اور پاخانے وریمٹرم ہی کی طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں ٹھنڈا پیٹ نہیں ہوتا۔

ایٹھوزا سی (Aethusa C): پھوٹے بچوں کا ہیضہ جو کہ بہت ہی اچانک لاحق ہو جاتا ہے۔ بچہ جیسے ہی دودھ پیتا ہے تے کر دیتا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے، دودھ کا کچھ حصہ وہی کی صورت میں اور کچھ حصہ پتلے مائع کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ پتلا سبزی مائل پتلا پاخانہ ہوتا ہے۔

**آرسینک البم (Arsenic Alb):** چھوٹے بچوں کے ہیضہ کے لئے ایتھوزا کے ٹاکم ہو جانے کے بعد یہ ایک عمدہ دوا ہوتی ہے۔ اس میں غیر منظم پاخانے ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے کمزوری ہوتی ہے۔ بڑوں کے ہیضہ کے لئے بھی یہ دوا ویرم کی طرح استعمال ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس میں بے چینی زیادہ ہوتی ہے اور پینہ کم ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ شدید قسم کی قے اور پاخانے ہوتے ہیں ' بدبودار پیلے یا بھورے رنگ کے پاخانے باافراط ہوتے ہیں۔

**کاربووتج (Carbo Veg):** یہ دوا مرض کے آخری مرحلہ کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ جبکہ مریض خاموش لیٹ جاتا ہے۔ نقاہت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ' تنفس ٹھنڈا اور نبض کمزور ہوتی ہے۔ نیز نبض تیز اور دھماکے کی طرح کی ہوتی ہے ' قے یا اسہال نہیں ہوتے ' درد اور تشنج بھی نہیں ہوتا ' بیماری جسم کو چھوڑ چکی ہوتی ہے لیکن کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ رطوبات خارج ہو جانے کے نتیجے میں مریض غیر مزاحمتی مرحلہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔

**ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid):** یہ دوا مرض کے اس مرحلہ کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ مریض نقاہت کے باعث ڈھیر ہو چکا ہوتا ہے جس کے ساتھ مادوں کا اخراج بھی اچانک رک جاتا ہے۔ کاربووتج کے برعکس اس میں غشی کے دورے پڑتے ہیں اور تشنجی دورے بھی ہوتے ہیں۔

**الیٹریم (Elaterium):** بچوں کا ہیضہ۔ پاخانے زیتون کے تیل کے سے ' سبز رنگ کے اور پانی کی طرح کے ہوتے ہیں ' یک دم اور زور کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔

**لیکسیس (Lachesis):** جلن کے ساتھ ہیضہ لاحق ہوتا ہے جو تھوڑی سی تھکاوٹ سے عود کر آتا ہے۔

**سیکیل کور (Secale Cor):** یہ آخری مرحلہ کی دوا ہے جب مریض کی خواہش ٹھنڈا رہنے کی ہوتی ہے ' تقریباً مریض کی نبض کھو چکی ہوتی ہے اور مریض ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اسے کپڑا اوڑھنے سے نفرت ہوتی ہے۔

**جیٹ روفا (Jatropha):** ہیضہ لاحق ہو ' رسی دار قے ہوتی ہے ' مادہ الیومین والا ہوتا ہے ' عظیم نقاہت ہوتی ہے ' قے اور پاخانے آتے ہیں اور پاخانہ چاولوں کی جھپے (اے بے ہوئے چاولوں سے نکلنے والا پانی) کی طرح ہوتا ہے۔ اینٹھن ہوتی ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے ' یہ پیسے کی مکمل تصویر ہوتی ہے۔

## قبض — (Constipation)

**نکس و امیکا (Nux Vomica):** ایسے مریضوں کے لئے جو پتکے ہوتے ہیں بہت زیادہ چڑھے اور شور سے اور ہوا کے جھونکوں سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ آنتوں میں صرف سخت قسم کے جلاب لینے سے ہی حرکت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ کھچاؤ کے ساتھ آنتوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ تکلیف تمباکو، شراب اور کافی کے حد اعتدال سے بڑھے ہوئے استعمال کے باعث لاحق ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش کے ساتھ قبض ہو، سستی والی عادات کے باعث یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔

**برائی اونیا (Bryonia):** بہت زیادہ پیاس کے ساتھ خشک پاخانہ ہوتا ہے جیسا کہ جلا ہوا ہو۔ اپینڈیکس کے ساتھ قبض لاحق ہوتا، گرم موسم میں قبض ہوتا۔ پاخانہ سخت، لمبا اور آٹوں (بلغم) کے بغیر ہوتا ہے۔

**الیومینا (Alumina):** آنتوں کی خشکی اور آنتوں کی حرکت نہ ہونے کے باعث قبض لاحق ہو۔ نہ تو پاخانہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ قابلیت ہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پاخانہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے چنانچہ مریض کلوزٹ کو سختی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ پاخانہ سخت ہوتا ہے۔ گانٹھ دار ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے جو کہ اعضاء کے ساتھ چپکنے والا ہوتا ہے۔ پاخانہ کرنے کی خواہش بہت تھوڑی ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ امعاءً مستقیم مکمل طور پر جمود کا شکار ہوتی ہے۔ چنانچہ نرم پاخانہ بھی بہت زیادہ مشکل کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ پاخانہ سخت اور گرہ دار ہوتا ہے جیسا کہ بھیڑ بکری کی میٹنیاں ہوتی ہیں اور منہ خشک ہوتا ہے اور زبان میں بیجان ہوتا ہے۔ اسی علامت سے اس دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش نہیں رہتی۔ دوران حمل قبض لاحق ہو۔

**سپیا (Sepia):** عورتوں میں قبض، اس میں شدید قسم کا درد پیڑوں میں ہوتا ہے جو پھیل کر امعاءً مستقیم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش ہوتی ہے۔

**اناکارڈیم (Anacardium):** جب پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش امعاءً مستقیم میں محسوس ہو۔ پاخانہ کرنے کے بعد امعاءً مستقیم پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ نکس و امیکا میں دباؤ پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔

**اوپیم (Opium):** امعاءً مستقیم کی غیر فعالیت کے باعث قبض لاحق ہو، پاخانہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ جب پاخانہ ہوتا ہے تو یہ سخت قسم کے خشک، سیاہ گیندوں کی طرح ہوتا ہے۔ آنتوں میں فعالیت نہیں ہوتی اسی طرح سے خشکی ہوتی ہے، منہ اور معدہ میں خشکی ہوتی ہے، کئی دنوں تک پاخانہ نہ کرنے کے باعث مریض سکون محسوس نہیں کرتا۔ پاخانہ کرنے کی

کوئی حاجت نہیں ہوتی۔

**پلیبم (Plumbum):** یہ مزمن قبض کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ یہ بھی اوجیم والے قبض کی طرح کا مرض ہوتا ہے لیکن اس میں آنتوں میں کچھ فعالیت ہوتی ہے۔ اس میں پاخانہ کی حاجت تو ہوتی ہے لیکن پاخانہ بہت ہی مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ اس میں عضلات کی فعالیت جاتی رہتی ہے اور آنتوں کے غدودوں سے رطوبت بہت کم خارج ہوتی ہے۔ پاخانہ سخت ڈھیلوں والا ہوتا ہے۔ جس کے باعث شکاف پیدا ہو جاتے ہیں۔

**لائیکوپوڈیم (Lycopodium):** سب سے زیادہ شدید قسم کی قبض۔ پاخانہ کرنے کی لا حاصل حاجت 'معدہ میں تیزابیت اور جلن ہوتی ہے جو ڈکاروں سے بہتر ہوتی ہے۔

**سلفر (Sulphur):** قبض۔ پاخانہ سخت ہوتا ہے۔ گانٹھ دار ہوتا ہے۔ خشک ہوتا ہے جیسا کہ جلا ہوا ہو۔ لمبا اور پُر درد ہوتا ہے۔ بچہ پاخانہ کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس سے درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔

**گریٹیولا (Gratiola):** سرطان والی قبض 'امعائے مستقیم میں کھچاؤ ہوتا ہے۔

**کاربو انیملس (Carbo An):** قبض لاحق ہو جس میں سریش خیال کرتا ہے کہ پاخانہ ہو گا لیکن صرف ہوا خارج ہوتی ہے۔

**سیلینیم (Selenium):** قبض لاحق ہو۔ سخت انخلاء جسے صرف بیرونی امداد سے دور کیا جاسکے۔ پاخانہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ پاخانہ بہت بڑا ہونے کے باعث کہیں مقعد کو نہ پھاڑ دے۔ پاخانہ میں بالوں کی طرح سے دھاگے سے ہوتے ہیں۔

**سفل (Syphil):** برسوں کی ضدی قسم کی قبض 'یوں محسوس ہوتا ہے جیسے امعائے مستقیم کو رسیوں سے باندھا گیا ہو۔ جب انہما استعمال کیا جاتا ہے تو نالی میں دروزہ کی طرح سے اذیت ہوتی ہے۔

**نیٹرم میور (Natrium Mur):** جب پاخانہ سخت اور مڑاڑا ہوتا ہے۔ امعائے مستقیم خشک ہوتی ہے۔ پاخانہ خارج کرنے میں بہت سخت ہوتا ہے جس کے باعث خون بہہ نکلتا ہے۔ امعائے مستقیم میں پاخانے کے بعد خشکی اور دکھن پیدا ہوتی ہے۔

**گریفائٹس (Graphites):** پاخانہ کی حاجت کے نہ ہونے کے ساتھ قبض لاحق ہو۔ کئی دنوں سے پاخانہ نہیں آتا جبکہ چہرہ پر پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ سیلان خون اور شکافوں کے ساتھ قبض لاحق ہو 'جن میں جلن ہوتی ہے۔ یہ تنگ ہوتے ہیں اور ان میں ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے۔ پاخانہ کے بعد مقعد میں دکھن ہوتی ہے۔ گریفائٹس کی عمومی طبیعت 'اداسی اور موٹاپے کی ہوتی ہے۔ ان علامات کو دیکھ کر اس دوا کے لئے فیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔



پاخانے پر آنوں کا طبع ہوتا ہے۔ یہ دوا ایسی مستورات کے لئے خصوصاً موزوں ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ہونے والی پاخانے کی حاجت کی پروا نہیں کرتیں اور پاخانہ کے لئے جانے میں دیر کر دیتی ہیں۔ مریض بہت زیادہ حساس اعصابی ہوتے ہیں اور ان کے اندر ارتکاز توجہ میں دقت پائی جاتی ہے۔ صبح جاگنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔

**پلائینا (Platina):** مسافروں اور مہاجروں کی قبض کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ جبکہ طرز رہائش میں تبدیلی پیدا ہو جانے کے باعث تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ حاجت متواتر ہوتی رہتی ہے۔ کم مقدار میں اور خشک پاخانہ آتا ہے۔ جب ٹکس دامیکا ناکام ہو جائے تو سکے کی زہر خورانی کے بعد قبض لاحق ہونے پر یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

**ورینٹرم البم (Veratrum Alb):** آنوں کا مکمل ضعف۔ فضلہ، اسعائے مستقیم میں کافی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے۔ مریض زور پر زور لگاتا رہتا ہے۔ اکثر مریض کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن آخر کار اپنی اس کوشش کو ترک کر دیتا ہے چنانچہ فضلہ مصنوعی ذرائع سے خارج کرنا پڑتا ہے۔

**سٹانم ایم (Stannum M):** آرام کے دنوں کے بعد آنے والے دنوں میں قبض ہو جاتی ہے۔

**پوڈوفائلم (Podophyllum):** اسعائے مستقیم یا مقعد کے خروج کے ساتھ مزمن قبض لاحق ہو۔

**لیک ویک ڈیفیل (Lac Vace Defl):** ایسی قبض جس میں اسعائے مستقیم مفلوج دکھائی دے۔ دیر تک زور لگانے کے باوجود پاخانہ اندر کی طرف انکار رہتا ہے۔

**مگنیشیا کارب (Magnesia Carb):** ایسے بچوں کی قبض جو مرھائے ہوئے اور بیمار ہوتے ہیں۔ یہ بچے غذا یا دودھ کو انکار کر دیتے ہیں کیونکہ غذا کھانے سے یا دودھ پینے سے ان کے معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ سوکڑے کے ساتھ سبز رنگ کے پاخانے لاحق ہوں۔

**کاسٹیکم (Causticum):** کھڑے ہو کر پاخانہ کرنے کی قابلیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

**میڈوررینم (Medorrhinum):** پیچھے کی طرف جھک کر پاخانہ کرنا چاہے۔

**مگنیشیا میور (Magnesia Mur):** پاخانے سے پہلے درد کے ساتھ حاجت ہوتی ہے۔ پاخانہ کرنے کے بعد مقعد میں جلن ہوتی ہے۔ اسعائے مستقیم کا ضعف اور مثانے کا ضعف۔ آگے کو جھکنے سے ہی اور پیٹ کے عضلات کو دبانے سے ہی صرف پیشاب خارج کر سکے۔ دانت نکالنے کے دوران بچوں کو قبض لاحق ہو۔ اچھارہ ہوتا ہے۔ پاخانہ لمبا، بڑا، سخت اور گرہ دار ہوتا ہے

لیکن درد کا باعث نہیں بنتا۔

ایسٹریاز آر (Asterias R): ضدی قسم کی قبض، بارہ سے پندرہ دنوں کے بعد پاخانہ ہوتا ہے۔

الیومن (Alumen): کئی دنوں تک پاخانہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ ضدی قسم کی قبض جس کے ساتھ متلی، تھکاوٹ، ایکائیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): یہ دوا 1x طاقت کے 3 قطروں کی ایک خوراک دن میں تین مرتبہ روزانہ قبض کے لئے دی جاتی ہے۔

امبرا آگریٹیا (Ambra Grisea): بوڑھے لوگوں میں پرانی قبض۔ خصوصاً اس وقت پاخانہ خارج نہیں ہوتا جب کوئی دوسرا شخص ان کے قریب ہوتا ہے۔

سنی کیولا (Sanicula): قبض لاحق ہو، پاخانہ بڑا اور سخت ہوتا ہے۔ خارج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ زور لگانے کے بعد ٹکڑوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ جبکہ ایک حصہ انکا رہتا ہے۔ جسے مصنوعی طریقہ سے نکالنا پڑتا ہے۔ کئی انچ لمبا پاخانہ جسے خارج کرنے میں بہت زیادہ کوشش درکار نہیں ہوتی۔

سیلیشیا (Silicea): انتہائی بدبودار پاخانہ جو اکثر سخت ہوتے ہیں اور مشکل سے خارج ہوتے ہیں۔ گندی بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ پیٹ سخت اور سوجا ہوا ہوتا ہے۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): پرانا قبض جس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے چنانچہ مریض کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور بل کھاتا رہتا ہے تاکہ تکلیف میں کچھ افاقہ ہو۔

### اسہال (Diarrhoea)

نکس وامیکا (Nux Vom): یہ دوا حاد کیسوں میں ایسے اسہال کے لئے دینی چاہئے جو بے تحاشا کھانے کے باعث لاحق ہوئے ہوں۔ 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔

ایلو (Aloe): جب مریض اپنے پاخانے پر قابو نہ پاسکے اور اسے بیت الخلاء کی طرف بھاگنا پڑے۔ اس وقت اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پاخانہ ٹکڑے سے ٹکڑے والے پانی کی طرح بہتا ہے۔ کانٹے والا اور اینٹھن والا درد پیٹ میں ناف کے گرد ہوتا ہے۔ کھانے اور پینے سے اجڑی ہوتی ہے۔ جب پیشاب کرے تو پاخانے کی بھی حاجت ہو جائے۔

ارگوٹن (Ergotin): جب امعاء مستقیم حساسیت کھو جینیں۔ یہاں تک کہ مریض کو پیشگی خبر نہیں ہوتی اور وہ کبھی صاف نہیں رہ سکتا۔ 2x طاقت کی خوراک دیجئے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): پیشاب کرتے ہوئے بے اختیارانہ پاخانہ خارج ہو جائے۔

پاخانے کا اخراج درد کے بغیر ہوتا ہے۔

**آرس البم (Ars Alb):** یہ دوا ایسے کیسوں میں مفید ہے۔ جن میں بہت زیادہ بے چینی، اذیت اور ناقابل برداشت درد ہو۔ چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ پاخانے کی مقدار جو خارج ہوتی ہے، بہت تھوڑی ہوتی ہے جبکہ نقاہت اور کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس مقدار سے کوئی بھی مناسبت نہیں رکھتی۔ سرد چیزوں کے ساتھ معدے کو ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اسہال لاحق ہوں۔ لیبریا والے اسہال۔

**وربٹرم البم (Veratrum Alb):** باافراط پاخانے آتے ہیں۔ بے چینی ہوتی ہے۔ پانی کی بڑی مقدار کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ پاخانے کے بعد بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پیوند آتا ہے۔ ٹھنڈ لگتی ہے اور جسم پر عموماً ٹیلاہٹ ہوتی ہے۔

**ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid):** دق میں اسہال لاحق ہوں۔ پتکے خون والے یا خالص خون کے اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ بواسیر سے افراط کے ساتھ خون بے۔ مزمن اسہال۔

**الیومینا (Alumina):** ایک ایک دن کے وقفے سے اسہال لاحق ہوں۔

**فلورک ایسڈ (Fluoric Acid):** ایک ایک دن کے وقفے سے اسہال لاحق ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ آخری گھنٹوں میں آتے ہیں۔

برائی ادویا، اگنیشیا، کولوسنتھ، سیسفی گیگیا (Ilgantia, Colocynth, Staphisagria, Bryonia): بد مزاجی کے بعد اسہال لاحق ہوں۔

**کروٹن ٹیگ (Croton Tig):** اسہال تین اہم علامات کے ساتھ لاحق ہوں۔ (1) پاخانے درد اور پانی والے ہوتے ہیں۔ (2) پاخانہ اچانک تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور (3) مشروبات یا غذا سے اضافہ ہوتا ہے۔ نرم اور پتلا پاخانہ ایک ہی لمبے میں زور سے یا پچکاری کی طرح سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں تپ اور سختی ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے اتفاق ہوتا ہے۔ ہر حرکت اخراج کا باعث بن جاتی ہے۔

**فالی ٹولاکا (Phytolacca):** دانت نکالنے کے دوران اسہال لاحق ہوں۔ جس کے ساتھ سوڑھے اور دانت کاٹنے کی نہ رکھنے والی خواہش ہوتی ہے۔

**ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H):** سرد ہوتے ہی فوراً پاخانہ آ جاتا ہے۔

**پٹرولیم (Petroleum):** دن کے دوران اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ دوران شب بہتری ہوتی ہے جب کہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اسہال ایک ہی وقت مقررہ پر لاحق ہوتے ہیں۔

**ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit):** شکر اور مٹھی گولیاں ٹافیاں کھانے کے باعث اسہال لاحق ہوں۔ جذبات کے باعث اعصابی اسہال لاحق ہوں۔

**مرک ڈل کس** (Merc Dulcis): سبز اسہال بچوں کو لاحق ہوں۔ ار جنٹم ٹائٹ اور اپیکاک کا بھی مطالعہ کیجئے۔

**نکس موسکاتا** (Nux Mosch): دوران حمل اسہال لاحق ہوں۔

**اولینڈر** (Oleander): بے اختیارانہ یاخانہ خارج ہونے کے ساتھ اسہال لاحق ہوں۔ معدہ کی تکالیف۔ ہاضمہ مفلوج ہو جاتا ہے اور غذا مکمل طور پر غیر منظم خارج ہو جاتی ہے۔ پاخانہ ہوا کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

**تھوجا** (Thuja): پیٹ میں گز گز اہٹ کے ساتھ صبح کے وقت کے اسہال جیسا کہ ہوا بند قیچی سے پانی گر رہا ہو۔

**ٹرومبیدیئم** (Trombidium): یہ اسہال کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ جب کہ اسہال میں کھانے اور پینے سے اضافہ ہو جائے۔ پاخانہ سے پہلے پاخانہ کے دوران اور پاخانہ کے بعد اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ اس میں پچپش بھی لاحق ہوتے ہیں۔

**ڈیجیٹلیس** (Digitalis): یرقان کے دوران اسہال لاحق ہوں۔ سفید چاک کے رنگ والے راکھ کے رنگ والے اور چکنے پاخانے ہوتے ہیں۔

**سنٹی کیولا** (Sanicula): اکثر غذا کھاتے ہی پاخانہ آ جاتا ہے۔ ہر کھانے کے فوراً بعد میز سے اٹھ کر پاخانے کے لئے جانا پڑے۔ پاخانہ نکل جانے سے بچنے کے لئے ٹانگوں کو ایک دوسری کے ساتھ ملا کر دبانا پڑے۔ مقعد کو بند کرنے والے عضلات پر قابو نہیں رہتا۔ اکثر دوڑتے ہوئے کھڑے کھڑے اور رات کے وقت پاخانہ کیڑوں ہی میں نکل جاتا ہے۔

**الستونیا کون** (Alstonia Con): کھانے کے فوراً بعد غیر منظم غذا کے اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ کھانا حتم کرتے ہی دسترخوان چھوڑنا پڑے۔ ہلکا بخار بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے۔

**مرک کار** (Merc Cor): زور کے ساتھ خود بخود بھٹکے سے پاخانہ خارج ہو۔

**گوالیکم** (Gualiacum): اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ غذا غیر منظم خارج ہوتی ہے۔ صبح سویرے لاحق ہونے والے اسہال خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ گرم مزاج مریضوں میں نیز گھٹیاوی مریضوں میں۔

**ار جنٹم میٹ** (Argentum Met): ذہنی تکان کے باعث اسہال لاحق ہوں۔

**چیپارو امارگوسو** (Chaparro Amargoso): اسہال اور پچپش لاحق ہو۔ مزمن یا حاد۔ جب کہ تمام دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔

**گریفائٹس** (Graphites): بھورے مائع کے ساتھ لمبے لمبے غیر منظم اجزائے غذا والے پاخانے نیز ناقابل برداشت بدبو بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔

**بیسنزوئیک ایسڈ (Benzoic Acid):** بے انتہا گندی بو والے پاخانے جو سارے گھر کو بدبودار بنادیں۔ سفید صابن کے جھاگ جیسے پاخانے ہوتے ہیں۔ متعفن اور خون والے پاخانے بچوں کے اسہال۔

**کونیئم (Conium):** ٹھنڈے پاخانوں والے اسہال لاحق ہوں۔

**ڈلکامارا (Dulcamara):** خصوصاً پہاڑوں پر رہنے والوں کے اسہال جب اسہال ٹھنڈے کے باعث لاحق ہوں۔

**سفی لینم (Syphilinum):** ایسے اسہال جو ہمیشہ پہاڑوں پر چلے جانے سے ٹھیک ہو جائیں۔

**سورینم (Psorinum):** سڑے ہوئے انڈوں والی بو کے حامل اسہال۔ بہت ہی گندی بو والے اسہال ڈکار بھی سڑے ہوئے انڈوں کی بو والے ہوتے ہیں۔

**آئرس ویر (Iris Ver):** جب پاخانے پانی والے ہوتے ہوں اور مقعد کو چلا دیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مقعد کو آگ پر رکھ دیا گیا ہو۔ منہ اور کھانے والے نالی کی جلن کے ساتھ متلی ہوتی ہے۔

**سیلیشیا (Silicea):** دودھ پینے سے اسہال لاحق ہوں۔ ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اسہال کا لاحق ہونا۔ پاخانے پانی والے ہوتے ہیں۔ لیس دار، سبزی مائل یا پیلے پاخانے ہوتے ہیں۔ سسٹی کے ای من (Septicaemin): خانہ بدوشی والی زندگی (کمپنگ) میں یہ دوا اسمالوں کے لئے جادو کا اثر رکھتی ہے۔

**روڈوڈنڈرون (Rhododendron):** سرد مرطوب موسم میں لاحق ہونے والے اسہال یہ اسہال طوفان باد و باراں کے ساتھ ہی عود کر آتے ہیں۔

**آرنیکا (Arnica):** دوران خواب غیر ارادی طور پر پاخانہ خطا ہو جائے۔

**کیمفر (Camphora):** مرض کے آغاز میں ہی مریض بے جان ہو جاتا ہے۔

**گریٹیولا (Gratiola):** موسم گرما کے اسہال، اسہال زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور بہت زور سے یک دم خارج ہوتے ہیں۔ پانی والے اسہال ہوتے ہیں اور اس طرح سے بہتے ہیں جیسے عل سے پانی بہتا ہے۔ حد اعتدال سے زیادہ پانی پی لینے کے باعث لاحق ہونے والے اسہال۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ میزینٹرک غدود میں سوجن ہوتی ہے۔

**لیائٹریس سپائی کاٹا (Liatris Spicata):** مزمن اسہال، خانہ بدوشی والی زندگی میں ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اسہال لاحق ہوں۔

**مگنیشیا کارب (Magnesia Carb):** زرد رو اور بیمار بچوں میں اسہال، ان بچوں کو دودھ پینے یا غذا کھانے کے بعد اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ یہ بچے غذا کھانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ

اس سے انہیں معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور سبز رنگ کے پاخانے لاحق ہو جاتے ہیں۔ سوکڑا لاحق ہو۔ پاخانے سبز رنگ کے جھاگ دار ہوتے ہیں جیسا کہ جوہر کے اوپر جمی ہوئی کائی ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): صبح کے وقت کے اسہال، عموماً یہ اسہال اس وقت لاحق ہو جاتے ہیں جب مریض اٹھنے کے متعلق سوچنا شروع کرتا ہے۔ آدھی رات اور صبح کے دوران لاحق ہونے والے اسہال، پاخانہ بدبو دار ہوتا ہے اور یہ بدبو مریض کا پیچھا پاخانہ کرنے کے بعد بھی کرتی رہتی ہے جیسا کہ پاخانہ اس کے کپڑوں اور جسم کو لگا ہوا ہے۔ اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہئے۔

پوڈوفیلوم (Podophyllum): خانہ بدوشی والی زندگی کے اسہال، ناخالص پانی پینے کے باعث لاحق ہوں۔ پاخانے خوشک قسم کی بدبو کے حامل ہوتے ہیں۔ صبح سویرے ہی پاخانہ آ جاتا ہے۔ پاخانے پانی والے، لیس دار، زرد یا غیر منضغ، یک دم زور کے ساتھ خارج ہونے والے ہوتے ہیں۔ قدرتی پاخانہ دن میں کافی دیر کے بعد خارج ہوتا ہے۔ پاخانے درد کے بغیر خارج ہوتے ہیں۔ یہ دوا بچوں کے ضدی قسم کے اسہال میں خصوصاً مفید ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): اسہال لاحق ہوں۔ پانی جیسے پتکے اور بغیر کسی تکلیف کے پاخانے آتے ہیں۔ پاخانے کے بعد مریض بہتری محسوس کرتا ہے۔ مقصد کو بند کرنے والے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں چنانچہ فضلہ غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ افراط کے ساتھ اور لمبے مسلسل اسہال ہوتے ہیں۔ جن کے باعث کمزوری ہو جاتی ہے۔

نٹرم کارب (Natrium Carb): دودھ پینے سے اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ زل کی دھڑکن بھی ہوتی ہے۔

لیتھیم کارب (Lithium Carb): کوکا پینے یا چاکلیٹ کھانے کے باعث اسہال لاحق ہوں۔ سکس کس لین (Cistus Can): مزمن اسہال جن کے ساتھ غدد اور پیٹ میں سوجن ہو جاتی ہے۔ تپ دق ہو سکتی ہے یا پھر تپ دق نہیں ہوتی۔

اوپیم (Opium): خوف میں اسہال لاحق ہوں جبکہ کوئی شکل ذہن میں متواتر ظاہر ہو کر خوف کا باعث بنے۔ خوشی کے باعث اسہال لاحق ہوں۔

ورٹرم البم (Veratrum Alb): ٹھنڈے پینے آنے کے ساتھ خوف میں اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): جب اسہال بہت زیادہ بخوش کے بعد لاحق ہوں جبکہ کوئی تصور چل رہا ہو۔ بچوں میں سبز اسہال جبکہ ماں بہت زیادہ شکر استعمال کرے۔

**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** جب پاخانے سبزی مائل، زرد اور نیچے ہوں۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ (۱۴ دیم) انیون کھانے والوں میں اسال۔

**جیٹ روفا (Jatropha):** اسال اور قے لاحق ہوتے ہیں۔ دھڑکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ قے اور پاخانہ ایک ہی وقت میں لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایشیائی ہیضہ میں ہوتا ہے۔

**یوفوربیا کورولانا (Euphorbia Corollata):** اسال اور قے لاحق ہوں۔ سارے جسم پر ٹھنڈا پسینہ ہوتا ہے۔ دماغ کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ مریض مرہا جانا چاہتا ہے۔

**چائنا (China):** پتلے پانی والے بغیر درد کے پاخانے، ہیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے اور سارے جسم پر پسینہ آتا ہے۔ غذا کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ خصوصاً پھل کھانے کے بعد اور رات کے وقت یا صبح سویرے ابتری ہوتی ہے۔

**ریوم (Rheum):** پاخانے کھٹے ہوتے ہیں اور سارے جسم میں کھٹاس اس دوا کی نمایاں علامت ہے۔ پاخانے جھاگ دار سبز ہوتے ہیں جیسا کہ جوہڑ کی کائی ہوتی ہے۔ یہ دوا خصوصاً بچوں کے لئے موزوں ہے۔ جن میں اوپر دی گئی علامات موجود ہوں۔

**گلکیریا فاس (Calcarea Phos):** بچوں میں کھٹے اور غیر منظم پاخانے۔ خصوصاً دانت نکلنے کے عرصہ کے دوران جب بچوں کو پاخانے لگ جائیں۔ آواز کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ خارج ہونے والے پاخانے۔ یہ پاخانے پانی والے سبزی مائل اور غیر منظم غذا والے ہوتے ہیں۔

**بوریکس (Borax):** پیشاب کرنے ٹیٹھے تو پیشاب سے پہلے پاخانہ آ جائے۔ ناشتے کے بعد اسال لاحق ہوں۔

**سٹرانٹیا (Strontia):** رات کے وقت بہت زیادہ عجلت کے ساتھ اسال لاحق ہوں مریض ابھی بیت الخلاء سے بمشکل باہر نکلتا ہے کہ دوبارہ حاجت ہو جاتی ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** مزمن اسال کے لئے۔ اس میں سبز رنگ کے بلغم والے پاخانے ہوتے ہیں۔ جن میں صبح کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ یہ پاخانے اکثر غیر منظم غذا والے اور بغیر درد کے ہوتے ہیں۔ پاخانوں میں سفید رنگ کے اجزاء، چاول یا تکوں کی طرح کے خارج ہوتے ہیں۔ پاخانوں کے بعد بھی مقعد کھلا رہتا ہے۔

**کیسٹوریم (Castoreum):** گرمیوں میں بچوں کو سبز پاخانے لاحق ہوں۔ تو یہ دوا دی جائے۔ اعصابی درد قوی لاحق ہو۔

**کولوسنٹھ (Colocynth):** شدید درد قوی کے ساتھ اسال لاحق ہوں۔ دبانے سے بہتری

ہوتی ہے۔ جذباتی جوش کے باعث تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ تشنگی درد قولنج کے ساتھ صفر اوی مادے خارج ہوتے ہیں۔

**فیرم میٹ (Ferrum Met):** مریض مشکل ہی سے کھانا ختم کرنے کا انتظار کر سکتا ہے۔ کھانے کے دوران ہی حاجت ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت کھانے اور پینے دونوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پاخانے غیر منظم غذا کے ہوتے ہیں اور اکثر رات کو لاحق ہوتے ہیں۔ مزمن کیسوں میں اخراج بغیر کسی درد کے ہوتا ہے۔

**گمبوجیا (Gambogia):** بوڑھے لوگوں میں اسہال، پاخانہ کرنے کی حاجت اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے اور پاخانہ بڑے زور کے ساتھ یک دم خارج ہوتا ہے۔ جس کے بعد مریض سکون محسوس کرتا ہے۔

**نایٹرم سلف (Natrium Sulph):** سبزیاں، پھل، پیسٹری، سرد غذا اور سرد مشروبات کے باعث لاحق ہونے والے اسہال۔ یہ دوا صبح کو لاحق ہونے والے اسہال کی نشاندہی کرتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد تھوڑی سی حرکت کرنے سے ہی اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اسہال سلفر سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس میں اسہال مریض کو بستر سے نکلنے کے معمول والے وقت سے بہت پہلے ہی بستر سے نکال دیتے ہیں۔ آستوں میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اور پھر اچانک تیزی کے ساتھ اور آواز کے ساتھ پاخانہ بڑے زور سے خارج ہو جاتا ہے۔

**ایلیٹریئم (Elaterium):** زیتون کے تیل جیسے سبز پاخانوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ پاخانے باقراط اور یک دم زور کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔

**ایبروٹینم (Abrotanum):** اسہال اچانک بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بوا سیر اور جلد گتھیا لاحق ہو جاتا ہے۔ اسہال اور قبض ادل بدل کر لاحق ہوتے ہیں۔

### خصوصاً بچوں میں اسہال کے لئے

**کیمومیلا (Chamomilla):** جب کہ بچہ درد کے باعث جاگ جائے اور پاخانہ بھی ساتھ ہی خطا ہو جائے۔ بچہ ہر وقت اٹھائے جانے کو پسند کرتا ہے۔ پاخانے سبز ہوتے ہیں۔ پانی والے، مسے ہوئے جیسا کہ کترے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ نیز کھنی بو والے ہوتے ہیں۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بچہ درد سے چلاتا ہے۔ غذا کھانے اور پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ نیز کھلونوں کو بھی منع کر دیتا ہے۔

**گنیشیا کارب (Magnesia Carb):** ہر تین ہفتوں کے بعد اسہال لاحق ہو جائیں۔ پاخانے سبز، جھاگ دار ہوتے ہیں جیسا کہ میونڈکوں والے جوہر کی کالی ہوتی ہے۔ دودھ غیر منظم ہی



پاخانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ اسہال کانٹے والے دردوں سے شروع ہوتے ہیں۔ بچے کے پورے جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

ریوم (Rheum): دانت بہت مشکل سے نکلتے ہیں۔ بچے بے چین رہتا ہے۔ چڑچڑا ہوتا ہے۔ زرد رنج، زرد چہرے والا ہوتا ہے۔ اس کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ حتیٰ کہ اسے دھلانے اور نسلانے کے بعد بھی بچے سے کھٹی بو آتی رہتی ہے۔ کھوپڑی پر مسلسل اور باقراط پسینہ آتا رہتا ہے۔

فائی ٹولا کا (Phytolacca): دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ جن میں مسوڑھوں اور دانتوں کو کانٹے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): بچوں کے مزمن اسہال، جس کے ساتھ بہت زیادہ خون میں کمی لاحق ہوتی ہے۔

ایلیم سیپیا (Allium Cepa): بد بھمکی، تے اور اچھارہ ہوتا ہے۔ بچہ بہت بدبودار ہوا خارج کرتا ہے۔

میڈورینیم (Medorrhinum): سبزی مائل زرد پاخانوں اور انتہائی گندی بو کے ساتھ بچوں کو لاحق ہونے والے اسہال، پاخانے بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پاخانے پانی والے، چھپچھپ، دہی کی طرح کے جسے ہوئے اور سڑے ہوئے انڈوں کی بو والے ہوتے ہیں۔ خون اور پیپ باقراط خارج ہوتی ہے۔

گمی گٹی (Gummi Gutti): ناف کے قریب کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ اچانک پاخانہ خارج ہونے پر بچہ چیختا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر تھوڑی دیر کے لئے بچہ کو سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے یہی صورتحال دوبارہ پیش آ جاتی ہے۔

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): جب بچہ کو پانی والے اسہال لاحق ہوں تو یہ دوا دی جائے۔ بچہ روتا چلاتا اور بہت زیادہ شامی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کانٹا ہے اور بے خوابی میں جھٹا رہتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): بچوں اور نوزائیدہ بچوں میں مجرب قسم کے پاخانوں کے لئے خصوصاً یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ خون، بلغم اور خوراک کے ملے جلے پاخانے ہوتے ہیں جن کی شکل نمائش کی چٹنی جیسی ہوتی ہے۔

### پیش (Dysentery)

سلفر (Sulphur): یہ دوا 200 طاقت میں عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ حاد یا

مزمن کیسوں میں علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ بہت سے کیسوں میں اس دوا کی ایک خوراک ہی مطلوبہ اثرات ظاہر کر دیتی ہے۔ اسے تین یا چار دنوں کے بعد دہرایا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ پہلی خوراک سے کچھ اچھے نتائج ظاہر ہوں۔

**مرک کار (Merc Cor):** یہ پچیش کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں مروڑوں کے ساتھ خون والے پاخانے کی علامات ہوتی ہیں۔ اس میں مروڑا انتہا درجہ کے شدید ہوتے ہیں۔ جو کہ شدید پردرد ہوتے ہیں۔ پاخانے بلغم کے پتھروں کے ساتھ کم مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ خون افراط کے ساتھ یا کم مقدار میں ہو سکتا ہے۔ یہ دوا خونی پچیش کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقعد میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ مروڑا پاخانہ سے پہلے اور بعد میں ہوتے ہیں۔

**مرک سال (Merc Sol):** یہ اس پچیش کی نشاندہی کرتی ہے جس میں خون نہیں ہوتا لیکن اس میں بلغم ہوتا ہے۔ یہ مرک کار کی نسبت کم شدت والے پچیش کی دوا ہے۔  
**تھوجا (Thuja):** یہ دوا امیسیائی پچیش کے لئے عمدہ ہے جبکہ سلفر اور دیگر نشاندہی کی گئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

**کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid):** نمایاں نقابت اور ٹھنڈے پینے کے ساتھ بلغم والے پچیش۔

**چپیا رو امارگوسو (Chaparro Amargoso):** حاد یا مزمن پچیش یا اسہال جب کہ بقیہ تمام ادویات ناکام ہو جائیں۔

**کولوسنتھ (Colocynth):** پاخانہ سے قبل مروڑوں کے ساتھ پچیش لاحق ہونے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ دہرا ہونے اور دبانے سے درد کم ہو جاتا ہے۔

**ٹرومبیدیئم (Trombidium):** جب کھانے اور پینے کے بعد پچیش میں ابتری ہو جائے۔ پاخانہ سے قبل دوران اور بعد میں اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔

**کالچیکم (Colchicum):** سفید بلغم خارج ہونے اور مروڑوں کے ساتھ موسم خزاں کے پچیش۔ خونی پاخانے جو نیچے مواد کے ساتھ ملے جلتے ہوں۔

**سناپیریس (Cinabaris):** پچیش جو ہر رات ابتر ہو جائیں۔ خون والے اور بلغم والے پاخانے بہت زیادہ زور لگاتا پڑتا ہے۔ سبز رنگ کے پاخانوں والے اسہال رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ پاخانہ کرنے کے دوران مقعد باہر نکل آئے۔

**سٹریپٹوکوکین 200 (Streptococcin 200):** جراثیمی قسم کے خونی پچیش کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ خون خارج ہوتا ہے اور حرارت جسمانی بہت زیادہ ہوتی ہے نیز زہریلا پن بھی ہوتا ہے۔

سٹیفنی لو کوکین 200 (Staphylococin 200): خون اور پیپ کے اخراج کے ساتھ لاحق ہونے والے پچش کے مزمین کیسوں کے لئے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔  
 سپی سائی من (Septicaemia): خانہ بدوشی کی زندگی کے پچش کے لئے یہ دوا جادو کا اثر رکھتی ہے۔ یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والوں کے اسہال میں بھی مفید ہوتی ہے۔  
 ٹیرینتھینا (Terebinthina): خون آنے اور آنتوں کی ناسوری کیفیت کے ساتھ آنتوں اور قولون کی سوزش لاحق ہو۔

کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): زہر کی اصل والے پچش لاحق ہوں۔ گہرے رنگ کے مائع اور خون کے بہت زیادہ اخراج کے ساتھ یا بے اختیارانہ پاخانہ خطا ہو جانے کے ساتھ 'عظیم نقابت اور بے ہوشی ہوتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں 'گہرا سرخ' خون کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

کیس کیرپلا (Cascarilla): بلغم میں لتھڑے ہوئے گرہ دار پاخانے آتے ہیں۔ جن کے ساتھ درد قوی اور جلن ہوتی ہے۔ خون کی نالیوں کے امراض کے باعث آنتوں سے سیلان خون پیلے و سرخ رنگ کا متواتر ہوتا رہتا ہے۔ یہ آنتوں سے خارج ہونے والا یا بواسیر والا سیلان خون نہیں ہوتا۔

لپٹنڈرا (Leptandra): پاخانے کالے، گاڑھے، تار کی طرح کے اور متعفن ہوتے ہیں۔ خونی بلغم آتا ہے۔ یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی چیز مقعد سے خارج ہو رہی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): پاخانے کی متواتر حاجت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آنتوں میں حرکت ہوتی ہے 'حاجت رک جاتی ہے۔ پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش۔

ایلو ایس (Aloe S): خون اور بلغم والے پاخانے کے بعد پیٹ کے نچلے حصہ میں جکڑن والے درد ہوتے ہیں۔ بلغم لعاب دار خارج ہوتا ہے اور غیر معمولی زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): طوفان باد و باراں یا ٹھنڈے مرطوب موسم سے پہلے یا دوران پچش لاحق ہوتے ہیں۔

### بد ہضمی (Dyspepsia)

نکس وامیکا (Nux Vom): ناقابل ہضم غذا کے باعث بد ہضمی لاحق ہوتی ہے۔ اینٹھن والے یا شج والے درد ہوتے ہیں۔ اچھارہ ہوتا ہے۔ قے لاحق ہوتی ہے اور قبض ہوتی ہے۔ شرایوں کی بد ہضمی 'غذا ہضم ہو جانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔ اسہال اور قے کے لئے اس

دوا کو سلفر کے ساتھ بدل کر دیا جائے۔

**کاربووٹیج (Carbo Veg):** بہت زیادہ اچھارہ ہوتا ہے۔ ہوا کے ذکار آتے ہیں۔ سینے میں کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ تیزابیت ہوتی ہے اور ڈھیلے پاخانے آتے ہیں۔  
**ابیس کین (Abies Can):** گوشت، اچار اور دیگر خراب غذاؤں کی طلب ہوتی ہے۔ کترن والے درد ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں بھوک اور غشی کا احساس ہوتا ہے۔  
**شائم (Stannum):** اعصابی بد ہضمی میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ مٹلی اور تے کھانا پکانے کی بو سے لاحق ہو۔

**کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid):** اعصابی بد ہضمی لاحق ہو جاتی ہے۔ شرایوں میں انتہا درجے کا درد اس دوا کی علامت ہے۔

**روبینیا (Robinia):** تیزابیت، معدہ میں درد، کھنٹی تے وغیرہ کے ساتھ بد ہضمی لاحق ہو۔  
**سلی سلک ایسڈ (Salicylic Acid):** سڑی ہوئی بو والے ذکاروں کے ساتھ بد ہضمی لاحق ہو۔ اچھارہ اعتدال سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ معدہ میں تیزابیت ہوتی ہے۔ مٹلی میں حلق میں کھنٹن ہوتی ہے اور منہ میں پانی بھرتا رہتا ہے۔

**امیگ ڈیلز پرسیکا (Amygdalus Persica):** اسہال اور تے لاحق ہوں۔  
**ایلیم سٹی دا (Allium Sat):** پھوڑے پر گوشت اشخاص میں بد ہضمی، خوراک میں معمولی سی بے قاعدگی کے باعث آنتوں میں کھنٹن ہوتی ہے۔

**کاسٹیکم (Causticum):** اعصابی بد ہضمی، بے چین کر دینے والا اچھارہ ہوتا ہے جس کے باعث دل پھڑپھڑاتا ہے۔ زندگی سے مایوسی ہوتی ہے۔

**کالی کارب (Kali Carb):** ایک عجیب قسم کی علامت کے ساتھ بد ہضمی لاحق ہو۔ وہ علامت یہ ہے کہ جیسے ہی دروازے کو بند کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے جیسے جھٹ کے بالائی حصہ میں دروازے کو بند کیا گیا ہے اور اگر جسم کو چھو لیا جائے تو اسے بھی مریض برداشت نہیں کر سکتا۔  
**مگنیشیا میور (Magnesia Mur):** بد ہضمی لاحق ہوتی ہے۔ پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بچوں میں قبض لاحق ہوتی ہے۔

**لپٹنڈرا (Laptendra):** صفرا دالی تے لاحق ہوتی ہے۔ سیاہ پاخانے آتے ہیں۔ پیشانی میں مدہم درد ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیشانی کے گرد ایک پٹی کس کر پاندھی گئی ہو۔

**مرک سول (Merc Sol):** پہلی اور ڈھیلی زبان ہوتی ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔ ہلکے پاخانے آتے ہیں۔ کم حوصلگی ہوتی ہے۔

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** بے ہنگم قسم کی بھوک ہوتی ہے۔ زبان پر سفید طبع ہوتا ہے۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔ منہ میں پانی بھرتا رہتا ہے۔ دودھ ناموافق ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں سوجن ہوتی ہے۔ کسے ہوئے کپڑے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ پیٹ تڑپتا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔ سفید رنگ کے بدبودار پاخانے آتے ہیں۔

**سینگوئی نیریا (Sanguinaria):** زبان پر پیلا یا سفید طبع ہوتا ہے۔ ناقابل ہضم چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تیز مصالحوں والی غذا کا شوق ہوتا ہے۔ بدبودار ذکار آتے ہیں۔ منگی، قے سے بھی دور نہیں ہوتی۔ منہ میں تھوک آتا رہتا ہے۔ درد سر کے ساتھ کڑوی قے آتی ہے۔ معدہ میں جلن دار دباؤ یا خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں دھکن ہوتی ہے۔ **پلساٹیل (Pulsatilla):** مرغن غذا کھانے سے بد ہضمی لاحق ہو۔ بلغم میں انتشار ہوتا ہے۔ زبان پر گاڑھا، چکنا اور سفید طبع ہوتا ہے۔ چھوٹی قے کے ساتھ منگی ہوتی ہے۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔ درد نہیں ہوتا۔ پیٹ میں تناؤ کا احساس ہوتا ہے۔ کپڑے ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں۔ پاخانے ڈھیلے یا باقاعدہ ہوتے ہیں۔

**انٹیم کروڈ (Antim Crud):** زبان دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ ہوا کے ذکار آتے ہیں اور متعفن غذا کے ذائقے والے ذکار آتے ہیں۔

**لائیکوپوڈیم (Lycopodium):** منہ میں پانی بھرتا رہتا ہے۔ زبان پر سفید طبع ہوتا ہے۔ آنسوؤں میں تناؤ کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے۔ مریض کپڑوں کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ قبض ہوتی ہے۔ پیشاب میں پتھریاں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ غنودگی رات کے کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ **اناکارڈیم (Anacardium):** علامات کھانے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور دو گھنٹے کے بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ (یہ دوا نکس دامیکا کے برعکس ہے۔ جس میں کھانا ہضم ہو جانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔)

**ابیس نامگرا (Abies Nig):** بد ہضمی اس احساس کے ساتھ لاحق ہوتی ہے کہ جیسے مریض نے کوئی ناقابل ہضم مادہ نگل لیا ہو جو کہ معدہ کے دل والے سوراخ میں پھنس گیا ہو۔ اس میں کم حوصلگی بھی ہوتی ہے۔ نیز مراقی حالت بھی ہوتی ہے اور قبض کے باعث بد ہضمی واقع ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی یا چائے نوشی کے باعث بد ہضمی لاحق ہو۔ جس میں بعض اوقات بھیچڑوں سے خون آتا ہے اور بعض اوقات نہیں آتا۔

**نکس موسکاٹا (Nux Mosch):** کھانا کھانے کے بعد تیزابیت منہ کو آتی ہے۔ کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔

## متعفن پاخانے (بدبودار پاخانے)

### Fetid Stools (Offensive Stools)

(نیز دیکھئے "اسہال")

**پوڈوفیلیم (Podophyllum):** گلے سڑے گوشت کی طرح کے بدبودار پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔ بچوں میں دہائی ہیضہ کے دوران اسہال لاحق ہوں۔ گرم موسم میں اتھری ہوتی ہے۔ پاخانے کھٹے ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے۔ حلق میں کھٹن ہوتی ہے اور بچوں میں حد اعتدال سے بڑھی ہوئی پیاس ہوتی ہے۔

**لیکسیس (Lachesis):** نیم جانی لاحق ہو۔ دوران نیند اتھری ہوتی ہے۔ **ریوم (Rheum):** دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بدبودار پاخانے آتے ہیں۔ جو کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ بچوں میں درد قویخ کے ساتھ۔ جبکہ جسم سے بھی کھٹی بو آتی ہے۔ بچے پچپش کے ساتھ مروڑوں کے باعث چلاتے ہیں۔

**بیسنزوئک الیڈ (Benzoic Acid):** بچوں میں پیشاب کی طرح کے بدبودار اسہال۔

**بپٹیشیا (Baptisia):** ٹائیفائیڈ بخار میں گندی بو والے پاخانے ہوتے ہیں۔

**سورینم (Psorinum):** کانوں سے مواد خارج ہونے کے ساتھ بدبودار پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ایگزیمہ اور اوپتھالمیا میں پیدا ہوتی ہے۔ بچوں میں خراب ہو جانے والے انڈوں کی طرح کے پاخانے، ان کے پہلے یا دوسرے موسم گرما میں لاحق ہوتے ہیں۔

**ایسافوئیڈا (Asafoetida):** بہت زیادہ پریشان کن 'بدبو والے' پانی کی طرح کے پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور متعفن ہوا خارج ہوتی ہے۔

**آرسینک الیم (Arsenic Alb):** کیسرو 'ملیشیا میں نیم جانی ہوتی ہے۔ آنتوں کے نزلہ میں نیز فساد خون کے مرض میں نیم جانی لاحق ہو۔

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** نوزائیدہ بچوں کے ہیضہ میں کھٹے پاخانے ہوتے ہیں۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بھی کھٹے پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔

**گرافائٹس (Graphites):** مقعد میں جلن کے ساتھ کھٹے پاخانے لاحق ہوں۔

**ایپس ایم (Apis M):** ہائیڈروسیفالائیڈ میں اسے استعمال کریں۔

### چیرے (Fissure)

(مقعد پر ناسور)

گریفائٹس (Graphites): ایسے اشخاص میں جو ایگزیرما سے حساس ہوتے ہیں۔ مقعد میں انہما درجے کی دکھن ہوتی ہے اور پاخانے ٹلنے سے تسخڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مروڑ یا کھچاؤ نہیں ہوتا۔

سینگلوئی نیریا نائٹ (Sanguinaria Nit): بیجان 'خارش اور جلن مقعد میں ہوتی ہے۔  
پائونیا (Paeonia): چیرے جن سے بہت زیادہ مواد رستا ہے۔ مقعد میں بدبودار رطوبت اور دکھن ہوتی ہے۔ ہر وقت مقعد سکڑا رہتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے کئی گھنٹے بعد تک مقعد میں جلن اور کٹھن ہوتی رہتی ہے۔ ساری رات چلنا پڑتا ہے۔

سیلیشا (Silicea): مقعد کو بند کرنے والے عضلات میں بیجان ہوتا ہے اور جزوی طور پر خارج ہونے والا پاخانہ دوبارہ واپس پھسل جاتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے آدھے گھنٹے بعد بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے اور کئی گھنٹوں تک باقی رہتا ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): اس احساس کے ساتھ کہ جیسے مقعد میں لکڑی کی چکریں یا تیلیاں پھنسی ہوئی ہوں، مقعد میں چیرے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مروڑ اور جلن ہوتی ہے۔ نیز اعضاء سے مسلسل متعفن قسم کا مادہ رستا رہتا ہے۔ جلن دار، کچا پن اور سکڑاؤ ہوتا ہے۔

رٹانیا (Ratanhia): کانٹے والے اور بھالے لگنے جیسے دردوں کے ساتھ جو کہ اسماعے مستقیم میں ہوتے ہیں، چیرے لاحق ہوں۔ اچانک ٹانگے لگنے جیسے دردوں کے ساتھ مقعد میں خشکی ہوتی ہے۔ مقعد میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ جس کے باعث پاخانہ کرنے کے گھنٹوں بعد تک درد اور جلن ہوتی ہے۔

الومینا (Alumina): چیرے لاحق ہوں۔ قبض اور بہت زیادہ کھچاؤ کے ساتھ باغی جھلی موٹی ہو جاتی ہے اور سوج جاتی ہے۔

پلاٹینا (Platina): مقعد میں چیرے ہوتے ہیں۔ جن میں رینگن اور خارش ہر شام کے وقت ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): بواسیر لاحق ہو۔ پاخانہ کرنے کے دوران شدید درد ہوتا ہے۔ مریض جب چلتا ہے تو شدید جلن ہوتی ہے۔ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔

بربرس ول (Berberis Vul): مقعد میں جلن کے احساس کے ساتھ اور گاڑھی پیلے رنگ کی پیپ خارج ہونے کے ساتھ اندرونی اندھا پھوڑا ہوتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): چیرے میں ہتھوڑے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔



### پھوڑا (ناسور) (Fistula)

**نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid):** اس مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ ہر ہفتہ 200 طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ زیریں آنت میں دکھن اور جلن والے درد ہوتے ہیں۔ پھوڑے سے پتلا سبز مائل مادہ آزادانہ طور پر بہہ کر خارج ہوتا ہے۔

**سیلیشیا (Silicea):** جب ناسور (پھوڑے) سے متعفن قسم کا پانی والا مادہ خارج ہو۔  
**بربرس ول (Berb- Vul):** ناسور مقعد میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ صفراوی علامات ہوتی ہیں اور اعضاء میں خارش ہوتی ہے۔

**لیکیس (Lachesis):** ناسور میں درد ہوتا ہے جیسا کہ ہتھوڑیوں سے مارا جا رہا ہو۔  
**ایسڈ فلور (Acid Flour):** ایسا ناسور جس کے ساتھ آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور دانتوں سے مواد خارج ہوتا ہے۔

**بیسلیئم (Bacillinum):** آتشکی اور پارے کی ہسٹری والا ناسور۔ یہ دوا عمل انگیز کے طور پر بھی دی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ اچھی منتخب شدہ ادویات افادہ دینے میں ناکام ہو جائیں۔  
**کلکیریا، سلفر (Sulphur, Calcareia):** مقعد کے ناسور میں بغیر درد کے ابھار ہوتا ہے۔  
چھپچھپانے والی پیپ خارج ہوتی ہے۔

**کاسٹیکم (Causticum):** ناسور اور لمبی بواہیر۔ امعاء مستقیم میں دکھن اور جلن ہوتی ہے۔  
**ہائیڈرائسٹس (Hydrastis):** مقعد میں ناسور۔ خمدی قسم کی قبض ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم میں جلن اور سکڑاؤ ہوتا ہے۔ سیلان خون اور غشی ہوتی ہے۔

**سلفر (Sulphur):** مقعد سے اوپر کی جانب بھالے لگنے جیسے درد پھیلتے ہیں۔ خصوصاً پاخانہ کرنے کے بعد۔ اندھا ناسور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ درد نہیں ہوتا۔ پیلاہٹ مائل سبز مادہ خارج ہوتا ہے۔ حلق میں خارش ہونے کے ساتھ کھانے کی خواہش بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔  
ناک کا نزلہ لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب میں یوریا خارج ہوتا ہے۔ نیز پیشاب میں فاسفیٹ اور انگریزائٹ خارج ہوتے ہیں۔

**کلکیریا فاس (Calcareia Phos):** خنازیری مریضوں میں چھاتی کی علامات کے ساتھ اولٹا بدلتا ہوا یا پھر ایسے اشخاص میں جنہیں موسم کی تبدیلی کے وقت جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔  
**کیلن ڈولا لوشن (Calendula Lotion):** ایک اونس پانی میں ایک ڈرام دوا ملا کر بیرونی طور پر لگایا جائے۔



## جریان خون (Haemorrhage)

**ہیپامیلس (Hamamelis):** جب خون گرمے رنگ کا ہو اور پاخانہ کرتے ہوئے بغیر درد کے خارج ہو۔

**فاسفورس (Phosphorus):** جب خون ہوا خارج کرنے کے دوران خارج ہو۔

**لیکیسیس (Lachesis):** جب خون دوران حیض خارج ہو۔

**امونیا کارب (Ammonia Carb):** پاخانہ کے بعد جریان خون ہوتا ہے۔

**سینگلوکی نیریا (Sanguinaria):** آنتوں سے خون بہتا ہے جو کہ خون نکالنے کے لئے جو عکس لگانے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔

**ناکٹرک ایسڈ، میورٹیک ایسڈ (Nitric Acid, Muriatic Acid):** یہ دونوں ادویات مقعد سے سیلان خون کے لئے چوٹی کی ادویات ہیں جبکہ سیلان خون بغیر کسی وجہ کے لاحق ہو۔

**کروکس (Crocus):** جب خون سیاہ لیس دار لو تھڑوں والا ہوتا ہے۔ یہ لو تھڑے سیلان خون کے دوران سوراخ سے کالے تاروں کی صورت میں لٹکے ہوتے ہیں۔

**ٹیربینتھینا (Terebinthina):** مقعد سے جریان خون لاحق ہو اور بواسیر میں سیلان خون لاحق ہو۔ پیشاب میں الیومن اور خون خارج ہوتا ہے۔ پیشاب شدید قسم کی متعفن بو والا ہوتا ہے۔ آنتوں میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

**ایٹیک ایسڈ (Acetic Acid):** خون والے پاخانے خارج ہوتے ہیں یا خالص خون خارج ہوتا ہے۔ جو کہ پتلا ہوتا ہے۔ بواسیر سے خون بافراط خارج ہو۔

## بواسیری جریان خون (Piles)

### (Haemorrhoids)

**نکس وامیکا، سلفر (Sulphur, Nux Vom):** خون والی یا بغیر خون کی بواسیر کے لئے یہ دوا میں چوٹی کی ہیں جبکہ جلن دار درد ہوتا ہے اور پاخانہ کرنے کی لاماصل خواہش کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔ تین ماہ تک کے لئے ہر ماہ سلفر کی 1000 طاقت والی خوراک دیجئے۔ لیکن اس دوا کے استعمال سے دو دن پہلے اور دو دن بعد کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ نکس وامیکا 30 طاقت کی دیگر ایام میں روزانہ تین مرتبہ دی جاسکتی ہے۔

**ہیپامیلس (Hamamelis):** بغیر درد کے سیلان خون ہوتا ہے۔ جس کے بعد نقاہت ہو جاتی ہے جو کہ خون ضائع ہونے پر لاحق ہونے والی ہر قسم کی نقاہت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ خون

سکڑے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں خون کی کمی لاحق ہوتی ہے۔ سانس کم ہو جاتا ہے اور کمزوری ہوتی ہے حالانکہ بھوک خوب لگتی ہے۔

میو کوٹا (Mucuna): سیلان خون والے بوائیر میں اس دوا کے مد نظر پتھر کی ایک خوراک ایک قطرہ کی دی جاتی ہے۔ دن میں دو یا تین خوراکیں دی جائیں تو دو تین دن میں بیماری رفع ہو جاتی ہے۔

فائیکس ریل (Ficus Rel): اگر میو کوٹا ناکام ہو جائے تو یہ ایک دوسری دوا ہے جسے آزمایا جا سکتا ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): حیض والے خون کے بند ہو جانے کے بعد آنتوں سے افراط کے ساتھ خون جاری ہو جاتا ہے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): جس بوائیر میں خون بہنا بند ہو جائے لیکن امعاء مستقیم میں تیز چہننے والے دردوں کے ساتھ بوائیر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔

کالکیریا کارب (Calcarea Carb): بوائیر کے سسے باہر کو نکل آتے ہیں۔ چلنے میں درد ہوتا ہے۔ بیٹھنے پر بہتری ہوتی ہے۔ پاخانہ کرنے کے دوران باافراط سیلان خون کے ساتھ درد ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): ہر پاخانہ کے بعد خون کی ایک پھوٹی دھار بہہ نکلتی ہے۔ کالی کارب (Kali Carb): بوائیر لاحق ہو۔ جس میں درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے جیسا کہ آگ لگی ہوئی ہو اور خون بہتات کے ساتھ بہتا ہے۔ اندر کی جانب بہت زیادہ قاف اور سوجن ہوتی ہے۔ مقعد کا ناسور لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے سے یا ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی طور پر جلن ختم ہو جاتی ہے۔

ایلو (Aloe): جب خون قل سے بننے والے پانی کی طرح خارج ہو۔ بوائیر کے سسے انگور کے ٹکے کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے بہتری ہوتی ہے۔ ہوا فضلے کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ شدید قسم کی خارش اور مقعد میں جلن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مریض مسلسل مقعد میں انگلی ڈالے رکھتا ہے۔ مرہم لگانے سے جلن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

میوریک ایسڈ (Mur Acid): بوائیر کے سسے انگور کے ٹکے کی طرح ہوتے ہیں۔ جو بیگنی رنگ کے ہوتے ہیں اور پھونکنے سے ان میں جلن ہوتی ہے۔ بچوں کی بوائیر بوائیر کے سسے باہر نکل آتے ہیں۔ جن کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria): آنتوں سے خون مسلسل بہتا ہے۔ یہ خون پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔

**اگنیشیا (Ignatia):** اندھی بواہیر جس میں درد ہوتا ہے۔ خواہ مریض بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ چلنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ امعاءً مستقیم میں دبانے والا تیز درد ہوتا ہے۔  
**لیکیس (Lachesis):** ایسی بواہیر جس میں ہتھوڑے نکلنے جیسے دردوں کے ساتھ سوزش ہوتی ہے۔

**الیومینا (Alumina):** بواہیر شام کے وقت ابتر ہوتی ہے اور رات کے آرام کے بعد اس میں بہتری ہو جاتی ہے۔ مقعد سے خون کے نو تھڑے خارج ہوتے ہیں۔ فسلہ سخت اور گرہ دار ہوتا ہے۔ جیسا کہ بھیڑ کی میٹلیاں ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ مقعد سے خون خارج ہونے کے بعد کانٹے والا درد ہوتا ہے۔

**ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip):** پُر درد، اندھی یا مقعد سے باہر نکلی ہوئی بواہیر جس کا رنگ میٹلنی ہوتا ہے۔ جس میں درد، جلن اور خارش کے ساتھ بہت زیادہ ابتری ہوتی ہے اور ککڑی کی پکڑیں یا تیلیاں امعاءً مستقیم میں پھنسی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ سیلان خون کم ہوتا ہے۔ سخت اور خشک پانخانے خارج ہوتے ہیں۔ جو وقت کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ جس کے بعد امعاءً مستقیم کے باہر نکلنے کا احساس ہوتا ہے۔ کمر اور کولہوں میں درد ہوتا ہے۔ خون جاری ہونے سے افادہ ہوتا ہے۔

**ایپس (Apis):** تیز ڈنگ نکلنے جیسے دردوں کے ساتھ جن میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔

**آرس البم (Ars Alb):** جلن دار درد اور بے چینی میں گرم چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔

**کاسٹیکم (Causticum):** ناقابل برداشت درد والی بواہیر، جب مریض پیتا ہے تو ابتری ہوتی ہے۔

**ڈائیوسکوریہ (Dioscorea):** بواہیر انگور کے لکھنوں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جس کے ساتھ جگر تک بندش پھیل جاتی ہے۔

**پائسونیا (Paeonia):** جریان خون کے ساتھ ناسور، مقعد اور بواہیر کے ارد گرد کے حصے میٹلنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ جو بھوسی سے ڈسکے ہوتے ہیں۔ مقعد کے اندر ناسور ہوتا ہے۔ بس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ ساری بلغمی جھلی ناسوروں اور خشکافوں سے پر ہوتی ہے۔ کانٹے والے درد ہوتے ہیں نیز مقعد میں خارش ہوتی ہے۔ جو مقعد کو کھرچنے پر آمادہ کرتی ہے۔

**پوڈوفیلیم (Podophyllum):** زچگی کے بعد مقعد کے خروج کے ساتھ بواہیر لاحق ہوتی ہے۔ جگر میں اجتماع خون ہوتا ہے نیز قبض ہوتی ہے۔

**لپٹنڈرا (Leptendra):** اسماعائے مستقیم کے خروج کے ساتھ بیرونی بوا سیر لاحق ہوتی ہے۔  
خونی بوا سیر۔

**رشاکس (Rhus Tox):** اندھی بوا سیر جو ہر پاخانے کے بعد باہر کو نکل آتی ہے۔ اس کے ساتھ کمر میں درد ہوتا ہے اور اسماعائے مستقیم میں باہر کی جانب دباؤ ہوتا ہے۔

**کیکٹس جی (Cactus G):** سیلان خون والی بوا سیر دریدوں کے ڈھیلے پر جانے کے باعث جن سے زیادہ مقدار میں خون بہتا ہے۔ رسولیاں بن جاتی ہیں۔

**کولن سونیا (Collinsonia):** جریان خون والی بوا سیر جس میں کمر درد اور خمدی قسم کی قبض ہوتی ہے۔ اسماعائے مستقیم کا خروج ہوتا ہے۔ بوا سیر سے خون بہتا ہے یا اندھی بوا سیر اور بوا سیر کے مسوں کا خروج، قبض اور اسہال اول بدل کر لاحق ہوتے ہیں۔

**سلیگ (Slag):** مقعد میں بہت زیادہ خارش، دکھن اور گھٹنوں کی چھٹیوں میں درد کے ساتھ بوا سیر لاحق ہو۔

**امونیا کارب (Ammonia Carb):** دیر تک رہنے والے درزوں کے ساتھ 'پاخانہ کے بعد بوا سیر کے سے مقعد سے باہر نکل آئیں۔ مریض چل نہیں سکتا۔ بوا سیر پاخانے کو آزاد کرنے کے لئے بھی مقعد سے خروج کرتی ہے۔ مقعد میں جلن اور خارش ہوتی ہے جو کہ سونے سے رک جاتی ہے۔ حیض کے وقت بوا سیر میں اتھری ہو جاتی ہے۔

**کیپسکیم (Capsicum):** بوا سیر لاحق ہو۔ مقعد میں دکھن کے احساس کے ساتھ جلن، سوجن، خارش اور جھکن ہوتی ہے۔ بوا سیر خون والی یا اندھی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ بھغم خارج ہوتا ہے۔ فربہ لوگ آسانی سے تھک جاتے ہیں۔

**کاربو ویج (Carbo Veg):** بوا سیر کے نیلے رنگ کے سے باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان سے پیپ بہتی ہے۔ جو بدبودار ہوتی ہے۔ اسماعائے مستقیم میں سوجن اور جلن ہوتی ہے۔ اسماعائے مستقیم سے مواد رستارہتا ہے۔ اچھارہ ہوتا ہے۔ سر میں اجتماع خون ہوتا ہے اور ناک سے سیلان خون ہوتا ہے۔ جس کا باعث امیرانہ طرز زندگی ہوتا ہے۔

**مرک سول (Merc Sol):** اسہال اور پیکش کے ساتھ جریان خون لاحق ہو۔

**جلسی میم (Gelsemium):** فالج سے جریان خون ہوتا ہے۔

**ہائپرکیم (Hypericum):** خصوصاً یہ دوا خونی بوا سیر کے لئے ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ درد اور نرمی ہوتی ہے۔

## امعائے مستقیم کی سوزش

(Inflammation of Rectum)

اگنیشیا (Ignatia): سکڑن والے گولی گٹنے جیسے اور تنگی والے درد ہوتے ہیں۔  
 کیپسکیم (capsicum): جب مروڑ لائق ہوں۔ جلن دار اور شدید قسم کے درد ہوتے ہیں۔  
 فاسفورس (Phosphorus): بھالے گٹنے جیسے اور گولی گٹنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ مقعد میں جلن ہوتی ہے۔  
 ایلو، پوڈوفیلوم (Podophyllum, Aloe): حاد کیسوں میں۔  
 کالجیکم (Colchicum): بہت زیادہ ملغم کے ساتھ ابتدائی حاد کیسوں میں۔  
 نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): مزمن کیسوں میں جبکہ تنگی کا رجحان پایا جاتا ہو۔

بدبودار (پاخانے) (Offensive)

(دیکھئے "متعفن پاخانے")

## امعائے مستقیم میں درد

(Pain in Rectum)

روٹا (Ruta): پاخانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ جو کئی گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔  
 رٹانٹیا (Ratanhia): مقعد میں جلن دار درد ہوتا ہے۔ جو پاخانے کے گھنٹوں بعد تک رہتا ہے۔ جس کا باعث چیرے ہوتے ہیں۔  
 رشاکس (Rhus Tox): پیشاب کرنے کے دوران مقعد میں درد ہوتا ہے۔  
 میورٹیک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ (Nit Acid, Mur Acid): امعائے مستقیم میں جلن دار درد ہوتا ہے۔  
 ایلو ایس، سلفر (Sulphur, Aloe S): اسہال کے دوران اور ہوا خارج کرنے کے بعد درد ہوتا ہے۔  
 کیپسکیم (Capsicum): پیچش کے دوران درد ہوتا ہے۔  
 کاسٹیکم (Causticum): مریض جب چل رہا ہو تو امعائے مستقیم میں درد ہوتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): تیز قسم کے دور امعائے مستقیم میں ہوتے ہیں اور اوپر کی جانب مار کرتے ہیں۔

بواسیر (Piles)

(دیکھئے ”بواسیری جریان خون“)

امعائے مستقیم کی رسولی (Polypus)

(نیز دیکھئے ”متفرق“ کے ذیل میں ”رسولی۔۔۔ امعائے مستقیم“)

ٹیو کریم (Teucrium): امعائے مستقیم میں گومڑ ہوتا ہے۔

Proctitis

(دیکھئے ”امعائے مستقیم کی سوزش“)

امعائے مستقیم کا خروج

(Prolapsus of Rectum)

ایلو ایس (Aloe S): اسہال، سیلان خون اور مروڑوں کے ساتھ امعائے مستقیم کا خروج۔  
پوڈوفالیم (Podophyllum): ہر پاخانے یا اچانک پکپش کے بعد امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو۔ اسہال کے ساتھ جھینگیں آتی ہیں۔ خصوصاً صبح کے وقت۔  
گمبوجیا (Gambogia): سبز یا پیلے اسہال کے ساتھ، جلن دار درد کے ساتھ یا سخت لیکن ناکافی پاخانہ کے ساتھ اور شدید قسم کی پاخانہ کی حاجت کے ساتھ، امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔

میوریک الیمڈ (Muriatic Acid): امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جبکہ مریض پیشاب کر رہا ہو۔ ساتھ میں بواسیر بھی ہوتی ہے۔

روتا (Ruta): زہنگی میں یا زہنگی کے بعد پاخانہ کرنے کی معمولی سی کوشش کے ساتھ امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جاتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): امعائے مستقیم کے خروج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ ہیٹ میں ڈھول کی طرح سے تباؤ ہوتا ہے اور اسہال کے بعد امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جاتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): نمایاں قسم کا امعائے مستقیم کا خروج۔

ایسکولس ہیپوکاسٹینم (Aesculus Hippocostanum): پاخانہ کرنے کے بعد امعاء مستقیم کا خروج لاحق ہو۔ بہت زیادہ بڑی بواسیر کے سے امعاء مستقیم میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ جلن دار قسم کا جریان خون ہوتا ہے۔ درد ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چاقو چلایا جا رہا ہو۔

### تشنجی دورے (Spasms)

کالی بانیکروم (Kali Bich): مجامعت کے بعد پیشاب والی نالی میں درد کے ساتھ امعاء مستقیم میں تشنجی دورے ہوتے ہیں۔

نکس موسکاتا (Nux Mosch): نرم پاخانہ خارج کرنے میں دقت ہوتی ہے جس کے ساتھ منہ خشک ہوتا ہے۔ ہر وقت غنودگی طاری رہتی ہے۔ غشی آسانی کے ساتھ طاری ہو جاتی ہے۔ چائنا (China): خونی بواسیر کے رجحان والے مریضوں میں نرم پاخانہ خارج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مواد بہت زیادہ دیر تک رستا رہتا ہے۔ مریض زرد اور کمزور ہوتا ہے۔ اچھارے کے ساتھ تباہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ابکیاں آتی ہیں۔ سکون کے بغیر ہوا خارج ہوتی ہے۔

سارساپیرلا (Sarsaparilla): پاخانے کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے۔ متواتر پیشاب آتا رہتا ہے۔ یادداشت جاتی رہتی ہے۔ پیشاب البیوسن کے ساتھ گاڑھا اور دھندلا ہوتا ہے۔ سیلیسا (Silicea): دباؤ اور پاخانہ کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ صرف بلغم یا دوسرا سخت پاخانہ خارج ہوتا ہے۔ جو کہ بہت دقت سے خارج ہوتا ہے۔

### گھٹن (تنگی) (Stricture)

تھائیو سینا-سینم (Thiosinaminum): امعاء مستقیم میں گھٹن ہوتی ہے۔  
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): سرطانی یا عام گھٹن (تنگی)۔  
ہائیڈراستس (Hydrastis): سرطانی گھٹن میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔

روٹا (Ruta): جب ہائیڈراستس ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

### مروڑ (پاخانہ کرتے وقت زور لگانا)

#### Tenesmus (Straining at Stool)

مرک کور (Merc Cor): مسلسل مروڑ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔  
ایلو ایس (Aloe S): پاخانہ کرنے کی ایسی خواہش کے ساتھ جس پر قابو نہ پایا جاسکے 'مروڑ

لاحق ہوتے ہیں۔  
بیلادونا (Bell): پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ حاجت یا بہت پاخانہ ہونے کے ساتھ مروڑ لاحق ہوں۔  
اگنیشیا (Ignatia): پاخانہ نہیں ہوتا گو مروڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امعاء مستقیم مقعد سے خارج ہوتی ہے۔  
نکس و امیکا (Nux Vom): متواتر لاحق حاصل پاخانہ کرنے کی حاجت۔  
پوڈوفالیم (Podophyllum): پاخانہ کرنے کے لئے زور لگانے پر آسانی سے امعاء مستقیم باہر نکل آتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): مسلسل امعاء مستقیم پر نیچے کی جانب دباؤ پڑتا رہتا ہے۔ پاخانہ ڈھیلے ہوتے ہیں۔ پیپ دار خون والے یا قبض والے پاخانہ ہوتے ہیں۔ پاخانہ کرنے سے پہلے اور بعد میں زور لگتا رہتا ہے۔

### پیٹ کے کیڑے (Worms)

سنا (Cina): کول دھاکے جیسے اور نیپ جیسے پیٹ کے کیڑوں کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ اس میں مریض دانت پیتا رہتا ہے۔ 1x طاقت کی دوا دینی چاہئے۔ مریض بے چین رہتا ہے اور مسلسل ناک مسلتا رہتا ہے۔ بھوک جاتی رہتی ہے یا بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کے باعث لگنے والے تشنجی جھٹکوں کو بھی روک دیتی ہے۔ جن میں اونچی طاقت کی خوراکیں دی جانی چاہئیں مثلاً 200 یا 1000 طاقت کی خوراکیں۔  
اینٹھیرم (Anantherum): نیپ جیسے کیڑوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ اس میں بھوک غیر صحت مند ہوتی ہے۔ مریض رات کو جاگ جاتا ہے۔  
ابروتانم (Abrotanum): یہ دوا پیٹ کے کیڑوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔  
چینو پوڈیم، تھائی مول (Chenopodium, Thymol): خصوصاً یہ دوا آنکڑے کی طرح کے کیڑوں کے مرض کے لئے ہوتی ہے۔  
کوسو (Kousso): نیپ والے کیڑوں کو یہ دوا نکالنے کے لئے بہت عمدہ ہے۔  
فلکس ماس (Felix Mas): نیپ کی طرح کے کیڑوں کو نکالنے کے لئے یہ بہت کار آمد دوا ہے۔ خصوصاً جب ان کے ساتھ قبض بھی لاحق ہو۔  
سینٹونائن (Santonine): جب سنا ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔ سنا اور سینٹونائن دونوں ادویات زیادہ تر کیسوں کا علاج کرتی ہیں۔ اس دوا کو 2x کی طاقت میں دو گھنٹوں



کے وقتوں کے ساتھ دن میں چھ مرتبہ چند روز تک دینا چاہئے۔  
کیلڈیم (Caladium): یہ ایسے کیزوں کے لئے مفید دوا ہے۔ جو سیون پر چلتے پھرتے ہیں اور چھوٹی لڑکیوں کی اندام نمائی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان لڑکیوں میں جلق کار بھان پایا جاتا ہے۔

ٹیو کریم (Teucrium): پن کی طرح کے پیٹ کے کیزوں کے لئے جبکہ امعاء مستقیم میں بہت زیادہ بیجان ہوتا ہے۔ مدر ٹیچریا 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔

سنایس نائیگرا (Sinapis Nigra): پن جیسے کیزوں کے لئے یہ ایک دوسری دوا ہے۔ جب ٹیو کریم ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

سپائی جیلیا (Spigelia): بھیگاپن اور جھٹکے لاحق ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ چہرہ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔ ناف کے قریب درد قویج کے ساتھ غشی والی متلی محسوس ہوتی ہے اور یہ سب کچھ پیٹ کے کیزوں کے باعث ہوتا ہے۔ اس دوا کا ٹیچر رومال پر ذال کر مریض کو سکھانے سے پیٹ کے کیزوں کے باعث لاحق ہونے والے جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں۔

سٹانم (Stannum): اس دوا کا استعمال پیٹ کے کیزوں کے لئے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے جو کہ جلاب کے ذریعے کیزوں کو آسانی سے باہر نکال دیتی ہے۔ مریض کا چہرہ زرد اور دھنسا ہوا ہوتا ہے اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔ طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ عموماً بے حسی ہوتی ہے۔ سانس متعفن ہوتا ہے اور معمولی بخار ہوتا ہے۔ مریض معدے کے بل لینے کو ترجیح دیتا ہے۔


کلکیریا کارب (Calarea Carb): خنازیری مزاج کے بچوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ ایسے بچے زرد اور مونے ہوتے ہیں۔ ان کا سر گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت پسینے آتے ہیں۔

کیوپرم آکسی ڈیٹم نائیگرم (Cuprum Oxydatum Nigrum): کہا جاتا ہے کہ یہ دوا تمام اقسام کے کیزوں کے لئے عمدہ دوا ہے۔ پھوٹی طاقت والی خوراکوں میں دینی چاہئے مثلاً 6x اسے گس دامیکا 30 کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے۔ جو کہ دن میں چار پانچ مرتبہ دی جاتی ہے اور چار سے چھ ہفتوں تک یہ دوا دی جاتی ہے۔

نایٹرم فاس (Natrium Phos): آنتوں میں پائے جانے والے لمبے بھول یا دھاگے کی طرح کے کیزے مریض ناک کو مسلاتے ہیں اور گنٹھیا کا رجحان ہوتا ہے۔

ٹیرےبینٹھ (Terebinth): مقعد میں جلن اور ریگن ہوتی ہے جیسا کہ کیزے مقعد سے باہر

ریجک کر نکل رہے ہوں۔ یہ دوا گول اور ٹیپ جیسے کیڑوں کو خارج کرتی ہے۔  
ٹیلوریم (Tellurium): یہ دوا دھماگے جیسے کیڑوں کو نکالتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): ٹیپ جیسے کیڑوں کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا قابل لحاظ طویل عرصہ  
 تک دینی چاہئے۔  
سکیرینم (Scirrhinum): جب سنا اور ٹیو کریمم ناکام ہو جائیں تو یہ دوا کیڑوں کو نکالنے میں مدد  
 دیتی ہے۔



# نظام بول کے امراض

## (Diseases of Urinary System)

گردے، مثانہ اور پیشاب

(Kidneys, Bladder and Urine)

پیشاب کی جراثیمیت (Bacillus- Coli)

تھوجا (Thuja): پیشاب کی جراثیمی وبا کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ ہر ہفتے ۱ ایم طاقت کی دوا دی جائے پھر اس دورانے کو بڑھا کر ایک مہینے تک لے جائیں۔ بشرطیکہ بہتری ہو رہی ہو۔

فارمیکا روفا (Formica Rufa): پیشاب کی جراثیمی وبا (infection) کے لئے یہ دوا بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ رات کے وقت پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے جو کہ گدلا ہوتا ہے اور اس کی بو بہت گندی ہوتی ہے۔

بی (ای) کولی 30 (B (E) Coli 30): پیشاب کے صاف و بائی کیسوں میں استعمال ہوتی ہے۔ میتھیلین بلیو (Methylene Blue): بخار، پیٹ کے دھول جیسے تناؤ اور ہڈیان والے کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جن میں پیشاب میں پیپ آتی ہے۔ گردوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب سبز رنگ کا ہوتا ہے۔

اکی ناسیا (Echinacea): جب و بائی مرض خون کی دھار کو متاثر کرے۔ پیشاب میں البیومن ہوتا ہے اور پیشاب متواتر آتا ہے۔

## گردوں کی سوزش

(Brights Disease)

(Inflammation of Kidneys-Nephritis)

**اکونائٹ این (Aconite N):** جب مرطوب زمین پر بیٹھنے یا لیٹنے کے باعث لمبڈ لگ جانے یا اچانک پیموں کے دب جانے کے باعث یہ مرض لاحق ہو۔ اس کے بعد بے چینی، پیاس، درد سر اور پیشاب کا اچانک دب جانا لاحق ہوتے ہیں۔

**ایپس مل (Apis Mel):** گردوں کی سوزش کے حادثوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ ان کیسوں میں پیاس بالکل نہیں رہتی۔ استسقاء میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ پھرے پر اور بازوؤں اور ٹانگوں پر استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ سر، کمر، ٹانگوں، بازوؤں اور گردوں میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب متواتر لیکن کم مقدار میں آتا ہے۔ پیشاب میں البیومن بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے اور تنفس میں دقت ہوتی ہے۔ دباؤ کے ساتھ سانس پھول جاتا ہے۔ تمام علامات میں گرمی سے افادہ ہوتا ہے اور سردی سے کمی واقع ہوتی ہے۔ چھوٹی طاقت کی خوراکیں دی جائیں کیونکہ چھوٹی طاقت کی خوراکیں بہترین عمل کرتی ہیں۔

**ہیلے بورس (Helleborus):** گردوں کی سوزش کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ پیشاب کم مقدار میں اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ پیشاب میں زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بے ہوشی لاحق ہوتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوتی ہیں اور روشنی سے حساسیت نہیں ہوتی۔ تشنگی جھٹکے لگتے ہیں۔ جسم سے پیشاب کی تیز بو آتی ہے۔ دماغ کے اندر رطوبات خارج ہوتی ہیں۔ یہی اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔

**آرسینک البم (Arsenic Alb):** یہ دوا گردوں کی سوزش کے تمام امراض کا اعلاہ کرتی ہے لیکن زیادہ تر بعد والے مراحل کی نشاندہی کرتی ہے۔ جبکہ پانی والے اسماں لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس میں جلد پیلی ہوتی ہے اور موی نمود لئے ہوتی ہے۔ پیشاب، بھلیوں اور البیومن سے پر ہوتا ہے۔ چھوٹے وقفوں میں پانی کی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ گرمی کی خواہش ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ چہرہ پھولا ہوتا ہے۔ سخت اذیت ہوتی ہے۔ موت کا خوف ہوتا ہے۔ تشنگی جھٹکے لگتے ہیں۔

**کینابیس سیٹی وا (Cannabis Sativa):** پیپ اور طعم کے باعث پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔ پیشاب گدلا اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ پیشاب کا اخراج قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔ پیشاب

کی ٹالی میں ٹانگے سے لگتے ہیں اور جلن ہوتی ہے۔  
**کالی کلور (Kali Chlor):** گردوں کی شدید قسم کی سوزش لاحق ہوتی ہے جس کے ساتھ پیشاب کم مقدار میں گہرے رنگ کا 'الیومن والا' بھلیوں والا خارج ہوتا ہے۔  
**کلکیریا سلف (Calcarea Sulph):** خون کی کمی لاحق ہو۔ جس کے ساتھ بڑھی ہوئی قحطیت اور کمزوری ہوتی ہے۔ پیشاب میں پیپ ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران جلن ہوتی ہے۔ پیٹ میں بہت زیادہ تھکاؤ ہوتا ہے۔ زلاوی درد سر ہوتا ہے۔

**مرکوریس کار (Mercurius Cor):** یہ دوا بڑے سفید گردے کی نشاندہی کرتی ہے۔ الیومن اور بھلیوں کے ساتھ کم مقدار میں سرخ پیشاب خارج ہوتا ہے۔ حمل والی گردوں کی سوزش 'پیپ والی گردوں کی سوزش' حمل کے پانچویں سے ساتویں مہینے میں پاؤں سوج جاتے ہیں۔

**پیکرک ایسڈ (Picric Acid):** پیشاب میں سرخ جسموں کا اخراج ہوتا ہے۔ پیشاب بہت زیادہ اندھی کین کا حامل ہوتا ہے۔ پیشاب میں دانے دار مادے کا اخراج ہوتا ہے اور پکٹائی کی اتھری واقع ہو جاتی ہے۔ گردوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے جس کے ساتھ شدید قسم کی کمزوری ہوتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا خون آلود اور کم مقدار میں ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیشاب کی حادث ہوتی ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** پیشاب میں خون کے سرخ جسکے خارج ہوتے ہیں۔ پیشاب گدلا اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ پیشاب کی تلھٹ سرخ ہوتی ہے نیز اس میں خون ہوتا ہے۔

**کنٹھرس (Cantharis):** پیشاب میں زہر کا توہم ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مسلسل اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ بے چینی کے ساتھ پیشاب کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے اور آنکھیں چمک دار ہوتی ہیں۔ پیشاب کرنے کی حادث ہوتی ہے لیکن کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ مثانہ میں پیشاب بالکل نہیں ہوتا۔ سرخ بخار یا خناق کے بعد استقاء لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب پر درد ہوتا ہے۔ ایک وقت میں صرف چند قطرے ہی خارج ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت گرم اور خون آلود ہوتا ہے۔

**ٹیر-بستہ (Terebinth):** گردوں میں اجتماع خون کے ابتدائی مراحل میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ پیشاب کی ٹالی کے ساتھ ساتھ اور کمر میں درد کے ہمراہ پیشاب خون آلود ہوتا ہے۔

**پلمبم (Plumbum):** گردوں کی دانوں والی اتھری لاحق ہوتی ہے۔ گھٹیا دی گردے 'چہرہ پیلا' پھولا ہوا اور بھاری تاثرات والا ہوتا ہے۔ قبض لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب میں الیومن خارج

ہوتا ہے 'گردے میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): گردوں کی دانے والی اجڑی جس کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ نبض ست ہوتی ہے۔

بیننزوئکک ایسڈ (Benzoic Acid): درد گردہ جو کہ تیز اور شدید ہوتا ہے 'درد کی لہریں کمر سے گزر جاتی ہیں نیز چھاتی تک چلی جاتی ہیں۔ پیشاب گہرے رنگ کا اور امونیا کی تیز بو والا ہوتا ہے 'پیشاب کی بو انتہا درجے کی چھینے والی یا ٹاک میں کھس جانے والی ہوتی ہے۔ گنٹھیا کے ساتھ گردوں کی سوزش اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔

مرکیوریس سالٹی ٹیٹ (Mercurius Gynat): پہلے اور دوسرے مرحلہ میں یہ دوا عمدہ ہوتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں گہرے رنگ کا اور البیومن سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ گردوں کی نالیوں میں درد ہوتا ہے۔

ایپوسائٹم (Apocynum): کم مقدار میں پیشاب اور پیاس کے ساتھ استسقاء کی حالت 'اٹھیں میں پیاس نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس دوا کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حمل والی گردوں کی سوزش میں سکتے اور تشنجی جھکوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔

وکی کیریا (Vesicaria): درد گردہ 'گردوں میں اعصابی درد 'پیشاب کی نالی میں جلن اور مثانہ میں ہیجان کے ساتھ پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ مریض رات کے دوران 30 مرتبہ پیشاب کرتا ہے۔ سوزاک لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب کی تلچھٹ میں اینٹ کا براہہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں کثیر مقدار میں یوریا خارج ہونے کا علاج بھی اسی دوا سے کیا جاتا ہے۔ پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب نرہ درد ہوتا ہے جس میں پیپ البیومن اور خون ہوتا ہے۔ یہ کیفیت استسقاء میں ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum): پیشاب میں البیومن ہوتا ہے جو کہ کالا ہو جاتا ہے۔ استسقاء سو جن کے ساتھ پیشاب کا کم مقدار میں خارج ہونا 'گردوں کی سوزش کی حاد صورت۔

سولی ڈیگو (Solidago): گردوں میں نری واقع ہو جاتی ہے۔ معمولی سا چھوٹے سے گردے نرم ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ درد گردوں سے چھٹ تک پھیل جاتا ہے۔ نیز مثانے اور نالگوں تک درد چلا جاتا ہے 'پیشاب سرخ بھورے رنگ کا 'کم مقدار میں 'گاڑھا' ناپید قسم کا ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ نیز پیشاب میں البیومن 'بلغم اور فاسفیٹ ہوتا ہے 1x یا 3x کی خوراک دیجئے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): جب گردوں کی سوزش اور استسقاء کے ساتھ پیشاب نہیں سرخ ریت خارج ہو۔

ایسڈ نائٹریک (Acid Nitric): کان کی تکلیف کے ساتھ گردوں کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ کان سے زردی مائل سفید مادہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کی بو گھوڑے کے پیشاب والی ہوتی ہے۔

آرسینک بروم (Arsenic Bron): جب شوگر کے ساتھ البیومن پیشاب میں خارج ہو۔ جب ٹیئم ناکام ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

## گردوں کی پتھری

(Stone in the Urinary Tract)

(Calculus- Renal. Gravel)

بربرس ول (Berberis Vul): گردوں والے درد قویج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً جب درد بائیں جانب ہوتا ہے اور گردوں سے پیشاب کی ٹالی تک پھیل جاتا ہے۔ یہ درد پیشاب کی حاجت کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ انہی علامات کے ساتھ یہ دوا دائیں جانب کے درد کا علاج بھی کرتی ہے۔

اوزیم کین (Ocimum Can): اذیت ناک اور مروڑنے والا درد لاحق ہوتا ہے۔ جس کے باعث مریض چلاتا ہے اور بلبلاتا ہے ' اینٹ کے برادے کے ساتھ پیشاب سرخ ہوتا ہے یا پیشاب کی تلچٹ سفید ہوتی ہے۔ پیشاب 'گدلا' سرخ اور خون آلود ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مزمن کیسوں میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ عاد درد ہو چکا ہو۔ ہیٹ میں اچھا رہتا ہے۔ خصوصاً پیشاب میں سرخ بریت کے ساتھ دائیں جانب۔ یہ دوا 30 طاقت کی دینی چاہئے اور دن میں دو مرتبہ سے زیادہ نہیں دینی چاہئے۔ یہ دوا صبح شام تقریباً تین ماہ تک دی جائے۔

چائنا سلف (China Sulph): جب پیشاب میں اینٹ کا برادہ یا زرد مادہ خارج ہو۔ سارسپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب کی سفید تلچٹ کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پیشاب گدلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مٹی والا پانی ہوتا ہے۔ پیشاب کے آخر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار والا چھپچھپا اور بھلیوں والا ہوتا ہے ' مثلاً میں اینٹیں ہوتی ہے۔

پیرییری (Pariera B): جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا مدر ٹنگر کو گرم پانی میں ملا کر پانچ قطرہوں کی خوراک کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔

**کلکیریا کارب** (Calcarea Carb): گردوں والا درد قونچ جبکہ گردوں کی پتھری بننے کا باعث یورک ایسڈ ہوتا ہے۔

**ارٹیکا یورینس** (Urtica Urens): گردے میں پتھری ہوتی ہے 'پیشاب گاڑھا ہوتا ہے' یہ دوا گردوں سے کنکر اور پتھری کو خارج کرتی ہے۔

**نیٹرم فاس** (Natrurn Phos): یہ دوا پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور چونے کے اجزاء (ایگزالیٹ) کو تحلیل کرتی ہے اور انہیں جگر کو سخت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دوا 7x طاقت کی خوراکوں کی صورت میں دن میں چار مرتبہ دینی چاہئے۔

**ٹیریبینٹینا** (Terebinthina): گردوں کے علاقہ میں شدید کھینچنے والا درد ہوتا ہے 'پیشاب میں شدید جلن اور کنسن ہوتی ہے' پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے۔ پیشاب میں خون اور البیومن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوا پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور گردوں کی پتھری کو تحلیل کرتی ہے۔ ایسے کیس میں اس دوا کی 1M ڈالی لیوٹن دی جاسکتی ہے۔ پیشاب سرخ 'بھورا' سیاہ یا دھوئیں کے رنگ کا ہوتا ہے۔

**بیلادونا** (Belladonna): گردوں کے علاقہ میں پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں جو کہ پتھری کے راستہ بنانے کے باعث لاحق ہوتے ہیں۔

**ڈائیوسکوریہ** (Dioscorea): مریض خشک اور اینٹھن والے دردوں کے ساتھ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت گردوں کی پتھری خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے۔ ناف کے قریب درد کے ساتھ پیشاب کی نالی میں کھینچن لاحق ہوتی ہے۔ جس میں دبائے سے افادہ ہوتا ہے۔

**کینتھارس** (Cantharis): گردے 'مثانے' اور پیشاب کی نالی کی سوزش۔ گردے میں تیز پھاڑنے والا اور چھین والا درد ہوتا ہے 'پیشاب خارج ہوتے ہیں دقت ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ خون خارج ہوتا ہے۔

**ہائیڈرینگیا آربورس** (Hydrangea Arbores): یہ دوا گردے کی پتھری کو توڑ دیتی ہے۔ خون آلود پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب میں سفید نمک خارج ہوتا ہے۔

**ملی فولیم** (Millefolium): مثانہ میں پتھری ہوتی ہے جس سے پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ پیشاب خون آلود ہوتا ہے۔

**کاسٹیکم** (Causticum): اذیت ناک درد ہوتا ہے جس کی لہریں گردے سے خسیوں تک جاتی ہیں 'حملہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض سو رہا ہوتا ہے' پیشاب قلعروں میں خارج ہوتا ہے۔



## ورم مثانہ — (Cystitis)

(نیز دیکھئے "پیشاب آنا")

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): تیز بخار اور گرم اور خشک جلد کے ساتھ حاد کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ پیاس ہوتی ہے۔ خوف لاحق ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ مثانہ میں مسلسل جلن دار درد ہوتا ہے۔ پیشاب تکلیف دہ اور بدقت ہوتا ہے۔ بچے چلا اٹھتے ہیں اور اعضائے مخصوص کو ہاتھ سے جکڑ لیتے ہیں۔

اپیس ایم (Apis M): مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ تواتر کے ساتھ اس دوا نے کئی کیسوں میں اچھا علاج کیا ہے۔ اس میں پیشاب کم مقدار میں 'گدلا' اور خون آلود ہوتا ہے۔

کینتھرس (Cantharis): مثانہ میں ناقابل برداشت جلن دار درد ہوتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی اور سیون کے ساتھ ساتھ تشفی درد ہوتا ہے جو غصیوں تک پھیل جاتا ہے۔ جو کہ اوپر کو چڑھے ہوتے ہیں۔ شند (سردکرا) میں جلن ہوتی ہے۔ سوراخ سرخ ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ پیشاب قطروں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بے انتہا جلن اور کمپن ہوتی ہے۔ جو کہ پیشاب کرنے سے پہلے، پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں خون آلود ہوتا ہے لیکن پانی پینے سے یا پانی کو دیکھنے سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حاد قسم کے متعدی کیس۔

ڈلکامارا (Dulcamara): مرطوب موسم میں ٹھنڈ لگ جانے کے باعث مثانہ کا نزول لاحق ہو۔ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ جو کہ پیٹ میں گہرائی میں محسوس ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ مثانہ کے علاقے اور پیشاب کی ٹالی کی جانب نیچے کو دباؤ کا ناخوشگوار احساس ہوتا ہے۔ پیشاب غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں متعفن 'گدلا' تیل والا ہوتا ہے۔ جو کہ سخت لعاب دار سفید یا سرخ رنگ کے بلغم سے ملے جلے مواد کا حامل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خون بھی خارج ہوتا ہے۔ پیشاب دودھ کی طرح متعفن یا بلغمی پیپ والا، سرخی مائل، جلن دار ہوتا ہے۔ قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کا تلچٹ لیس دار ہوتا ہے۔ کئی بوڑھے آدمیوں کو ورم مثانہ بری طرح لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے خبیثے بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ اس دوا سے انہیں بہت زیادہ آرام حاصل ہوتا ہے۔

تیربری (Terebinth): بہت گہرے رنگ کا خون والا پیشاب خارج ہوتا ہے جو کہ لیس دار گاڑھے کچھڑ کے طرح کے تلچٹ کا حامل ہوتا ہے۔

ایکونکی زیٹم (Equisetum): بہت گہرے رنگ والا کم مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے جو کہ متواتر خارج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ درد ہوتا ہے اور تلچٹ میں بلغم پایا جاتا ہے۔

بربریس و لگرس (Berberis Vul): گاڑھے تلخ اور چمکدار سرخ مواد کے حامل تلخٹ کے ساتھ پیشاب خارج ہو۔

کوپایبوا (Copaiva): مزمن ورم مثانہ، خصوصاً عورتوں میں لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ استقاء میں پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے، مسلسل بے نتیجہ پیشاب کرنے کی خواہش رہتی ہے۔

### تیرتایا حرکت کرتا گردہ

(Floating or Moving Kidney)

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Iod): یہ دوا سب سے پہلے استعمال ہونی چاہئے۔  
سپیا (Sepia): اگر کلکیریا آئیوڈ ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

### گردوں میں رکاوٹ کے باعث پیشاب کا اجتماع

(Hydronephrosis)

(A Collection of Urine in the pelvis of the  
Kidney from Obstructed Outflow)

پلمبم، آرسینک البم (Plumbum, Ars Alb): پلمبم چوٹی کی دوا ہے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو آرسینک البم آزمائیں۔

### ورم گردہ — (Nephritis)

(دیکھئے "گردوں کی سوزش")

### یوریمیا — (Uremia)

(نیز دیکھئے "گردوں کی سوزش")

(خون میں کسی نقصان دہ مادے کی رکاوٹ ہوتی ہے جو عموماً گردے خارج کر دیتے ہیں جس کے باعث پیشاب میں بندش ہو جاتی ہے۔ تشخیصی جھٹکے لگتے ہیں اور سکتے وغیرہ ہوتا ہے۔)  
بیلادونا (Belladonna): پر خون اور صحت مند مریضوں میں حاد یوریمیا لاحق ہو جبکہ گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پیشاب گہرے رنگ کا اور گدلا ہو جاتا ہے۔ عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے جس کے ساتھ شدید تشنجی جھٹکے لگتے ہیں۔

ہیلی بوریس (Helleborus): بے ہوشی کے ساتھ یوریمیا لاحق ہوتا ہے۔ آنکھوں کی چٹلیاں پھیل جاتی ہیں اور روشنی سے بے حسی ہوتی ہے۔ تشنگی جھٹکنے لگتے ہیں، جسم سے پیشاب کی تیز بدبو آتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): اذیت کے احساس کے ساتھ یوریمیا کا توہم ہوتا ہے۔ بے چینی کے ساتھ پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں جھٹکنے لگتی ہیں، پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے لیکن کچھ بھی خارج نہیں ہوتا، مثلاً میں پیشاب نہیں ہوتا۔

کیپورم آرس (Cuprum Ars): اسہال، بڑھ جو نوزائیدہ بچوں میں ہو یا بدہشی کے ساتھ یوریمیا کی حاد صورت ہو سکتا ہے کہ مریض کو شوگر ہو جس میں پیشاب اچانک کم مقدار والا گہرا سرخ نیز لہسن کی تیز بدبو والا ہو جاتا ہے۔

ارٹیکا یورٹنس (Urtica Urens): پیشاب کی بندش کے ساتھ یوریمیا لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ جسم سے پیشاب کی بہت زیادہ بو آتی ہے۔ اس دوا کے مددِ نچڑ کے پانچ قطروں کی خوراکیں گرم پانی میں ملا کر دی جائیں۔

پلمبم (Plumbum): یوریمیا کا سکتہ لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ ناف پر کھنچاؤ کا احساس ہوتا ہے، پیشاب میں بندش واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً میں پیشاب نہیں ہوتا، چہرہ سرخ کی طرح زرد ہو جاتا ہے۔ تحفہ مست ہو جاتا ہے۔ IM طاقت کی ایک ہی خوراک دیجئے۔

ٹیری تسمہ (Terebinth): تشنگی دوروں اور جیزوں کے مل جانے کے ساتھ یوریمیا لاحق ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہر پندرہ منٹ کے بعد وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ شدید قسم کے تشنگی جھٹکنے لگتے ہیں۔ جس کے باعث پیٹ کی خطرناک قسم کی اکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔

### پیشاب آنا — (Urination)

### جلن دار — (Burning)

کینتھرس (Cantharis): پیشاب میں جلن ہوتی ہے جو کہ استادگیوں کے ساتھ صرف قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔

سٹیفیسیا سگریا (Staphisagria): پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے جبکہ پیشاب نہیں کر رہا ہوتا، پیشاب کرتے ہوئے جلن رک جاتی ہے۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔

مرک سول (Merc Sol): ہر گھنٹے کے بعد دن اور رات میں پیشاب ہونے کے ساتھ جب

پیشاب کرنا شروع کرے تو جلن ہوتی ہے۔  
بیلادونا (Belladonna): مسلسل پیشاب کرنے کی عادت کے ساتھ مثانہ میں بہت زیادہ  
 بھجان ہوتا ہے۔ پیشاب کی تمام طویل ٹالی کے ساتھ ساتھ جلن ہوتی ہے، بٹنے سے حساسیت  
 ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): بلا ارادہ پیشاب خطا ہو جانے کے ساتھ پیشاب میں جلن لاحق ہوتی ہے۔  
ٹیری۔تھ (Terebinth): پیشاب کی بندش کے ساتھ جلن لاحق ہو، پیشاب کرنے کے  
 دوران جلن ہوتی ہے، پیشاب کم مقدار میں خون آلود ہوتا ہے۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): پیشاب کرنے سے پہلے جلن ہوتی ہے۔  
کلیمنس (Clematis): جب پیشاب کا آخری قطرہ شدید قسم کا بھجان اور جلن پیدا کر دے۔

## خواہش (پیشاب کرنے کی)

(Desire)

لیلیئم ٹگ (Lilium Tig): کم مقدار میں خارج ہونے والے پیشاب کے ساتھ پیشاب کرنے  
 کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ اگر پیشاب نہ کیا جائے تو پیشاب کا اجتماع سینے میں محسوس ہوتا  
 ہے۔

ایکوئی زیٹم (Equisetum): مسلسل پیشاب ہوتا ہے۔ مٹانے میں درد ہوتا ہے جیسا کہ وہ  
 بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، پیشاب کرنے سے بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ پیشاب کم مقدار میں ہوتا ہے  
 جس میں بہت زیادہ بلغم ہوتا ہے، یہ دوا بوڑھے لوگوں میں مٹانے کے بھجان کے لئے حیران کن  
 دوا ہے۔ مسلسل پیشاب کی تنگ کرنے والی خواہش، اس دوا کی بنیادی علامت ہے جبکہ پیشاب  
 کرنے کے بعد بہت تھوڑا سا سکون ملتا ہے یا بالکل سکون نہیں ملتا، مثانہ کی مزمن سوزش کے  
 لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پیشاب کرنے کی عقیم خواہش ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی مقدار میں  
 پیشاب خارج ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی نہ رکھنے والی خواہش۔ IM طاقت کی  
 خوراک دیجئے۔

پیٹروسی لینم (Petroselinum): پیشاب کرنے کی فوری خواہش اگر تیزی کے ساتھ پیشاب  
 کرنے نہ جائے تو پیشاب خطا ہو سکتا ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): پاخانہ کرنے کی اور پیشاب کرنے کی فوری خواہش۔  
کونیم (Conium): پیشاب کی ٹالی میں اعصابی درد کے ساتھ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش

ہوتی ہے۔

نٹرم میور (Natrum Mur): پیشاب کرنے کی عظیم خواہش جس کے ساتھ کم مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): پیشاب کرنے کی متواتر اور فوری خواہش، پیشاب کی دھار کم زور ہوتی ہے۔ یہ احساس رہتا ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ پیشاب کی نالی میں پیشاب کرنے کے بعد اٹکارا گیا ہے۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ چکر بھی آتے ہیں۔

لائی سین (Lyssin): چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): اگر لائی سین ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔

ابسنٹھیم (Absinthium): پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ پیشاب گہرے مالے رنگ کا ہوتا ہے، پیشاب کی بو بہت تیز ہوتی ہے جیسا کہ گھوڑے کے پیشاب کی ہوتی ہے۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): نوجوان شادی شدہ مستورات میں پیشاب کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔

ارنگ اق (Eryng Aq): پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش رہتی ہے۔ جو کہ دن رات میں ہر آدمی گھنٹے کے بعد ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کا دوران اور پیشاب خارج ہونے کے بعد جلن ہوتی ہے۔

### وقت — (Difficult) Dysuria

کینتھرس (Cantharis): درد کے ساتھ پیشاب خارج ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے یا گری محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔

کوپایوا (Copaiva): مسلسل لا حاصل خواہش، پیشاب کی نالی میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ پیشاب کا انخراج قطروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مستورات کے لئے یہ خصوصی دوا ہے۔ مٹانے کی مزمن سوزش لاحق ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): ہسٹریائی کیسوں میں پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔

ایپس مل (Apis Mel): مریض جب پیشاب کرتا ہے تو جلن اور دکھن ہوتی ہے، پیشاب کرنے کی متواتر خواہش رہتی ہے۔ پیشاب صرف چند قطروں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں اور بہت زیادہ رنگ دار ہوتا ہے۔

کلیمٹس (Clematis): جب پیشاب کے بہاؤ میں اچانک پیشاب کی نالی میں لاحق ہونے والے کٹینی دوروں کے باعث خلل واقع ہو جائے۔ پیشاب کے بہاؤ میں کمی اور زیادتی ہوتی

رہتی ہے۔ پیشاب میں بلغم ہوتا ہے لیکن پیپ نہیں ہوتی، سوزش، خچاؤ کا آغاز ہوتا ہے۔  
کونیم (Conium): پیشاب اچانک رک جاتا ہے اور اس کا بہاؤ چند لمحات تک شروع نہیں ہوتا۔

کیمفر (Camphor): حاد کیسوں میں جبکہ زہریلے مادے اخفد کے باعث پیشاب کی بندش کی وجہ سے پیشاب میں دقت واقع ہوتی ہے، پھولی طاقت کی نراکیں۔

تیربری (Terebinth): وجع المفاصل جیسے درد کے ساتھ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): پیشاب صرف سیٹ سے اخفلات کو دبانے ہی سے خارج ہو سکتا ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب خارج ہونے کے بعد بہت زیادہ درد لاحق ہو جاتا ہے۔ صرف کھڑے ہو کر ہی پیشاب خارج کر سکے۔ بیٹھے ہونے کی صورت میں پیشاب صرف قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ 1M طاقت کی خوراک ہر چند روز کے بعد دہرائی جائے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): پیشاب کرنے سے پتہ پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے یا پیشاب گرم لگتا ہے۔ سبب ہوتی ہے اور مریض زور لگاتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی خارج نہیں ہو سکتا۔

چیمافیلہ امبلٹا (Chimaphila Umbellata): پیشاب گرم لگتا ہے اور جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے پلے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جبکہ بعض اوقات دھاگے کی طرح کی دھار ہوتی ہے اور آخر میں قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔

پروٹس سیانکی نوسا (Prunus Spinosa): پیشاب خارج ہونے سے پہلے لمبے عرصے تک اعضاء کو دانا پڑتا ہے، پیشاب خشک تک آتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن سرواپس ہو جاتا ہے اور پیشاب کی ٹالی میں درد کا باعث بنتا ہے۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے۔ پیشاب خارج کرنے سے پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر پیشاب کا بہاؤ بہت سست ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ کچھ پیشاب پیچھے مٹانے میں رہ جاتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پیشاب خارج نہ ہو سکے۔ لوگوں کی عمومی گزرگاہ میں پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔

میورٹیکم ایسیڈم (Muriaticum Acidum): آنتوں کو حرکت دینے پر پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔

**نکس وامیکا (Nux Vomica):** یہ دوا پیشاب کی تشغی بندش کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ مریض کو پیشاب کرنے کے لئے زور لگانا پڑتا ہے۔ مروڑ ہوتے ہیں اور حاجت ہوتی ہے۔ مثانہ بھرا ہوتا ہے اور پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود جب مریض زور لگاتا ہے تو پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ (پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے۔)

**امبرا گریسیا (Ambra Grisea):** دیگر لوگوں کی موجودگی میں پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔ سرخ پچھٹ کے ساتھ خون آلود پیشاب۔

**الیومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate):** مثانہ کی فالجی کمزوری، پیشاب کرنے کی لا حاصل حاجت۔ پیشاب کی ٹالی سے ٹانگم اور پیپ خارج ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد مثانہ میں بے اطمینانی کا احساس ہوتا ہے۔

**مرک سلف (Merc Sulph):** پیشاب خارج ہونے میں دقت ہوتی ہے جو کہ پتلی دھار میں خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کی دو دھاریں بن جاتی ہیں اور جلن ہوتی ہے نیز بعض اوقات مثانہ خالی ہونے میں طویل وقت صرف ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے آخر میں خون کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں۔

**پیرا (Pareira):** زہنگی کے بعد یا زہنگی سے دو ہفتہ قبل سے یہ حالت ہوتی ہے کہ مریض کو پیشاب خارج کرنے کے لئے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ صرف گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے ہی پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے لئے چاروں ہاتھوں پاؤں کو زمین پر ٹیکنا پڑتا ہے۔

**بوریکس (Borax):** بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے۔ (بافنی جھلی کی سوزش کے باعث) پیشاب آگ کی طرح جلتا ہوا گرم ہوتا ہے۔

**الیومینا (Alumina):** امعاء مستقیم اور مثانہ کی فالجی حالت کے باعث پیشاب اور پاخانہ سستی کے ساتھ خارج ہو۔ پیشاب خارج ہونے کی نااہلیت کے ساتھ مریض کو پیشاب کے بہاؤ کے آغاز سے بہت عرصہ پہلے پیشاب کے لئے بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر پیشاب کی دھار بہت سستی سے بہتی ہے۔ پیشاب کے بہاؤ میں جلدی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات پیشاب میں بندش ہو جاتی ہے۔ اور غیر ارادی طور پر ٹپکتا رہتا ہے۔ مریض جب پاخانہ کے لئے زور لگا رہا ہوتا ہے تو پیشاب خارج ہو جاتا ہے یا اس طرح سے زور لگائے بغیر پیشاب خارج نہیں ہوتا۔

## بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جانا — Enuresis

(Involuntary Urination- Wetting the Bed)

کاسٹیکم (Causticum): رات کے پہلے حصہ کے دوران بے ہوشی میں بستر میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ جب کہ ناک بہہ رہی ہوتی ہے۔ دوران شب بستر میں پیشاب نکل جائے جبکہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ کھانسی کے دوران، ہنسنے کے دوران یا چھینکنے کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے۔ ٹھنڈ سے ابتری ہوتی ہے۔ مثانے کا فالج لاحق ہوتا ہے۔ جس کا اثر اخراج والے عضلات پر ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے اور مقعد کو بند کرنے والے عضلات متاثر ہوتے ہیں۔ جس کے باعث پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ پیشاب کی دھار خارج ہو رہی ہے۔

جلی میسم (Gelsemium): بستر کو گیلیا کر دینے والے مریضوں میں درد سر لاحق ہوتا ہے۔ جب کاسٹیکم ناکام ہو جائے تو یہ دوا بستر گیلیا کرنے کے مرض کو شفا دیتی ہے۔

پلساٹیللا (Pulsatilla): رات کے پہلے حصہ میں پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً گرم مزاج مریضوں میں۔ کھانسی کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے مریض شریف الطبع اور بدلتے ہوئے مزاج والے ہوتے ہیں۔ کھلی ہوا میں جانے کی طلب ہوتی ہے۔ یہ مریض چکنائی کو پسند نہیں کرتے۔ چڑچڑے اور روکھے ہوتے ہیں۔ چچک کے بعد بستر گیلیا کر دینے کا مرض ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): زرد رو، بیمار قسم کی لڑکیوں میں غیر ارادی طور پر پیشاب کا خطا ہو جانا۔ خصوصاً نیند کے آغاز میں ہی بستر پر پیشاب نکل جانے کے مرض کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض جیسے ہی بستر پر جاتی ہے۔ جازے سے پیشاب نکل جاتا ہے اور بستر گیلیا ہو جاتا ہے یا پھر بستر پر جانے کے دو گھنٹے کے اندر اندر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): مریض جب خاموش بیٹھا ہو تو پیشاب خطا ہو جائے۔ جب مریض چل رہا ہوتا ہے تو پیشاب کو روکنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

براہیونیا (Bryonia): مریض جب حرکت کرتا ہے تو پیشاب ٹپکتا ہے۔ چلتے ہوئے پیشاب بہہ نکلتا ہے اور صرف خاموش رہنے سے ہی افادہ ہوتا ہے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): چلتے ہوئے پانی کی آواز سننے پر بلا ارادہ پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائیڈ کے بعد۔ تشنگی جھٹکوں کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔

میںزونیک ایسڈ (Benzoic Acid): سونے کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو



جاتا ہے۔ بستر اتنی زیادہ مرتبہ گیلیا ہوتا ہے کہ صفائی کے قابل نہیں رہتا۔ بستر سے بہت زیادہ پیشاب کی بدبو آتی ہے۔ پیشاب کی کثافت انسانی نچلے درجہ کی ہوتی ہے۔  
الیومینا (Alumina): مٹانے کے فالج کے باعث پیشاب بلا ارادہ ٹپکتا رہتا ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے اور پھر ٹپکنے لگتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): رات کے پہلے حصہ کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اس وقت جاگنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ مریض خواب دیکھتا ہے کہ وہ بڑے مناسب انداز میں پیشاب کر رہا ہے۔

ایکیوئی زیٹم (Equisetum): بلا ارادہ پیشاب نکل جانے اور پیشاب رک جانے کے لئے یہ ایک دوا ہے۔ جب مریض بغیر کسی قابل فہم وجہ کے صرف عادتاً بستر پر پیشاب کر کے اسے گیلیا کر دے۔

اینن تھیروم (Anantherum): چلنے یا سونے کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جائے۔

آرینک البم (Arsenic Alb): دوران حمل یا زچگی کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جائے۔

اکونائٹ این (Aconite N): پیاس اور خوف کے ساتھ غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sul): رات کے وقت بلا ارادہ بستر پر پیشاب خارج ہو جائے۔ ٹھنڈ میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ پہلے 30 طاقت کی دوا دیجئے اور پھر 200 طاقت کی دوا دیجئے۔  
سلفر (Sulphur): زرد رو دہلے پتے بچوں میں جن کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اور جو شکر اور مصالحہ دار غذاؤں کے شوقین ہوتے ہیں۔ دھوئے جانے سے نفرت کرتے ہیں۔ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش رہتی ہے۔ چند قطرے بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ غل سے بستے ہوئے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔

سورینم (Psorinum): جب دیگر اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ایکڑیمیا یا پھوڑے پھنسی کے دب جانے کے بعد یا شدید حم کی عادت بیماری کے بعد بستر پر پیشاب نکل جانے کی عادت لاحق ہو جاتی ہے۔ مریض کو جاڑا لگتا ہے اور دھوئے جانے سے ڈرتا ہے۔ پورے چاند کے دوران پیشاب سے بستر گیلیا کر دے۔

میڈورینم (Medorrhinum): رات کے وقت بستر میں پیشاب نکل جائے۔ بہت زیادہ مقدار میں تیزبو والا پیشاب یا کم مقدار میں پیشاب یا گہرے رنگوں والا پیشاب یا بافراط زرد پیشاب تیز

بو کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ حیض کے دوران اہتری ہوتی ہے۔ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ مٹانے میں پُر درد مروڑ ہوتے ہیں۔ پیشاب کے آخر میں شدید درد ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): سونے کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ دوران شب پیشاب بہت زیادہ آتا ہے جبکہ دن کے دوران پیشاب کی مقدار معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ شکر اور گرم مشروبات کی طلب ہوتی ہے۔

سنا (Cina): پیشاب بافراط اور غیر ارادی طور پر خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ پیٹ کے کیڑوں کی علامات بھی ہوتی ہیں۔

سائیکوٹم (Sycotum): بد مزاج بچوں میں اندھیرے کے ڈر کے ساتھ نیز تھائی کے ڈر کے ساتھ پیشاب کا خطا ہو جانا عام ہے چھٹی ہوتی ہے۔ چہرے کے عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پونے بھپکتے ہیں۔ جلد چکنی ہوتی ہے۔ پیشاب از تپ دن والی شباہت ہوتی ہے۔ اعضائے تناسل کے گرد نچلے درجے کی سوزش ہوتی ہے۔ خصوصاً مستورات میں۔

فیرم سیٹ (Ferrum Met): حرکت کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ نیز جب مریض کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں پیشاب ٹپکتا رہتا ہے اور کیڑوں کو گیلار کھتا ہے۔ آرام کے وقت یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔

لیک کینیٹم (Lac Caninum): دوران شب پیشاب سے بستر گیلار ہو جاتا ہے۔ خواب میں پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ جس سے مریض بیدار ہو جاتا ہے۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): دن کے دوران پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت رہتی ہے اور رات کے دوران پیشاب سے بستر گیلار ہو جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ پسینے آتے ہیں۔ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا مضبوط قسم کے چھیلے بچوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جو مشروبات زیادہ استعمال کرتے ہیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): بلا ارادہ پیشاب نکل جاتا ہے۔ خصوصاً کھانستے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے۔

سیکونڈا وروسا (Cicuta Virosa): مریض جب انھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چکر آ جاتا ہے۔ چیزیں آنکھوں کے سامنے گھومتی ہیں چنانچہ دوبارہ لیٹ جانا پڑتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیوں کے سکڑاؤ کے ساتھ آنکھیں اندر کودھنسی ہوتی ہیں۔ مٹانے کا فالج لاحق ہوتا ہے چنانچہ پیشاب غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔

میگ نیٹس پولس آسٹریلیس (Magnetis Polus Australis): عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مریض ہر آدھے گھنٹہ کے بعد مٹانہ خالی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ سب سے

پہلے چند قطرے بلا ارادہ خارج ہوتے ہیں پھر بہتر رتج جیٹ کے دباؤ کو استعمال کرنے سے مزید پیشاب خارج ہوتا ہے۔ رات کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ جاگنے پر خارج ہوتا ہوا پیشاب رک جاتا ہے۔

### متواتر (پیشاب آنا) (Frequent)

(نیز دیکھئے ”بالفراط پیشاب آنا“)

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): متواتر اور بالفراط پیشاب خارج ہو۔ بد ہضمی کے باعث متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): بد ہضمی کے باعث متواتر پیشاب آتا ہے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

ویسی کیریا (Vesicaria): درد گردہ اور ورم مثانہ کے باعث رات کے دوران تقریباً 30 مرتبہ پیشاب خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا پیشاب کی زیادتی، استقاء، پردرد پیشاب، پیپ، البیومن اور پیشاب میں خون آنے کا علاج کرتی ہے۔

مالی گیلی (Mygale): پیشاب کا بہاؤ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں ڈنک لگنے کے ساتھ پیشاب گرم لگتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ معمولی سی ہرانگیخندگی سے پیشاب پکنے لگتا ہے۔ مریض کو ذہن میں ہر وقت مسلسل اس کیفیت کو رکھنا پڑتا ہے ورنہ پیشاب نکل جائے گا۔

کاسٹیکم (Causticum): رات کو پیشاب متواتر آتا ہے۔ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیشاب کرنے کے قابل ہو لہذا وقت صرف ہو جاتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): کافی پینے کے بعد متواتر پیشاب آتا ہے۔ ہسٹریا میں متواتر پیشاب آئے۔ سبل سیرولانا (Sabal Serrulata): رات کے وقت پیشاب کرنے کی مستقل خواہش رہتی ہے۔ ورم مثانہ لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب میں دقت ہوتی ہے۔ سستی ہوتی ہے۔ بے پروائی ہوتی ہے۔ لا تعلقی ہوتی ہے۔ ہمدردی کو پسند نہیں کرتا۔ غصیوں کی تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ مدر ٹیچر دیجئے یا چھوٹی طاقت کی خوراکیں دیجئے۔

میوریک ایسڈ (Muriatic Acid): پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی۔ جب ہوا خارج ہوتی ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے۔

لیڈم پی (Ledum P): متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا کم ہو

جاتی ہے۔ پیشاب کی دھار بہاؤ کے دوران اکثر رک جاتی ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ سرخی ہوتی ہے اور پیپ خارج ہوتی ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): پیشاب پیپے گئے مائع کی نسبت بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ پیشاب خارج ہوتا ہے۔

الیومینا (Alumina): متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ زور لگانے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ مریض کو پاخانے پر زور لگانا پڑتا ہے تاکہ پیشاب خارج ہو۔ پیشاب کی نالی سے ہلکے پیلے رنگ کی پیپ خارج ہونے کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔

ارنجیم (Aryngium): دن اور رات میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ جلانے والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران اور بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ تکلیف مستقل ہوتی رہتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔

چیلنی ڈونیم (Chelidonium): سفیدی مائل اور بھاگ دار پیشاب استدارجے کی افراط کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

## پیشاب میں خون آنا (Haematuria)

(Blood in Urine)

تیربینٹھ (Terebinth): پیشاب میں خون ہوتا ہے۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔ کافی کے برادے کی طرح کی تلچٹ ہوتی ہے۔ جلن ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد کے ساتھ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ پیشاب میں الیومن ہوتا ہے اور بخش کی بو ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): پیشاب میں خون آتا ہے خصوصاً ورم گردہ والے مرض میں۔ گردوں اور جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب گدلا ہوتا ہے۔ جس میں سرخ تلچٹ ہوتی ہے۔

چائنا سلف (China Sulf): درو یا بے چینی کے بغیر پیشاب میں خون آتا ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): گردوں کے مدہم درد کے ساتھ پیشاب میں خون آتا ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): میکانیکی زخموں کے باعث پیشاب میں خون آتا ہے۔

تھلاسپی بی (Thlaspi B): گہرے رنگ کا خون اور گاڑھا پیشاب آتا ہے۔

اوسی کم کین (Ocimum Can): خون آلود پیشاب جس کے ساتھ سرخ تلچٹ ہوتی

ہے۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): گہرے رنگ کا خون آلود پیشاب آتا ہے۔ جس کے ساتھ سوزاک کا دب جانا بھی لاحق ہوتا ہے۔

نٹرم فاس (Natrurn Phos): رات کے وقت پیشاب متواتر آتا ہے۔ بیدار آنے کے دوران رات کے وقت سونے کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ پیشاب شروع ہونے کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): پیشاب کرنے کی متواتر اور پردردو حاجت ہوتی ہے۔ جو کہ نئی شادی شدہ اعصابی مستورات میں انتہا درجے کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

الفالفا کیو (Alfalfa Q): متواتر اور حد اعتدال سے زیادہ پیشاب آتا ہے۔ جس کے ساتھ مریض کا وزن اور گوشت کم ہو جاتا ہے۔ بھوک جاتی رہتی ہے۔ نقاہت ہوتی ہے۔

## پیشاب کی بندش Incontinence

(Retention- Suppression)

آرنیکا (Arnica): چوٹوں کے بعد یا تھکاوٹ کے بعد پیشاب دب جاتا ہے۔  
اکونائٹ این (Aconite N): ٹھنڈے موسم میں خصوصاً بچوں میں جو کہ بے چین ہوتے ہیں اور درد سے چلاتے ہیں، پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے۔

اوپیم (Opium): بچوں میں پیشاب کی بندش جبکہ پیشاب کی بندش کا باعث خوف یا دایا سے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ مثلاً بھرا رہتا ہے۔ مقعد کو بند کرنے والے عضلات میں کھنچاؤ کے باعث یا فنڈس کے فالج کے باعث پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): سوزاک کے دب جانے میں درد کے ساتھ پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔

ایپس مل (Apis Mel): ٹھنڈ لگ جانے کے بعد یا بخار کے بعد پیشاب دب جاتا ہے۔ مریض اونگھتا رہتا ہے۔ نملیاں سوجن کے ساتھ سکتہ لاحق ہوتا ہے۔ دودھ پینے والوں بچوں میں پیشاب کی بندش 1x یا 1M طاقت کی دوا دیجئے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔ مثلاً پھول جاتا ہے۔ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ زور لگانا پڑتا ہے۔

ٹیری (Terebinth): پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ مثلاً کے مروڑ لاحق ہوتے ہیں۔ پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ جس کا رنگ چمکیلا ہوتا ہے یا پیشاب میں خون ملا

ہوتا ہے۔ جلن دار اور کاسٹے والے درد مثانہ میں ہوتے ہیں۔ سوزا کی کیفیت ہوتی ہے۔  
 لاروسیرا کس (Laurocerasus): جزوی فلج میں پیشاب کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔  
 پیشاب کی دھار پتلی ہوتی ہے۔ بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔  
 آرسینک البم (Ars Alb): اس دوا کی علامت امپس ایم کی مماثل ہوتی ہیں لیکن آرسینک  
 کے مریض انتہا درجے کے بے چین ہوتے ہیں۔ انہیں غنودگی یا بے ہوشی نہیں ہوتی۔  
 پیٹروسلینیم (Petroselinum): بچوں میں اوپر نیچے اچھلنے کے بعد پیشاب رک جاتا ہے۔ جس  
 سے درد ہوتا ہے اور بچے چلاتے ہیں۔ بچہ پیشاب خارج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔  
 کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): پیشاب کرنے سے پہلے پیشاب کرنے کے دوران یا  
 پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور  
 مریض پیشاب کے لئے زور لگاتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی خارج نہیں ہوتا۔  
 روٹا (Ruta): رات کے وقت پیشاب کی بندش لاحق ہو یا دن کے دوران پیشاب متواتر آتا  
 ہے اور اگر مریض پیشاب کرنے کے لئے نہ بیٹھے تو مثانہ مفلوج ہوتا دکھائی دے۔ جس کے  
 ساتھ پیشاب کے اخراج کی نااہلیت ہوتی ہے جبکہ وہ خود موقع فراہم کرے۔  
 پلمبم ایم (Plumbum M): ایک ایسی خاتون کو اس دوا سے شفا ملی جس کا پیشاب دو روز سے  
 بند تھا اور ساتھ میں بے ہوشی بھی تھی۔ کیٹیز (پیشاب خارج کرنے والا آلہ) نے مثانہ میں  
 پیشاب ظاہر نہیں کیا تھا۔ مریض میں اس مرض سے کئی دن پہلے ذہنی علامات پائی جاتی تھیں۔  
 سوچ میں سستی تھی اور تصور میں بھی سستی تھی۔  
 وریٹرم البم (Veratrum Alb): ہیضہ میں پیشاب کی بندش لاحق ہو۔  
 ہائیڈروکلورک ایسڈ (Hydr Acid): گردن توڑ بخار میں پیشاب کی بندش لاحق ہو۔  
 ہیلی بوریس (Helleborus): پیشاب کا دب جانا (یوریمیا) خون کے زہریلے مادے کی صورت  
 اختیار کر جاتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جانے کے ساتھ مکمل بے ہوشی لاحق ہوتی ہے۔  
 روشنی کا احساس باقی نہیں رہتا۔ یوریمیا کے نشانی جھٹکے لگتے ہیں۔ جسم سے پیشاب کی بو آتی  
 ہے۔

## پیشاب خطا ہو جانا Involuntary

(دیکھئے ”بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جانا“)

پُر درد (پیشاب آتا) — (Painful)

اکونائٹ این (Aconite N): اچانک جاڑا لگ جانے کے باعث مٹانے میں جلدن دار درد ہوتے ہیں۔ تیز کانٹے والے درد حدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیشاب چمکیلا سرخ ہوتا ہے۔ جس میں خون ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت زور لگتا ہے۔

کینتھرس (Cantharis): خون آلود پیشاب کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں اور مریض دوہرا ہو جاتا ہے اور درد سے چلاتا ہے اور کمرے میں ازیت کے ساتھ ناچتا ہے۔

پروئس سپاکی نوسا (Prunus Spinosa): محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب خفہ تک آچکا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے جس کے باعث پیشاب کی نالی میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب خارج ہونے سے پہلے دیر تک دبانا پڑتا ہے۔

پیٹروسلینیم (Petroselinum): درد کے باعث مریض کپکپاتا ہے اور ازیت کے ساتھ کمرے میں ناچتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): خبیثے کی تکلیف میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ مریض ازیت کے ساتھ کمرے میں ناچتا ہے۔

ایسڈ نائٹریک (Acid Nitric): گوشت خور پھوڑا، پیشاب کے آلات پر اس پھوڑے کی نمود ہوتی ہے جو کہ پر درد ہوتا ہے اور اس سے پیشاب کرنے کے دوران اور مجامعت کے دوران خون آسانی کے ساتھ بہتا ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): بھرپور کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے کے دوران درد ہوتا ہے۔

کینابیس سیٹیوا (Cannabis Sativa): پیشاب کرتے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے دوران درد ہوتا ہے۔ یہ گوشت خور پھوڑے کے باعث ہو سکتا ہے۔ (اس کی نمود پیشاب کی نالی کے پچھلے لب پر ہوتی ہے) اس سے خون آسانی کے ساتھ بہتا ہے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد درد ہوتا ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب درد کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیشاب شروع ہونے سے پہلے بچہ چلاتا ہے۔

## بافراط پیشاب آنا (Polyuria)

(اعتدال سے زیادہ۔۔۔ دیکھئے ”ڈیابیطس“)

نکس وامیکا (Nux Vomica): جب مرض بد ہنسی کے باعث لاحق ہو۔ پیشاب دوران شب متعدد مرتبہ خارج ہوتا ہے۔ 200 طاقت کی خوراک دیجئے۔

یورینیم نائٹ (Uranium Nit): بد ہنسی میں بافراط پیشاب خارج ہوتا ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پئے جانے والے مائع کی نسبت بہت زیادہ مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔

چائنا (China): ہیٹ کے کیڑوں کے باعث بافراط پیشاب خارج ہوتا ہے۔ ورم زرخہ میں پیشاب کا بہت زیادہ خارج ہوتا۔

فانی ٹولا کا (Phytolacca): حیض کے دوران بکثرت پیشاب خارج ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): اعصابی درد سر کے دوران پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): گلا خشک ہونے کے ساتھ بافراط پیشاب خارج ہو۔

ایکونی زینم (Equisetum): صاف اور ہلکا پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

وکی کیریا (Vesicaria): جب یورینیم نائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

سینی کیولا (Sanicula): زرد یا بے رنگ پیشاب بافراط خارج ہوتا ہے۔ کثافت اضافی 1000

ہوتی ہے۔ مریض تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ذائقہ برا ہوتا ہے اور بھوک نہیں لگتی بہت زیادہ

مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔

میوریکس (Murex): دن کے دوران اور رات کے دوران پیشاب کرنے کی متواتر خواہش

رہتی ہے۔ جس کے ساتھ بے رنگ پیشاب خارج ہوتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): شوگر کے ساتھ یا شوگر کے بغیر پیشاب متواتر آنے کے

لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

میڈوررینم (Medorrhinum): بافراط پیشاب آنے کے مرض کو اس دوا سے شفا ہوتی ہے

جب دیگر ادویات ناکام ہو جاتی ہیں۔

## پیشاب میں رکاوٹ (Stricture)

کلیٹس (Clematis): زخم کی ریزش کے جم جانے کے باعث اسٹیفنی جسم، چھتے کے عمل کے

نہ ہونے کے باعث معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ سوزش والے بلغم کی ابتدائی صورت پیدا ہو

جاتی ہے۔



سلیشیا (Silicea): عضو تناسل کی چوٹ کے باعث کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وقفوں میں پیپ بنانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔  
گرافائٹس (Graphites): پیشاب کا براؤ اچانک رک جاتا ہے پھر رنگ دار بلغم کے لیے دھاکے رستے ہیں۔  
اوپیم (Opium): برے طریقے سے بنائی گئی شراب پینے کے بعد تشنگی دورے ہوتے ہیں جیسے کہ شرابیوں میں ہوتے ہیں۔  
سٹرامونیم (Stramonium): رات تک ہونے کے باعث پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔  
 پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔

## پیشاب میں البیومن

(Urine- Albuminous)

اپیس مل (Apis Mel): پیشاب میں البیومن خارج ہونے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔  
 دوران حمل، سرخ بخاروں میں اور کھال اترنے کے مرض کے دوران۔  
یوپاٹوریم پرف (Eupatorium Perf): استقاء کے ساتھ پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے۔  
ہیلی بوریس (Helleborus): پیشاب کم مقدار میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ البیومن خارج ہوتا ہے۔ نیز استقلاتی سو جن سارے جسم میں ہوتی ہے۔  
گلوٹائین (Glonoine): گردوں کی نالیوں کی سوزش جس کے ساتھ درد سر لاحق ہو جو کہ دھوپ میں چلنے سے لاحق ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں سن ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جو شدید جھنجھناہٹ کے ساتھ اولڈ بدل رہتا ہے۔ البیومن والا پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ رات کے دوران متواتر الٹنا پڑتا ہے۔  
کالی کلور (Kali Chlor): ورم گردہ، پیشاب میں خون خارج ہو۔ پیشاب میں البیومن اور بھلیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کثرت کے ساتھ آتا ہے۔  
چیمافیلہ امیبلاتا (Chimaphila Umbellata): پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے۔ عرصہ دراز سے لاحق سوزاک کے باعث پیشاب میں خون خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں گرمے رنگ کا، متعفن، گاڑھا خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بلغم کی تلچھٹ باافراط ہوتی ہے۔  
فیرم آیوڈ (Ferrum Iod): شرابیوں میں سو جن کے ساتھ البیومن والا پیشاب خارج ہو۔

دودھیا تلچھٹ کے ساتھ اور مٹھی بو کے ساتھ پیشاب خارج ہو۔  
مرک سول (Merc Sol): کم مقدار میں پیشاب البیومن والا خارج ہوتا ہے اور پیاس نہیں  
 رہتی۔ مریض ٹھنڈے مشروبات پسند کرتا ہے لیکن یہ ٹھنڈے مشروبات نقصان دہ ہوتے ہیں۔  
 چہرہ اتنا سوجا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ غبارہ ہو۔  
انونی مینم (Enonyminum): 1x ٹرائکی ٹوریشن کے دو دانے آدھا گلاس پانی میں حل کر کے  
 ہر گھنٹے کے بعد ایک چمچ مخلول دیا جائے۔ یہ دوا پیشاب میں البیومن کے ساتھ اشتقاق کا علاج  
 کرتی ہے۔  
کالچیکم (Colchicum): ٹائیفائیڈ کے دوران یا ٹائیفائیڈ کے بعد پیشاب میں البیومن خارج ہوتا  
 ہے۔  
ایسڈ فاس (Acid Phos): ٹائیفائیڈ کے دوران یا ٹائیفائیڈ کے بعد پیشاب میں البیومن ہوتا  
 ہے۔  
ٹیربنتھ (Terebinth): سرخ بخاروں کے بعد پیشاب میں خون، البیومن اور چند بھلیاں ہوتی  
 ہیں۔ پیشاب شدید بو والا، کمرے رنگ والا، دھندلا اور غبار والا ہوتا ہے۔  
میڈورینم (Medorrhinum): بلوریں بھلیوں کے ساتھ البیومن والا پیشاب خارج ہوتا ہے  
 جبکہ مریض موی جلد والا ہوتا ہے۔ پاؤں اور گھٹنوں میں سوجن ہوتی ہے اور ٹکڑوں میں نرمی  
 ہوتی ہے۔  
مرکیورئیس کار (Mercurius Cor): ابتدائی حمل میں البیومن والا پیشاب خارج ہو۔  
فاسفورس (Phosphorus): حمل کے آخر زمانہ میں البیومن والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔  
لیک ڈیفیل (Lac Defl): میعاد بخار کے بعد بہت زیادہ البیومن والا پیشاب خارج ہوتا  
 ہے۔

### کھار (پیشاب میں)

#### Alkaline

بپٹسیا (Baptisia): ٹائیفیس میں کھار والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔  
کینتھارس (Cantharis): مثانے کے نزلہ میں۔  
نیٹرم میور (Natrium Mur): پیشاب کی سرخ تلچھٹ کے ساتھ۔

### سیاہ (پیشاب) (Black)

کالچیکم (Colchicum): سرخ بخار کے بعد سیاہ روشنائی کی طرح کا پیشاب خارج ہو۔ استفقاء اور درم گردہ میں۔

لیکیس (Lachesis): پیشاب تقریباً سیاہ، گہرا سرخ، سوجن کے ساتھ، سرخ بخار کے بعد ہوتا ہے۔

ٹیربنتھ (Terebinth): پس ہوئی کافی کی تلچٹ کے ساتھ جگر کی تکلیف میں۔

ایسڈ کاربولک (Acid Carbolc): پیشاب گہرے رنگ کا، سیاہ یا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ زخموں، سبزی گھاس جیسا سبز پیشاب خارج ہوتا ہے۔

### خون (پیشاب میں) (Blood)

(دیکھئے "گردوں کی سوزش")

### بھورا (پیشاب) (Brown)

ہائپرکیم (Hypericum): سر میں چوٹ لگنے کے باعث، گردن توڑ بخار میں، پیشاب بیز شراب کی طرح ہوتا ہے۔

آرسینک البم (Ars Alb): ٹائیفس میں گازمی بیز کی طرح کا پیشاب ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): گہری آمیزش والا پیشاب۔

لیپٹنڈرا (Leptendra): جگر میں کھنچاؤ کے ساتھ۔

بیسنزوئک ایسڈ (Benzoic Acid): مٹانے کے نزلہ میں پیشاب بہت زیادہ رنگین ہوتا ہے۔ پیشاب بدبودار ہوتا ہے جیسے کھوڑے کے پیشاب کی بو ہوتی ہے۔ پیشاب گاڑھا اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔

ہیلی بوریس (Helleborus): پس ہوئی کافی کی طرح کا۔

ایپس مل (Apis Mel): پیشاب پس ہوئی کافی کی طرح کا ہوتا ہے۔

### جھلیاں (پیشاب میں) (Casts)

کینتھارس (Cauntharis): نالی کی طرح کی جھلیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں پتھریوں کی طرح کی جھلیاں ہوتی ہیں۔

فسفورس (Phosphorus): چربی یا مومی جھلیاں پیشاب میں خارج ہوں۔

مرک کار (Merc Cor): بہت زیادہ مقدار میں تالی کے اندر دانے دار چربی بھلیاں ہوتی ہیں۔ ان بھلیوں کی سطح پر لعاب دار خلیے ہوتے ہیں۔ نیز دانے دار چربی کی اتھری والی حالت ہوتی ہے۔

ٹیری (Terebinth): تالی کی طرح کی بھلیاں ہوتی ہیں۔ (پیشاب میں البیومن ہوتا ہے۔)

### ٹھنڈا (پیشاب) Cold

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): جبکہ پیشاب پھونکنے سے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب جب خارج ہو رہا ہو تو اس وقت بھی مریض کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔

### پیشاب میں چکنائی (Fatty)

مرکیوریس کار (Mercuricus Cor): چربی کے ذرات پیشاب میں خارج ہوتے ہیں۔

### سبز (رنگ کا پیشاب) Greenish

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): پیشاب سبزی مائل اور دھندلا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مقعد سے بلا ارادہ بلغم خارج ہو جاتا ہے جبکہ مریض پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ مقعد سے خارج ہونے والا بلغم گھاس کے رنگ کا سبز ہوتا ہے۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): جب بکر میں کھنچاؤ لاحق ہو۔

### انڈی کین (پیشاب میں) Indican

انڈول (Indol): پیشاب میں انڈی کین کی موجودگی۔

### دودھیا (سفید پیشاب)

#### Milky (White)

آئیوڈیم (Iodium): دودھیا پیشاب خارج ہوتا ہے یا خراش دار گدلا پیشاب خارج ہوتا ہے یا پیلاہٹ مائل سبز اور جسم کو گھلانے والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹگرینم (Lillium Tigrinum): سبج کے وقت دودھیا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ صاف اور سفید پیشاب خارج ہو۔ اچلتے ہوئے تیل کی طرح کا پیشاب خارج ہو۔ سو جن بہت زیادہ

ہے۔ پیشاب میں فاسفیٹ ہوتا ہے۔ پیشاب باافراط ہوتا ہے۔ پیشاب کی تلچھٹ سفید یا سرخ ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جیسے کہ پیشاب میں چاک ملا یا گیا ہو۔ پیشاب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی اور چاک ملا یا گیا ہو یا مکھن نکلی لسی کی طرح کا پیشاب خارج ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): نئے ہوئے دودھ کی طرح کا پیشاب جس کے ساتھ اینٹ کے برادے کی تلچھٹ ہوتی ہے اور اس پر بھٹی ہوتی ہے۔

کولوسنتھ (Colocynth): ٹھنڈے دودھ کی طرح کا پیشاب شوگر میں۔

سپونگیا (Spongia): خاکستری مائل سفید پیشاب۔

ایپس مل (Apis Mel): دماغ کی مھلیوں میں پانی بھر جانے کے حاد مرض میں یا نوزائیدہ بچوں کے گردن توڑ بخار میں دودھ یا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ سرخ یا دالے پھوڑے پھنپھوں کے بعد۔

اورم میٹ (Aurum Met): لسی کی طرح کا پیشاب۔

اگیریکس (Agaricus): سر پہر کے وقت دودھ یا پیشاب خارج ہو۔

### بلغم (پیشاب میں) Mucus

مرک کار (Merc Cor): دھاگے ملا پیشاب، بعد میں گاڑھا اور دھندلا ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں مچھلیوں کی طرح کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔

پیرا (Pareira): گاڑھا لیس دار پیشاب خارج ہوتا ہے۔

چیمافیلہ (Chimaphila): رسی دار گاڑھا پیشاب جس کے ساتھ ذاتی سو یا میں باافراط تلچھٹ ہوتی ہے۔ تلچھٹ، باغی پیپ والی ہوتی ہے۔

ایسڈ میٹزنوئک (Acid Benzoic): پیشاب میں فاسفیٹ ملے ہوتے ہیں اور تلچھٹ میں بھی فاسفیٹ ہوتے ہیں۔ (مثانے کا نزلہ) خیسے بڑے ہو جاتے ہیں۔

بو — Odour

(دیکھئے ”پیشاب“ کے ذیل میں ”بو“)

### چکنہ (پیشاب) Oily

ہیپیر سلف، لائیو پوڈیم (Hepar Sulph, Lycopodium): گر لیس والی مھلیوں والا۔

کوکا (Coca): پھچھڑوں کی دق میں جو پیشاب ہوتا ہے اس میں تیل والی بھلی ہوتی ہے۔  
 کلکیریا کارب (Calcarea Carb): بچوں میں پیشاب تیل کی طرح کا ہوتا ہے۔  
 سمبل (Sumbul): پیشاب میں تیل والا جالا ہوتا ہے۔

### آگزلیٹ (پیشاب میں)

#### Oxlate of Lime

ایگزالک ایسڈ (Oxalic Acid): پیشاب میں آگزلیٹ ہونے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔  
 کاسٹیکم (Causticum): پیشاب میں آگزلیٹ باافراط موجود ہوتا ہے۔  
 ٹیری۔ستھ (Terebinth): پیشاب میں آگزلیٹ کی موجودگی البیومن کے ساتھ ہوتی ہے۔

### فاسفیٹ (پیشاب میں) (Phosphates)

ریفانوس (Raphanus): پیشاب میں امونیم اور میگنیشیم فاسفیٹ بڑھ جاتے ہیں۔  
 ایسڈ فاس (Acid Phos): پیشاب نمیلا ہوتا ہے جس میں فاسفیٹ بھرے ہوتے ہیں۔  
 ٹائیٹانیڈ میں یا ورم گردہ کے امراض میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔  
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): پیشاب میں فاسفیٹ کی کمی یا زیادتی لاحق ہو جاتی ہے۔  
 ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): پیشاب میں خون آتا ہے اور البیومن خارج ہوتا ہے۔  
 پیشاب فاسفیٹ والا ہوتا ہے۔ خارج ہوتے وقت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی بو گھوڑے کے پیشاب جیسی ہوتی ہے۔

### پیپ (پیشاب میں) (Pus)

(دیکھئے ”گردوں کی سوزش“)

### سرخ (پیشاب) — (Red)

بوویشا (Bovista): جب پیشاب سرخ ہو۔

### کم مقدار (پیشاب) (Scanty)

ہیلی بوریس (Helleborus): سارے جسم میں استسقلی سوجن اور پیشاب میں البیومن کے ساتھ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سرخ بخار کے بعد۔

ایپس ایم (Apis M): ہیٹ کے استقاء میں۔  
 کروکس سیٹوا (Crocus Sat): دماغ کی ہسیلوں کی تکلیف میں (دماغی تکلیفات)۔  
 اکونائٹ این (Aconite N): دمہ میں پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ گنٹھیا میں پیشاب  
 میں کمی واقع ہوتی ہے۔  
 سٹرامونیم (Stramonium): ہڈیاں میں پیشاب کم ہو جاتا ہے۔  
 آر جنتم نائٹ (Argentum Nit): رحم کے خروج میں۔  
 ڈیجی ٹالس (Digitalis): دل کے استقاء میں۔  
 کیلیڈیم (Caladium): شام کے وقت نامردی میں۔  
 مرک سول (Merc Sol): پیشاب کی دھار کمزور ہوتی ہے۔  
 لیکسیس (Lachesis): سرخ بخاروں کے بعد سو جن کے ساتھ۔  
 بپٹسیا (Baptisia): ٹائیفس میں۔  
 کالکیریا آرس (Calcarea Ars): پیشاب کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔  
 پیشاب میں الیومن اور جھلیاں ہوتی ہیں۔ منی کی نالیوں میں درد ہوتا ہے۔ تھکاوٹ اور پانی  
 پینے کے بعد۔

### تلیخت (Sedements) —

سپیا (Sepia): تلیخت میں اینٹ کا برادہ ہوتا ہے۔ گردن توڑ بخار میں پیشاب کی تلیخت  
 میں سرخ سفوف ہوتا ہے۔ زردی مائل چمکا مواد تلیخت میں ہوتا ہے۔ سفید چمکنے والی جھلی  
 ہوتی ہے۔  
 لائیگو پوڈیم (Lycopodium): پیشاب کی تلیخت میں سرخ ریت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت کردہ  
 کے درد قویج میں یا کسی دوسری وجہ سے ہوتی ہے۔  
 ٹیرنٹولا ایچ (Terentula H): فالجی کیفیت میں پیشاب کی تلیخت میں اینٹ کا برادہ ہوتا  
 ہے۔  
 میفٹس (Mephites): دمہ میں پیشاب کی تلیخت میں اینٹ کا برادہ ہوتا ہے۔  
 کاسٹیکم (Causticum): ورم زرخرہ کے مرض میں اینٹ کا برادہ پیشاب کی تلیخت میں ہوتا  
 ہے۔  
 ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip): اینٹ کا برادہ جس کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے۔  
 ایپس مل (Apis Mel): پس ہوئی کافی کی طرح کا اینٹ کا برادہ۔

سر ساپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب میں سفید ریت ہوتی ہے۔  
سلیکیم (Selenium): مٹی کی طرح کی سفیدی مائل تلچٹ، چاندی کی طرح کی سفید تلچٹ۔  
بربرس وول (Berberis Vul): گاڑھا سرخی مائل یا مساکتی جیسے رنگ والا برادہ تلچٹ میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لعاب دار مادہ تیرتا رہتا ہے۔ گردوں کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر پیشاب کی ٹالی اور مثانہ تک چلا جاتا ہے۔  
نیٹرم میور (Natrum Mur): گاڑھا، کچڑ والا پیشاب ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ تلچٹ ہوتی ہے اور گندی بو ہوتی ہے۔ مریض کا ناک نقشہ بھدا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور پیشانی میں درد ہوتا ہے۔  
کوپائیوا (Copiva): تلچٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ درم تر خرہ اور مثانے کے نزلہ میں۔  
فاسفورس (Phosphorus): پیشاب بدبودار ہوتا ہے جس میں سرخ اور بھوری تلچٹ ہوتی ہے۔ طوفان اور شور کے باعث اعصابی قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ مریض جلدی سے چونک جاتا ہے۔ مریض کی شبابہت خاکستری ہوتی ہے۔  
کینتھارس (Cantharis): گردوں کے علاقہ میں دکھن ہوتی ہے اور کانٹے والا درد ہوتا ہے۔ جو پیشاب کی ٹالی اور مثانے تک پھیل جاتا ہے۔ پیشاب کم خارج ہوتا ہے۔ جس کا رنگ گاڑھا ہوتا ہے۔ تلچٹ سرخی مائل اینٹ کے برادے والی ہوتی ہے۔  
اورم میٹ (Aurum Met): پیشاب گاڑھا ہوتا ہے جو کہ دھندلا اور بہت زیادہ بدبو والا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پھیو آتا ہے۔  
لیڈم پی (Ledum P): پیشاب میں سرخ ریت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے۔

بو — (Smell)

سپیا (Sepia): بدبودار اور کھنا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ کمرے میں برداشت نہیں ہو سکتی۔  
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): پیشاب کی بو ایسی ہوتی ہے جیسے کہ گھوڑے کے پیشاب کی ہوتی ہے۔ بو بہت تیز ہوتی ہے۔ گرمی سے اتھری ہو جاتی ہے۔  
لکیسیس (Lachesis): معدوی اور اعصابی بخار میں امونیا والی بو ہوتی ہے۔  
کوکا (Coca): امونیا والی بو، سوزاک کے رک جانے میں۔  
ابسینٹیم (Absinthium): پیشاب کی بو بہت تیز ہوتی ہے جیسے کہ گھوڑے کے پیشاب کی



ہوتی ہے۔ پیشاب کا رنگ شگترے کے رنگ کی طرح ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔

موسکس (Moschus): پیشاب میں امونیا کی بو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی علامت موجود نہیں ہوتی۔

کاجوپٹم (Cajuputam): پیشاب کی بو ایسی ہوتی ہے۔ بھیسی جلی کے پیشاب کی ہوتی ہے۔ اچھارے والا درد قویٰ ہوتا ہے۔

پیشیا (Baptisia): سڑے ہوئے انڈوں کی بو پیشاب میں ہوتی ہے۔ ٹائیفائیڈ بخار میں پیشاب متعفن بو والا ہوتا ہے۔

بیسنزوئک ایسڈ (Benzoic Acid): پیشاب بہت ہی زیادہ تیز بو کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو کہ گھوڑے کے پیشاب کی طرح کی ہوتی ہے۔ بدبو دار متعفن پیشاب، بہت ہی گہرے رنگ والا۔

ہیرٹامیور (Baryta Mur): غدود کی سوجن میں بدبو دار پیشاب خارج ہوتا ہے۔

بوریکس (Borax): چبسنے والی بو کے ساتھ گرم پیشاب خارج ہو۔

اوسمیم (Osmium): ہنسنے کی طرح بو پیشاب میں ہوتی ہے۔

انڈیگو (Indigo): شدید گندی بدبو والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد۔

فیرم آیوڈ (Ferrum Iod): میٹھی بو والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔

### کثافت اضافی (Specific Gravity)

یورینیم نائٹ (Uranium Nit): پیشاب کی کثافت اضافی اونچے درجے کی ہوتی ہے جو کہ 1040 سے 1044 تک ہوتی ہے۔

ٹیر-ہستہ (Terebinth): پیشاب کی کثافت اضافی 'ورم گردہ کے مرض میں 1018 ہوتی ہے۔ پلمبم (Plumbum): کثافت اضافی کم ہوتی ہے مثلاً 1002 نیز جب کثافت اضافی 1016 اور 1017 ہو۔

برہیگی گلوٹس (Brachyglottis): یہ دوا حسب ذیل کثافت اضافی کے لئے دی جاتی ہے۔ 1004، 1008، 1020، 1023، 1024 اور 1034۔

آرنیکا ایم (Arnica M): کثافت اضافی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔

سنی گیولا (Sanicula): باافراط پیشاب آنے کے ساتھ کثافت اضافی 1000 ہوتی ہے۔

### یوریا (پیشاب میں) (Urates)


تھلاپی بی (Thlaspi B): پیشاب میں یوریش کی موجودگی کے باعث لاحق ہونے والے امراض۔

نیٹرم سلف (Natrurn Sulph): معدے کی گتھیا کی تکلیف کے ساتھ پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): یوریا کے لیکٹکٹ کا اضافہ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پرائیٹ کی سوزش ہوتی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): امونیا کے یوریش پیشاب میں ہوتے ہیں۔ جو دق کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔

بیمنزونک ایسڈ (Benzoic Acid): پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے جس کے ساتھ گتھیا کی علامات ہوتی ہیں۔ گردوں کی کمزوری۔



# اعضائے تناسل کے امراض

(Diseases of Genitalia)

## حصہ اول۔۔۔۔ مشترک امراض

گلیٹ — Gleet

(دیکھئے ”سوزاک“)

## سوزاک — (Gonorrhoea)

پلساٹیلہ ”اکونائٹ این“ (Pulsatilla, Aconite N): مرض کے ابتدائی مراحل کے دوران ان ادویات کو ہر گھنٹے کے بعد بدل بدل کر دینا چاہئے۔ سوزش والے مرحلے کے دوران 1x طاقت کی دوا دیجئے۔ بعد والے مراحل میں پلساٹیلہ اوپچی طاقت میں بھی دے سکتے ہیں۔ جبکہ مریض ملائم طبیعت کا ہو۔ پیاس بالکل نہیں رہتی۔ پیشاب بغیر تکلیف کے خارج ہوتا ہے۔ خضیوں کی سوزش کے ساتھ پیلے رنگ کا گاڑھا پیشاب باافراط خارج ہوتا ہے۔ یہ تمام علامات اکٹھی ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک علامت بھی غیر موجود نہیں ہوتی۔

کیوبیبا (Cubeba): جب سوزش والا مرحلہ گزر جاتا ہے اور پیشاب کی نالی میں پیشاب کرتے وقت صرف جلن باقی رہ جاتی ہے۔ پیشاب گاڑھا پیلا اور پیپ کی طرح کا خارج ہوتا ہے۔ گہرا سرخی مائل بلغم خارج ہوتا ہے۔ یہ بلغم بھی گاڑھا اور سوزاکی ہوتا ہے۔ سوزاک کے دوسرے اور آخری مرحلے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

سیلیسیا (Silicea): مرض سوزاک میں یہ دوا خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ پیشاب کی نالی سے پیپ کی طرح کا مادہ خارج ہوتا ہے۔ ہلکا سا چھچھروں کی طرح کا مواد بھی خارج ہوتا ہے۔ خون آلود پیشاب جو کہ پیپ والا ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی سے گاڑھی متعفن پیپ خارج ہوتی ہے۔ اس دوا کو سوزاک کے تمام کیسوں میں اعتماد کے ساتھ آزمایا جاسکتا ہے۔ 1000 طاقت کی خوراک دیجئے۔

کوپا یوا (Copaiva): یہ دوا مزمن سوزاک میں مفید ہے۔ پیشاب کے اخراج سے پہلے اور بعد مٹانے کے پیچھے اور پیشاب کی نالی میں کانٹے کی کیفیت ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ پیشاب دودھیا ہوتا ہے۔ پیشاب کی بو ہنشنہ جیسی ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): مزمن سوزاک میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ جب پیشاب پتلا اور سبز رنگ کا خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ جلن دار درد پیشاب کرنے کے دوران ہوتا ہے۔

نسی لیکوپٹ (Tussilago Pet): پہلے اور سفید رنگ کے گاڑھے پیشاب کے اخراج کے ساتھ انتہائی شدید سوزاک لاحق ہو۔ پیشاب کی نالی میں ریٹگن ہوتی ہے۔ منی کی نالی میں اور خیموں میں جھٹکے لگتے ہیں اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔

پٹروسلینیم (Petroselinum): پیشاب کی نالی میں شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ مریض پیشاب کی نالی میں خارش کرنے کے لئے کوئی چیز گھسیڑ دینا چاہتا ہے۔

میڈورنیم (Medorrhinum): دے ہوئے سوزاک کے لئے یہ ایک بنیادی دوا ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ بو تیز ہوتی ہے۔ پیشاب گریں جیسے مادے کی تہ سے ڈھکا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ زرد ہوتا ہے۔ پیشاب کا بہاؤ ست ہوتا ہے۔ عصبو تاسل کی جڑ میں کٹن ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): سوزاک کا حاد مرحلہ گزر جانے کے بعد یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا سوزاک اور سوزاکی مسوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ گو مز (کونڈی لومانا) مکمل طور پر عصبو تاسل کے سر کو گھیرے ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں چھین والے اور گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔

کینٹھارس (Cantharis): سوزاک کا دب جانا جب اس کا اثر مٹانے پر ہو۔ پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے پر جلن ہوتی ہے اور شعلی ہوتی ہے۔ خیموں کی پر درد سوجن لاحق ہو۔ خراش دار لیکوریا کے ساتھ ریم (بیضہ دانی) کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔

سائبرس (Cinnabaris): طویل مدت سے لاحق سوزاک جو آنکھ کے ساتھ پیچیدہ ہو جانا

کپسیکیم (Capsicum): پیشاب پیپ دار خون آلود اور متعفن ہوتا ہے۔ دبا ہوا سوزاک۔ آلات تاسل کی فھنڈک اور سکڑن لاحق ہو۔ نامردی (بانجھ پن)

الیومن (Alumen): پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ سوجن ہوتی ہے اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پہلے رنگ کا پیشاب مزمن طور پر بغیر درد کے خارج ہوتا ہے۔ اندام نسانی میں یا ریم کی گردن پر ناسوری دھجیاں ہوتی ہیں۔

نٹرم سلف (Natrum Sulph): یہ دوا پانی کی زیادتی والے مریضوں کو دی جانی چاہئے۔

پیلاہٹ مائل، سبزی مائل پیشاب خارج ہونے کے ساتھ مزمن سوزاک لاحق ہوتا ہے۔ حشفہ اور خضیوں کی سوزش۔ اعضائے تناسل کی خارش۔ یہ خارش حشفہ اور عضو تناسل میں ہوتی ہے۔ مریض انہیں ملنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ یہ دوا علامات کی بروی تعداد کا احاطہ کرتی ہے۔ غدودوں کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ خون پانی کی طرح پتلا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ انجماد خون، پیریکا ایسیا، جلدی دانے، انگیزا تھما، انگیزری سینسر، پھوڑے پھنسی ہاتھوں اور پاؤں میں چھیدنے والے درد ہوتے ہیں۔ پھنسیاں ہوتی ہیں۔ آبلے ہوتے ہیں۔ ہتھیلیوں میں دکھن ہوتی ہے۔ پتلا مواد رستا ہے۔ آنشک کے گھاؤ ہوتے ہیں۔ بد شکل ناخن ہوتے ہیں۔ یہ علامات آنشک یا سوزاک کے باعث لاحق ہو سکتی ہیں۔

آر سینک، سلف، فلیو (Ars. Sul. Fl) خوفناک دردوں کے ساتھ سوزاک لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے جو کہ پتلا اور مستقل ہوتا ہے۔ بے چینی کے ساتھ تمام پیشاب کی ٹالی کے ساتھ دن رات جلن ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): ایسے مریضوں کے لئے یہ دوا بطور عمل انگیز استعمال ہوتی ہے جنہیں ٹھنڈ بہت جلد لگ جاتی ہے اور جن کا علاج صحیح طریقے سے نہ کیا گیا ہو۔ بہت زیادہ یخچان ہوتا ہے۔ دکھن اور جلن اعضاء میں ہوتی ہے۔

کینابیس سینی وا (Cannabis Sativa): پیشاب کی ٹالی میں جلن اور سکڑن ہوتی ہے۔ پیشاب والے سوراخ سے لے کر مثانہ تک جلن اور سکڑن ہو۔ پیشاب کی ٹالی سوجی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دکھن ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت ٹانگے لگنے جیسے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ پیشاب کے اخراج کے آخر میں ابتری ہو جاتی ہے۔ تقریباً مسلسل پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ پیشاب سفیدی مائل اور دھندلا ہوتا ہے۔

ملی فولیم (Millefolium): عضو تناسل اور خضیوں کی سوجن جس کے ساتھ خون اور پانی جیسا لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے۔

ایسڈ فلوور (Acid Fluor): پرانا سوزاک، سکڑن، سوزا کی مادہ رات کے دوران خارج ہوتا ہے جو سوئی کپڑے پر زرد دھبہ چھوڑ دیتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں جلن کے ساتھ پیشاب کرنے کی متواتر خواہش ہوتی ہے۔

ارجنٹم ٹائٹ (Argentum Nit): سوزا کی مادہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کی متواتر خواہش کے ساتھ پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد چند قطرے خارج کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): سوزاک اور پیشاب کی ٹالی کی سوزش خصوصاً مستورات میں۔

خراش دار، خون والا اور بہت زیادہ بدبو والا مواد خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لب فرج میں خراش اور سکڑن ہوتی ہے۔

کیمفر (Camphor): قطرات کا ٹپکنا ہو پیشاب کرنے کے بعد بھی دور نہ ہو۔ مثانے کے پیشاب سے بھرے ہونے کے ساتھ شدید سختی دوروں کے ساتھ پیشاب کرنے کی لا حاصل کوشش ہوتی ہے۔

مرکیورئیس (Mercurius): قطرات کا ٹپکنا، سوزاک، پیشاب کی نالی کی سوزش، پیشاب کمزور دھار کے ساتھ اور کانٹے والے دردوں کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ کے ہونٹ سرخ اور سوزشی ہوتے ہیں۔ فرج کی سوزش، جس کے ساتھ سوجن ہوتی ہے نیز فرج سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ پیلاہٹ مائل سبز پیشاب خارج ہوتا ہے۔ رات کے وقت پسینے آتے ہیں۔ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ پسینے کے دوران اتھری ہوتی ہے۔

### بال (زیر ناف) (Hair Pubic)

نائٹرک ایسڈ، سلینیم (Selenium, Nitric Acid): زیر ناف بال گر جاتے ہیں۔  
آئیوڈم (Iodum): زیر ناف بالوں کا گر جانا، اگر اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائیں۔

سلفر (Sulphur): بدبو دار پسینے کے باعث زیر ناف بال تباہ ہو جاتے ہیں۔

### آتشف — Syphilis

مرک سول (Mer Sol): غیر پیدا کنشی اور خود حاصل کردہ آتشک کے تمام مراحل کے لئے یہ چوبی کی دوا ہے۔ حاد کیسوں میں اسے فحلی طاقتوں میں دینا چاہئے اور مزمن کیسوں میں بہت اونچی طاقتیں دینی چاہئیں۔ آتشک کے زخم سرخ ہوتے ہیں جو اندر کی جانب پھیلتے ہیں اور جن سے پیلاہٹ مائل متعفن مادہ خارج ہوتا ہے۔ ان میں سیلان خون کا رجحان ہوتا ہے۔ زبان پر سوزا کی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ نیز حلق یا چیمچروں میں آتشکی گنٹھیا لاحق ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): یہ دوا دوسرے درجے کی آتشک میں مفید ہوتی ہے۔ جس میں پارے کا غلط استعمال کیا گیا ہو۔ میسٹوئیز میں کھودنے والے درد ہوتے ہیں۔ آتشک کے باعث ناک کی ہڈیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغ میں رسولیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ سخت قسم کا درد سر لاحق ہوتا ہے۔ نالو کی ہڈی کلنے سڑنے لگتی ہے نیز دوسری چھٹی ہڈیاں کھٹی سڑتی ہیں۔ جس کے ساتھ ہلکا نزلہ رہتا ہے۔

شاہیرس (Cinnabaris): آتشک میں جو کہ سوزاک کے ساتھ پیچیدہ ہو جاتا ہے یہ ایک مفید دوا ہے۔ آتشک والے زخم سخت اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیشاب کے راستے سے پیپ خارج ہوتی ہے۔

مرک ڈلس (Merc Dulc): مستورات کی آتشک میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ جس میں بیرونی اعضائے تناسل کے گرد کئی پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایسڈ نائٹریک (Acid Nitric): آتشکی ناسوروں کے لئے یہ مفید دوا ہے۔ یہ پھوڑے گہرائی کی نسبت ارد گرد زیادہ پھیلتے ہیں۔ جس کے ساتھ ڈنگ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ککڑی کی کئی کرچیں ایک ساتھ چبھ رہی ہوں۔ سیان خون کا رتھان ہوتا ہے۔ دانے بکثرت ہوتے ہیں۔ جن کے کنارے بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ گوڑیا پھوڑے اور گوبھی کے پھول جیسے پھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آتشکی بچے کی رات کی تکلیف جبکہ دیگر مقاصد کے لئے دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ نوزائیدہ بچوں میں ناسوری کیفیت۔ لب فرج میں ناسور ہوتے ہیں۔ مقعد کے پاس انجیر جیسے سے ہوتے ہیں۔ چھاتی پر تانبے کے رنگ والے پھوڑے پھنسیا ہوتے ہیں۔

مرک کار (Merc Gor): آتشکی زخم ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ منہ میں 'سوزھوں میں اور حلق میں بہت زیادہ ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ سانس متعفن ہوتا ہے۔ تھوک بہت زیادہ آتا ہے۔ ٹانگز بہت بوہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ زبان پر آتشکی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ حلق یا پیچھڑوں میں بھی۔

کیلوٹروپس (Calotropis): دوسرے مرتلے کی آتشک جس میں ٹانگوں کے سرے موٹے ہو جاتے ہیں۔ درخت کے پانچ قطروں کی خوراک دی جائے۔

سٹیلنگیا سل (Stillingia Syl): دوسرے مرتلے کی آتشک جس کے ساتھ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ ماتھے اور ہڈی کی ہڈی پر گانٹھیں ہوتی ہیں۔ آتشکی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے۔

مائی گیل (Mygale): حدت کے ساتھ زیادہ ہلاؤ والا پیشاب ہوتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے اور ڈنگ لگتے ہیں۔

کالی آیوڈ (Kali lod): گہری ناسوری کیفیت۔ آتشکی کھانہ اور حلق، پیچھڑوں یا زبان کی سوجن ہوتی ہے جو کہ آتشک کے باعث ہوتی ہے۔ آتشکی گھٹیا خصوصاً انگلیوں اور انگوٹھوں کا۔ درد کے ساتھ یا درد کے بغیر۔ فلینجس کا ہتھرتج بڑا ہو جاتا۔ زکام ہوتا ہے۔ نشتوں اور ہونٹوں پر چھالے ہوتے ہیں۔ ناک میں اور پیشانی کی ہڈیوں میں تلکین ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ کترن والے اور کھودنے والے درد ہڈیوں میں ہوتے ہیں۔ کھوپڑی اور کمر پر معروف پھوڑے

پھنسیاں ہوتی ہیں۔

**فلورک ایسڈ (Fluoric Acid):** منہ کی آتشکی ناسوری کیفیت، 'طلق اور ناک کی آتشک والی ناسوری کیفیت لاحق ہو جبکہ پیشاب گاڑھا خراش دار خارج ہوتا ہے۔ مریض خوف زدہ اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ خصوصاً ناک اور پنڈلی کی ہڈیوں کا گھٹنا سزنا لاحق ہوتا ہے۔

**کریو زوٹ (Kreosote):** آتشک کا حاد زکام جس کا اثر دانتوں پر ہوتا ہے۔ یہ مرض دانتوں کو کالا کر دیتا ہے اور جلد ہی تباہ کر دیتا ہے۔ منہ اور گلا دکھتے ہیں اور منہ کے کناروں پر ناسوری کیفیت اور شکاف ہوتے ہیں۔

**کالی پائیکرام (Kali Bich):** آتشکی زکام جو منہ کی باغی جھلی کو متاثر کرتا ہے نیز ناک اور گلے کی باغی جھلی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ منہ یا ناک میں چمید کرنے والے ناسور ہوتے ہیں۔ بدبو دار اور تباہ کن نزلہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ گاڑھا پیلا مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔

**تھوجا (Thuja):** سب دن والی آتشک، جلد پر دانے ہوتے ہیں۔ پھوڑے ہوتے ہیں ناسور ہوتے ہیں۔ آتشکی چیرے ہوتے ہیں۔ جملن دار اور خارش والی رطوبت رکتی ہے۔

**بایاگا (Badiaga):** غدود کی سخت قسم کی سوجن کے ساتھ نوزائیدہ بچوں میں آتشکی کیفیت۔  
**سفیلیلیم (Syphilinum):** یہ ایک نوسوڈ ہے۔ جسے اونچی طاقتوں میں دینا چاہئے۔ یہ دوا علاج کے شروع میں دینی چاہئے یا پھر عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے جبکہ بہترین منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں۔

**لیکیسیس (Lachesis):** یہ دوا آتشکی اوزینا (پرانا زکام) اور پارے کے غلط استعمال کے بعد آواز کے جاتے رہنے کے مرض کو درست کرتی ہے۔

## حصہ دوم۔۔۔ مردانہ امراض تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی

(Azoospermism)

(مادہ منویہ میں تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی یا امراضی حالت)

**ڈامینا (Damiana):** جنسی ضعف اعصاب کے باعث نامردی میں تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی، پرائیٹ کا مزمن اخراج۔

**چائینی نم سلف (Chininum Sulph):** جنسی خواہش کے دب جانے یا کم ہو جانے کے ساتھ



مادہ منویہ کی غیر موجودگی۔

سٹرائکی کینینیم (Strychnium): جب مادہ منویہ کی غیر موجودگی کے ساتھ بہت زیادہ جنسی خواہش پائی جائے اور / یا خصلیوں کی سوجن موجود ہو۔

کونیم (Conium): مادہ منویہ کی غیر موجودگی نامردی کے ساتھ۔ ناکافی ایستادگیاں یا ایستادگیوں کی غیر موجودگی۔ مجامعت میں طاقت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ عورت کی موجودگی ہی انزال کا باعث بن جائے۔

آئیوڈیم (Iodium): بڑھی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ یہ دوا ایسے اشخاص کی نشاندہی کرتی ہے۔ جو شدید قسم کی یا مستقل ایستادگیاں رکھتے ہیں۔ خبیثے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پرورد ہوتے ہیں۔

### سرطان (Cancer)

(نیز دیکھئے "متفرقات" کے ذیل میں "سرطان")

کونیم (Conium): عضو تناسل کا سرطان۔

سپونجیا (Spongia): خصلیوں کا سرطان۔

### مجامعت — (Coition)

گریفائٹس (Graphites): نامردی کے ساتھ مجامعت سے بے زاری، مجامعت کے دوران اچانک طاقت کھو جائے۔ مجامعت کے بعد ناگہان ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مجامعت کے بعد پیونہ آتا ہے۔

اگیریکس ایم (Agricus M): مجامعت کے بعد بد مزاجی۔

سلیمنیم (Selenium): مجامعت کے بعد مریض بد مزاج ہو جاتا ہے اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcareo Carb): مجامعت کے بعد گھٹنے جواب دے جاتے ہیں۔ مجامعت کے بعد مریض غیر مطمئن اور غصہ ور ہوتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔

نیٹرم کارب (Natrum Carb): مجامعت کے بعد بہت زیادہ پسینے کا رجحان ہوتا ہے۔

سٹیفیسیا (Staphisagria): جنسی غلط کاریوں کے برے اثرات۔ ذہن مسلسل جنسی مضامین پر مرکوز رہتا ہے۔ (یعنی جنسی خیالات رہتے ہیں) مجامعت کے دوران اور بعد تنگی تنفس لاحق ہو جاتی ہے۔ مجامعت کے بعد پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔

ٹائی ٹینیم (Titanium): مجامعت میں منی کا اخراج بہت جلد ہو جانے کے ساتھ جنسی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ (سرعت انزال)

سپیا (Sepia): مجامعت کے باعث تکالیف لاحق ہوں۔ خصوصاً چکر آتے ہیں۔

موسکس (Moschus): مجامعت کے بعد تھکاوٹ لاحق ہو۔

کینتھارس (Cantharis): مجامعت کے بعد پیشاب کی ٹالی میں درد ہوتا ہے۔

ڈیفنی (Daphne): مجامعت کے بعد دانت کا درد لاحق ہو۔

سٹرائی کینا فاس (Strychina Phos): شرم یا اس سوچ کے باعث کہ وہ نامرد ہے حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، مجامعت کے وقت ایسا دہائیوں کا فقدان لاحق ہو جاتا ہے۔ تیسری ڈائی لیویشن استعمال کیجئے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): عضو تناسل اچانک ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور انزال کو روک دیتا ہے۔

مجامعت کے بعد خواہش بڑھ جاتی ہے اور احتلام ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): اس سے پہلے کہ ایسا دہائی مکمل ہو۔ انزال ہو جاتا ہے۔

بیرٹا کارب (Baryta Carb): جماع کے دوران سو جائے۔

لانی سین (Lyssin): انزال بہت دیر سے ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مجامعت سے بے زاری، آگے تناسل مرحلے ہونے کے ساتھ۔ مجامعت کے دوران سو جائے۔ مجامعت کے دوران اچانک طاقت زائل ہو جائے۔

امبرا گریشیا (Ambra Grisea): جماع کی کوشش کرنے پر دمہ لاحق ہو۔

کالی کارب (Kali Carb): مجامعت کے بعد نظر کمزور ہو جائے اور / یا کمر میں درد ہو۔

یوفو (Bufo): مجامعت کے دوران تشنگی جھٹکے لگتے ہیں۔

سبیل سیرولاٹا (Sabal Serrulata): مجامعت کے بعد پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔

مرک کار (Merc Cor): مجامعت کے بعد امعاء مستقیم میں پر درد تشنگی دورے ہوتے ہیں۔

کریو زوٹ (Kreosote): مجامعت کے دوران آگے تناسل جیسے ہی اندام نسلی کی رطوبت کو چھوتا ہے تو آلات تناسل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): جنسی ہیجان لاحق ہوتا ہے، ہاتھ مسلسل اعضائے تناسل پر رہتے ہیں۔

ملی فولیم (Millefolium): مجامعت میں انزال کا فقدان۔

## خواہش۔۔۔ گھٹی ہوئی (نامردی)

### Desire---Decreased (Impotency)

نیوفر (Nuphur): ایٹادگیوں اور جنسی خواہش کی مکمل غیر موجودگی۔ پاخانہ کرنے کے دوران یا جب پیشاب کر رہا ہو تو غیر ارادی طور پر مادہ منویہ خارج ہو جائے۔

سبل سیرولانا (Sabal Serrulata): نامردی، اعضائے قائل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ خصے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آرز قائل سکڑا ہوا اور ٹھنڈا ہوتا ہے جس کے ساتھ پیشاب کی تکلیفات بھی ہوتی ہیں۔

اونوس موڈیم (Onosmodium): جنسی خواہش مدہم پڑ جائے، آرز قائل کے حقد میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ احتکام لاحق ہوتا ہے۔ بہت جلد انزال ہو جاتا ہے۔

ڈامیانا (Damiana): نامردی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ 5 سے 10 قطروں کی خوراک روزانہ تین مرتبہ دیجئے۔

ٹائی ٹی نیم (Titanium): جماع کے دوران ضرورت سے زیادہ جلدی انزال ہو جانے کے ساتھ جنسی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

کیلڈیم (Caladium): جلق کے باعث نامردی لاحق ہو، شدید جنسی خواہش کے ساتھ آرز قائل ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ صبح کے وقت کچی غیند میں ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ مکمل طور پر بیدار ہونے پر ایٹادگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پرانے عیاشوں میں نامردی لاحق ہو جو کہ ایٹادگیاں کے نقدان کے باعث ازدواجی تعلقات انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ جنسی بے اعتدالیوں کے باعث اور تمباکو نوشی کے باعث یا تمباکو چبانے کے باعث ذہنی اور جسمانی نقاہت لاحق ہوتی ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): بوڑھے لوگوں میں نامردی، جزوی نامردی، 1M طاقت کی خوراک ہر ماہ استعمال کیجئے۔

سٹیفی سیکریا، فاسفورس (Staphisagria, Phosphorus): بے اعتدالیوں کے باعث نامردی لاحق ہو۔

موسکس، کیپورم میٹ (Moschus, Cuprum Met): شوگر کے ساتھ نامردی لاحق ہو۔

نٹرم میور (Natrum Mur): بغل گیر ہونے کے دوران مادہ منویہ کم خارج ہو۔

یوہم نیم (Yohimbinum): اعصابی کمزوری کے باعث نامردی لاحق ہونے کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): خفیہ برائی اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد نامردی لاحق ہو۔  
 آرنیکا، ہائپرکیم (Arnica, Hypericum): گر جانے کے باعث مکا وغیرہ لگ جانے کے  
 باعث۔  
 مرکوریس، کالی آیوڈ (Mercurius, Kali lod): آشک کے باعث نامردی لاحق ہو۔

## خواہش۔ بڑھی ہوئی

(Desire- Increased)

ایسڈ فلورک (Acid Flouric): یہ دوا گھٹیا ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ ایک آدمی ایک عورت سے مطمئن نہیں ہوتا اور یکے بعد دیگرے بیویاں بدلتا رہتا ہے۔ مریض گلی کی کلز پر کھڑا ہو جاتا ہے اور معصوم قسم کی گلی سے گزرنے والی عورتوں سے خواہشات نفسانی رکھتا ہے۔ یہ دوا برائی کرنے والوں (بدکاری) کے لئے ہوتی ہے جو اپنی بیوی سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے جنہیں اپنے بچوں اور عزیز ترین دوستوں سے نفرت ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): متواتر ایستادگیوں ہوتی ہیں اور ایسے جنسی خیالات ہوتے ہیں جن پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہے۔ جوان آدمیوں میں جذبات پر قابو پانے کی کوشش کے باوجود ایستادگیاں ہوتی ہیں جبکہ ذہن اور اعصابی نظام میں خرابی اس کیفیت کا باعث ہو۔  
 ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): انتشار ہے کا جنسی جوش۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): بڑوں میں یعنی بالغوں میں نامناسب قسم کی جنسی بھوک۔  
 پیکرک ایسڈ (Picric Acid): شدید قسم کی اور خطرناک قسم کی ایستادگیاں جن کا باعث ذہنی اور اعصابی نظام کی خرابی ہوتی ہے۔ عضو تناسل متاع ہوتا ہے کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔  
 اوری گی نیم (Origanum): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ایستادگیوں کی لہریں اور جلق کی عادت میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ تیسری طاقت کی دوا دیتے۔

اینٹن تھیرم، کینتھرس (Anantherum, Cantharis): خطرناک قسم کی جنسی بھوک ہوتی ہے جسے مطمئن کرنے کی ہر کوشش اس میں اضافہ کر دیتی ہے یہاں تک کہ مریض خود لذتی اور پاگل پن تک پہنچ جاتا ہے۔ شدید قسم کی ایستادگیاں ہوتی ہیں، دی ہوئی ترتیب کے مطابق ادویات آزمائی جاتی ہیں۔

کیلڈیم (Caladium): شدید قسم کی جنسی خواہش، نامردی اور عضو تناسل کے ڈھیلا پڑ جانے کے ساتھ۔ صبح کے وقت جب مریض نیم خوابی میں ہوتا ہے تو ایستادگیاں ہوتی ہیں لیکن حمل طور سے جاگنے پر ایستادگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایستادگیاں خود بخود خواہش کے بغیر ہوتی ہیں بہت

سخت اور پُر درد ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔  
 نکلس دامیکا (Nux Vom): جنسی بھوک ہوتی ہے جو کہ شراب نوشی کی بے اعتدالیوں کے باعث ہوتی ہے۔  
 کونیم (Conium): معمولی قسم کا جذبہ مادہ منویہ کے اخراج کا باعث بن جاتا ہے۔ اخراج ہوتا ہے اور پروٹھیٹ غدود سخت ہو جاتا ہے، خواہش کے دب جانے کے بد اثرات۔  
 موسکس (Moschus): جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔  
 پلائینا (Platina): اعظام کی تحریک (لڑکے کے مقعد کے ذریعے جنسی فعل انجام دینا) اور ہم جنس پرستی (جنسی فعل مقعد کے ذریعے انجام دے)۔

### ایٹادگیاں — (Erections)

(نیز دیکھئے ”جماعت“ اور ”خواہش“)  
 کونیم (Conium): ایٹادگیاں نہیں ہوتیں۔ جزوی یا مکمل طور پر ایٹادگیاں غیر موجود ہوتی ہیں۔  
 ڈائیوسکوریا (Dioscorea): دن رات متواتر ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔  
 نیٹرم میور (Natrium Mur): احتلام کے ساتھ متواتر ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔  
 پلائینم (Platinum): خصوصاً رات کے وقت شدید ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔  
 کینتھارس (Cantharis): شدید قسم کی ایٹادگیاں ہوتی ہیں جو کہ پُر درد ہو سکتی ہیں۔  
 کیمفر (Camphor): خوابوں کے دوران شدید قسم کی ایٹادگیوں کا حملہ ہوتا ہے۔  
 فاسفورس (Phosphorus): ایٹادگیاں نہیں ہوتیں یا کمزوری ہوتی ہیں۔  
 کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): بڑھی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ میکاکی اور پُر درد ایٹادگی۔  
 ایسڈ پیکریک (Acid Picric): خوفناک قسم کی ایٹادگیاں جو نیند میں خلل پیدا کر دیتی ہیں۔  
 کسی بھی جنس میں حد اعتدال سے بڑھا ہوا جنسی نظام کا جوش جو کہ ریڑھ یا دماغ کی تکالیف کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ آرتھرائٹس اتاتا ہوا ہوتا ہے کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔  
 اوسمیم (Osmium): صبح سویرے اٹھنے کے بعد سخت قسم کی ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔  
 آرنیکا ایم (Arnica M): چمٹل قدمی کرنے کے بعد ایٹادگیاں ہوتی ہیں۔

## حشفہ (عضو تناسل کا سر)

(Glans)

(نیز دیکھئے "کھونگھٹ" کے ذیل میں "سوجن")

آر سینک الیم (Ars Alb): حشفہ میں شکاف ہوتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے دوران حشفہ میں جلن ہوتی ہے۔

مرک کار (Merc Cor): مزمن، گریس دار، چرپٹا، بدبودار مواد خارج ہونے کے ساتھ حشفہ کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ حشفہ کی حساسیت۔

مرکیور میس (Mercurius): حشفہ پر گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): حشفہ کے گرد نمی ہوتی ہے۔

کوپا لیا (Copaiva): سوزاک کے بعد حشفہ میں درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): حشفہ کے پردہ کی سوجن کے باعث حشفہ میں درد ہوتا ہے جس کے باعث حشفہ کا پردہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): حشفہ میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔

اورم میور نیڑم (Aurum Mur, Nat): حشفہ پر نامور ہوتے ہیں جو گہرے گوشت خور ہوتے ہیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): حشفہ پر سے ہوتے ہیں، ضدی قسم کا لگاؤ ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): نرم، مرنے کی کلفتی کی طرح کے سے اسٹھنی جن سے آسانی کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے، حشفہ کی برقی ٹھنڈک۔

تھوجا (Thuja): سوزاک کے بعد سے چھوٹے ٹوک دار ہوتے ہیں۔ جن سے لیس دار مواد خارج ہوتا ہے۔

کالی میور (Kali Mur): آتشکی زخم کے بعد عضو تناسل کے سر پر سے ہوتے ہیں۔

اورم سلف (Aurum Sulph): آواز تناسل کے حشفہ کا گومڑ، نامردی کے ساتھ یا نامردی کے بغیر، عضو تناسل کے حشفہ کی سوزش۔

خصیوں کی تھیلی میں پانی بھرنا (Hydrocele)  
(دیکھئے ”خصیوں کی سوزش“)

نامردی — (Impotency)  
(دیکھئے ”خواہش۔ کھٹی ہوئی“)

جلق — (Masturbation)

پلاٹینم (Platinum): سن بلوغ سے پہلے جلق اور اس کے اثرات۔  
کونیوم: (Conium): جلق اور بے اعتدالیوں کے بد اثرات۔  
اگنس کاسٹس (Agnus Castus): جلق اور بے اعتدالیوں کے بعد عضو تناسل کی کمزوری  
حتیٰ کہ مریض کی جوان اور خوبصورت بیوی بھی اس میں المیہ تادیوں کا جوش پیدا نہ کر سکے۔  
کیلڈیم (Caladium): یہ دوا جلق کی عادت کو دور کرنے کے لئے اور اس کے بد اثرات کو  
رفع کرنے کی لئے استعمال کی جاتی ہے۔ سر ذکر پلپلا ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل ڈھیلا ہوتا ہے۔  
یوفو (Bufo): جلق کی عادت پوری کرنے کے لئے مریض تھائی کا خواہاں رہتا ہے۔ ذہنی  
حالت کھو رہی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر طیش میں بھرا ہوا ادھر ادھر دوڑتا ہوا پھرتا ہے۔  
اوری کینم ایم (Origanum M): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی تحریکات کے ساتھ جلق کی نہ  
رکنے والی عادت، جنسی خواہش اسے پاگل کر دے۔  
اسٹیلگو (Ustilago): جلق کا نہ رکنے والا رنجان، شہوانی خیالات اور پُر شہوت خوابوں کے  
ساتھ خود لذتی کی عادت۔  
سٹیفنی سگریا (Staphisagria): بچوں میں جلق کی عادت اور اس کے بد اثرات۔  
مرک سول (Merc Sol): لڑکوں کے پستانوں میں دودھ ہوتا ہے۔

جنسی جنون — Nymphomania (Satyriasis)

(تیز دیکھئے ”خواہش بڑھی ہوئی“)  
کینتھرس (Cantharis): اگر مقامی بیجان کے باعث خواہش کا بڑھ جانا لاحق ہو۔  
نکس دامیکا (Nux Vom): شراب نوشی کی بے اعتدالیوں کے باعث۔  
فاسفورس، پیکرک ایسڈ (Phosphorus, Picric Acid): دماغ یا اعصاب کی خرابی کے  
باعث۔

## عضو تناسل — (Penis)

### غیر موجود (عضو تناسل) — (Absent)

کوکا، کوکین (Coca, Cocaine): یہ احساس ہوتا ہے جیسے عضو تناسل موجود نہ ہو۔

### جلن (عضو تناسل کی) — (Burning)

کریو زوٹ (Kreosote): مجامعت کے دوران عضو تناسل میں جلن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اگلے دن عضو تناسل سوجا رہتا ہے۔

مگنیشیا مور (Magnesia Mur): صبح سویرے متواتر الٹا دگیوں کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔

پیریرا (Pariera): وقفوں کے ساتھ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کے ہمراہ جلن ہوتی ہے۔

### ٹھنڈا (عضو تناسل) — (Cold)

اگنس کاسٹس، لائیگو پوڈیم (Agnus Castus, Lycopodium): عضو تناسل ٹھنڈا ہوتا ہے۔

### پھوڑے، پھنسیاں (عضو تناسل کی) — (Eruptions)

گرافائٹس (Graphites): آلہ تناسل پر داد جیسی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

کروٹن ٹگ (Croton Tig): آلہ تناسل پر چھالوں کی طرح کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): زخم ٹکنے کے بعد جامنی سرخ رنگ کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): آلہ تناسل کی خارش۔

### پکڑنا — (Handling)

(نیز دیکھئے "عضو تناسل" کے ذیل میں "کھینچنا")

سٹرامونیم (Stramonium): مریض مسلسل اعضاء تناسل پر ہاتھ رکھتا ہے۔

بوفو (Bufo): آلات تناسل پر مسلسل ہاتھ رہنے کا رجحان۔



### درد (عضو تناسل کا) — (Pain)

اگنیشیا (Ignatia): کھانسنے پر (آلہ تناسل میں درد ہوتا ہے۔)  
ڈیجیٹل (Digitalis): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد۔  
پٹروسلینم (Petroselinum): پیشاب کی نالی کے امراض میں آلہ تناسل کی جڑ میں درد ہوتا ہے۔ خصوصاً سوزاک میں۔  
کپسکیم (Capsicum): دوران شب پر درد ایسا دگیاں ہوتی ہیں۔  
نکس وامیکا (Nux Vom): صبح کے وقت پر درد ایسا دگیاں ہوتی ہیں۔  
کالی کارب (Kali Carb): باافراط پر درد احکام ہونے کے بعد درد ہوتا ہے۔  
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): رات کے وقت تشنجی دوروں کے ساتھ آلہ تناسل میں درد ہوتا ہے۔

### کھینچنا (عضو تناسل کا) — (Pulling)

مرک سول، کینتھرس (Merc Sol, Cantharis): بچہ اپنے آلہ تناسل کو مسلسل کھینچتا رہتا ہے۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات آزمائی جائیں۔

### سکڑاؤ (عضو تناسل کا) — (Retracted)

اگنیشیا (Ignatia): آلہ تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔  
نوفر (Nuphur): آلہ تناسل کی سکڑن۔

### چھوٹا (عضو تناسل) — (Small)

لائکوپوڈیم (Lycoodium): جلق کے بعد آلہ تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔  
اگنس کاسٹس (Agnus Castus): آلہ تناسل چھوٹا اور سرد ہو جاتا ہے۔  
اگنیشیا (Ignatia): آلہ تناسل چھوٹا اور سکڑا ہوا ہوتا ہے۔

### ناسور (عضو تناسل کے) — Ulcers

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): عضو تناسل کی ساری جلد کینچلی کی طرح اتر جاتی ہے۔ جس سے عضو تناسل نکا ہو جاتا ہے۔  
لیکسیس (Lachesis): پارے والے آتشی ناسور ہوتے ہیں۔

## احتلام — Pollutions

(دیجئے ”مادہ منویہ کا اخراج“)

### گھونگھٹ (عضو تناسل کا)

Prepuce (Foreskin of the Penis)

### سرخ باد (گھونگھٹ کا) — Erysipelas

ایپس ایم (Apis M): نقتہ کے بعد سرخ باد لاحق ہو جائے۔

### سوزش (گھونگھٹ کی) — Inflammation

مرکوریس (Mercurius): چوٹی کی دوا ہے۔ آله تناسل کا گھونگھٹ سوجا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حشفہ کے ساتھ ساتھ اس میں بھی پانی بھرا ہو۔ باریک سرخ رنگ کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔ شکاف ہوتے ہیں اور جلن، کنکن، خارش اور درد کے ساتھ جلد پھٹ جاتی ہے۔  
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پبلی پیپ کے ساتھ سوزش ہوتی ہے۔ اعضاء سفید ہوتے ہیں نہ کہ سرخ۔ حشفہ میں کنکن اور جلن ہوتی ہے۔ آله تناسل کا گھونگھٹ سرخ اور سوزشی ہوتا ہے۔

کورایم (Corallium): دکھن ہوتی ہے جیسا کہ سونیاں چھوٹی جاری ہوں۔  
ہیپرسلف (Hepar Sul): پیپ کو روکنے یا باری کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔  
نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): اندرونی سطح کی سوزش اور اس کے کناروں کی سوزش جس کے ساتھ پیپ والے ناسور ہوتے ہیں جو کہ چھنے ہوتے ہیں۔ ڈنگ لگنے جیسے اور پھاڑنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے اجڑی ہو جاتی ہے اور تمام رات جاری رہتی ہے جس سے نیند میں خلل ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): حشفہ اور گھونگھٹ میں ریگنے جیسے اور ڈنگ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ گھونگھٹ سوجا ہوا اور سوزشی ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے حشفہ میں چکلی بھرنے جیسا درد ہوتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): تیز ڈنگ لگنے جیسے اور جلن دار دردوں کے ساتھ آله تناسل کی سوزش اور بہت زیادہ سوجن۔

آرنیکا ایم (Arnica M): میکانگی زخم کے باعث سوزشی حالت، چمک قدی کے بعد ایسا دگیماں ہوتی ہیں۔

کروٹن ٹنگ (Croton Tig): آگہ ناسل کے گھونگھٹ کی اندرونی سطح کی سوزش جس کے ساتھ پیشاب کرتے وقت حشفہ میں جلن ہوتی ہے۔ خصبوں اور حشفہ پر کھا جانے والی خارش ہوتی ہے۔

کونیم (Conium): آگہ ناسل کے گھونگھٹ کی سوزش، جس کے ساتھ ڈنگ لگنے جیسے اور کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ پیشاب کرتے ہوئے آگہ ناسل میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): عضو ناسل کے حشفہ اور گھونگھٹ کی سرخی اور سوجن، جس کے ساتھ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی ٹالی میں جلن اور کنن ہوتی ہے۔

سنایرس (Cinnabaris): گھونگھٹ کی سوجن بہت زیادہ خارش کے ساتھ۔ گھونگھٹ پر سے ہوتے ہیں۔ جن کو چھونے سے خون بہتا ہے۔

### خارش (گھونگھٹ کی) — Itching

سنایرس (Cinnabaris): یہ خارش کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): اندرونی سطح پر خارش ہو۔

کونیم (Conium): ہر جذبے پر پروٹھیٹ والا اخراج ہونے کے ساتھ گھونگھٹ کی خارش۔

رشاکس، یوفوریم (Euphorblum Rhus Tox): شہوانی خارش، رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

وائیولائی آر (Viola Tr): سوجن کے ساتھ خارش ہوتی ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): گھونگھٹ پر داہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ناقابل برداشت خارش اور اخراج ہوتا ہے۔ حشفہ سرخ اور سوزشی ہوتا ہے۔

### گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی

(Phimosis)

مرکیوریس آئیوڈ (Mercurius Iod): یہ گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

سلفر (Sulphur): متعفن پیپ خارج ہونے کے ساتھ بچوں میں گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی لاحق ہو۔

**ہیپیر سلف** (Hepar Sulphr): پیپ خارج ہوتی ہے نیز چکن والا درد ہوتا ہے۔  
**سلیبرس** (Cinnabaris): پیپ کی طرح کا اخراج ہوتا ہے۔ پیپ متعفن ہوتی ہے۔ (آتھک کا درد سرا مرحلہ) آتھک تامل کا گھونگھٹ سو جاتا ہے۔  
**نائٹریک ایسڈ** (Nitric Acid): گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی جس کے ساتھ سوجن ہوتی ہے اور آتھکی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔  
**ایسٹک ایسڈ** (Acetic Acid): گھونگھٹ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس میں چیرے ہوتے ہیں وہ سوز نہیں سکتا اور خوف زدہ کر دینے والی خارش ہوتی ہے۔  
**مرکوریس** (Mercurius): آتھک کے باعث۔  
**جاکارانڈا** (Jacaranda): گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی جس کے ساتھ گھونگھٹ پُر درد اور سو جاتا ہے۔  
**اکونائٹ این**، **ایپیس ایم**، **بیلادونا** (Belladonna, Apis M, Aconite N): گھونگھٹ کے پردہ کی حاد سوزش دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات استعمال کیجئے۔

### سوجن (گھونگھٹ کی)

(Swelling)

**گرافائٹس** (Graphites): بڑا سا پانی والا پھیلا ہوتا ہے جس کی سوجن ہوتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔  
**رشاکس** (Rhus Tox): کمرے سرخ رنگ کی سوجن ہوتی ہے جس کے ساتھ درد اور جلن ہوتی ہے۔  
**کیلڈیم** (Caladium): کناروں کے ساتھ ساتھ سوجن ہوتی ہے۔  
**مرک سول** (Merc Sol): جلد حشفہ کے اوپر کھینچی نہیں جاسکتی یعنی کھینچ نہیں سکتی۔  
**بیلاہٹ مائل** سبز پیپ با افراط بہتی ہے۔ جب ایسا کرنے کی کوشش کی جائے۔

خیزش — (Priapism)

(دیکھئے ”ایستادگیاں“)

پروٹیٹ — (Prostate)

سرطان (پروٹیٹ کا) — (Cancer)

کروٹلیس ایچ (Crotalus H): سیلان خون کے ساتھ سرطان لاحق ہو۔

اخراج — (Discharge)

کونیئم (Conium): گھونگھٹ کی خارش کے ساتھ ہرچڑبے پر اخراج ہوتا ہے۔

گلس وامیکا، سپیا، سلینیم (Selenium, Sepia, Nux Vomica): پاخانے کے دوران اخراج ہو جاتا ہے۔

کالی بانیکرام (Kali Bich): پروٹیٹ کی مزمن سوزش میں پاخانے کے دوران اخراج ہو۔

سلیشا (Silicea): جب پاخانے پر زور لگایا جا رہا ہو۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): پاخانہ کے بعد اخراج ہوتا ہے۔

تھوچا (Thuja): جب اخراج سبزی مائل اور گاڑھا ہوتا ہے۔

سٹیفی سگریا (Staphisagria): پروٹیٹ والا اخراج جنسی بے اعتدالیوں کے بعد لاحق ہوتا ہے۔

بڑھ جانا (پروٹیٹ غدود کا)

Enlargement

اکونائٹ، بیلادونا (Aconite, Belladonna): سوزش کے ابتدائی مرحلہ کے لئے یہ موزوں ادویات ہیں۔

سپونگیا (Spongia): جب پیشاب کی دھار پھوٹی ہوتی ہے۔ جو کہ جھاگ دار ہوتی ہے اور خبیثوں کی سوجن اور مادہ منویہ والی نالی میں سوجن ہوتی ہے۔ اس وقت یہ دوا موزوں ہوتی ہے۔

بیرشا کارب (Baryta Carb): ضعیف لوگوں میں پروٹیٹ غدود کا بڑھ جانا۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): جب زخموں کے باعث پروٹھیٹ غدود بڑھ جائے۔ زخموں والے کیسوں میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے خراشیں ڈالی گئی ہوں 'پینا گیا ہو۔ سن ہو جانے کے ساتھ جھنجھٹا ہوتی ہے۔

تھوچا (Thuja): سوزاک کے باعث 'حاد سوزش لاحق ہوتی ہے۔

اوسی میم کین (Ocimum Can): پیشاب میں خون آتا ہے۔ پروٹھیٹ غدود کی تکالیف کے ساتھ یا پروٹھیٹ والی بو اسیر کے ساتھ۔

کونیم (Conium): پروٹھیٹ غدود بڑھ جاتا ہے۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔

سبل سیر (Sabal Ser): مزمن یا حاد طور پر پروٹھیٹ غدود کا بڑھ جانا جس کے ساتھ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے یا پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): مقعد کے علاقہ میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے مریض ایک گیند پر بیٹھا ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): مزمن ہائپر ٹرائی جس کے ساتھ پراسٹیٹ والا اخراج ہوتا ہے۔

سولی ڈیکو (Solidago): مزمن طور پر پروٹھیٹ غدود کے بڑھ جانے میں 2x ڈالی لیوٹن دیتے ہیں۔

سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ

کم مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔ جو کہ پتلی دھار کی صورت میں ہوتا ہے یا قطروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے اور پیشاب کی حاجت رہتی ہے جیسا کہ مثلاً ابھی خالی نہ ہوا ہو۔

پیریرا (Pereira): پروٹھیٹ کا بڑھ جانا پیشاب کی بندش کے ساتھ لاحق ہو۔

آئیوڈیم (Iodium): خنازیری اور تپ دق والے اشخاص میں پروٹھیٹ کی سوزش۔

مرک آئیوڈ (Merc Iod): جب پروٹھیٹ میں پیپ پڑ گئی ہو تو ایسے کیسوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

ڈیجی ٹالس (Digitalis): پروٹھیٹ غدود کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ دل کی تکلیف کے ساتھ

پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے یا پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ جس کے ساتھ پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے۔ پیشاب کے دب جانے کے ساتھ استقاء لاحق ہو۔ جریان 'رات کا احتلام۔

ورم خصیہ — Sarcocoele

(دیکھئے ”ضمیموں کی سوزش“)

بڑھی ہوئی خواہش جماع Satyriasis

(دیکھئے ”خواہش‘ بڑھی ہوئی“ نیز ”جنسی جنون“)

مادہ منویہ کا اخراج

Seminal Emissions

(Spermatorrhoea and Pollution)

ایسڈ فاس (Acid Phos): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ ریزہ میں جلن کے ساتھ ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اعضاءے قائل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور خیمے پیلے ہو جاتے ہیں۔ آئر قائل میں ایٹادگی کی طاقت نہیں رہتی۔ ایٹادگیوں نامکمل ہوتی ہیں۔ مجامعت کے دوران مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جاتا ہے۔ اچانک آئر قائل کا ڈھیلا پڑ جانا اخراج کو روک دیتا ہے۔ لذت کے ساتھ یا لذت کے بغیر انزال۔

سیلینیم (Selenium): مادہ منویہ کے اخراج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ تقریباً 95 فیصد کیسوں کو درست کر دیتی ہے۔ اخراج بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سنسنی بہت دیر تک رہتی ہے۔

کالی برومیم ڈیجی ٹیلس (Digitalis, Kali Brom): دونوں دوائیں نامناسب توازن کے ساتھ مادہ منویہ کے اخراج کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ڈیجی ٹیلس مادہ منویہ کے اخراج کے ساتھ دل کی دھڑکن کی نشاندہی کرتی ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): خوفناک ایٹادگیوں اور بہت زیادہ خواہش کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے۔

سیلیشا (Silicea): پاخانہ کرتے وقت منی ضائع ہو جاتی ہے جبکہ پاخانہ بڑا ہو اور مشکل سے خارج ہو۔

کاسٹیک (Causticum): جب مادہ منویہ کا اخراج خون والا ہو۔

سلفر (Sulphur): ایٹادگی مکمل ہونے سے پہلے ہی اخراج ہو جائے۔

گرافائٹس (Graphites): مادہ منویہ کے اخراج کی غیر موجودگی۔  
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): مادہ منویہ کا اخراج ست ہوتا ہے جس کے ساتھ جلن دار اور ڈنگ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ ہر مرتبہ مجامعت کے بعد یا مادہ منویہ کے اخراج کے بعد رات کے پینے آتے ہیں جس کے بعد دماغ اور جسم کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ مادہ منویہ بہت دیر سے خارج ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): ٹکائی ایستادگیوں کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔  
کاربو ویتج (Carbo Veg): مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جاتا ہے اور پھر سر میں گر جن ہوتی ہے۔

لائسی سین (Lyssin): مادہ منویہ بہت دیر سے خارج ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔  
فارمیکا (Formica): مادہ منویہ بہت کم خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ ایستادگیاں نامکمل ہوتی ہیں۔

کونیم (Conium): معمولی سا جذبہ بھی مادہ منویہ کے اخراج کا باعث بن جاتا ہے۔ مریض عورتوں کی موجودگی میں بہت جلد پر جوش ہو جاتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے۔  
چائنا (China): مادہ منویہ کے اخراج سے کمزوری ہو جاتی ہے۔  
جیلسمیم (Gelsemium): غیر ارادی طور پر رات کے وقت بغیر کسی خواب کے مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ معمولی سے جوش کے باعث یا تھکاوٹ کے باعث مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔

سٹانم (Stann): اعتدال سے بڑھی ہوئی نقاہت کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔ جماع کی لذت بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بازو کو کھجلائے سے بھی۔  
نکس وامیکا (Nux Vomica): جماع کی لذت کے بغیر رات کے وقت غیر ارادی طور پر مادہ منویہ تواتر کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مریض کو درد سر لاحق ہو جاتا ہے۔ خصوصاً صبح ہونے کے قریب، کمر درد ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹیلس (Digitalis): مریض کو جگائے بغیر کھری نیند میں مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔  
پرسیکا (Persica): ایستادگی کے بغیر پاخانہ کرنے کے دوران منی خارج ہو جاتی ہے۔  
ایٹک ایسڈ (Acetic Acid): کمزور کر دینے والا مادہ منویہ کا اخراج 'پاخانہ کرتے وقت منی خارج ہو جاتی ہے۔

اکونائٹ کیم (Aconite Cam): شہوانی خوابوں کے بغیر اختلام ہو جائے۔  
کالی بروم (Kali Brom): مادہ منویہ کا متواتر اخراج، طبیعت دلی دلی ہوتی ہے۔ سوچ مدہم



ہوتی ہے۔ کمر میں درد ہوتا ہے۔ چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ جماع کی لذت کے ساتھ یا جماع کی لذت کے بغیر بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔

زنگم میٹ (Zincum Met): افسردگی اور ناامیدی کے ساتھ عضو تناسل کا بہت زیادہ غلط استعمال، پیلاہٹا ہوا چہرہ، جس کے ساتھ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔

کینتھارین (Cantharis): شدید قسم کی ایتھادگی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

کیلڈیم (Caladium): جنسی بے اعتدالیوں کے بد اثرات کے باعث مادہ منویہ کا اخراج جبکہ شہوت یا کسی جنسی جوش وغیرہ کے بغیر خوابوں میں انزال ہو جائے۔ بغیر خوابوں کے یا بغیر جنسی خوابوں کے ساتھ رات کے وقت اخراج ہو جاتا ہے۔ یہ دوا جلق اور اس کے اثرات کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ عضو تناسل کا حشفہ پلپلا ہو جاتا ہے۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): پرانے گناہ گاروں میں مادہ منویہ کا اخراج۔ اعضاء ٹھنڈے اور ڈھیلے ہوتے ہیں۔ جنسی بھوک نہیں ہوتی اور مریض مالٹھولیا کا شکار ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مکمل نامردی میں مادہ منویہ کا اخراج۔ جب کہ ایتھادگیاں یا تو موجود نہیں ہوتیں یا نامکمل ہوتی ہیں۔ اعضاء تناسل ٹھنڈے اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔

ٹائیٹینیم (Titanium): جماع میں بہت جلد انزال ہو جاتا ہے۔ جنسی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جلق کی وجہ سے بہت زیادہ نفاہت کے باعث مادہ منویہ کا اخراج۔ آنکھوں کے گرد گہرے نیلے حلقے ہوتے ہیں۔ چہرہ زرد ہوتا ہے۔ چڑچڑاہٹ اور شرمیلا پن بہت نمایاں ہوتا ہے۔

ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): طاقتی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج، عضو تناسل اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں خوابوں کے ساتھ دو یا تین مرتبہ مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ٹھنڈوں میں۔

اوسمیم (Osmium): مادہ منویہ کا بہت زیادہ اور مسلسل طویل تر اخراج۔

اسٹیلگو (Ustilago): شہوانی تصورات اور پرشہوت خوابوں کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): خون آنکھوں میں جلن اور حرارت کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔

ارین جیم اے کیو (Eryngium Aq): منی کے اخراج کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے۔

اخراج ایتھادگیوں کے ساتھ یا ایتھادگیوں کے بغیر ہوتا ہے۔ 2x طاقت کی دوا دیتے ہیں۔

فیرم بروم (Ferrum Brom): خون کی کمی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

## جنسی — Sexual

(دیکھئے "مجامعت")

## خضیے — Testicles

### لاغری (خضیوں کی) — Atrophy

اورم میٹ (Aurum Met): لاغری لڑکوں میں کم حوصلگی اور سن ہو جانے کی کیفیت کے ساتھ۔

کیپسکیم (Capsicum): نامردی میں لاغری لاحق ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خضیوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور خضیوں کی لاغری کا رجحان ہوتا ہے۔

آئیوڈیم (Iodum): خضیوں کا سٹائو، خوابوں کے ساتھ منی کا برہنہ، نامردی۔  
کاربو انیملس (Carbo Animalis): جلن دار بھالے لگنے جیسے اور کانٹے جیسے دردوں کے ساتھ غدہ سخت ہو جاتا اور بچہ درد ہوتا ہے۔

کونیم (Conium): جلن دار اور کانٹے والے دردوں کے ساتھ خضیے پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں۔

ایپس ایم (Apis M): دیگر اعضاء میں استقامت کے ساتھ ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ خارش اور سرخی کے ساتھ خضیوں کا استقامت۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): خضیوں کی عمومی کمزوری، دایاں خضیہ غائب ہو جاتا ہے۔  
ایوینا سیٹوا (Avena Sat): بہت زیادہ جنسی مشغولی کے بعد نامردی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): گھونسا لگنے یا کوئی دوسرا زخم یا پوٹ لگنے کے باعث خارش دار درد کے ساتھ لاغری ہوتی ہے۔ جامنی سرخ سوجن ہوتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں ابھرتی ہوتی ہے اور حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔

کلکیر یا کارب، سلیشیا، سلفر (Sulphur, Silicea, Calcarea Carb): جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو وی کئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں آزمائی جاسکتی ہیں۔

## سرطان (خصیوں کا) — Cancer

آرسینک البم (Arsenic Alb): جب مریض درو یا کسی اور وجہ سے بے چین ہو جائے۔ چھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ IM ذاتی یوشن دن میں تین مرتبہ دیجئے۔ یہاں تک کہ افادہ شروع ہو جائے پھر اس دوا کو لمبے وقفوں کے ساتھ دینا چاہئے۔

کونیم (Conium): یہ کینسر کے لئے ایک عمدہ دوا ہے اسے بھی آرسینک البم ہی کے طرز پر دینا چاہئے۔

سکرینم (Scirrhinum): یہ ایک نوسوڈ ہے۔ جسے عمل انگیز دوا کے طور پر دیا جائے۔ خوراک 200 طاقت کی یا IM طاقت کی دی جائے۔ جس دن یہ دوا استعمال کی جائے۔ اس دن کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔

## اعصابی درد (خصیوں کا) — Neuralgia

اگنیشیا (Ignatea): جب جنسی غلط کاریوں کے باعث اعصابی درد لاحق ہو۔ ہیمامیلکس (Hamamelis): اعضاء کی غیر معمولی حساسیت اور حرارت کے ساتھ اعصابی درد لاحق ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): سخت قسم کے اگاؤ کے ساتھ اعصابی درد ہوتا ہے۔ مگنیشیا فاس، کولوستھ (Colocynth, Magnesia Phos): جب اعصابی درد کی وجہ معلوم نہ ہو۔

## خصیوں کی سوزش — Orchitis

(Inflammation of Testicles & Hydrocele)

(نیز دیکھئے "خپئے" کے ذیل میں "تپ دق")

براہیونیا (Bryonia): جب پیدائشی طور پر خصیوں میں پانی بھرا ہوا ہو۔ ایبروٹانم (Abrotanum): بچوں کے خصیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جب روڈوڈنڈرن تکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔

اورم سلف (Aurum Sulph): بچوں کے خصیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ خپئے سخت ہو جاتے ہیں۔ عضو تاسل کے مشق کی سوزش، آلہ تاسل کے نامور، خپئے سو جے ہوتے ہیں۔

خصوصاً دائیں جانب والا خصیہ۔

**مرکیوریس (Mercurius):** یہ دوا سوزاک کے بدترین کیسوں میں دینی چاہئے جبکہ سوزاک دبا ہوا ہو لیکن سوزاک کے دب جانے سے پہلے پیپ والا سبز رنگ کا مادہ خارج ہوتا ہو۔ دائیں جانب کے خصیوں کی سوزش جس کے ساتھ شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر پیرت اور ناگوں تک چلا جاتا ہے۔ خصیے سرخ اور چمکیلے ہوتے ہیں۔

**پلساٹیل (Pulsatilla):** اگر مرکیوریس ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ خصیوں کی سوجن کے ساتھ یا سوجن کے بغیر جلن اور دکھن ہوتی ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں ٹھنچاؤ ہوتا ہے اور گہرے رنگ کے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ آنکھوں کی سوزش کا رتھان ہوتا ہے۔ ٹھنچا لاجن ہوتا ہے جس کے ساتھ درد ایک حصے سے دوسرے میں تیزی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ دائیں یا بائیں خصیے میں سوجن ہوتی ہے 'جاڑا لگتا ہے۔ بھوک اور پیاس کھو جاتی ہے۔ اس دوا کے استعمال کے بعد پیلاہٹ مائل سبز رنگ کا مواد خارج ہوتا ہے۔ خصیوں میں پانی بھر جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

**اورم میٹ (Aurum Met):** خصیوں کی پر گوشت سوجن 'خصیوں کا گوشت بھرا پھوڑا جو کہ مزمن قسم کا ہوتا ہے۔

**آئیوڈیم (Iodidum):** خصیے سخت اور سوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعضائے ناسل کا بدبودار پسینہ۔

**گرافائٹس (Graphites):** خصیوں کی استسقامی سوجن۔

**اپیس مل (Apis Mel):** خصیوں کی اور پراسٹیٹ کی پر درد سوجن۔

**تھو جا (Thuja):** سوزاک کے باعث نیز انجیر جیسے مسوں اور گومڑوں کے باعث خصیوں کی سوزش کے عود کر آنے والے ملے۔

**کلیٹس (Clematis):** خصیوں کی سوزش کے لئے یہ دوسری دوا ہے جبکہ سوزش سوزاک کے دب جانے کے باعث لاجن ہو۔ پلساٹیل کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے آزمایا جائے۔ ان دونوں ادویات میں گرم چیزیں لگانے سے درد میں اتھری ہوتی ہے۔

**آرنیکا مونٹ (Arnica Mont):** جب خصیوں کی سوزش چوت لگنے کے باعث ہو اور اس کے ساتھ دکھن بھی ہو۔

**کونیم (Conium):** خصیے بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ خصوصاً چوٹوں کے لگنے کے نتیجے میں۔

**روڈوڈنڈرون (Rhododendron):** اس احساس کے ساتھ خصیوں کی سوزش لاجن ہوتی ہے

کہ جیسے خضیوں کو کھل دیا گیا ہو۔ کھینچنے والا درد خضیوں میں ہوتا ہے جو پھیل کر رانوں اور پیٹ تک چلا جاتا ہے۔ خصوصاً دائیں جانب، پھونے سے حساسیت ہوتی ہے۔ دکھن ہوتی ہے۔ پانی بھرا ہوتا ہے۔ مرطوب موسم میں اتھری ہوتی ہے اور حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔

سپونجیا (Spongia): خضیوں کی سوزش جو کہ سوزاک کے دب جانے کے باعث لاحق ہو بتدریج سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اولیم انیل (Oleum Animale): خضیوں کا اعصابی درد نیز مادہ منویہ کی نالی کا اعصابی درد لاحق ہوتا ہے۔

آگزالیک ایسڈ (Oxalic Acid): منی کی نالی کا اعصابی درد۔

### خضیوں کا چڑھ جانا — (Undescended)

اورم میور نیٹرونیم (Aurum Mur Natronatum): خضیے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں جب لڑکے لڑکیوں جیسا رویہ ظاہر کریں۔ ظاہری حالت اور جسمانی ہیئت لڑکیوں جیسی ہو۔ اورسٹ سوڈی کلورائیڈ کا 1x محلول کشید کئے ہوئے پانی میں ملا کر ایک قطرے کی ایک خوراک دیجئے۔ دوا صبح، شام روزانہ 2 مرتبہ دی جائے۔ اس دوا کا ہومیوپیتھک نام اورم میور نیٹرونیم ہے یہ پہلی طاقت میں دی جاسکتی ہے۔

### تپ دق (خضیوں کا) — Tuberculosis

سپونجیا (Spongia): حاد، مزمن یا تپ دق والی خضیوں کی سوزش۔ خضیے ہموار سوجے ہوئے اور سوزشی ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ احتقاق والا، دکھن والا اور تپکن والا درد ہوتا ہے۔ منی کی نالی میں اوپر کی جانب گولی سی لگتی ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): خضیوں کی سوزش مزمن یا تپ دق والی ہوتی ہے۔ اعصابی درد ہوتا ہے۔ شدید درد کے ساتھ خضیے سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ خصوصاً رات کے وقت، خضیے لاغرئی کے نقطہ پر ہوتے ہیں۔ خضیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ کم حوصلگی ہوتی ہے۔ مردگی ہوتی ہے۔ یادداشت کھو جاتی ہے۔ نالی میں اعصابی درد ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): کپٹے والے، دبائے والے اور خراش دار درد، خنازیری مریضوں کے خضیوں میں ہوتے ہیں۔

مرک بن آیوڈ (Merc Bin Iod): آتشکی خضیوں کی سوزش، منی کی نالی کی حساسیت کے ساتھ۔

**سلیشیا (Silicea):** خضیوں کا فیل پاؤں والا درد، خضیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ خضیئے دکھتے ہیں اور تڑھتے ہیں۔ خضیوں میں رنگین والا درد ہوتا ہے۔ خضیوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور ہرنیا ہو جاتا ہے۔

**سلفر (Sulphur):** خضیئے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور نیچے کو لٹک جاتے ہیں۔ خضیوں میں تری ہوتی ہے۔ دباؤ اور کھنچاؤ منی کی ٹالی میں ہوتا ہے۔

## خضیوں کی رگوں کا پھول جانا

(Varicocele)

**ہیپامیلین (Hamamelis):** خضیوں کی رگوں کے پھول جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خضیئے منی کی ٹالی میں کھینچنے والے درد کے ساتھ سوج جاتے ہیں۔ اعضاء بہت زیادہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان پر بھینہ آتا ہے۔ جھپٹنے والا درد خضیوں سے پیٹ تک جاتا ہے۔

**لیکسیس (Lachesis):** جب وریدوں کا رنگ نیلا پڑ جائے اور اس کے ساتھ ذہنی دباؤ یا افسردگی بھی ہو۔

**پلساٹیل (Pulsatilla):** وریدیں نیلی ہو جاتی ہیں۔ جس کے ساتھ منی والی ٹالی میں کھینچنے والا درد ہوتا ہے۔ جو کہ سوجتی ہوئی اور پردرد ہوتی ہے۔

**امونیا میور (Ammonia Mur):** منی والی دائیں ٹالی میں ٹانگے لگنے اور کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ اس میں کئی علامات کھانسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔

**آرنیکا مونٹ (Arnica Mont):** منی والی ٹالی درد کے ساتھ سوجتی ہوتی ہے۔ پیٹ میں ٹانگے سے لگتے ہیں۔ زخموں والی تکلیف۔

**بیلادونا (Belladonna):** پھاڑنے والا درد اوپر کی جانب سفر کرتا ہے۔ شام کے وقت یا بستر میں اتری ہوتی ہے۔

**چائنا آف (China off):** مادہ منویہ کی ٹالی اور خضیوں میں پردرد سوجن ہوتی ہے۔ بائیں خضیئے میں نیز بائیں جانب کے گھونگھٹ میں بھی پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ تکلیف آسانی سے ہو جاتی ہے۔ درد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

**کلیمٹس (Clematis):** مادہ منویہ کی دائیں ٹالی حساس ہوتی ہے۔ خضیئے اوپر کو کھینچ جاتے ہیں۔ خضیوں میں درد ہوتا ہے۔ مادہ منویہ والی ٹالی میں کھینچن ہوتی ہے۔

**کالی کارب (Kali Carb):** خضیوں میں اور مادہ منویہ والی ٹالی میں سوجن ہوتی ہے۔ خضیوں میں خراش ہوتی ہے۔ خضیئے اور آلہ تھامل بائیں جانب کھینچتے ہیں۔ کانٹے والے درد اس دوا کی

بنیادی علامت ہیں۔

**سٹیفی سیگریا (Staphisagria):** منی والی نالی میں گولی لگنے جیسے اور کھینچنے والے درد ہوتے ہیں۔ غصے، غم، اداسی، افسردگی، پریشانی اور جذبات کے مجروح ہو جانے کے باعث تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث، جلق کے باعث، جنسی بے اعتدالیوں کے باعث، متاثرہ حصوں کو پھونکے کے باعث، تمباکو کے باعث، پارے کے غلط استعمال کے باعث۔

**سلفر (Sulphur):** خضیوں اور مادہ منویہ والی نالی میں دباؤ اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ خضیے ڈھیلے ہو کر نیچے کو لٹک جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ دکھن ہوتی ہے اور خضیوں والی تھیلی نرم آلود ہوتی ہے۔

حصہ سوم — زنانہ

سرطان — Cancer

(دیکھئے ”رسولی“)

موقونی حیض — Climacteric

(Change of Life or Menopause)

**سلفر (Sulphur):** تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وزن کم ہو جاتا ہے۔ جلد کھردری ہوتی ہے اور گندی نظر آنے کی طرف راغب ہوتی ہے۔ ارد گرد کی ہر چیز گندی ہوتی ہے اور ناقابل وضاحت حد تک بے ترتیب۔ جب دیگر تمام اچھی منتخب شدہ ادویات مکمل شفا دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔

**کیمفر (Camphor):** گرم کمرے میں گرمی اور پسینے کا زور ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں اور پیٹ بہت سرد ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ پسینہ آیا ہو تو کپڑے اتارنے سے مریضہ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔

**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** مزاج چڑچڑا ہوتا ہے جو کہ بدلتا رہتا ہے۔ بند اور گرم کمرے میں گرم پسینے آتے ہیں۔ مریضہ روئے بغیر اپنی علامات نہیں بتا سکتی۔

**اکٹیارلیس موسا (Actea Racemosa):** سر میں شدید درد ہوتا ہے جیسا کہ چوٹی سے سر کٹا ہوا ہو۔ کمر اور گردن کے عضلات میں دکھن ہوتی ہے۔ گھٹیا لائق ہو یا گھٹیا کارہنجان ہو۔

**لیکسیس (Lachesis):** موقونی حیض کے زمانہ کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ سر کے پچھلے حصہ

میں شدید درد ہوتا ہے اور سر کے اگلے حصے تک آتا ہے۔ چھوٹے سے بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن پریشان کن ہوتی ہے اور بدن میں ٹپکن ہوتی ہے۔ گہرے رنگ کا سیلان خون ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مریض حیران کن حد تک باتونی ہوتی ہے۔ جلن کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ جسم پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا ہو۔ ختمناہٹ ہوتی ہے۔ مریض بالخصوص لیبائی اور چڑچڑی ہوتی ہے۔ بے ہوشی کے دورے ہوتے ہیں۔ جریان خون ہوتا ہے۔

گلوٹائسن (Glonoin): دھڑکن حلاطم ہوتی ہے۔ سر میں ہتھوڑے لگتے ہیں۔ گرم کمرے میں اور سورج کی حرارت میں اتھری ہوتی ہے۔ مریض بستر میں نہیں لیٹ سکتی۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): چلی، چلی، ست اور ٹھنڈی مریضوں کے لئے جو اعتدال سے زیادہ کام کرنے کے باعث تھک چکی ہوں۔ سلفر کی طرح یہ دوا بھی عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہونی چاہئے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): حساس مستورات میں افراط کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے۔ جو کہ چڑچڑی اور جھگڑاو ہوتی ہیں۔ وہ بہت جلد ناراض ہو جاتی ہیں۔ اس دوا کو صرف اسی صورت میں استعمال کرنا چاہئے۔ جب یہ تمام علامات نظام ہضم کی تکلیف کے ساتھ لاحق ہوں۔ سپیا (Sepia): رحم کے خروج کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے۔ نیچے کو دبانے والے درد ہوتے ہیں۔ مریض جسمانی طور پر لمبی اور دلی ہوتی ہے اور جلدی سے افسردہ ہو جاتی ہے۔ مریض ٹھنڈی، چلی اور کینہ پرور ہوتی ہے۔ تکلیفات سے تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمدردی کو ناپسند کرتی ہے۔ بد ہضمی یا قبض کے ساتھ لیکوریا ہوتا ہے۔ اچانک حدت والی ختمناہٹ ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پینہ آتا ہے اور کمزوری ہوتی ہے اور بے ہوشی کا رجحان ہوتا ہے۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria): لیکوریا خراش دار متعفن ہوتا ہے۔ حیض کے ختم ہو جانے کے بعد مسلسل جاری رہتا ہے۔

پلائینا (Piatina): بیض دان میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اعتدال سے زیادہ خون جاری ہوتا ہے۔

سبنا (Sabina): چمک دار سرخ رنگ کا خون جاری ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شدید قسم کے درد پیڑ سے ٹاف کے اگلے سرے تک مار کرتے ہیں۔

کروکس (Crocus): گہرے رنگ کے لوتھڑوں کے ساتھ ہسٹریائی مستورات میں سیلان خون، پیٹ کے نچلے حصہ میں وزن کے احساس کے ساتھ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مریض کو بچہ پیدا کرنا ہو۔



میس لینم (Bacillinum): چہرے کا بائیں جانب کا اعصابی درد، بستر میں جانے کے وقت ابھری ہوتی ہے۔

میڈورنیم (Medorrhinum): نیچے گلوٹانے کے باعث لیکوریا کے دب جانے کے بعد چہرے کا اعصابی درد، تیزابیت، زبان کے طبع، گندے ذائقے اور گندے شخص کے ساتھ صبح کے وقت پھوٹی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ زبان اتنی گندی ہوتی ہے کہ صاف ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ پیٹا ہٹ ہوتی ہے۔ جاڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے مرطوب موسم سے ابھری ہوتی ہے۔

بیلس پیر (Bellis Per): موقوفی حیض کے دوران دریدیں پھول جاتی ہیں۔  
فریکسی ٹرس ایم (Fraxinus Am): رحم کی کمزوری کی حالت کے ساتھ زندگی میں تبدیلی آنے کے وقت (یعنی موقوفی حیض کے وقت) دماغی امراض میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔  
ٹریلیئم (Trillium): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی کمزوری کے باعث سیلان خون لاحق ہوتا ہے۔  
کیمفر (Camphor): گرم کمرے میں گرمی اور پسینے کا زور ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں اور پیٹ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بافراط پینہ آنے پر جب کہ جسم کپڑوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اگر جسم نکال کر دیا جائے تو مریض کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔  
اوفرینم (Oophorinum): ماسوں اور دیگر موقوفی حیض کی جلدی خرابیوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

### مجامعت — Coition

### مجامعت کے دوران و بعد کے امراض

(Ailments During and After)

سپیا (Sepia): مجامعت سے نفرت اور اندام نہانی کی خشکی کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے اور اسے سب سے پہلے آزمانا چاہئے۔ قبض کے ساتھ لیکوریا ہوتا ہے۔  
نیٹرم میور (Natrur): بے زاری کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا کئی خون دانی مستورات کی نشاندہی کرتی ہے۔ جن کی جلد خشک اور منہ خشک ہوتا ہے۔ پرورد جملع کے ساتھ اندام نہانی کی خشکی۔  
ہائیڈراستس (Hydrastis): مجامعت کے خیال کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ لیکوریا کے دوران مریض ابھرتی ہوتی ہے۔ لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوتا ہے۔

امبر اگریشیا (Ambra Gr): جماعت کے دوران دمہ لاحق ہوتا ہے۔  
 کریوزوٹ (Kreosote): جماعت کے دوران اور جماعت کے بعد اندام نسائی میں جلن،  
 شدید سختی اور خراش ہوتی ہے۔ جماعت کے بعد خون جاری ہو جاتا ہے۔  
 سٹیپی سیکریا (Stapiaria): جماع کے آخر تک پچھتے پچھتے نفسی لاحق ہو جاتی ہے۔ رتم  
 کا سرطان ہوتا ہے۔ شادی شدہ زندگی کے ابتدائی ایام میں مستورات میں پردرد جماعت۔  
 گریفائیٹس (Graphites): جماعت سے نفرت ہوتی ہے۔ بیض دان بڑے اور سخت ہو  
 جاتے ہیں۔ رتم اور بیض دان کی نرمی۔  
 کیگٹس (Cactus): جماعت کے دوران اندام نسائی کی سکڑن۔  
 برومیم (Bromium): جماعت کے دوران جذباتی لہر (یعنی لذت) کی غیر موجودگی۔  
 پلساٹیل (Pulsatilla): جماعت کے دوران رحم کو چھونے سے حساسیت ہوتی ہے۔  
 فیرم میٹ (Ferrum Met): جماعت کے دوران اندام نسائی میں دکھن اور کھن ہوتی ہے۔  
 پلائینا (Platina): جماعت کے دوران فرج میں درد کے ساتھ حساسیت ہوتی ہے۔  
 فاسفورس (Phos): جماعت کے دوران اندام نسائی میں حساسیت نہیں ہوتی۔  
 لائیکوپوڈیم (Lycopodium): جماعت کے دوران اور جماعت کے بعد اندام نسائی میں  
 شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔ اندام نسائی کی خمدی قسم کی خشکی۔ جاگھ میں نیچے کی جانب دباؤ  
 ہوتا ہے جیسے کہ حیض شروع ہو جائیں گے۔  
 سیڈرون (Cedron): جماعت کے بعد مستورات میں ہکلاہٹ۔  
 امبر اگریشیا (Ambra Grisea): جماعت کی کوشش کرنے پر دمہ لاحق ہو جائے۔

### لطف۔ غیر موجود (Enjoyment- Absent)

بربرس فول (Berberis Vul): جماعت کے دوران لطف کا احساس نہیں ہوتا۔ اعضاء میں  
 ٹانگے سے لگتے ہیں۔  
 کاسٹیکم (Causticum): جنسی خواہش بہت زیادہ کمزور ہونے کے ساتھ لطف کا نہ ہونا۔  
 سپیا (Sepia): جماعت سے بیزاری کے ساتھ مسرت کی غیر موجودگی۔

### لذت جماع (اعضائے تناسل میں مسرت کا احساس)

#### Orgasm

سٹانم (Stannum): لذت جماع آسانی سے پیدا ہو جائے۔ بازوؤں کو کھلانے سے اعضاء

تاسل میں ناقابل برداشت خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔  
 بربرس فول (Berberis Vul): مؤخر شدہ خوشی کے احساس میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ خوشی  
 کے احساس کی غیر موجودگی میں بھی یہ دوا دی جاتی ہے۔  
 برومیم (Bromium): خوشی کے احساس کا فقدان۔  
 اوسمیم (Osmium): انزال کے دوران، معمول والی سنسنی نہیں ہوتی۔

### پُر درد — Painful

فیرم میٹ (Ferrum Met): مجامعت پر درد ہوتی ہے۔ جس کے بعد خون جاری ہو جاتا  
 ہے۔ اندام نہانی میں دکھن اور کاٹنے والا درد ہوتا ہے۔  
 کرلوزوٹ (Kreosote): مجامعت کے دوران اور مجامعت کے بعد درد ہوتا ہے۔  
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): مجامعت کے دوران درد ہوتا ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrur Mur): جنسی عمل کے دوران درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اندام  
 نہانی کی خشکی بھی ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندام نہانی کی دیواروں کو کسی چھتری  
 سے دبایا جا رہا ہو۔  
 لائی سین (Lyssin): مجامعت کے لئے ناپسندیدگی کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بچے کی  
 پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔  
 سپیا (Sepia): لیکوریا کے ساتھ مجامعت کے دوران خوفناک درد ہوتا ہے۔  
 ہائیڈراستس (Hydrastis): تقریباً مستقل جنسی خواہش کے ساتھ درد لاحق ہوتا ہے۔  
 خصوصاً جب مریض انڈے کی سفیدی کی طرح کا مواد خارج کرتی ہے۔  
 مرک کار (Merc. Cor): رحم کو دبانے یا چھونے سے تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔  
 بربرس ول (Berb. Vul): انزال پر درد یا بہت دیر سے ہوتا ہے۔

### وضع حمل — Delivery

وضع حمل سے پہلے، دوران اور بعد کی تکلیفات

(Ailments Before, During and After)

اکتیارلس موسا (Actea Racemosa): یہ دوا وضع حمل سے تین یا چار مہینے پہلے دی جا  
 سکتی ہے تاکہ وضع حمل محفوظ اور بغیر درد کے ساتھ یقینی بنایا جاسکے۔ یہ دوا وضع حمل کو محفوظ

اور درد کے بغیر بنانے میں مدد دے گی۔ حتیٰ کہ اگر وضع حمل سے چند دن پہلے بھی دی گئی ہو تب بھی کار آمد ہوتی ہے۔ یہ دوا زندہ بچوں کی پیدائش کو بھی یقینی بناتی ہے لیکن اس مقصد کے لئے اسے وضع حمل سے چھ سات ماہ پہلے سے روزانہ تین مرتبہ دینا چاہئے۔ یہ زچگی کے غلط قسم کے دردوں کو روکتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): زچگی کے جھوٹے دردوں سے بچنے کے لئے اور وضع حمل کو محفوظ بنانے کے لئے عین موقع پر یہ دوا دی جاسکتی ہے۔ ہر پندرہ منٹ کے بعد 1000 طاقت کی دوا دی جائے۔ جب وضع حمل متوقع ہو تو اس وقت صرف تین خوراکیں دی جائیں۔ اس کے بعد وضع حمل محفوظ ہو گا۔ خواہ وضع حمل میں حقیقتاً دوا تین دن لگ جائیں۔ یہ بچے کو صحیح حالت میں رکھتی ہے اگرچہ بچہ دانی میں اپنی حالت بدل ہی چکا ہو۔ بشرطیکہ جھلیاں پھٹنے سے پہلے دی جائے۔ نفاس کم مقدار میں ہوتا ہے۔

وسکم البم (Viscum Album): آنول کی بندش لاحق ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): گرم خون بافراط خارج ہونے کے ساتھ آنول کی بندش لاحق ہو۔

کنٹھارس (Cantharis): پردرد پیشاب ہونے کے ساتھ آنول کی بندش لاحق ہو۔

سبینا (Sabina): کمزور حالت کے باعث آنول رک جاتی ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): جب نفاس دب جائے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): نفاس خراش دار ہوتا ہے۔

ٹریلیم (Trillium): نفاس خون والا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): نفاس گرم اور کم مقدار میں خارج ہو۔

کریو زوٹ (Kreosote): نفاس خراش دار ہوتا ہے اور وقفہ دار ہوتا ہے۔

اورم میور نیٹرم (Aur Mur Nat): آتھلی ماؤں کو یہ دوا دینی چاہئے تاکہ ان کے بچے اس مرض سے محفوظ رہیں۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): وضع حمل کے بعد لاحق ہونے والے دردوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

کالوفائلیم (Caulophyllum): زچگی کے درد جھوٹے 'بے قاعدہ' تشبیہ ہوتے ہیں۔ زچگی کے شروع میں جھوٹے درد ہوتے ہیں۔ جلد لاحق ہو جانے والی زچگی کے بعد سیلان خون ہوتا ہے۔ قوت کے فقدان کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ بہت لمبی زچگی کے بعد زچگی کے بعد والے درد لاحق ہوتے ہیں۔ تشبیہ درد ہوتے ہیں جو کہ پیٹ کے زیریں حصہ میں ہوتے ہیں اور جائگہ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ دوا پلساٹیلہ والے کیسوں کی تکمیلی دوا ہے۔ جن میں بچہ نامناسب

حالت میں رحم کے اندر ہوتا ہے۔ 30 طاقت کی ایک خوراک روزانہ وضع حمل سے دو تین ہفتے پہلے سے دی جائے۔ یہ وضع حمل کو آسان بنائے گی اور زچگی کے جھوٹے دوروں کو روکے گی۔

چائنا (China): وضع حمل میں بسات کے ساتھ سیلان خون کے بعد 1000 طاقت کی ایک خوراک مریضہ کی طاقت کو بحال کر دے گی۔

سٹرامونیم (Stramonium): زچگی کے دوران ناقابل برداشت جنسی عمل کی خواہش۔  
پیتورین (Piturin): مؤخر شدہ زچگی کے لئے درودہ کے دوسرے مرحلہ میں جب کہ قرن حمل طور پر پھیلی ہوئی ہو۔

روٹا (Ruta): زچگی کے بعد اسحائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جائے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): زچگی کے دوران مریضہ اچانک اندھی ہو جاتی ہے۔ زچگی کے درد رک جاتے ہیں اور تشنجی جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ جھٹکے انگلیوں اور انگوٹھوں سے شروع ہوتے ہیں۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): زچگی کے دوران ہلکی لگ جاتی ہے جو کھانے پینے اور سونے کو روک دیتی ہے۔

پلائینا (Platina): جنسی عمل کی ناقابل برداشت خواہش، درودہ میں جھٹلا مستورات میں بہت زیادہ جنسی خواہش۔

کالی کارب (Kali Carb): خون کی ٹالیوں کی حالت کمزور ہو جانے کے باعث سیلان خون ہوتا ہے اور زچگی کے ایک ہفتہ بعد خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): زچگی کے بعد پیشاب میں بندش ہو جائے۔

واہرنم اوپ (Viburnum Op): زچگی کے جھوٹے درودوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ درد ایک عورت کی زندگی کو کئی ہفتوں تک اذیت ناک بنائے رکھتے ہیں۔ ہر درد کے بعد ایک خوراک زچگی کے بعد والے درودوں کو آرام دے گی۔

خواہش (جنسی) بڑھی ہوئی — (Increased)

(نیز دیکھئے ”جنسی جنون“)

موسکس (Moschus): بغیر کسی ظاہری وجہ کے جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

پلائینا (Platina): ناقابل برداشت جنسی عمل کی خواہش، نوجوان لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ جن کے جنسی اعضاء اور حیوانی جبلت وقت سے پہلے نشوونما پا لیتے ہیں۔ یہ حیوانی جبلت زچگی کے

دوران عورتوں میں بدترین ہوتی ہے۔  
ایسٹریا زرب (Asterias Rub): بھڑکی ہوئی جنسی طلب جو جماع کے بعد بھی تسکین نہیں پاتی۔ رحم میں پھڑکن ہوتی ہے۔ باہر کو دھکیلنے کا احساس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت شدید قسم کا جوش ہوتا ہے۔  
ہائوسکیمس (Hyoscyamus): شدید قسم کی جنسی طلب ہوتی ہے۔ مریض بے حیالی سے اپنے آپ کو تنگ کرتی ہے وہ فحش گفتگو میں ملوث ہوتی ہے۔  
کالی فاس (Kali Phos): کنواری لڑکیوں میں جنسی جوش جو وقت سے پہلے جوان ہو جاتی ہیں۔ ہر حیض کے بعد جنسی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔  
لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): بیضہ دان کی تکلیفات کے ساتھ مستورات میں نہ ختم ہونے والی جنسی خواہش ہوتی ہے۔ بھراؤ کے احساس کے ساتھ اندام نہانی میں شہوانی خارش ہوتی ہے۔ خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جنسی خواہش کو دبانے کے لئے خود کو مصروف رکھنا پڑتا ہے۔  
اوری گی نم (Origanum): یہ دوا ایسی مستورات کی نشاندہی کرتی ہے۔ جن کی اعتدال سے بڑھی ہوئی جنسی طلب انہیں جلق کی طرف لے جاتی ہے۔ ناقابل مزاحمت جنسی جذبہ اور تحریک، شدید قسم کا جنسی بیجان اور ہوش ہوتا ہے۔  
لیک ویک فلوک (Lace Vace Floo): جیسے ہی ہاتھ پستانوں کو چھوتے ہیں۔ جنسی خواہش آسانی کے ساتھ جوش پر آ جاتی ہے۔  
نیٹرم کارب (Natrum Carb): بغل گیر ہونے کے بعد یا ہم آغوش ہونے کے بعد مستورات منی کو نہیں روک سکتیں۔  
فاسفورس (Phosphorus): بیواؤں میں بڑھی ہوئی جنسی خواہش، مجبوری کے تجرد کے باعث جنسی خواہش کا بڑھ جانا (غیر شادی شدہ زندگی)  
ٹیرن ٹولا ایچ (Tarentula H): چیخنے کی خواہش کے ساتھ ہسٹیریا میں جنسی جوش، رحم میں درد ہوتا ہے۔ سکڑاؤ ہوتا ہے۔ گٹھن ہونے کے احساس کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔  
میوریکس (Murex): اعضاء کے ساتھ معمولی سا رابطہ ہونے پر شدید جنسی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔

## دبی ہوئی یا گھٹی ہوئی (جنسی خواہش)

(Suppressed Or Decreased)

کونیئم (Conium): بیضہ دان اور رحم کی ختی اور بڑھ جانا۔ پیڑ کی ختی اور سوزش کے ساتھ

رحم کا خروج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ باافراط لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جنسی خواہش کے دبائے سے لاحق ہوتا ہے۔

اونوس موڈیم ویر (Onosmodium Vir): جنسی خواہش مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ دیگر رحمی تکالیف کے ساتھ یا ان کے بغیر جیسا کہ نیچے کو دبائے والے درد، اینٹھن اور رحم کی دکھن، پستان سوجے ہوئے اور سخت محسوس ہوتے ہیں۔ CM طاقت کی دوا دیتے ہیں۔

## رحم کی یا بیضہ دان کی سوزش

Inflammation of Uterus/ Ovaries

(Metritis, Ovaritis)

نکس وامیکا (Nux Vomica): رحم کی حاد سوزش والے کیسوں میں یہ دوا موزوں ترین ہوتی ہے۔ پیری ٹونیم کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر جبکہ بخار اونچے درجے کا نہیں ہوتا یا جب کہ بخار کم ہو چکا ہو۔ معدے کے زیریں حصہ میں درد ہوتا ہے۔ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ رحم کے سوراخ میں سوجن ہوتی ہے۔ پیٹ میں بھاری پن اور جلن ہوتی ہے۔ سیدیا (Sepia): حاد رحمی سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ رحم کی پروردہ سختی لاحق ہوتی ہے۔ ٹھنڈا والا دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے جیسے کہ ہر چیز اندام نہانی سے خارج ہو جائے گی۔ رحم کا گر جانا لاحق ہوتا ہے۔

گریفائٹس (Graphites): رحم کی مزمن سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ بیضہ دان کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ جلدی تکالیف کے ساتھ۔

پلائینا (Platina): رحم اور بیضہ دان کی حاد سوزش میں زچگی کے بعد بڑھی ہوئی جنسی خواہش اور اندرونی رحم کی خارش کے ساتھ۔

کونیم (Conium): رحم کی مزمن سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ بیضہ دان یا پیری ٹونیم کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر پیٹ تھابوا ہوتا ہے۔ رحم میں جکڑن اور ٹھنچن ہوتی ہے۔ نیچے کی جانب پروردہ دباؤ ہوتا ہے۔ خون والا یا دودھ کی طرح کالیکوریا ہوتا ہے۔ تے ہوتی ہے، بھگی ہوتی ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): رحم کی حاد سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ شدید نامیدی کے باعث نیز غصے کے دورے کے باعث یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ حیض کے دوران یا زچگی کے بعد پیٹ پھولا ہوا اور حساس ہوتا ہے۔

کولو سنقرس (Colocynthis): حیض یا نفاس کے دب جانے والے کیسوں میں جب کیمو میلا نام کام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): رحم کی مزمن سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ اندام نہانی اور رحم میں ٹانگے سے لگتے ہیں۔ بجلی کے صدموں کی طرح ہے۔ لیکوریا سوتی کپڑے پر غیلا داغ ڈال دیتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): غصہ کے بعد، خصوصاً زچگی کے بعد سوزش لاحق ہوتی ہے۔ اعضائے تناسل پر پُر درد دباؤ ہوتا ہے۔ پترے کی سرخی کے ساتھ کھودنے والا درد ہوتا ہے۔

چائنا (China): خون ضائع ہو جانے کے بعد یا جماع کی بے اعتدالی کے بعد۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): بچے کی پیدائش کے دوران۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ کی علامات کے ساتھ وضع حمل کے بعد۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پاؤں گیلے ہو جانے کے بعد یا حیض دب جانے کے باعث دودھ میں کمی کے ساتھ 'جاڑے' کے ساتھ اور پیاس نہ ہونے کے ساتھ۔ معدے کے زیریں حصہ میں کھینچنے والا تھکاؤ اور سکڑاؤ ہوتا ہے۔

ایپس (Apis): بچپن میں بیضہ دان کی سوزش۔

اکونائٹ (Aconite): حیض کے دب جانے کے بعد یا خوف کے باعث بیضہ دان کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ یہ دوا علاج کے آغاز میں دی جاتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): صبح کے وقت یا سونے کے بعد درد ہوتا ہے۔

## اعضائے تناسل کی خارش

(Itching of the Genitals)

سلفر (Sulphur): خشک خارش ہوتی ہے جو کہ خوفناک قسم کی ہوتی ہے اور مریض مسلسل کھجائی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اعضاء سے خون بہنے لگتا ہے۔

کولن سونیا (Collinsonia): فرج کی خارش خصوصاً حمل کے دوران۔

نیرن ٹولا ایچ (Urtica Urens): فرج کی خارش جس کے ساتھ اندام نہانی سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ چیخنے کی خواہش کے ساتھ ہنسی جوش اور ہسٹریا ہوتا ہے۔ رحم میں درد ہوتا ہے۔ نیز رحم میں سکڑاؤ، سختی اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔

ارٹیکا یورنس (Urtica Urens): جلن، سوجن اور لب ہائے فرج کے موٹا ہونے کے ساتھ فرج میں خارش ہوتی ہے۔ ایگزیمہ لاحق ہوتا ہے۔



کیلڈیم (Caladium): فرج اور اندام نہانی کی خارش کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ بعض اوقات یہ خارش آنٹوں کے کیڑوں کے باعث ہوتی ہے جو کہ اندام نہانی میں داخل ہو کر حلق کا باعث بنتے ہیں نیز حتیٰ کہ ناقابل برداشت جنسی خواہش کا باعث بنتے ہیں۔ حمل کے دوران خارش حلق میں جٹلا کر دیتی ہے۔

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): دھن اور سوجن کے ساتھ فرج کے بیرونی حصہ کی خارش لاحق ہوتی ہے۔ دو حیضوں کے درمیان کے عرصہ میں خون خارج ہوتا ہے۔ پیلاہٹ مائل لیکوریا ہوتا ہے۔

ہیلونیا (Helonias): فرج اور اندام نہانی میں خارش ہوتی ہے۔ اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ مریض خارش کر کے گوشت پھاڑ ڈالنا چاہتی ہے۔ جلد سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ جو کہ پتے 'سفید' دہی کی طرح کے مواد سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔

اورم میور نیٹرونیم (Auru Mur Natronatum): اندام نہانی کی آگے کو بڑھی ہوئی جلد پر ناسور ہوتے ہیں۔ رحم میں رسولی ہوتی ہے۔

سیپیا (Sepia): لیکوریا کے ساتھ اندام نہانی کی خارش۔

برومیم (Bromium): ذہنی اجڑی (پاگل پن) کے ساتھ رحم کی خارش لاحق ہو۔

کریوڑوٹ (Kreosote): فرج کے اندر گہری پر شہوت خارش ہوتی ہے جس کے ساتھ لب ہائے فرج میں جلن اور سوجن ہوتی ہے۔ جنہیں مریض ہر وقت مسکنے پر مجبور ہوتی ہے۔ زرد خراش دار لیکوریا ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹگ (Lilium Tig): اعضاء کے بھراؤ کے ساتھ پر شہوت خارش ہوتی ہے۔

بوریکس (Borax): دوران حمل خارش ہوتی ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): پیشاب لگ جانے کے باعث جسے دھونائی پڑتا ہے۔ رحم میں اجڑی ہوتی ہے۔ رحم کی خارش میں اجڑی ہوتی ہے۔ اس میں لیکوریا بھی ہو سکتا ہے جو کہ خراش دار ہوتا ہے اور اس میں رات کے وقت اجڑی ہو جاتی ہے۔

اوفورینیم (Oophorinum): یہ خارش کے لئے دوا ہے جو کہ حیض کے بعد تھوڑے وقت کے لئے بہتر ہو جاتی ہے۔

### لیکوریا — (Leucorrhoea)

سیپیا (Sepia): قبض کے ساتھ پتلا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ لیکوریا خراش دار گھلا دینے والا پیلاہٹ مائل 'پانی کی طرح' کا یا سرخی مائل سبز ہوتا ہے۔ فرج میں گرمی اور خارش ہوتی ہے۔

فرج کے ہر دینی حصہ میں دکن کے ساتھ حیض سے پہلے لیکوریا ہوتا ہے۔ چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا۔

مرکوریس (Mercurius): لیکوریا خراش دار، جلن دار، خارش والا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ کچا پن ہوتا ہے۔ ہمیشہ رات کے وقت اتری ہو جاتی ہے۔ رحم کی خارش ہوتی ہے جو پیشاب کے نکلنے سے اتری ہو جاتی ہے جسے ضرور ہی دھونا پڑتا ہے۔

بوریکس (Borax): لیکوریا دہی کی طرح کا اور انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ گرم پانی بہہ رہا ہو۔ خراش دار لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcareia Carb): پتلا دودھ کی طرح کا لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ کیوبیبا (Cubeba): باافراط پیلے رنگ کا سبزی مائل، خراش دار اور بدبودار لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): چپکنے والا گاڑھا لیکوریا خواہ رحم والا یا اندام نہانی والا ہو۔ لمبے دھاگے کی طرح کا اور ایک قسم کی خارش کا باعث بننے والا۔

آر سینک آئیوڈ (Ars iod): جب خارج ہونے والے مادے بیجان خیر اور گھلا دینے والے ہوں۔ ان مادوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔

ایسڈ نائٹریک (Acid Nitric): گھلا دینے والا لیکوریا جس کے ساتھ لب ہائے فرج پر چھلکے ہوتے ہیں۔ بیضہ دان کے علاقہ میں جلن دار اور پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔

بربرس ول (Berberis Vul): نپردرد پیشاب کی علامات کے ساتھ لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ ملی فولیوم (Millefolium): بچوں میں لیکوریا۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پانی والا، خراش دار اور جلن دار لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ دودھ کی طرح کا لیکوریا گاڑھا اور سفید۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کبھی کم اور کبھی زیادہ لیکوریا ہوتا ہے۔ دودھ کی طرح کا یا اعصابی (پورے چاند کے وقت) لیکوریا لاحق ہو۔ لیکوریا لاحق ہونے سے پہلے کانٹے والا درد قویج معدے کے گڑھے میں ہوتا ہے۔ (معدے کا زیریں حصہ)

فاسفورس (Phosphorus): حیض کی بجائے لیکوریا لاحق ہو جاتا ہے۔ حیض سے پہلے انڈے کی سفیدی کی طرح کا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ رونے کا موڈ ہوتا ہے اور پیشاب کرنے کی متواتر خواہش ہوتی ہے۔ سوڑھے سوچے ہوتے ہیں۔

نایٹرم کارب (Natrium Carb): گاڑھا، زرد رنگ کا، متعفن لیکوریا۔ سٹینم میٹ (Stannum Met): سبز، گاڑھا، پتلا، باافراط لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ اعصابی درد

کے دور ہو جانے کے بعد۔

گرافٹائٹس (Graphites): حیض کی بجائے لیکوریا لاحق ہو جاتا ہے۔ حیض کے دوران اختا درجے کی سستی ہوتی ہے۔ حیض سے پہلے شدید قسم کی خارش فرج میں ہوتی ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): جب لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے تو مریضہ بہتری محسوس کرتی ہے لیکن جیسے ہی لیکوریا غائب ہوتا ہے کوئی دوسری تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔

میڈورینم (Medorhinum): جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دینی چاہئے۔ IM ذاتی لیوشن کی ایک خوراک ہر پندرہ دن کے بعد دی جائے۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب خارج ہونے والا مادہ خراش دار اور خون والا ہو۔ سفیدی مائل لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ جو سوتی کپڑے پر داغ ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ ٹانگوں کی کمزوری ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): جب اخراج اتنی افراط سے ہوتا ہے کہ اس کا ہواؤ ایڑیوں تک چلا جاتا ہے۔ یہ اخراج خراش دار، چبسنے والا، بافراط، پھیلنے والا، گاڑھا اور پیلا ہوتا ہے۔ فرج میں خارش ہوتی ہے۔

اوواٹسٹا (Ova Testa): یہ دوا لیکوریا کے لئے تقریباً مخصوص دوا ہے۔ 3x ٹرائی ٹوریشن کی صورت میں دینی چاہئے۔

کالوفائلکم، کینابیس سیئی وا (Cannabis Sat, Caulophyllum): چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا۔

کوکولس آئی (Cocculus I): چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا، حیض کی بجائے لیکوریا ہو جاتا ہے۔

آئیوڈین (Iodine): بیڑو کی سوجن اور سختی کے ساتھ لیکوریا لاحق ہوتا ہے اور اخراج اتنا خراش دار ہوتا ہے کہ جانتھوں میں دکھن پیدا کر دیتا ہے۔ مزمن لیکوریا جو کہ گاڑھا، لیس دار اور بعض اوقات خون والا ہوتا ہے۔

نیٹرم فاس (Natrurn Phos): حیض کے بعد لیکوریا لاحق ہوتا ہے جو کہ خراش دار، بافراط، کریم کی طرح کا، شد کے رنگ جیسا، کھنی بو والا، پیلا اور پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔ جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

ایلو (Aloe): درد قویج کے ساتھ شروع ہونے والا خون آلود بلغم والا لیکوریا۔  
تھلاپی (Thlaspi): خون والا، بدبودار لیکوریا افراط کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جو حیض کے خون کی مدت کو طویل کر دیتا ہے۔

اونوس موڈیم (Onosmodium): ہلکے پیلا ہٹ مائل رنگ والا لیکوریا جو بدبودار، پھیلنے والا

اور باافراط ہوتا ہے۔ نیچے ٹانگوں تک بہتا رہتا ہے۔  
 ایسکولس ہپ (Aesculus Hip): گہرا، پیلا، گاڑھا اور چپکنے والا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ کمر کے نچلے حصہ میں لنگڑا ہٹ ہوتی ہے جو چلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔  
 تھوجا (Thuja): دو حیضوں کے درمیان یا حیضوں کی بجائے لیکوریا لاحق ہوتا ہے جبکہ مریض کی ہسٹری میں حفاظتی نیچے نہیں لگوائے گئے ہوتے یا جب حفاظتی نیچے کئی مرتبہ لگوائے گئے ہوں۔

سینی کولا (Cnicula): مچھلی کے چھلکوں کی تیز بدبو کے ساتھ لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔  
 چائنا (China): حیض سے پہلے لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ یہ لیکوریا متعفن یا خون والا ہوتا ہے۔  
 پردرد دباؤ، جانگم اور مقعد کی طرف ہوتا ہے۔  
 میوریکس (Murex): جب لیکوریا میں اتھری ہوتی ہے تو مریض حوصلہ مند ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔  
 کاربو انیلس (Carbo Ani): لیکوریا سوتی کپڑے پر پیلا داغ ڈالتا ہے۔  
 سفیلینیم (Gyphillinum): لیکوریا باافراط ہوتا ہے جو رومال کو ہلکوا دیتا ہے اور ایڑیوں تک بہتا ہے۔

الیومن (Alumen): رحم کے ماسوروں اور حتیٰ کہ سرطان اور رحم کی سختی کے ساتھ باافراط لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ مریض زرد چہرے والی ہوتی ہے۔

## زندہ بچے کی پیدائش

(Living Birth)

(”حمل“ کے ذیل میں دیکھئے)

پستان — Mammae

پھوڑا (پستان کا) — Abscess

ہیسپر سلف (Hepar Sulph): سوزش میں جبکہ پیپ پڑ چکی ہو یا پیپ پڑنے والی ہو۔ یہ دوا پیپ بننے کے عمل کو روکتی ہے۔ شدید قسم کی حرارت اور چپکنے والے درد کے ساتھ سوزش ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے ابتدائی مراحل میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ جبکہ متاثرہ حصے

سرخ اور سخت ہوتے ہیں۔

**فالٹی ٹولاکا (Phytolacca):** کیک (مکیہ) جیسی سختی ہوتی ہے۔ جب کہ پیپ ناگزیر ہوتی ہے۔ پستانوں میں سخت قسم کی ٹکیوں یا ٹیکوں کی طرح کی سختی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ سختی بچے کے سر کی چوٹ ٹکٹے کے باعث ہو سکتی ہے یا پھر دودھ کے اجتماع کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔

**برائی اونیا (Bryonia):** پستانوں کی ابتدائی مراحل والی سختی، جبکہ یہ سختی دودھ کے اکٹھا ہو جانے یا بعض دوسری وجوہات کے باعث لاحق ہو۔ ہر 6 گھنٹے کے بعد 200 ڈالی لیوشن کی دوا دینی چاہئے۔ تین یا چار خوراکیوں میں شفا حاصل ہو جائے گی۔

**سیلیسا (Silicea):** ایک کے بعد دوسری ناسوری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اخراج ایک ہی مشترکہ ناسور سے درد کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر ہر حصے کے ناسور میں بہت سے سوراخ ہو سکتے ہیں۔ پیپ والی ٹالی کا مواد پیپ کی صورت میں خارج ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

**لیکسیس (Lachesis):** جب متاثرہ حصے نیلاہٹ مائل یا ارغوانی مائل صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ مریضہ کو رات کے وقت جاڑا لگتا ہے اور دن کے وقت حرارت سے تھماہٹ ہوتی ہے۔

## لاغری (پستانوں کا گھٹ جانا)

### Atrophy (Wasting Away)

**اونوس موڈیم (Onosmodium):** جب پستان اپنی معمولی جسامت سے بہت چھوٹے ہو جائیں یا بالکل غائب ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ GM طاقت کی دوا دیجئے۔ **کیمافیلہ (Chimaphila):** پستانوں کی کمزوری (چھوٹا ہو جانا) یا ضرورت سے زیادہ نشوونما کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

**بل سیر (Sabal Serr):** تاخیری حیضوں کے باعث پستان سکڑ جاتے ہیں یا پھر رحم کے دوسرے امراض کے باعث پستانوں کا سکڑنا۔

**نکس موسکاٹا (Nux Mosch):** پستان چھٹے ہو جاتے ہیں جو کہ کبھی خوب گول ہوتے تھے۔ پستان بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان میں دودھ نہیں رہتا۔ چوچیاں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔

**کریوزوٹ (Kreosote):** پستانوں میں چھوٹے سخت اور پتھر جیسے مٹیلوں کے ساتھ پستان ٹکٹے ٹکٹے بالکل کم رہ جاتے ہیں۔

کوئیم (Conium): پستانوں کی لاغری جو انہیں بہت ڈھیلا کر دیتی ہے۔ پستانوں کی جلد تھیلے کی طرح سے ڈھیلی ڈھالی ہو جاتی ہے۔ یہ دوا پستانوں کے بڑھ جانے اور پستانوں کی سختی کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

ڈلکارامارا (Dulcamara): جب پستانوں کی لاغری لیکوریا یا حیضوں کی موجودگی کے ساتھ لاحق ہو۔

آئیوڈیم (Iodium): پستانوں کا گھٹتے جانا جبکہ دیگر غدود بڑھتے رہتے ہیں۔

### سیلان خون (پستانوں سے) — Bleeding

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): پستانوں سے خون آتا ہے اور بچہ اتنا زیادہ خون پی جاتا ہے کہ اسے تے ہو جاتی ہے چنانچہ وہ خون کی قے کرتا ہے۔ پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ سیلان خون آسانی سے ہوتا ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): بہت زیادہ دکھن کے ساتھ پستانوں سے خون کا سیلان ہوتا ہے۔  
سپیا (Sepia): پیپ پڑ جانے کے امکان کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے۔

### سرطان (پستانوں کا) — Cancer

(دیکھئے ”رسولیاں“)

### پستانوں کا بڑھ جانا Hypertrophy

فائی ٹولاکا (Phytolacca): پستانوں کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ پستان اتنے زیادہ بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے اہل پڑیں گے۔

فری جیریا وسکا (Fragria Vesca): یہ دوا پستانوں کی جسامت کو گھٹاتی ہے اور دودھ خشک کرتی ہے۔

کوئیم (Conium): پستانوں کا بڑھ جانا خواہ عمومی ہو یا خواہ زچگی والا۔

کیمافیلہ (Chimaphila): یہ دوا پستانوں کی لاغری اور پستانوں کے بڑھ جانے دونوں کو شفا دیتی ہے۔

### سوزش (پستانوں کی) — Inflammation

برائی اونیا (Bryonia): دودھ کے جم جانے کے باعث یا کسی دوسری وجہ سے سوزش لاحق ہو

جاتی ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** جب کہ متاثرہ حصے سرخ اور گرم ہوتے ہیں۔  
**مرکیوریس (Mercurius):** جب بیلادونا اور برائیو نیا ناکام ہو جائیں۔  
**بیلس پیر (Bellis Per):** مکالگ جانے کے بعد لاحق ہونے والی سوزش اور سختی۔  
**کونیم (Conium):** سوزش کی سختی والا مرحلہ 'متاثرہ حصے مضبوط' سخت اور پردرد ہوتے ہیں۔  
**پائیس پستان میں سوجن اور سختی کے ساتھ سونوں سے ٹانگے لگنے کا احساس ہوتا ہے۔**  
**فانی ٹولا کا (Phytolacca):** جب پستان پتھر کی طرح سخت ہو جائیں اور ساتھ میں بہت زیادہ درد ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ پستانوں کی سوزش 'سوجن اور پیپ پڑنے والی کیفیت' پستانوں میں دھن ہوتی ہے اور ڈھیلے ہوتے ہیں۔ (گھٹیاں)

### دودھ — Milk

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** دودھ بڑھانے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔  
**لیک ویک ڈھیل (Lac Vace Defl):** دودھ میں کمی کرنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔  
**چو تنقش (Chioanthus):** دودھ روکنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔  
**سبل سیر (Sabal Serr):** دودھ پیدا کرنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔  
**لیکٹوسا وائروسا (Lactusa Virosa):** دودھ میں زیادتی کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔  
**رکی نس (Ricinus):** دودھ پلانے والی عورتوں میں اور حتیٰ کہ کنواریوں میں بھی اس دوا سے دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔  
**سکٹانی (Sticta P):** دودھ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا دودھ کی مقدار کو زیادہ کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے کیسوں میں بھی مفید ہوتی ہے جن میں دودھ سوکھ چکا ہوتا ہے۔ مریضہ ہمیشہ دودھ کی کمی کی وجہ سے پرہم رہتی ہے۔  
**بوریکس (Borax):** دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے اور بد مزہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے روک دیتی ہے۔ (یہ دوا دوران حمل دینی چاہئے تاکہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے موزوں اور خوش مزہ دودھ مل سکے۔) بد مزہ دودھ کی وجہ سے بچہ پستان منہ میں نہیں لیت۔  
**ارٹیکا یورٹیس (Urtica Ur):** دودھ کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ پستانوں کی سوجن کے ساتھ۔  
**دودھ چھڑانے والی مستورات میں بھی دودھ خشک ہو جاتا ہے۔**  
**پلساٹیل (Pulsatilla):** یہ دوا ایسی ماؤں کو دودھ منتشر کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ جو بچوں

کو دودھ پلانا چھوڑ چکی ہوں۔ دودھ پلانا روکنے کے فوراً بعد یہ دوا دینی چاہئے۔ اگر یہ دوا در دیا تکلیف میں افادہ نہ کرنے تو کلکیریا کارب آزمائی جاسکتی ہے۔ یہ دوا دودھ کے دب جانے یا (سوکھ جانے) کے لئے بھی مفید ہے۔ جس کے نتیجے میں پستان سوجے ہوئے اور پردرد ہوتے ہیں۔

ایسافوئیڈا (Asafoetida): دودھ کا معیار بہتر بنانے اور بوہانے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ پستان دودھ کے ساتھ تنے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ حمل کے بغیر بھی۔  
لیسی تھم (Laceithim): یہ دودھ بوہانے کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جس سے دودھ زیادہ مقوی ہو جاتا ہے اور مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): حیض کا خون آنے کی بجائے پستانوں میں دودھ بھر جاتا ہے۔ یہ دوا ایسے لڑکوں کے لئے بھی مفید ہے۔ جن کی پھیاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے پستانوں میں دودھ کا آ جانا۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): بچہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ دودھ کا ذائقہ تمکین ہوتا ہے۔

فالٹی ٹولاکا (Phytolacca): پستانوں میں سوزش ہوتی ہے جبکہ دودھ تار دار ہوتا ہے اور سر پستان سے نکل کر نیچے کو لٹکا ہوتا ہے۔ ہما ہوا دودھ 'دودھ کم مقدار میں' گاڑھا' غیر صحت بخش اور جلد سوکھ جانے والا ہوتا ہے۔ خون والا پانی کی طرح کا مواد خارج ہوتا ہے۔ جو کئی سالوں سے مسلسل نوزائیدہ بچوں کا دودھ پھڑانے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ یہ دوا اس شکایت کو بھی رفع کر دیتی ہے۔

یوفو (Bufo): جب دودھ خون آلود ہو۔

اورم سلف (Aurum Sulph): دودھ کا دب جانا یا غائب ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پستانوں کی سوجن بھی ہوتی ہے۔

لیک ٹینیم (Lac Gan): دودھ خشک کرنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے کیونکہ دودھ بہت زیادہ افراط کے ساتھ آتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): دودھ کا دب جانا یا دودھ کا ظاہر نہ ہونا وضع حمل کے بعد۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): شفا سے ناامیدی کے ساتھ دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب دودھ زچگی کے بعد ظاہر ہونے میں ناکام ہو جائے۔ اس کے ساتھ متذکرہ بالا ذہنی حالت بھی ہوتی ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): جب غصے کے دورے کے نتیجے میں دودھ دب جائے۔



الفالفا (Alfalfa): یہ دوا دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کے معیار اور اس کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔ دن میں چار مرتبہ ہر گچھر کے 5 سے 10 قطروں کے خوراک دی جائے۔

## سرہائے پستان (چوچیاں)

(Nipples)

فائیٹولوگا (Phytolacca): سرہائے پستان (چوچیاں) میں دکھن ہوتی ہے اور پستانوں میں پھوڑے کا رجحان ہوتا ہے۔ چوچیاں اندر کو دھنسی ہوتی ہیں۔ پستان بچے کے منہ میں دینے پر شدید درد ہوتا ہے۔ سرہائے پستان میں شکاف ہوتے ہیں۔ سرہائے پستان (چوچیاں) حساس ہوتے ہیں۔ ان میں دکھن ہوتی ہے اور چیرے ہوتے ہیں، دودھ پلاتے وقت شدید بہتری ہوتی ہے۔

سرسلپاریلا (Sarsaparilla): پُر درد حیض، اسہال، قے اور بے ہوشی کے دوروں کے ساتھ چوچیاں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ چوچیاں پھوٹی، مریضائی ہوئی اور ناقابلِ جوش ہوتی ہیں۔ کاسٹراکوئی (Castor Equi): چوچیوں میں دکھن ہوتی ہے، ان میں شکاف ہوتے ہیں اور پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، بڑھی ہوئی حساسیت ہوتی ہے، مریضہ ان کا پھوٹا برداشت نہیں کر سکتی۔ ہائیڈراستس (Hydrastis): دودھ پلانے والی عورتوں کے سرہائے پستان میں خراش ہوتی ہے۔ سرہائے پستان دھنسنے ہوتے ہیں۔

گرافائٹس (Graphites): گھلا دینے والے چھالے یا ٹاسور ہوتے ہیں جن سے چپکنے والا مواد رستا ہے پھر پٹریاں بن جاتی ہیں جو کہ دودھ پلانے سے اتر جاتی ہیں لیکن بعد میں دوبارہ بن جاتی ہیں۔ چوچیاں دودھ پلانے سے پھٹ جاتی ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): چوچیوں پر پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن کے گرد داد ہوتی ہے۔ کاربوائیٹس (Carbo An): چوچیوں پر رسولیاں ہوتی ہیں جو کہ سخت ہوتی ہیں اور اتنی بڑی جتنا کہ مرئی کا انڈا ہوتا ہے۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چوچیوں میں درد ہوتا ہے جو پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ چوچیوں میں پُر درد کھینچن ہوتی ہے جیسا کہ رسی سے کھینچا جا رہا ہو۔ سیلیسا (Silicea): دودھ پلاتے ہوئے تمام جسم میں اور سرہائے پستان میں درد ہوتا ہے۔

فیلنڈریم (Phellandrium): دودھ پلانے کے وقفہ کے دوران ناقابلِ برداشت درد ہوتا ہے۔ بوریکس (Borax): دودھ پلاتے ہوئے دوسرے پستان میں درد ہوتا ہے۔

رٹانہیا (Ratanhia): چوچی میں شکاف اور چیرے ہوتے ہیں جو دودھ پلانے کے باعث ہو جاتے ہیں۔

### جلق — (Masturbation)

اوری گینم (Origanum): جلق اور حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہنسی تحریک میں یہ دوا پر اثر ہوتی ہے، لیکوریا لاحق ہوتا ہے، ہسٹریا ہوتا ہے، پر شہوت خیالات اور خواب ہوتے ہیں۔  
کیلڈیم (Caladium): لب ہائے فرج اور اندام نسائی میں خارش ہوتی ہے جس کے باعث جلق کا رجحان ہوتا ہے۔ رات کے وقت رحم میں انقباض والے درد ہوتے ہیں۔

### حیض کا دب جانا یا رک جانا

(Menopause)

(دیکھئے موقوفی حیض)

### حیض - غیر موجودگی

(Menses- Absent) (Amenorrhoea)

پلساٹیل (Pulsatilla): بلوغ کی عمر کو پہنچنے پر حیض ظاہر نہیں ہوتے جس کی کوئی بظاہر وجہ نہیں ہوتی، مریضہ بنیادی طور پر ڈرپوک، رونے والی ہوتی ہے اور یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب مریضہ اپنے مرض کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری محسوس کرتی ہے۔ پاؤں ٹپلے ہو جانے کے باعث حیض کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): جب ٹھانہٹ یا خون میں کمی کے باعث حیض دب جائیں یا سوتل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ کھلی ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔

سائیکلے من (Cyclamen): گیلا ہو جانے کے باعث حیض دب جاتے ہیں۔ یہ دوا اس حالت کی نشاندہی کرتی ہے جب پلساٹیل کی علامات موجود ہوتی ہیں لیکن مریضہ کھلی ہوا میں بہتری محسوس کرتی ہے۔ غنودگی اور درد سر محسوس ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): جب جاڑا لگ جانے کے باعث حیض دب جائیں، اگر اس دوا سے اتفاق نہ ہو تو پلساٹیل کے بعد دینی چاہئے۔

سلفر (Sulphur): جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں، خصوصاً جب معدہ میں خالی پن کا

احساس ہو جس کے ساتھ درد سر بھی ہوتا ہے۔  
سینی شیو اورینس (Senecio Aurens): کھانسی، ہسٹیریا، لیکوریا، سبزیہ قان، ضیق النفسی وغیرہ، امراض جب حیض کے دب جانے کے باعث لاحق ہوں، ٹچر کی صورت میں یا 1x طاقت کی دوا استعمال کیجئے۔

ٹرنرا (یا ڈامیانہ) (Turnera or Damiana): مستورات کی افسردگی (ٹھنڈا پن) یہ دوا نوجوان لڑکیوں میں معمول کے مطابق حیض کا خون لانے میں مدد دیتی ہے۔ مدر ٹچر کے 10 سے 15 قطروں کی خوراک دن میں دو مرتبہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد دی جائے۔  
سٹرامونیم (Stramonium): حیض یا نفاس وغیرہ کے دب جانے کے باعث تکلیفات لاحق ہوں۔

سبل سر (Sabal Serr): رحمی امراض اور پستانوں کے مرجھا جانے یا سکڑ جانے کے باعث حیضوں میں تاخیر ہوتی ہے۔

لیک ویک ڈفلورٹم (Lac Vacc Defloratum): ٹھنڈا پانی پینے یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے باعث حیض دب جاتے ہوں۔ رحم کے علاقہ میں شدید درد ہوتے ہیں۔ شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Moschata): ذہنی جوش یا گھبراہٹ ہو جانے کے باعث حیض دب جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ غنودگی بے ہوشی اور بازوؤں، ٹانگوں کا ٹھنڈا ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ اندام نمائی کا اچھا رہ لاحق ہوتا ہے۔

یوپونی اوٹیم (Eupionum): جب حیض کا خون وقفوں میں آئے تو ناک سے خون جاری ہوتا ہے۔ جب خون جاری ہو جاتا ہے تو کانٹے والا درد رک جاتا ہے۔ پیلے رنگ کے لیکوریا کے ساتھ کمر درد لاحق ہوتا ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): حیض سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔

مرکیوریس (Mercurius): پستانوں میں درد ہوتا ہی جیسا کہ ان میں ماسوری کیفیت موجود ہو، یہ کیفیت ہر حیض کے عرصہ میں ہوتی ہے۔ حیض کی بجائے پستانوں میں دودھ بھر جاتا ہے یا حیض کے زمانہ میں پستانوں میں دودھ بھر جائے۔

اپیس مل (Apis Mel): اعصابی، ہسٹریائی، بودے اور بے وقوف قسم کی مریضوں میں سن بلوغ کو پہنچنے پر حیضوں کی غیر موجودگی۔ یہ بودا پن قدرتی نہیں ہوتا بلکہ عضلات کے عدم ارتباط کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔

کیسٹوریم (Castoreum): پُر درد اچھارے کے ساتھ حیضوں کی غیر موجودگی، رحمی

کنزوریوں کے باعث حیض کا خون قطروں کی صورت میں بہتا رہتا ہے۔ جذباتیت پاؤں کی ٹھنڈک وغیرہ کے باعث۔ ٹھنڈے پینے آتے ہیں اور طاقت اچانک کھو جاتی ہے۔ ناف کے نزدیک کانٹے کا احساس ہوتا ہے۔ ہوا کے باعث پیٹ پھولا ہوتا ہے۔ جاگھ میں کھینچن ہوتی ہے۔ حیض کے دوران پاخانہ کار تھان ہوتا ہے۔

کوکولس انڈ (Cocculus Ind): غم اور پریشانی کے باعث حیض دب جاتے ہیں جس کے ساتھ چکر آتے ہیں، درد سر ہوتا ہے اور حمل ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): حیضوں کی بندش جبکہ ساتھ میں شدید قسم کا ہسٹریائی درد سر ہوتا ہے، لیکوریا ہوتا ہے اور دانت کا درد ہوتا ہے، جسم نازک ہوتا ہے، چہرے پر پیلاہٹ یا نکل رنگ والے درغ ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اور کپکپاہٹ ہوتی ہے اور کبھی گرمی لگتی ہے، یہ دونوں کیفیتیں اولتی بدلتی رہتی ہیں۔ نازک مزاج مستورات میں ٹھنڈ کے باعث سن بلوغ کو ٹھنچنے پر حیضوں کی بندش کا لاحق ہوتا۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): حیض خوف کے باعث دب جاتے ہیں، درد سر لاحق ہوتا ہے، کھنٹی تے ہوتی ہے پاؤں سوج جاتے ہیں، بے ہوشی کے دورے ہوتے ہیں اور لیکوریا ہوتا ہے، جب مریضہ 15، 16، 17، 18 سال کی عمر بغیر حیضوں کے گزار دے۔ پستان نشوونما نہیں پاتے اور بیض دان اپنا کام انجام نہیں دیتے۔ اندام نمائی سے ہوا خارج ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ٹھنڈ یا تہ خانے میں رہائش رکھنے کے باعث حیض دب جاتے ہیں، پستانوں میں اجتماع خون ہوتا ہے اور سخت ہوتے ہیں، ہاتھوں پر سے ہوتے ہیں، ہر حیض کے زمانہ کے دوران جلد پر پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں۔

کالی کارب (Kali Carb): ضیق النفس، دل کی دھڑکن، پیٹ کی ایٹشن، رخساروں اور موڑھوں کی سوجن کے ساتھ ابتدائی یا ثانوی حیضوں کی بندش کے لئے یہ بہترین دوا ہے۔ لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔

چائونٹھس (Chionanthus): برکان کے باعث حیضوں کی غیر موجودگی۔ نوٹ خون کی کمی یا تپ دق کے باعث حیضوں کی غیر موجودگی کے لئے مریانی فرما کر یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ پہلے ان امراض کا علاج مناسب دواؤں سے کر لیجئے۔

### مؤخر اور / یا پُر درد

(Delayed and/ or Painful) (Dysmenorrhoea)

اکٹیارلس موسا (Actea Racemosa): حیضوں کے دوران اور بعد درد ہوتا ہے۔ حیض

بے قاعدہ، بہت جلد جلد یا بہت تاخیر سے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ خون جاری ہوتا ہے اتنا زیادہ درد ہوتا ہے۔ مریض اعصابی، بے چین اور مایوس ہو جاتا ہے۔ رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے جو کہ حیض جاری ہونے کے دوران لاحق ہوتا ہے۔ گنٹھیا لاحق ہوتا ہے، حیض بند ہو جاتے ہیں، رحم اور بیض دان کے علاقہ میں دھکن ہوتی ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): بڑے درد حیض ہوتے ہیں جن کے ساتھ پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔

ایلی ٹریس فاری نو سا (Aletris Farinosa): قبض لاحق ہوتی ہے، حیض باافراط اور وقت سے پہلے جاری ہوتے ہیں، درد نہ جیسے درد ہوتے ہیں یا حیضوں کی بندش لاحق ہوتی ہے (حیضوں کی غیر موجودگی) رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث نقاہت ہوتی ہے۔ ہاتھ پیر ہوتا ہے، استقامت حمل کا رتھان عادتاً ہوتا ہے، رحم کا خروج ہوتا ہے۔

واہبرنم اوپولس (Viburnum Opulus): حیض سے پہلے شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو دوہرا ہونے سے کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حیض کا خون جاری ہوتا ہے درد غائب ہو جاتا ہے۔ درد قونچ پیٹ کے زیریں حصہ میں ہوتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، درد اچانک شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ مدر فنگر کے 3 قطروں کی خوراک دیکھنے یا 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔  
کیومیلا (Chamomilla): باافراط اور بڑے درد حیض میں شدید قسم کا درد قونچ ہوتا ہے۔ اس سال کے ساتھ اطراف میں درد نہ جیسا درد ہوتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): حیض بہت جلد، بہت باافراط اور دیر تک رہتے ہیں۔ اخراج کمرے رنگ کا ہوتا ہے اور جما ہوا خون خارج ہوتا ہے، حیض صرف اسی وقت ہوتا ہے جب مریض لیٹی ہو، بیٹھنے پر حیض بند ہو جاتا ہے یا چلنے سے بھی حیض بند ہو جاتا ہے۔ جب درد قونچ شدید ہو، حیض کا اخراج صاف اور پانی والے خون کا ہوتا ہے۔ ناف میں درد ہوتے ہیں جو کہ سفیدی مائل لیکوریا کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔ حیض کے عرصہ کے دوران تھکے اور دل کی جلن لاحق ہوتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): حیض بہت زیادہ تاخیر سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کم مقدار میں اور بہت زیادہ کم دورانیے کے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ بواسیری دردیں ہوتی ہیں، ناک سے خون بہتا ہے، خون والے پاخانے ہوتے ہیں، قبض ہوتی ہے، لیکوریا ہوتا ہے اور دانت میں درد ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): حیض بہت تھوڑے اور بہت تاخیر سے ہوتے ہیں یا بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت افراط کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر 6 یا 8 دن کے بعد دوبارہ حیض ہو

جاتے ہیں، معمولی سے خوف کے باعث حیض دب جاتا ہے۔ پیٹ میں اچھارہ ہوتا ہے۔  
پلساٹیلہ (Pulsatilla): ڈرپوک لڑکیوں میں پُر درد حیض ہوتے ہیں، جو کہ بہت جلد پُر جوش ہو جاتی ہیں، بہت ہلکے مزاج والی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے مرض کی علامات بتاتے ہوئے رونے لگتی ہیں۔ جسمانی طور پر موٹی ہوتی ہیں، ٹھنڈی اور کھلی ہوا کو پسند کرتی ہیں۔ جب حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو درد رک جاتا ہے۔

لیپس ایلبس (Lapis Albus): حیض کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریضہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو درد میں افادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے دن گہرے رنگ کے لوتھڑے اور خون کی کالی گٹھیاں خارج ہوتی ہیں، کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان درد ہوتا ہے، درد سر ہوتا ہے کمرے سے باہر رہنا پسند کرتی ہیں، یعنی کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتی ہیں۔

سبائنا (Sabina): حیض کے وقت پریشان کر دینے والا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ نیچے کی جانب دباؤ ہوتا ہے اور درد ذہ کی طرح سے درد ہوتا ہے، بیض دانوں اور رحم میں سوزش ہوتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): پُر درد حیض ہوتے ہیں جس کے ساتھ رحم کا بڑھ جانا اور رحم کی سختی لاحق ہوتی ہے۔ حیضوں میں انتہی ہوتی ہے۔ کمر میں شدید درد ہوتا ہے جو کہ کولوں تک پھیل جاتا ہے، قبض لاحق ہوتی ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): اینٹھن اور ہڈیان کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے۔  
بیوفو (Bufo): بیضہ دانوں اور پیڑوں میں حیض سے پہلے اور حیض کے دوران جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے۔

کولوفائلم (Coulrophyllum): تشنگی دوروں والے شدید درد پیٹ میں ہوتے ہیں۔  
کولوسنتھ (colocynth): حیض سے پہلے حیض والا درد قویٰ ہوتا ہے، حیض بہت جلد ظاہر ہو جاتے ہیں، خون سیاہی مائل ہوتا ہے جس میں اکثر خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں۔ خراش دار لیکوریا ہوتا ہے۔ حیض والا درد قویٰ ہوتا ہے جبکہ جبکہ کر دوہرا ہونے سے اس میں افادہ ہوتا ہے نیز سخت دباؤ سے بھی افادہ ہوتا ہے۔ درد رحم یا بیضہ دانوں میں ہو سکتا ہے، مریضہ اعصابی ہوتی ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): اسہال، تھکاوٹ اور غشیوں کے ساتھ جو کہ حیض کے وقت لاحق ہوتی ہیں، پُر درد حیض ہوتا ہے۔ سرہائے پستان سکڑے ہوتے ہیں۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): حیض پُر درد ہوتے ہیں جو کہ بے قاعدہ ہوتے ہیں، سارے

پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ خصوصاً بیض دانوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں پُر خوف درد ہوتا ہے، سارے جسم میں درد ہوتا ہے، مسلسل غشیاں ہوتی ہیں، تے اور مٹکی ہوتی ہے۔ جب حیض تاخیر سے ہوں۔ حیض سے پہلے اور حیض کے بعد تے بھی ہوتی ہے جبکہ مریضہ تھکی ہوئی اور بخار میں مبتلا محسوس کرتی ہے۔ حیضوں کی بے قاعدگی کے ساتھ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

گن پاؤڈر (Gun Powder): پُر درد اور کم مقدار والے حیضوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ حیض کا خون رک جاتا ہے اور پھر دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ 3x کی دوا دیجئے۔

کیسٹوریم (Castoreum): حیض والا درد قویٰ ہوتا ہے جس کے ساتھ مریضہ پبلی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔

کالی کارب (Kali Carb): یہ دوا ان تمام صورتوں میں دی جاتی ہے مثلاً حیض خواہ بہت تاخیر سے ہوں اور بہت کم مقدار والے ہوں یا بہت جلدی ہوں اور بہت افراط کے ساتھ ہوں اور دیر تک رہیں۔

سیدیا (Sepia): ٹاکنی یا سست یا جلد ہونے والے اور باافراط حیض جن کے ساتھ اینٹنشن والے درد ہوتے ہیں۔ کمزور اور مرمل قسم کی مریضوں میں پہلے حیض میں تاخیر ہونے پر جبکہ حیض کی بجائے لیکوریا لاحق ہو جاتا ہے۔ خون کے چھاتی میں معین ہو جانے کے ساتھ پیڑو کے علاقہ میں نیچے کی جانب بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک کے کھو جانے کے ساتھ مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ حیض کے بعد تے اور دل کی جلن لاحق ہوتی ہے۔

گرافائٹس (Graphites): بہت زیادہ حد اعتدال سے بڑھی ہوئی تاخیر حیضوں میں ہوتی ہے۔ بہت کم حیض ہوتے ہیں، مستحکم قسم کی قبض بھی ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ گردہ دار باغم خارج ہوتی ہے۔ بائیں بیض دان میں سختی ہوتی ہے جو کہ پتھری جیسی ہوتی ہے، جلدی امراض کا رجحان ہوتا ہے، موناپے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔

کولن سونیا (Collinsonia): بواسیر کے ساتھ حیض کی شدید قسم کی بندش ہوتی ہے، رحم کے علاقہ میں شدید قسم کے درد سے پہلے شدید قسم کا تشنج ہوتا ہے، دل کے اعصاب کا پیمانہ لاحق ہوتا ہے، دل کی تکلیف دور ہو جانے کے بعد دبے ہوئے حیض واپس لوٹ آتے ہیں۔

وربٹرم ایلیم (Veratrum Alb): انتہا درجے کی ٹھنڈ کے ساتھ پُر درد حیض ہوتے ہیں، ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی اور ٹپلی پڑ جاتی ہیں۔ ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے، ہر کسی کو چوسنے کا پاگل پن ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): پُر درد حیضوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ دوہرا ہو کر جھکنے اور حرارت یا گرم چیزیں لگانے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔ 6x ٹرائی ٹوریشن کی دوا حاد

کیسوں میں دہجئے اور اوپچی طاقت کی دوا مثلاً TM یا CM کی ایک خوراک ہر ہفتے یا 15 دن کے بعد مستقل اور یقینی علاج کے لئے دہجئے۔

**کلکیریا فاس (Calcarea Phos):** سن بلوغ کو پہنچنے پر لڑکیوں میں پُر درد حیض ہوتے ہیں جبکہ اس کی وجہ غیر محتاط طرز زندگی ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں بانجھ پن لاحق ہو جاتا ہے 'سن بلوغ کے ساتھ منسلک رحم کا درد' درد زہ جیسا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ نیچے کی جانب دباؤ بھی ہوتا ہے۔

**بوریکس (Borax):** انڈے کی سفیدی اور رسی دار لیکوریا کے ساتھ پُر درد حیض ہوتے ہیں 'حیض سے کئی دن پہلے درد ہوتا ہے' درد زہ جیسا درد ہوتا ہے۔

**جیہوراندی (Jaborandi):** جب حیض ٹھنڈے کے احساس کے ساتھ اور غشی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں 'سر میں اور پیڑوں میں اعصابی ٹپکن ہوتی ہے' جس کے ساتھ درد سر ہوتا ہے۔

**سیکیل کار (Secale Cor):** حیض والا درد قویٰ ہوتا ہے 'جس کے ساتھ ٹھنڈ لگتی ہے اور ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے۔ رحم میں جلن دار درد ہوتے ہیں 'بھورے رنگ کی طرح کا بدبودار لیکوریا ہوتا ہے۔ اگلے حیض تک پانی والا خون مسلسل رستا رہتا ہے۔

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** یہ اشقی سورک مزاج والی ایک عمدہ دوا ہے 'بیضہ دانہ کی تکلیفات ہوتی ہیں جس کے ساتھ پلپٹا پن ہوتا ہے' تھائی رائیڈ اور پچوٹری غدود کے فعل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے۔ بیرونی اعضاء تکاسل میں خارش ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ افراط کے ساتھ انہی جگہوں پر ہوتا ہے 'قبل از وقت حیض دیا

تین دن جلدی آجاتے ہیں۔ نفس قسم کے خواب آتے ہیں 'درد سر ہوتا ہے' اعصابی نفاہت ہوتی ہے اور حیض سے پہلے پستانوں کی سوجن ہوتی ہے 'رحم میں گومڑ ہوتا ہے۔

**ہیلونیا (Helonias):** مڈھال 'غیر فعال' تھکی ہوئی مریضوں میں جو کہ تھکا رہنا چاہتی ہوں 'حیض مؤخر ہو جاتے ہیں۔ بیضہ دانوں کی تکلیف کے باعث حیض بدبودار اور لوتھڑوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ گردوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے نیز فیا بیٹس 'الیمین اور فاسفیٹ

یوریا کے اخراج والا مرض بھی ہو سکتا ہے۔

**کونیم (Conium):** کم مقدار والے حیض ہوتے ہیں جن کے ساتھ خوفناک قسم کا درد دونوں بیضہ دانوں میں ہوتا ہے۔ اکثر چہرے اور دھڑ پر خارش ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں میں یہ

کیفیت ہوتی ہے جو کہ دل شکستہ 'بزدل اور رونے کا رجحان رکھتی ہوں۔

**اوفورائیم (Oophorinum):** حیض ہر 40 سے 65 دنوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں جو کہ پُر درد



ہوتے ہیں اور مختصر دورانیے کے ہوتے ہیں۔ لب ہائے فرج میں خارش ہوتی ہے۔  
 زخمو کسی لم (Xanthoxylum): دبے ہوئے، مؤخر اور پُر درد حیض ہوتے ہیں جن کے  
 ساتھ لیکوریا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ 1x ذاتی لیوشن ہر تین گھنٹوں کے بعد دی جائے۔  
 مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): پُر درد حیض ہوتے ہیں جو کہ عموماً بہت زیادہ تاخیر کے  
 ساتھ اور کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ اخراج رات کے دوران اور لیٹے ہونے کی حالت میں زیادہ  
 افراط کے ساتھ ہوتے ہیں اور مریضہ جب کھڑی ہو جاتی ہے یا چلتی ہے تو رک جاتے ہیں۔  
 جوع الکل (کتوں والی بھوک) اور معدے کا درد ہوتا ہے، 'مٹلی ہوتی ہے'، نگڑاپن ہوتا ہے اور  
 حیض سے پہلے دکن والا درد ہوتا ہے، 'شدید درد قونچ ہوتا ہے'۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): حیض بہت جلد ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک رہتے ہیں  
 جن سے پہلے کھینچنے والے درد پیڑوں کے پچھلے عضلات میں ہوتے ہیں۔ انس۔۔۔ گوشت کے ساتھ  
 سستی ہوتی ہے اور بازوؤں اور ٹانگوں میں گٹھیا کا درد ہوتا ہے، 'بے چینی ہوتی ہے اور چڑچڑا  
 پن ہوتا ہے اور مزاج میں لڑاکاپن ہوتا ہے۔ رحم میں اینٹن ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): حیض بہت جلدی، بہت افراط کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت  
 دیر تک رہتے ہیں جن کے ساتھ درد قونچ ہوتا ہے، نیز اطراف میں درد ہوتا ہے۔ دو حیضوں  
 کے درمیان خون خارج ہوتا ہے، جب حیض بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں تو ان سے پہلے  
 لیکوریا ہوتا ہے۔ کانٹے والے درد ہوتے ہیں جیسے کہ چاقو کے ساتھ کانٹے سے ہوتے ہیں۔  
 رونے کا مزاج ہوتا ہے اور صفراوی تے ہوتی ہے۔

پلاٹینا (Platina): حیض بہت جلد اور افراط کے ساتھ ہوتا ہے اور درد زہ جیسا درد ہوتا ہے  
 اور اینٹن ہوتی ہے، سیاہ مواد خارج ہوتا ہے جو کہ لیکوریا کے بعد ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی  
 ہے، کم خوابی ہوتی ہے۔ مریضہ ٹکی مزاج ہوتی ہے اور احساس برتری کا شکار ہوتی ہے۔ اینٹن  
 ہوتی ہے، درد قونچ ہوتا ہے، جس کے ساتھ لب ہائے فرج کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، جاگھ میں  
 کھینچ ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے اور متواتر پیشاب کرنے کی خواہش رہتی ہے۔

سلفر (Sulphur): گھٹے ہوئے اور پُر درد حیض، پریشانی کے ساتھ ہوتے ہیں، بندش ہوتی ہے،  
 قبض ہوتی ہے اور پیٹ میں تناؤ ہوتا ہے۔ جب دیگر منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ  
 ایک طبی دوا ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): پُر درد حیض ہوتے ہیں جن کے ساتھ باافراط خون جاری  
 ہوتا ہے۔ نہ صرف رحم سے بلکہ ناک، چھاتی، منہ وغیرہ سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے۔

### بدبودار (حیض) — (Offensive)

**پلائینا (Platina):** بدبودار اور متعفن حیض ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیلان خون کے ساتھ اسقاط حمل کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔

**کروٹیل (Crotalus):** رکے ہوئے اور گلے سڑے مواد والے بدبودار حیض ہوتے ہیں۔

**لیکسیس (Lachesis):** بیض دانوں کے مرض کے ساتھ بدبودار حیض ہوتے ہیں۔

**لیلیئم ٹگ (Lilium Tig):** جلد جلد آنے والے، کم مقدار والے، گہرے رنگ والے، لوتھڑوں والے، بدبودار حیض ہوتے ہیں۔ خون صرف اسی وقت جاری ہوتا ہے جب مریض حرکت کرتی ہے، نیچے کی طرف دبائے کا احساس ہوتا ہے۔

**کولو سنٹھ (Colocynth):** بیض دانوں کی رسولی میں بدبودار حیض لاحق ہوں۔

**سلفر (Sulphur):** کھٹی بو والے حیض۔

**کالی کارب (Kali Carb):** پیٹ میں جاڑے اور اینٹھن والے دردوں کے ساتھ تیزبو والے حیض ہوتے ہیں۔

### قبل از وقت (حیض) — (Premature)

**کلکیریا فاس (Calcareo Phos):** مناسب عمر سے پہلے کمزور و لاغر لڑکیوں میں حیض ہوتے ہیں، حیض بہت جلدی، بہت زیادہ اور چمکیلے ہوتے ہیں۔ اگر تاخیر سے ہوں تو خون گہرے رنگ کا ہوتا ہے، لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوتا ہے۔

**سابینا (Sabina):** مناسب عمر سے پہلے ہی حیض لاحق ہوں، جو کہ باافراط اور چمکیلے سرخ ہوتے ہیں، رحم کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

**کلکیریا کارب (Calcareo Carb):** چھوٹی لڑکیوں میں حیض، جس کے ساتھ خارش اور جلن ہوتی ہے، حیض سے پہلے بھی اور حیض کے بعد بھی دودھ کی طرح کا لیکوریا ہوتا ہے۔ درد سر ہوتا ہے، اور حیض سے پہلے درد قویٰ ہوتا ہے۔

**کاربو ویج (Carbo Veg):** قبل از وقت اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ حیض آتے ہیں، خون پیلا ہوتا ہے، لب ہائے فرج سوجے ہوتے ہیں، حیض کے دوران ہاتھوں اور پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن ہوتی ہے۔

## بافراط (حیض)

### Profuse (Menorrhagia or Malomrhagia)

چائنا (China): حد اعتدال سے زیادہ خون بننے کے لئے اور حیض کا دورانیہ لمبا ہونے کے لئے یہ چینی کی دوا ہے۔ اسے سب سے پہلے استعمال کرنا چاہئے۔ خصوصاً جب مریض لاغر کمزور ہو۔

رہس اروماتیکا (Rhus Aromatica): رحم کی کمزور حالت کے باعث سیلان خون ہوتا ہے، درختچر کی قطروں والی خوراکیں دیجئے۔

تھلاپی برساکیو (Thlaspi Bursa Q): سیلان خون آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہی اور پھر بہت زیادہ افراط کے ساتھ بننے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ مریض بے انتہا کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ بمشکل ہی اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرتی ہے کہ اگلے مہینے کا خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درختچر کی قطروں والی خوراک دیجئے۔

میچلا (Mitchella): متواتر پیشاب آنے کے ساتھ حیض کا خون آتا ہے، پیشاب آزادانہ اور پُر اجبو نہیں ہوتا، پر درد پیشاب آنے کے ساتھ خون چکیلا سرخ ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): وقت سے پہلے اور بافراط حیض ہوتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ کہ جیسے ہر چیز اندام نمائی سے خارج ہو کر گر پڑے گی، گندی بو والا جما ہوا خون خارج ہوتا ہے۔ سر میں ٹپکن والا درد ہوتا ہے اور چہرہ سرخ اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): سیاہ خون کا بافراط اخراج ہوتا ہے، خون جما ہوا لوتھڑے دار ہوتا ہے، پیٹ میں، رانوں میں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں کھینچنے والے درد ہوتے ہیں۔ مریض باتونی ہوتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): ہر پندرہ دن کے بعد طویل دورانیے والے حیض ہوتے ہیں، پیٹ میں اینٹھن اور سختی ہوتی ہے، ہسٹیریا ہوتا ہے، غشی کے ساتھ مٹکی ہوتی ہے، روشنی برداشت نہیں ہوتی، نظر دھندلی ہو جاتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica): جب بافراط خون کھچاؤ کے ساتھ جاری ہوتا ہے، غلط اقدام یا دوسری میکانیکی چوٹ کے باعث ہوتا ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): کھینچنے والے اینٹھن والے درد قویٰ کے ساتھ، بافراط حیض جاری ہوتا ہے، درد قویٰ پیٹ کے اطراف میں ہوتا ہے۔

راتانتیا (Ratanhia): پیٹ اور جانگھ میں درد کے ساتھ رحم سے سیلان خون ہوتا ہے،

اعضائے ناسل کی طرف نیچے کو دباؤ ہوتا ہے، اس کے بعد لیکو ریالاق ہو جاتا ہے۔  
سیلیشا (Silicea): ہر مرتبہ جب بچہ پستان منہ میں لیتا ہے تو اندام نسائی سے خون جاری ہو جاتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): گرمے رنگ کے لو تھڑے اور سخت قسم کے دردوں کے ساتھ اعتدال سے زیادہ خون جاری ہوتا ہے، جب خون کا اجراء شروع ہوتا ہے اور لو تھڑے خارج ہوتے ہیں تو درد میں افتادہ ہو جاتا ہے۔ گرمی اور گرم موسم کے دوران بہتری ہوتی ہے، ٹھنڈ میں بہتری ہوتی ہے۔ ناخوشگوار بو کے ساتھ با افراط پیسے آتے ہیں، پستان غیر مکمل نشوونما یافتہ یا ناکافی نشوونما یافتہ ہوتے ہیں۔

وسکم الیم (viscum Album): با افراط خون جاری ہوتا ہے جو کہ ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔

ایپی ہسٹری نیم (Epihysterinum): ریشوں والی رسولی کے باعث با افراط سیلان خون ہوتا ہے۔

ایلی ٹریس فارینوسا (Aletris Farinosa): حیض با افراط اور قبل از وقت ہوتے ہیں جو کہ رحم کی ناطاقی والی حالت کے باعث ہوتے ہیں، حیضوں کی غیر موجودگی والے درد، درد زہ کی طرح ہوتے ہیں۔ رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث خفاہت ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پن لاحق ہوتا ہے۔ طبعی اسقاط حمل کا رجحان ہوتا ہے۔ خروج رحم ہوتا ہے، قبض ہوتی ہے، غذا سے نفرت ہوتی ہے، مٹلی اور بد ہضمی ہوتی ہے، رحم سے جریان خون ہوتا ہے، یہ کیفیت اسقاط حمل کے بعد ہو سکتی ہے یا اس کا تعلق حیضوں سے ہو سکتا ہے۔ با افراط سیلان خون سے پہلے بڑے بڑے خون کے لو تھڑے خارج ہوتے ہیں۔

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): اعصابی مستورات میں معمولی سے کھنچاؤ کے ساتھ دو حیضوں کے درمیان خون جاری ہوتا ہے۔ بہت جلد اور بہت افراط کے ساتھ وقت سے سات روز پہلے حیض جاری ہو جاتا ہے اور پھر شدید قسم کی خارش دکھن اور سوجن اعضائے ناسل میں ہو جاتی ہے۔

فائیگیس ریل (Ficus Rel): خون با افراط جاری ہوتا ہے جو کہ رحم سمیت جسم کے کسی بھی حصہ سے جاری ہو جاتا ہے جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی۔

کریوزوٹ (Kreosote): کوئی چیز اٹھانے کے باعث بہت زیادہ تھکاوٹ کے باعث اور ہمیشہ بجماعت کے بعد رحم سے خون جاری ہوتا ہے۔ بجماعت کے دوران کوئی درد نہیں ہوتا۔ حیض باقاعدہ ہوتے ہیں لیکن با افراط اور لو تھڑوں والے ہوتے ہیں، بعض اوقات سیاہ رنگت والے

بہت زیادہ متعفن ہوتے ہیں۔ اعضاءے تناسل اور رانوں میں کچا پن پیدا ہوتا ہے، حیض رک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، بہت جلد شروع ہوتے ہیں اور بہت دیر تک رہتے ہیں۔ مسلسل دکھن والا دھم درد کمر میں ہوتا ہے، خون جاری ہونے کے ایک دن بعد سر کے بائیں جانب خوفناک درد ہوتا ہے، دودھ جیسا لیکوریا ہوتا ہے۔ حیض صرف اس وقت ہوتے ہیں جب مریض لیٹی ہوتی ہے، بیٹھنے سے یا چلنے سے حیض رک جاتے ہیں۔

**سابینا (Sabina):** نیچے کو دبانے کے احساس کے ساتھ خون جاری ہوتا ہے، بعض اوقات حیض کا آئندہ دور شروع ہونے تک خون جاری رہتا ہے۔ گنٹھیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اولٹا بدلتا ہوا سیلان خون ہوتا ہے، سیلان خون گنٹھیا کے رکنے پر شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے برعکس ہوتا ہے۔

**کاربو انیمالس (Carbo Animalis):** حیض بہت جلدی، بہت طویل اور باافراط ہوتے ہیں، ہر حیض کے جاری ہونے کے ساتھ شدید قسم کی نفاست ہو جاتی ہے، اندام نہانی میں جلن ہوتی ہے جیسے کہ اس پر جلا کوئلہ رکھ دیا گیا ہو۔ جیسے ہی مریض پستان بچے کے منہ میں دیتی ہے خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔

**کاربو ویج (Carbo Veg):** ملاقات کے فقدان کے باعث رحم میں سکڑنے کی اہلیت نہیں ہوتی جس کے باعث خون جاری ہو جاتا ہے، یہ کیفیت زچگی، حیض یا حادثاتی سیلان خون کے بعد ہو سکتی ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** ٹھنڈے پانی کی ناقابل برداشت پیاس کے ساتھ سیلان خون لاحق ہوتا ہے، سرگرم ہوتا ہے۔

**امونیا کارب (Ammonia Carb):** حیض بہت جلد ہوتے ہیں، خون سیاہی مائل ہوتا ہے، اکثر خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں۔ لیکوریا خراش دار ہوتا ہے، اعضاءے تناسل میں سوجن ہوتی ہے، حیض سے پہلے جکڑن اور درد قونچ ہوتا ہے۔ حیض کے ہر دورے میں اعضاءے مستقیم سے خون بہتا ہے۔

**امونیا ایم (Ammonia M):** آنٹوں اور اعضاءے مستقیم سے جریان خون کے ساتھ حیض ہوتے ہیں، خصوصاً زرد رنگت والی بیمار اور کمزور مستورات میں، حیض جلد جلد ہوتے ہیں اور ہر ماہ کمر میں درد کے ساتھ ہوتے ہیں، خون کا سیلان رات کے وقت ہوتا ہے۔

**سیکیل کار (Secale Cor):** سیاہ رنگ کے خون کا سیلان باافراط ہوتا ہے جس کے ساتھ بازوؤں اور ٹانگوں میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دہلی پتلی مستورات میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے جو کہ گرمی سے ہمیشہ بیمار ہوتی ہیں۔ مریض کپڑے اتارنا چاہتی ہے اور خود کو ٹھنڈا کرنا چاہتی

ہے، حیض کا خون پتلا اور متعفن ہوتا ہے، خون میں لو تھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔  
اسٹیلگو (Ustilago): رحم کے اندر کی جانب جھکے ہونے کے باعث سیلان خون ہوتا ہے، خون  
 چمکیلا سرخ جس کا کچھ حصہ مانع اور کچھ حصہ لو تھڑوں والا ہوتا ہے، معائنہ کرنے والے کی انگلی  
 کو مریضہ کا رحم نرم اور اسفنجی محسوس ہوتا ہے۔

ٹرلیئم (Trillium): سیلان خون چمکیلا سرخ اور باافراط ہوتا ہے جس کے ساتھ معدے کے  
 بالائی حصہ میں غشی کا احساس ہوتا ہے۔ کمر درد ہوتا ہے، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نبض  
 تیز رفتار اور نرم ہونے کے ساتھ نقاہت ہوتی ہے، رحم کے ریشوں کی تکلیف کے باعث جریان  
 خون ہوتا ہے۔ یہ دوا جریان خون کو روک دیتی ہے اور ریشوں کی نشوونما کو جذب کر لیتی ہے۔  
اکونائٹ این (Aconite N): جب تیزی کے ساتھ چمکیلا سرخ خون خارج ہونے کے ساتھ  
 موت کا خوف لاحق ہو۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): حیض بہت جلدی اور بہت افراط کے ساتھ جاری ہوتے ہیں جو  
 دیر تک رہتے ہیں جن کے باعث مریضہ کو نقاہت ہو جاتی ہے۔

ایپیکاک (Ipec): شدید نقاہت کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے، چمکیلا سرخ خون ایک دھار کی  
 صورت میں بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے جو کہ کپڑوں اور بستر میں سے گزر کر فرش پر ایک  
 تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ خون جلدی سے نہیں جمتا، مریضہ پہلی ہوتی ہے، اس  
 کا جی مٹلاتا ہے اور غشی ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی یا 1M طاقت کی خوراک ہر پندرہ منٹ کے  
 بعد دینے سے یہاں تک کہ افاقہ شروع ہو جائے اور پھر دوا روک دیجئے۔

پلاٹینم (Platinum): حیض 4 یا 6 دن پہلے جاری ہو جاتے ہیں اور بہت افراط کے ساتھ  
 ہوتے ہیں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): رحمی جریان خون ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے لو تھڑوں  
 اور چمکیلے سرخ مانع کے ساتھ ملا جلا ہوتا ہے اور بہت افراط کے ساتھ ہوتا ہے، ذہنی صدمہ  
 سیلان خون کا باعث بنتا ہے۔ پاؤں ٹھنڈے مرطوب ہوتے ہیں، یہ دوا ایسی حالت میں ناگزیر ہو  
 جاتی ہے جبکہ حیض معمول کے دنوں سے چند روز پیشتر ہی ظاہر ہو جائیں خصوصاً جب خون کا  
 بہاؤ نمایاں طور پر زیادہ ہو۔

ونکامائنر (Vincaminor): باافراط حیض جاری ہوتے ہیں یا بغیر رک کے کثرت کے ساتھ حیض  
 جاری ہوں جبکہ خون مسلسل ایک دھار کی صورت میں بہتا ہے جس کے ساتھ شدید ہسم کی  
 نقاہت ہو جاتی ہے۔

کوکولس انڈیکا (Coccul Ind): غم اور پریشانی کے باعث بہت زیادہ لاغر مستورات میں

بہت زیادہ جلد اور بہت دیر تک رہنے والے حیض۔  
فر-لنکسی نس امیریکانہ (Fraxinus Americana): بے انتہا دروں والے حیض 'یہ حیض مؤخر ہوتا ہے لیکن باافراط ہوتا ہے 'یہ 5 سے 12 ہفتوں کے وقفے سے آتا ہے۔

### کم مقدار (حیض) — (Scanty)

سائیکل من (Cyclamen): کم مقدار والے حیض جن کے ساتھ چکر آئیں اور درد سر ہو 'بیٹ میں خرفاک قسم کا درد ہوتا ہے 'جو کبھی بڑی سے شروع ہو کر بیٹ کے دونوں جانب پیڑو تک پھیل جاتا ہے 'حیض بے قاعدہ ہوتے ہیں جو کہ کئی مہینوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ مریضہ 'تھکن' دل شکستہ ہوتی ہے 'کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی 'ست ہوتی ہے۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): مؤخر اور کم مقدار والے حیض 'سائیکل من والی تمام علامات کے ساتھ سوائے اس کے کہ پلساٹیل کے مریضہ پیشہ کھلی ہوا میں بستر ہو جاتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): قبض اور جلد کے پھوٹے پھینوں کے رجحان اور ختمناہٹ کے ساتھ حیض مؤخر ہوتے ہیں۔ دوسرے پہلے بیٹ کے گڑھے میں معدہ خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

الیومنا (Alumina): مستورات کی مکمل جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کے بعد کم مقدار والے حیض ہوتے ہیں 'دو حیضوں کے درمیان لیکوریا لاحق ہوتا ہے جو کہ باافراط 'خراش دار اور پھیلنے والا ہوتا ہے اور بہت کراڑیوں تک چلا جاتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): کبھی کبھی ہونے والے حیض جو بہت پہلے اور بہت تھوڑے دورانیے والے ہوتے ہیں۔ بیٹ میں درد ہوتے ہیں 'رحم میں اینٹھن ہوتی ہے 'بازوؤں اور ٹانگوں میں گٹھیاوی درد ہوتا ہے 'ہاتھ اور پاؤں میں استسقالی سوجن ہوتی ہے 'کم مقدار والا حیض دیگر تکلیفات کے ساتھ ہوتا ہے مثلاً درد سر اور جلدی بیماریاں۔

مینگانم (Manganum): کم مقدار والے حیض اور متواتر ہونے والے حیض خون کی کمی والی لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): ٹھیلی جلد والی مریضوں میں قبض کے ساتھ کم مقدار والے حیض ہوتے ہیں۔

اکٹیارلیس موسا (Actea Racemosa): حیض کم مقدار والے 'گہرے رنگ والے اور جے ہوئے خون والے ہوتے ہیں 'شدید قسم کی عام کمزوری ہوتی ہے 'دو حیضوں کے درمیان کم مقدار کا سیلان خون ہوتا ہے۔

**گن پاؤڈر (Gunpowder):** کم مقدار والے اور بڑے درد حیضوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ سیلان خون رک جاتا ہے اور پھر ۱۲ گھنٹوں کے بعد جاری ہو جاتا ہے۔ 3x طاقت کی دوا دیکھئے۔

دودھ — (Milk)

(”پستان“ کے ذیل میں دیکھئے)

**ابھار (فرج سے اوپر والی جگہ)**

Mons Veneris (Projection of the Lower Part  
of the Abdomen Over the Vulva)

**پلائٹینا (Platina):** جبکہ ٹھنڈی اور پھونے سے احتیال سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ رومال برداشت نہیں ہو سکتا۔ اندام نہانی یا رحم پر مسلسل دباؤ پڑتا ہے۔ جبکہ بڑے درد ہوتی ہے۔  
**کورنیم (Cornium):** بڑے بڑے کیل مہاسے ہوتے ہیں جو پھونے سے درد کرتے ہیں۔ خارش ہوتی ہے۔

**جنسی جنون — (Nymphomania)**

(تیز دیکھئے ”خواہش۔ بڑھی ہوئی“)

**پلائٹینا (Platina):** بڑھی ہوئی خواہش جماع کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً زچگی کے بعد والی مستورات میں یا حمل کے دوران۔

**فاسفورس (Phosphorus):** اگر پلائٹینا تکام ہو جائے تو اسے آزمایا جاسکتا ہے۔

**نکس وامیکا (Nux Vomica):** خود لذتی کے بعد (یعنی جلق کے بعد)۔

**اگیریکس ایم (Agar. M):** ہم آغوش ہونے کی شدید خواہش کے ساتھ اعضاء میں خارش اور بیجان ہوتا ہے۔

**سپیا، پلساٹیل (Sepia, Pulsatilla):** جب یہ تکلیف لیکوریا کے ساتھ ہو، دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات استعمال کیجئے۔

**گریشیولا (Gratiola):** مستورات میں بڑھی ہوئی خواہش جماع اور جلق کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔



ہائوسکیمس (Hyoscyamus): حیا کے فقدان کے ساتھ جماع کی بڑھی ہوئی خواہش۔  
 میوریکس (Murex): جنسی اعضاء میں شدید قسم کا جوش ہوتا ہے اور ہم آغوش ہونے کی  
 اعتدال سے بڑھی ہوئی خواہش ہوتی ہے، اعضاء کو معمولی سا چھونے کے باعث شدید قسم کا  
 جنسی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔  
 کیلیڈیم (Caladium): پیٹ کے کیزوں کے باعث بڑھی ہوئی خواہش جماع، یہ کیزے اندام  
 نہائی میں ریگکتے ہیں اور بیجان کا باعث بنتے ہیں۔  
 زنک (Zinc): حد اعتدال سے بڑھا ہوا جنسی بیجان جو مریضہ کو جلق کی طرف کھینچ کر لے جاتا  
 ہے۔  
 اوری کینم (Origanum): عظیم جنسی جوش جو مریضہ کو خود لذتی کی طرف لے جاتا ہے۔  
 مریضہ مشکل ہی سے ایک دن اس میں ملوث ہوئے بغیر گزارتی ہے۔ بھاگ جانے کی تحریک  
 ہوتی ہے۔  
 سلفر (Sulphur): خود لذتی یا جلق کی خواہش کے ساتھ بڑھی ہوئی خواہش جماع۔  
 سٹرامونیم (Stramonium): حیض کے وقت بڑھی ہوئی خواہش جماع۔  
 کلکیر یا کارب (Calcarea Carb): ذہنی جوش کے ساتھ نہ کہ جسمانی جوش کے ساتھ  
 جماع کی بڑھی ہوئی خواہش۔

### بیضہ دانیاں — (Ovaries)

(یہ دیکھئے ”رحم کی یا بیضہ دان کی سوزش“)

اپیس مل (Apis Mel): نیچے کی جانب ران کے سن ہو جانے کے ساتھ یا اس کے بغیر دائیں  
 بیضہ دانی میں اجتماع خون اور سوزش ہوتی ہے۔ چھاتی میں تنگی ہوتی ہے اور اضطرابی کھانسی  
 بھی موجود ہو سکتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): بیضہ دانوں کی حاد سوزش چپکن والے درد ہوتے ہیں، دائیں جانب  
 اتھری ہوتی ہے، معمولی سا جھٹے سے درد ہوتا ہے، اعتماد رے کی حساسیت ہوتی ہے۔

لیکیسس (Lachesis): بائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے جس میں رحم سے اخراج ہونے کے  
 باعث اتفاق ہوتا ہے، رحم کے علاقہ میں بھاری پن برداشت نہیں ہو سکتا، یہ دوا دائیں بیضہ دانی  
 کی تکلیف میں بھی مفید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ بائیں بیضہ دانی والی دی گئی تمام علامات موجود ہوں۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): جلن دار شدید درد بیضہ دانیوں میں ہوتے ہیں جن میں  
 اتفاق گرم چیرس لگانے سے ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، مختصر وقفوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی

مقدار کے لئے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

پلاٹینم (Platinum): بیضہ دانوں میں جلن دار درد ہوتے ہیں جس کے ساتھ حساسیت ہوتی ہے اور جنسی جوش ہوتا ہے 'دباؤ درد میں اضافہ کر دیتا ہے۔

لیلیئم تلک (Lilium Tig): بیضہ دانوں کا اعصابی درد ہوتا ہے 'بیضہ دانوں سے شروع ہو کر جلن دار درد پیٹ میں اوپر کی جانب اور رانوں میں نیچے کی جانب پھیلتا ہے۔ کوئی نکلنے جیسے درد بائیں بیضہ دانی سے شروع ہو کر پیڑو تک یا اوپر پستانوں تک چلے جاتے ہیں۔

کولوسنتھ (Colocynth): بیضہ دانیوں والا درد قویٰ ہوتا ہے 'جکڑن والے درد ہوتے ہیں 'جن میں افادہ جھک کر دہرا ہونے سے ہوتا ہے۔

آئیوڈین (Iodine): پستانوں کے گھٹتے گھٹتے کم ہو جانے کے باعث دائیں بیضہ دانی میں اجتماع خون اور استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ مدہم دبانے والا درد رحم تک پھیل جاتا ہے۔ فائدہ ٹھکنے جیسا درد دائیں بیضہ دانی کے علاقہ میں ہوتا ہے۔

اوفوریم (Oophorium): بیضہ دانی میں تھیلی ہونے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

پالادیئم (Palladium): دائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے جس میں افادہ سخت دباؤ سے ہوتا ہے۔

کنچریس (Canchris): دائیں بیضہ دانی میں سوزش اور درد ہوتا ہے 'اخراج گہرے رنگ کا اور گندا ہوتا ہے جس کے ساتھ دائیں بیضہ دانی میں اینٹھن ہوتی ہے۔

بیوفو (Bufo): بیضہ دانیوں میں جلن دار گرمی اور درد ہوتا ہے جو کہ پھیل کر نیچے کو رانوں تک چلا جاتا ہے۔ بیضہ دانیوں کے قریب تھیلیاں اور کیڑے ہونے کے ساتھ حیض کی عدم موجودگی ہوتی ہے۔

کاربونیم سلف (Carboneum Sulph): بیضہ دانیوں کی کمزوری ہوتی ہے 'ہملا سے بے زاری ہوتی ہے۔ لب ہائے فرج میں خارش ہوتی ہے۔

زینتھو کسی لم (Xanthoxylum): بیضہ دانیوں کا اعصابی درد ہوتا ہے۔ حیض بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور پُر درد ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیریں پیٹ میں اور جاگھ میں درد ہوتا ہے۔

باختر ناقص ہوتا ہے 'بے خوابی ہوتی ہے 'چاند میں درد سر ہوتا ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): دائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے جو گرم کپڑوں سے ڈھانپنے سے بہتر ہوتا ہے اور پسینے آنے سے دور ہوتا ہے 'بیضہ دانیوں میں ڈنک نکلنے جیسے 'پھاڑنے جیسے اور کاٹنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

وے سپا (Vespa): متواتر جلن دار پیشاب آنے کے ساتھ بائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے '

اندام نسائی کے بیرونی سوراخ کے ارد گرد پھیلن ہوتی ہے۔

## حمل — (Pregnancy)

### اسقاط (حمل) — (Abortion)

اکونائٹ این (Aconite N): خوفناک خوابوں کے باعث اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے مثلاً لیروں کے خواب، آگ یا سمندر میں ڈوبنے وغیرہ کے خواب ہوتے ہیں۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): غلط قدم یا بھاری وزن اٹھانے کے باعث یا دیگر جسمانی جھٹکن، جلوس، مگرنے، خراشوں یا چوٹوں کے لگنے کے باعث اسقاط حمل ہوتا ہے۔

سابینا (Sabina): ہر مرتبہ دوسرے یا تیسرے مہینے میں اسقاط حمل ہو جانے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ اسقاط حمل کی عادت ہوتی ہے۔ کمرے رنگ کا خون خارج ہوتا ہے۔ چھوٹی کمر میں اور اعضائے تناسل میں درد ہوتا ہے۔

وایبرنم پرو (Viburnum Pru): اسقاط حمل کر روکنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً آنکھیں مہینے میں جب کہ بچے پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے ہیں۔ یہ دوا ایسی ادویات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے جن کے کھانے سے اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے۔ کوئی عورت اسقاط نہیں کر سکتی اگر اسے یہ دوا استعمال کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔

سپیا (Sepia): پانچویں سے ساتویں مہینے کے دوران اسقاط حمل لاحق ہو، مریضہ کمزور اور نازک ہوتی ہے، لیکوریا اور قبض والا مزاج ہوتا ہے۔

جلسی میم (Gelsemium): ذہنی جوش کے باعث اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے، درد پیٹ سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور کمر میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔

اورم میور۔ نیٹرم (Aurum Mur. Nat): گردن رحم کی سختی کے باعث جب اسقاط حمل ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جوش والے اسقاط حمل کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے، یہ دوا 1x ذاتی لیوشن میں ایک مہینہ کے لئے دی جاتی ہے۔ 30 ذاتی لیوشن میں اگر یہ دوا دی جائے تو اسقاط حمل کو روک دیتی ہے۔ مریضہ بزدل، ٹھنڈی ہوتی ہے، جسے پیاس نہیں لگتی، اخراج وقفہ دار ہوتا ہے۔

کروکس (Crocus): تیسرے مہینے میں اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے

پیٹ میں کوئی زخمہ چھڑ موجود ہو۔

تھلاپی (Thlaspi): ایسا اسقاط حمل جس کے شروع میں خون جاری ہوتا ہے، 'در ٹچر' استعمال کیجئے۔

گوسی ہلم (Gossypium): یہ ایک دوسری دوا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بتدریج لاحق ہونے والے اسقاط حمل کے لئے مفید ہوتی ہے۔ یہ دوا در ٹچر کے قطروں والی خوراکیوں کی صورت میں دینی چاہئے۔

کلیریا کارب (Calcarea Carb): افراط دم (کثیر مقدار میں خون) والی مستورات میں بلا افراط اور قبل از وقت حیضوں کے ساتھ لیکوریا کا مزاج ہوتا ہے۔ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔  
کیمفر (Camphor): پتلی جسامت والی مستورات کے لئے یہ ایک موزوں دوا ہے۔ جو لیکوریا کے لئے مددگار ہوتی ہے۔ چھاتی میں ٹھنڈک ہوتی ہے یا سر میں ٹھنڈک ہوتی ہے یا نرلاوی ماوے خارج ہوتے ہیں۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): سبز رنگ والی مریضوں کے لئے یہ موزوں دوا ہے۔ جن میں حیض رک جاتا ہے اور وہ لیکوریا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

ایپیکاک (Ipec): چمکیلے سرخ خون کے مسلسل اخراج کے ساتھ درد قویخ اور پیٹ میں کانٹے والے درد کے ساتھ حاویان خون ہوتا ہے رتم بہ شدید دیا ہوتا ہے۔

پلاٹینا (Platina): جب اپنی کاک ٹاکم ہو جائے تو اسے آزمایا جاسکتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): جب رتم میں عضلاتی مرض لاحق ہو چکا ہو یا طاقت میں کمی واضح ہو گئی ہو۔ پتلی دلی اور تھکی ہوئی مستورات کے لئے موزوں دوا ہے، اسقاط حمل تیسرے مہینے میں ہوتا ہے۔

نوٹ: یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہئے کہ ہومیو پیتھی میں کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو امراض کو پیدا کرے۔ لہذا اسقاط حمل پیدا کرنے میں ٹاکمی ایک عام اصول ہو گا۔ تاہم اوپر دی گئی ادویات ایسے کیسوں میں آزمائی جاسکتی ہیں جن میں مریضہ کی صحت کے اعتبار سے ان ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت مند عورتوں میں اسقاط حمل کا باعث بننا ایک جرم ہے۔

### البیومن کا اخراج (دوران حمل)

(Albuminuria)

اپیس مل (Apis Mel): حمل کے دوران پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے جس کے لئے یہ چھٹی کی دوا ہے۔

کینٹھرس (Cantharis): جلن دار پیشاب ہوتا ہے نیز پیشاب جلتا ہے اور اس کے ساتھ ایلیومن خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔  
ایونی من (Euonymin): دوران حمل پیشاب کے ساتھ ایلیومن خارج ہو۔ ۲ گرین 1x کی خوراک آدھے گلاس پانی میں ملائیں اور ہر گھنٹے کے بعد ایک چھوٹا چمچ خوراک دیں۔  
ہیلونیا (Helonias): دوران حمل پیشاب میں ایلیومن خارج ہو۔  
ٹیری ستم (Terebinth): پیشاب کی بندش کے ساتھ یا پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہونے کے ساتھ ایلیومن خارج ہوتا ہے۔  
مرکیورس کار (Mercurius Cor): حمل میں گردوں کی سوزش کے ساتھ ایلیومن کا اخراج۔  
فسفورس (Phosphorus): تاخیری حمل میں اور حمل کا زمانہ پورا ہو جانے پر ایلیومن خارج ہوتا ہے۔

### مقعد (دوران حمل) — (Anus)

کیپسکیم (Capsicum): دوران حمل مقعد میں جلن ہوتی ہے۔

### نفرت، بیزاری (دوران حمل) — (Aversion)

سپیا (Sepia): حمل میں روٹی سے نفرت ہوتی ہے۔ غذا کے متعلق مریضہ سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس سے وہ بیمار ہو جاتی ہے۔  
لاروسیرا کس (Laurocerasus): دوران حمل غذا سے نفرت ہوتی ہے۔

### نیچے کو دباؤ (خروج)

#### Bearing Down (Prolapsus)

(نیز دیکھئے "رحم" کے ذیل میں "نیچے کو دباؤ")

سپیا (Sepia): نیچے کی جانب دباؤ کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے خواہ حمل میں یا اس کے بغیر ہو۔ ساتویں مہینے میں درد نہ جیسے درد ہوتے ہیں۔ اونچے درجے کی دوا دیجئے۔ مثلاً 1000 یا CM طاقت کی دوا۔

سرساپارٹا (Sarsaparilla): کمر میں کھینچنے والا درد ہوتا ہے جس کی لہریں ہاتھوں، پاؤں اور انگوٹھوں تک جاتی ہوں، پاخانہ کرنے سے پہلے اور پاخانہ کرنے کے دوران کمر میں شدید درد

ہوتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): چھوٹی کمر میں شدید درد ہوتا ہے جیسا کہ کوئی بوجھ پیڑڈ میں رکھا ہو۔ طاقت کی ایک خوراک دیجئے اور تین یا چار دن تک انتظار کیجئے۔

سیکیل کار (Secale Cor): متواتر اور دیر تک رہنے والا زور دار درد ہوتا ہے۔ جسمانی سائت پکی اور مزاج خراب ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): بچے کو دہانے کے احساس کے ساتھ درد زہ جیسے درد ہوتے ہیں یہ رات کی چوکیداری یا ذہنی تکاؤ کے باعث ہو سکتا ہے۔

اسٹیلگو (Ustilago): یہ دوا پُر درد اور طویل حمل کے لئے مفید ہوتی ہے۔

### تنفس (دوران حمل) — Breathing

نکس دامیکا (Nux Vom): دوران حمل تنفس میں دقت ہوتی ہے۔

### کھانسی (دوران حمل) — Cough

کالی بانیکرام (Kali Bi): کمروری مسلسل کھانسی ہوتی ہے۔ اعصابی کھانسی ہوتی ہے جس سے استقامتِ حمل کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

کالی بروم (Kali Brom): حاملہ مستورات کی اضطرابی کھانسی رات کے وقت خشک تھکا دینے والی کھانسی ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): خشک کھانسی ہوتی ہے۔

کونیم (Conium): مسلسل خشک کھانسی ہوتی ہے جس میں ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔ نیز بولنے سے یا چلنے سے ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): کمروری کھانسی خشک چہرہ پر تتمہاٹ ہوتی ہے۔

### موت (کا خوف دوران حمل) — Death

اکونائٹ این (Aconite N): دوران حمل موت کا خوف ہوتا ہے۔ 200 ڈاکی لیوشن کی دوا استعمال کیجئے۔ چار گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ دوا تین خوراکیں کافی ہوں گی۔

### خواہش (دوران حمل) — Desire

ورٹرم البم (Veratrum Alb): تیزابیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر چیز ٹھنڈی ٹھیکین پسند

کرتی ہے یا غذا۔  
 سلفر (Sulphur): شکر یا اچار کی خواہش ہوتی ہے۔  
 مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): مخصوص قسم کی غذا کی خواہش ہوتی ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrur Mur): نمک اور نمکین غذا کی خواہش ہوتی ہے۔  
 چیلی ڈونیم (Chelidonium): غیر معمولی غذا کی اشیاء کی خواہش ہوتی ہے۔  
 نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): مٹی یا چاک یا چونے کی خواہش ہوتی ہے۔  
 ایومینا (Alumina): کوئلے چاک یا چونے کی خواہش ہوتی ہے۔

### استسقاء — Dropsy

اپیس (Apis): پاؤں اور چہرے کی استسقائی سوجن کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔  
 ایپوسائٹم (Apocynum): جب استسقاء جگر کے باعث ہو۔ پیاس ہوتی ہے اور مریضہ کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتی ہے۔  
 آرسینک البم (Ars Alb): دل کی تکلیف کے باعث استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ بس کے ساتھ مختصر وقفوں کے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔  
 ڈیجی ٹالس (Digitalis): دل کی دھڑکن کے ساتھ استسقاء لاحق ہوتا ہے۔

### غلط تصور (حمل کا)

(False Conception)

کروکس (Crocus): رحم میں جنین کی شدید حرکات محسوس ہوتی ہیں یا خیالی حمل ہوتا ہے۔  
 کالوفیلیم (Caulophyllum): غلط تصور، خیالی حمل۔

### جنین — اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور حرکت کرنا

(Foetus-Displacement and Movement of)

پلساٹیل (Pulsatilla): جنین کو یا بچے کو صحیح جگہ رکھنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچے کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جائیں۔ تب بھی اس دوا سے افادہ ہوتا ہے۔  
 کالوفیلیم (Caulophyllum): جب حرکات رک پھلی ہوں۔

کروکس (Crocus): جب حرکات بہت شدید اور پرورد ہوتی ہیں۔  
 تھوجا (Thuja): ساتویں یا آٹھویں مہینے کے دوران بچے کی شدید حرکات جو ماں کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ جس کے ساتھ پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔  
 آرنیکا ایم (Arnica M): جب رحم میں حساسیت، دکھن اور نرمی کا احساس ہوتا ہے۔ جو کہ جنین کے حرکت کرنے کے باعث ہوتا ہے۔  
 لائیو پوڈیم (Lycopodium): رحم میں جنین ہوتا ہے جس کے باعث حد اعتدال سے بڑھی ہوئی حرکات سے غلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔  
 سلفر (Sulphur): رحم میں جنین اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کے مار رہا ہو۔

### پاگل پن (دوران حمل) — Insanity

سٹرامونیم (Stramonium): حمل کے دوران پاگل پن لاحق ہوتا ہے۔ 200 ڈالی لیوٹن کی دوا دیجئے۔

### وضع حمل کے درد (غلط) (False)

#### Labour Pains

(دیکھئے ”وضع حمل“ کے ذیل میں)

### زندہ پیدائش — Living Birth

اکٹیاریسی موسا (Actea Racemosa): اس دوا سے زندہ بچوں کی پیدائش چھینی ہوتی ہے۔ ایسی مستورات میں جو پہلے مردہ بچے پیدا کر چکی ہوں۔

### درد (دوران حمل) — Pain

واہیرنم اوپ (Viburnum Op): دوران حمل پیٹ میں اور ٹانگوں میں درد یا اینٹھن ہوتی ہے۔

### بے خوابی (دوران حمل) — Sleeplessness

اناکارڈیم (Anacardium): یہ دوا 200 ڈالی لیوٹن میں دوران حمل بے خوابی کے لئے دی جاسکتی ہے۔



کافیا (Coffea): اگر انکارڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 200 طاقت کی ایک خوراک کافی ہو سکتی ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): بے خوابی اگر خوف کے باعث، ڈر یا پریشانی کے باعث ہو۔  
ہائوسائیمس (Hyoscyamus): اعصابیت اور چڑچڑے پن کے باعث اگر بے خوابی لاحق ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): اگر پریشان کن خیالات، غم، اداسی یا کسی افسردہ کر دینے والے جذبے کے باعث بے خوابی لاحق ہو۔

### دانت کا درد (دوران حمل) — Toothache

سٹیفنی سیگریا (Staphisagria): پُر درد تنکین ہوتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں میں کترن اور کچھن کا احساس ہوتا ہے۔ بے ہوش کر دینے والا یا کھودنے والا درد سر ہوتا ہے۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کالے ہو جاتے ہیں۔ بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھونک ہو جاتے ہیں۔

سپائی جیلیا (Spigelia): پھاڑنے والا اور چکنے والا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پُر درد جھکے لگتے ہیں۔ ٹھنڈے سے ابتری ہوتی ہے۔ آرام کرنے سے شدید ترین ہو جاتا ہے۔ ٹکیے پر سر رکھتے ہی درد میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ٹکیے سے سر اٹھایا جاتا ہے۔ شدت میں کمی آ جاتی ہے۔

سیدیا (Sepia): دوران حمل دانت کے درد کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): ایک ہی گٹنے سڑنے والے دانت میں درد ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب جبڑے کی ایک جانب متاثر ہو یا درد مختل ہو جائے۔

فلکس دامیکا (Nux Vom): جب کسی ایک گٹنے، سڑنے والے دانت سے درد شروع ہو کر چہرے کی ہڈیوں تک چلا جاتا ہے اور اس میں ابتری شراب اور کافی پینے سے ہوتی ہے۔ نیز ذہنی کام سے بھی ابتری ہو جاتی ہے۔ درد چپکنے والا، کھینچنے والا، پھاڑنے والا، کھودنے والا یا جھنکوں والا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جب دانت کا درد، درد سر کے ساتھ ہو۔ پھاڑنے والا، کھینچنے والا درد اور تنکین والا درد ہوتا ہے۔

## پیشاب (کی بندش دوران حمل) Urine

(Retention of)

نکس و امیکا، کیمفر، پلساٹیل (Nux Vom, Camphor, Pulsatilla): دوران حمل  
پیشاب کی بندش کے لئے یہ دوائیں دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں اگرچہ میں کھینے  
کے اندر افادہ نہ ہو تو کیتھرز کا استعمال کرنا چاہئے۔  
کاسٹیکم (Causticum): پیشاب کرنے کی متواتر خواہش کے لئے بیت اللہاء میں پختے سے  
پہلے ہی چند قطرے پیشاب نکل جاتا ہے۔

## قے (دوران حمل صبح کے وقت کی تکلیف)

Vomiting (Morning Sickness)

نکس و امیکا متبادل ۱- نیم کروڈ (Nux Vomica alternated with Antim Crud):  
یہ دوائیں دوران حمل قے کو روکتی ہیں۔ بشرطیکہ یہ دونوں دوائیں چند روز تک ہر آدھے گھنٹے  
کے بعد اول بدل کر دی جائیں۔ نکس و امیکا 1x ڈاکٹی لیوشن میں دینی چاہئے جبکہ ۱- نیم کروڈ 6 ڈاکٹی  
لیوشن میں۔ تکلیف کے بغیر اچھارے کو بھی نکس و امیکا سے آرام ہوتا ہے۔ زبان پر کریم کی  
طرح کی پٹم کا طبع ہوتا ہے۔ تیزابیت ہوتی ہے اور دل میں جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ معدہ  
بھی خراب ہوتا ہے۔

صفوری کارپس ریس (Symphoricarpus Race): شدید قسم کی مٹلی ہوتی ہے۔ قے  
سلسل ہوتی ہے۔ شدید ابکائیاں ہوتی ہیں۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔  
ایپیکاک (Ipec): اعتدال سے بڑھا ہوا اچھارہ تکلیف اور دل کی جلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح  
کی تکلیف کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔

کالچیکم (Colchicum): مٹلی سر میں محسوس ہوتی ہے اور جب مریض گاڑی میں بیٹھتی ہے یا  
حسّتی میں بیٹھتی ہے تو اہتری ہوتی ہے۔ غذا کی بو سے مٹلی ہوتی ہے۔  
کالی کارب (Kali Carb): جب مریض چلتی ہے تو قے کے بغیر مٹلی ہوتی ہے۔ کھاتے ہوئے  
بہت زیادہ غنودگی ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

ککربیتا پیپس (Cucurbita Peps): دوران حمل قے آتی ہے اور تھوک بہتا ہے۔ شدید  
قسم کے کیسوں میں اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ ٹیپ والے پیٹ کے کیڑوں کے لئے عمدہ دوا ہے۔

لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): حمل کی قے جس کے ساتھ منہ میں پانی بھرتا ہے۔ تھوک آتا ہے اور تیزابیت ہوتی ہے۔

اسارم یورپیم (Asarum Europum): حمل کی مٹلی۔

فاسفورس (Phosphorus): جب پانی کو دیکھنے سے حمل کی قے لاحق ہو۔ حمل کرتے وقت مریضہ کو آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں۔ ہاتھ گرم پانی میں ڈالنے سے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نکس موسکاتا (Nux Moschata): دوران حمل مٹلی اور قے ہوتی ہے۔ پیسری (Passary) (مورتوں کو رحم ٹھیک کرنے کا آلہ جو رحم کے منہ پر لگا دیا جاتا ہے) کے باعث۔

کالی کلور (Kali Chlor): گلے کی دکھن کے ساتھ حمل کی مٹلی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ کریوزوٹم (Kreosotum): مٹلی ہوتی ہے اور ٹیٹھے پانی کی قے ہوتی ہے۔

ایلٹرس فار (Aletris Far): پہلے 'بیار' سبز بھس والے چرے کے ساتھ قے لاحق ہو۔ مریضہ لیٹ جانا چاہتی ہے اور کچھ کرنا نہیں چاہتی بلکہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ ایسی لاغر حاملہ مستورات میں قے کا لاحق ہونا۔

سیپیا (Sepia): حمل کی صبح کے وقت کی تکلیف۔ معدے کے گڑھے میں کچھ نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے سے قے دفع ہو جاتی ہے۔

### بانجھ پن — Sterility (Barrenness)

سیپیا (Sepia): بانجھ پن کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ لیکوریا اور قبض کے ساتھ حیضوں کی بے قاعدگی ہوتی ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryta Carb): بیضہ دانوں اور پستانوں کے غدود کے کھٹنے کے باعث بانجھ پن لاحق ہوتا ہے لیکن لیٹنگ غدود بڑھ جاتے ہیں اور فلٹر نہیں ہوتے۔

اورم میور نیٹرم (Aurum Mur Nat): بانجھ پن کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ 3x ٹرائکی ٹوریشن کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ یہ ماسوری کیفیت 'تختی' بیضہ دان کی مزمن سوزش 'اندام نہانی کے بیرونی سوراخ کے ماسوروں اور بیضہ دان کی سوجن کو آرام دیتی ہے۔ یہ دوا استقامت حمل کی عادت کو بھی شفا دیتی ہے اور خروج رحم بھی اس سے درست ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مؤخر اور باافراط حیضوں کے ساتھ بانجھ پن 'اعتدال سے بڑھی ہوئی شہوت پرستی کے ساتھ بانجھ پن۔

کالی بروم (Kali Br.): بیضہ دانوں کی ناخاقتی کے باعث بانجھ پن ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): ذہنی افسردگی کے باعث بانجھ پن لاحق ہوتا ہے۔

**نیزم کارب (Nat. Carb):** ہم آغوش ہونے کے بعد مستورات میں بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں بانجھ پن لاحق ہو جاتا ہے۔

**تیجی ٹرین (Pituitrin):** بانجھ عورتوں میں بیض دانوں کے پھیلاؤ کے عمل کو متوازن کرنے والی دوا ہے اور کئی کیسوں میں اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔

**اگنس کاسٹس (Agnus Castus):** جب جنسی خواہش بالکل نہ ہو اور / یا حیض بھی نہ آتے ہوں۔ زرد وجہ ڈال دینے والا لیکوریا ہوتا ہے۔

**المی ٹرس ایف (Aleteris F):** جب بانجھ پن رحم کی کمزوری کے باعث لاحق ہو۔ یہ دوا رحم کو قوت دیتی ہے۔

**پلاٹینا (Platina):** حد اعتدال سے بڑھی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ مستورات میں بانجھ پن ہوتا ہے۔ یہ دوا ۱۲ سال سے لاحق بانجھ پن کا علاج کر چکی ہے۔

**تھوجا (Thuja):** لیکوریا کے ساتھ بانجھ پن ہوتا ہے۔ خون کی کمی کا مرض بھی موجود ہو سکتا ہے۔ مستورات کے چہرے اور ٹانگوں پر بال ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ اعضائے قاسل کا بدبودار پسینہ ہوتا ہے۔

**کالوفالیم (Caulophyllum):** لیکوریا کے بعد بانجھ پن لاحق ہوتا ہے۔ 10 سال سے شادی شدہ ایک عورت کا علاج اس دوا سے کیا گیا تھا۔

## بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے

### Suckling, Disinclination To

**سنا (Cina):** جب بچہ پستان منہ میں لینے سے انکار کر دے۔ خواہ پیدائش کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی اسے دیا جائے۔ 200 ملاقات کی صرف ایک خوراک دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

**مرکوریس کار (Mercurius Cor):** تیسری ڈاکی لیوشن میں اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ بشرطیکہ سنا کام ہو جائے۔

**سلیشیا (Silicea):** جب نوزائیدہ بچے بڑی تیزی کے ساتھ ماں کا دودھ نہیں لیکن اس کے فوری بعد دودھ نکال دیں تو یہ دوا دی جا سکتی ہے۔

## رسولیاں (سرطان، تھیلیاں، گومڑ) Tumors

(Cancer, Cysts and Polypus)

(نیز دیکھئے ”متفرقات“ کے ذیل میں ”سرطان“)

**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** ریشہ دار رسولیوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً فڈس کے قریب رحمی دیوار میں ہوتی ہیں۔ 1000 ڈائی لیوشن کی دوا ہر ماہ یا 3 ہفتے کے بعد دہرائی چاہئے۔  
**ہائیڈراستس (Hydrastis):** پستان کی رسولی سخت اور پردرد ہوتی ہے۔ سرہائے پستان اندر کو دھسنے ہوتے ہیں۔ یہ دوا بیضہ دانوں کے سرطان کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پستانوں کا سرطان رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

**ایسٹریازرب (Asterias Rub):** پستانوں کا سرطان سخت نشوونما ہوتی ہے۔

**چیمافیلہ (Chimaphila):** پستانوں کی رسولی جان لیوا ہو یا دوسری۔

**کالی آیوڈ (Kali Iod):** رحم کی ریشہ دار رسولی اگر پلساٹیلہ ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جا سکتا ہے۔ رحم ریشہ دار رسولی سے بھرا ہوتا ہے۔ ٹانگوں میں تھکن اور سو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں گرم ہوتے ہیں اور جلتے ہیں۔ گو بعض اوقات سارے جسم میں شدید قسم کی کچکپاہٹ ہوتی ہے۔

**کریوزوٹ (Kreosote):** رحم کا سرطان خصوصاً گردن رحم کا خوفناک قسم کے بدبودار اور خون آلود اور متعفن مواد کے رسنے کے ساتھ۔

**لکسیس (Lachesis):** غمگین، پریشان اور باتونی قسم کی مریضوں میں ریشہ دار رسولی ہوتی ہے۔

**اورم آرس (Aurum Ars):** بڑھی ہوئی جنسی خواہش اور بیضہ دانوں کی سوزش کے ساتھ رحم کا سرطان ہوتا ہے۔ لب ہائے فرج پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ حیض موجود نہیں ہوتے یا بہت افراط کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ خراش دار اور بہت متواتر ہوتے ہیں۔ لب ہائے فرج میں خارش ہوتی ہے۔

**فریکسی نس ایم، وریرٹرم الیم (Fraxinus Am' Veratrum Alb):** پردرد خبیوں کے ساتھ ریشہ دار رسولیوں کے لئے یہ ادویات اول بدل کر دی جائیں۔ فریکسی نس ایم کی مدر ٹچر کے ۱۰ قطرے سونے سے پہلے دیئے جائیں اور وریرٹرم الیم 30 ڈائی لیوشن میں ہر صبح دی جائے۔  
**لیپس الیم (Lapis Albus):** جلن دار شدید قسم کے دردوں کے ساتھ اور کمزور کر دیئے والے بافراط سیلان خون کے ساتھ رحم کی ریشہ دار رسولی، رحم کا سرطان۔

کوپاٹوا (Copaiva): مستورات میں مزمن درم مثانہ بے نتیجہ اور مستقل پیشاب کی خواہش ہوتی ہے۔ مثانہ میں درد کے ساتھ پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔  
ٹریلیئم پینڈولم (Trillium Pendulam): رحمی جریان خون جو رحم میں ریشوں کے پیدا ہو جانے کے باعث ہوتا ہے۔ شدید قسم کے نیچے کی جانب دباؤ کے ساتھ خروج رحم لاحق ہو۔  
لیکوریامست افراط کے ساتھ پیلے رنگ کا اور داغ چھوڑنے والا ہوتا ہے۔  
سلفر (Sulphur): اندرونی خارش اور بوا سیری سیلان خون کے ساتھ پستانوں کی رسولی یا پستانوں کا سرطان لاحق ہوتا ہے۔ IM یا CM طاقت کی ایک خوراک حیض کے ہر زمانہ میں دی جائے۔

پالیدیئم (Palladium): بیضہ دانوں کی رسولی۔  
تھلاسپی برسرا (Thlaspi Bursara): جریان خون کے ساتھ رحم کا سرطان لاحق ہو۔  
ٹیوکریم (Teucrium): اندام نہانی میں گو مز (پھوڑا) ہوتا ہے۔  
الیومن (Alumen): ضدی قسم کی قبض کے ساتھ بیضہ دانوں کی رسولی لاحق ہو۔ 200 ڈائی یوشن کی خوراک ہر ہفتہ دی جائے۔  
کالی کارب (Kali Carb): رحم کا سرطان جس کے ساتھ کولہوں سے شروع ہو کر شدید قسم کا درد گھٹنوں تک جاتا ہے۔ خصوصاً دائیں جانب۔ ٹانگ میں درد اس دوا کی طبعی علامت ہے۔  
تھوجا (Thuja): گردن رحم پر گو مز ہوتا ہے۔ خروج رحم اور غلط قسم کا حیض۔  
کونڈورانگو (Condurango): پستانوں کے غدود کا سرطان۔ رسولی اٹھنے کی جسامت والی سخت ہوتی ہے اور بائیں پستان پر ہوتی ہے۔ جس میں اضافہ ہائیڈراسٹس اور فائی ٹولا کا کے استعمال سے ہوتا ہے۔ عارضی طور پر کونیم کے ذریعے رک جاتی ہے۔ کونڈورانگو کی پہلی ڈائی یوشن اس کو شفا دیتی ہے۔

کونیم (Conium): پستانوں پر سخت قسم کی رسولیاں ہوتی ہیں۔  
سلیشیا (Silicea): اندام نہانی میں تھیلیاں ہوتی ہیں جو مٹر کے دانے یا سنگترے کی جسامت والی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اندام نہانی سے باہر کو نکلی ہوتی ہیں۔  
فائی ٹولا کا (Phytolacca): ٹھنڈ یا دودھ کے جم جانے کے باعث پستانوں میں گٹھیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن سے میسین نکلتی ہیں اور وہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ دودھ پالنے والی عورتوں کا دودھ خون آلود ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر عورتوں کا علاج بھی اس دوا سے ہو چکا ہے۔  
نکس دامیکا اپیکاک (Nux. Vom Ipec): ہائیڈروجینی جسامت والے مریضوں میں رحمی ریشے لاحق ہوتے ہیں۔ ایسی جسامت جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اس طرح مریطوب موسم

اور پانی پینے کے باعث علامات میں بہتری ہو جاتی ہے۔)  
 کیڈمیئم میٹ کیڈمیئم آئیوڈائیڈ میئم سلف (Cadmium Iod, Cadmium Sulph)  
 (Cadmium Met): ریڈیائی شعاعوں کے ذریعے علاج کے ناکام ہو جانے کے بعد یہ دوائیں  
 رحم کے سرطان کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ CM طاقت میں یہ دوائیں دی گئی ترتیب کے  
 مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔

پوفو (Bufo): سرخ دھاریوں کے ساتھ سرطان ہوتا ہے۔  
 سکروفولیریا (Scrophularia): چھاتیوں میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔

### رحم — Uterus

#### نیچے کی جانب دباؤ (Bearing Down)

(نیز دیکھئے ”حمل“ کے ذیل میں ”نیچے کی جانب دباؤ“)

سیپیا (Sepia): نیچے کی جانب دباؤ کے لئے یا کمر کی جانب سے پیٹ کی طرف دباؤ کے ساتھ  
 رحم کے خروج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اسے اونچی طاقت میں دینا چاہئے مثلاً 1000 طاقت  
 یا CM طاقت کی خوراک ہر چند روز کے بعد دی جائے۔ کمر کی جانب سے پیٹ کی طرف دباؤ  
 کے باعث سانس میں بھی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں کا ابھرا ہوا پیٹ۔

بیلادونا (Belladonna): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں موجود ہر چیز باہر نکل آئے گی۔  
 کھڑے ہونے سے بہتری ہوتی ہے۔

سبائنا (Sabina): کمر کے زیریں حصہ سے پیٹ کے ارد گرد سے اور رانوں کے ارد گرد سے  
 دباؤ نیچے کی جانب ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): اس دوا کی علامات سیپیا کے مماثل ہوتی ہیں۔ جب سیپیا ناکام ہو  
 جائے تو اسے آزمانا چاہئے۔ نیچے کی جانب دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے  
 بیڑوں کی اشیاء اندام نہانی میں نیچے کی طرف دباؤ ڈال رہی ہوں۔ لب ہائے فرج کی مدد ہاتھ سے  
 کرنا پڑتی ہے۔ حیض جلد آتے ہیں۔ کم مقدار میں ہوتے ہیں۔

آرنیکا ایم (Arnica M): چوٹ کے باعث خروج رحم لاحق ہوتا ہے۔ خروج رحم میں مریضہ  
 اکڑ کر نہیں چل سکتی یا سیدھی ہو کر نہیں چل سکتی۔

لیکیسیس (Lachesis): سن یا اس کے دوران خروج رحم لاحق ہو جاتا ہے۔ حرارت کی  
 متماہٹ ہوتی ہے۔ سر کی چوٹی پر حرارت ہوتی ہے۔ سر میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

ہیلونیاس (Helonias): بھاری رحم کے باعث رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔ رحم نیچے جھک جاتا ہے۔ فنڈس (رحم کا پینڈا) آگے کو لڑھکا ہوتا ہے۔ اندام نہانی کے سوراخ اور اعضاء مستقیم (مقعد) کے بیچ انگلی مشکل سے گزاری جاتی ہے۔  
میوریکس (Murex): شدید قسم کا نیچے کی جانب دباؤ۔ ٹانگیں آپس میں ملانے سے درد ہوتا ہے۔

فریکس ایم (Frax Am): رحم کی تمام بھاری حالتوں میں جیسے خروج رحم نیچے کی جانب دباؤ اور رحم کے بندوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔ ان تمام حالتوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے جو کہ مقوی رحم دوا ہے۔

سٹانم (Stannum): جب خروج رحم میں پاخانہ کے دوران اتھری ہو۔ خصوصاً زور لگانے کے دوران۔

اگیریکس ایم (Agar. M): نیچے دبانے والے درد بہت بری طرح سے لاحق ہوتے ہیں جو کہ تقریباً قاتل برداشت ہوتے ہیں۔

ایسکولس ہپ (Aesculus Hip): رحم کی گردن کی سوزش، رحم کا ٹل جانا، رحم کا خروج، رحم کا بڑا ہو جانا اور رحم کی سختی جب کہ نرمی، گرمی اور خشک طبی طور پر ہوتی ہے۔  
اورم میٹ (Aurum Met): بھاری وزن اٹھانے کے بعد رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔ حیض کے زمانہ میں اتھری ہوتی ہے۔

پوڈوفائلم (Podophyllum): رحم اور اندام نہانی کا خروج عام نقاہت کے باعث ہوتا ہے۔ اعتدال سے زیادہ وزن اٹھانے کے باعث اور خصوصاً زچگی کے بعد جس کے ساتھ شدید قسم کا درد کمر ہوتا ہے اور زیادہ یا کم خروج مقعد بھی ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): عضلات اور طویل بند (Ligament) وغیرہ کے ڈھیلے پڑ جانے کے باعث رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔ گردن رحم میں اجتماع خون اور سختی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ناموری اور جلن دار نیز ڈنک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ رحم سے پیلا، خراش دار اخراج ہوتا ہے۔

ایلو (Aloe): طویل مدت تک کھڑے رہنے کے باعث خروج رحم لاحق ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پیڑ کی ہڈی اور دیگی کی ہڈی کے درمیان فائدہ گڑا ہوا ہے۔ رحم نیچے کی طرف کھینچا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیڑ کے تمام اعضا تیزی کے ساتھ گھٹ کر باہر نکل آئیں گے۔

ایسٹریاز ربنز (Asterias Rubens): رحم میں پھڑکن کے ساتھ باہر کو دھکیلنے کا احساس



ہوتا ہے۔  
نٹرم ہائپو کلورو (Natrurn Hypochloro): پیڑ کا نیچے کی طرف دہکا۔ رحم پانی سے بھرا  
 ہوتا ہے۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): نیچے کی طرف دہاؤ میں لینے سے ابتری ہوتی ہے۔

### شعور — Consciousness

ہیلونیا (Helonias): رحم کا شعور، گردن رحم کی سوزش، خروج رحم، کمرے رنگ کا  
 بدبودار لیکوریا، مریض بے چین ہوتی ہے۔ ہر کسی میں نقص نکالتی ہے۔ چڑچڑی ہوتی ہے۔ جب  
 ذہن اور جسم مصروف ہوں تو بہتری ہوتی ہے۔

### اینٹنشن — Cramps

کاسٹیکم (Causticum): معدہ میں، چھاتی میں اور چھوٹی کمر میں درد کے ساتھ اینٹنشن کے  
 لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ درد مریض کو جھک کر دہرا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کھانے  
 کے بعد ابتری ہوتی ہے۔  
کوکولس (Cocculus): چھاتی میں دہاؤ اور اینٹنشن کے ساتھ رحم میں پردرد دہاؤ ہوتا ہے۔  
 مریض بے چین ہوتی ہے اور اسے غشی آتی ہے۔ نئے آتی ہے اور پھر آتے ہیں۔  
کونیم (Conium): لب ہائے فرج میں سراسیمگی کے ساتھ، رحم میں اینٹنشن ہوتی ہے۔ پیٹ  
 میں تھوہ ہوتا ہے اور چھاتی میں درد ہوتا ہے۔  
مگنیشیا میور (Magnesia Mur): رحم میں اینٹنشن ہوتی ہے جس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ جو  
 پھیل کر راتوں تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد لیکوریا ہو جاتا ہے۔  
اگنیشیا (Ignatia): دردزہ جیسے دردوں کے ساتھ رحم میں اینٹنشن ہوتی ہے۔ جس کے بعد  
 لیکوریا ہو جاتا ہے۔

### ٹل جانا (رحم کا) — Displacement

بیلڈونا (Bell.): پُر خون مریضوں میں رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا لاحق ہوتا ہے۔  
پوڈوفائلم (Podophyllum): مقعد کے خروج کے ساتھ اور اس کی پیچیدگی کے ساتھ۔  
سپیا (Sepia): الٹا ہوا رحم، اندام نہانی کا سوراخ اوپر کی جانب پیڑ کے مقابل دھکا ہے۔  
 قذش (رحم کا پینڈا) نیچے کی جانب جھک کر سیکرم کے مقابل تک آ جاتا ہے۔

لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): رحم کا الٹ جانا، رحم کا پیندا سیکرم کے بالفاظ آ جاتا ہے۔ اندام نہانی کا سوراخ پیڑ کی جانب ہوتا ہے۔ رحم قبض کے ساتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے۔ ہیلونئاس (Helonias): رحم نیچے کی جانب ٹل جاتا ہے۔ رحم کا پیندا آگے کی جانب لڑھکا ہوتا ہے۔ اندام نہانی کے سوراخ اور مقعد کے درمیان انگلی بڑی مشکل سے گزاری جاتی ہے۔ کمزور مریضوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): رحم کا گر جانا، رحم کا ہرنیا، رحم کا ٹیڑھا ہو جانا، اندر کی جانب جھک جانا، رحم سے خون کا جاری ہونا سوزش کے ساتھ۔

سبائنا (Sabina): استقاء حمل کے بعد۔

آرنیکا ایم (Arnica M): پیٹ کے زیریں حصہ میں مکالگ جانے کے بعد۔

مرکیوریس (Mercurius): جب رحم کی باغی، بھلیوں کی سوزش کے باعث مرض لاحق ہو۔

### استقاء (رحم کا) — Dropsy

پلساٹیل (Pulsatilla): حیضوں کے دب جانے کے باعث، لیکوریا یا نفاس کے دب جانے کے باعث، استقاء لاحق ہوتا ہے۔

کریوسوٹ (Kreosote): جب سرطان کے باعث استقاء لاحق ہو۔

آرسینک ایلب (Arsenic Alb): جب استقاء کی وجہ معلوم نہ ہو اور بے چینی ہو، پیاس کے ساتھ گرم کمرے میں یا گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب کونیئم (Calcarea Carb Conium): ان ادویات کو دی گئی ترتیب کے مطابق آزمایا جاسکتا ہے۔ جبکہ استقاء کو مڑوں یعنی پھوڑوں کے باعث لاحق ہو۔

تھوجا (Thuja): قبل از وقت زچگی ہو جانے کے ساتھ رحم دوگنا بڑا ہو جاتا ہے۔

سیدیا (Sepia): گردن رحم بڑی اور موٹی ہو جاتی ہے۔

اسٹیلگو (Ustilago): رحم کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اسٹیفنی نری ہوتی ہے۔

اندام نہانی کا سوراخ اور رحم کی گردن کافی ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انگلی گزر سکتی ہے۔

کونیئم (Conium): بھالے لگنے جیسے درد کے ساتھ رحم کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ بیض دانوں میں سختی ہوتی ہے۔ نیز خروج رحم کے ساتھ رحم میں بھی سختی ہوتی ہے اور رحم کی گردن میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): رحم کی سختی اور اس کا بڑھ جانا لاحق ہو جاتا ہے جس کے ساتھ حیضوں میں اتاری ہوتی ہے۔ کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر کولوں تک چلا

جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ اندام نہانی کے سوراخ پر ناسور ہونے کے ساتھ رحم کی گردن کا موٹا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ بوڑھی عورتوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔

بربادی (رحم کی) Erosion

(دیکھئے "رحم" کے ذیل میں "ناسور")

گلنا، سرسڑنا — Gangreen

سیکیل کار (Secale Cor): رحم کے گلنے سڑنے والے مرض کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ 30 یا 200 ڈاگی لیوشن کی خوراک دیجئے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو آرسینک الیم 30 اور کریو زوٹ 30 آزمائیں۔

ہوا (اپھارہ) (Gas Flatulence)

ایسڈ فاس (Acid Phos): رحم سے ہوا خارج ہونے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ رحم کی ڈھول بھی کیفیت کا بھی علاج کرتی ہے۔

لائکو پوڈیم (Lycopodium): جب اندام نہانی سے گندی بو والی گیس خارج ہو۔  
کاربو وج چائنا (Carbo Veg. China): ان ادویات کو دی گئی ترتیب کے مطابق آزمایا جا سکتا ہے بشرطیکہ اوپر والی دونوں ادویات ناکام ہو جائیں۔

رحم کی سختی Induration

(دیکھئے "ناسور")

گوشت کا لو تھڑا (Moles)

یا دیگر بیرونی اجسام مثلاً پانی کی تھیلیاں اور خون وغیرہ رحم میں

(or other foreign bodies like Hydatids and Sanguineous)

کینتھرس، سبائنا (Cantharis, Sabina): رحم سے گوشت کے لو تھڑے وغیرہ خارج کرنے میں یہ دوا میں مدد دیتی ہیں۔ دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جائیں۔

پلساٹیل، سیکیل کار (Pulsatilla Secale Cor): دی گئی ترتیب کے مطابق رحم کے اندر گوشت کے لو تھڑوں کے لئے آزمائیں۔

نائٹرک ایسڈ، ایسڈ فاس (Nitric Acid, Acid Phos): جتنے ہوئے خون کا نیز عضلاتی بندوں کا سخت ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائیں۔  
کلکیریا، سیلیشیا (Calcarea, Silicea): رحم میں پانی سے بھری ہوئی تھیلیوں کے لئے دی گئی ترتیب کے مطابق ان دواؤں کو آزمائیں۔

### درد — Pain

کونیم (Conium): جلن دار، ڈنک لگنے جیسے اور تیر لگنے جیسے درد رحم کی گردن میں ہوتے ہیں۔ بھالے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ رحم کا اعصابی درد ہوتا ہے۔  
پلساٹیلہ (Pulsatilla): حیضوں کی غیر موجودگی کے ساتھ رحم میں درد ہوتا ہے۔  
لکسیس (Lachesis): رحم میں درد ہوتا ہے جو کہ خون کے جاری ہونے سے دور ہو جاتا ہے۔ زچگی کے بعد اور حیضوں کے دوران بیضہ دانوں میں سخت دکھن والے درد ہوتے ہیں۔  
میوریکس (Murex): رحم کے دائیں جانب درد ہوتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے۔ مخصوص کیسوں میں درد سارے بدن میں سے گزرتا ہے اور اوپر کو بائیں پستان تک پھیل جاتا ہے۔  
ہائپرکیم (Hypericum): جراحی کے بعد سارے پیڑ پر درد ہوتا ہے اور نرمی ہوتی ہے۔ ۲۰۰ ڈاکٹی لیوشن کی دوا دیجئے۔

سمبل (Sumbul): چست اور زندہ دل مستورات میں چہرے کا یا بیضہ دانوں کا اعصابی درد ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹگ (Lilium Tig): چست اور زندہ دل مستورات میں چہرے کا یا بیضہ دانوں کا اعصابی درد ہوتا ہے۔ بیضہ دانوں میں تیز درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ نیچے کی جانب دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔

پلائٹینا (Platina): مزمن سوزاک کے باعث بیضہ دانوں میں درد ہوتے ہیں۔  
پوڈوفیلیم (Podophyllum): کم مقدار میں ہونے والے حیضوں کے ساتھ بیضہ دانوں میں درد ہوتا ہے۔ حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ جگر کی خرابی کے باعث۔  
اکٹیاریس موسا (Actea Racemosa): رحم کی گردن کی جھلی کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔  
لیک کینیم (Lac. Can): دائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے۔ چکلیے سرخ خون کے جاری ہونے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔

لوڈیم (Lodum): درد دائیں بیضہ دانی میں شروع ہوتا ہے اور نیچے کو رحم میں سے گزر جاتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): حیض کے دوران بائیں پیضہ دانی میں درد ہوتا ہے۔ جو نیچے کی طرف رانوں تک پھیل جاتا ہے۔  
 برائیونیا (Bryonia): دائیں پیضہ دانی میں درد جو نیچے کو رانوں کی طرف دوڑتا ہے۔ آرام کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ حرکت کرنے سے یا چھوٹے سے بہتری ہوتی ہے۔  
 ارجنٹم میٹ (Argentum Met): خروج رحم کے ساتھ بائیں پیضہ دانی میں درد ہوتا ہے۔  
 ہائیڈرو کوٹائل (Hydro Cotyle): کوئی لگنے جیسے، تیر لگنے جیسے اور بھالے لگنے جیسے درد اندام نہانی میں ہوتے ہیں۔  
 کریو زوٹ (Kreosote): اندام نہانی میں جلن دار اور کسٹو والا درد ہوتا ہے۔ جیشی ہوئی حالت سے اٹھنے پر بہتری ہوتی ہے۔ اندام نہانی سوجی ہوئی ہوتی ہے۔

### گو مڑ — Polypus

کلکیریا کارب (Calcaria Carb): یہ دوا گو مڑوں کو ٹکالنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ گو مڑ خواہ عضلاتی ہوں، گوشت دار پھپھوندی والے ہوں، خواہ دانے دار ہوں۔ متواتر سیلان خون کا علاج بھی اسی دوا سے ہو جاتا ہے۔  
 تھو جیا (Thuja): گوشت دار گو مڑوں کے لئے، رحم کی گردن پر گو مڑ ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ خروج رحم ہوتا ہے اور خرابی والے حیض ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات باقراط اخراج کے ساتھ لمبے وقفوں میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن سارے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا خون بہتا رہتا ہے۔  
 کونیئم (Conium): جب گو مڑ پتھر کی طرح سخت ہوں۔  
 ٹیو کریئم (Teucrium): جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

### خروج (رحم کا) — Prolapsus

(دیکھئے ”نیچے کی جانب دباؤ“)

### ناسور (رحم کے) — Ulcers

ارجنٹم نائٹریکم (Argentum Nitricum): اندام نہانی کے سوراخ پر ناسوروں کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خروج رحم کے ساتھ سیلان خون والے ناسور ہوتے ہیں۔ الیومن خارج ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): جب ارجنٹم ٹاٹ ٹاکم ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاتا ہے۔ اس میں خون والے اخراج کے ساتھ رحم کی گردن پر ٹاسور ہوتے ہیں جو سرطان کے باعث ہو سکتے ہیں۔ خروج رحم ہوتا ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): رحم کی گردن پر پرانے ٹاسور ہوتے ہیں۔ جن سے خون آسانی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ متعفن خراش دار مادہ خارج ہوتا ہے۔ رحم کی گردن کی سوزش ہوتی ہے۔

کاربو انیملس (Carbo. An): اندام نسائی کے سورخ پر مسلک ٹاسور ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ گندے مادے خارج ہوتے ہیں اور جن سے سیلان خون آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کونیئم (Conium): خروج رحم کے ساتھ رحم میں ٹاسور ہوتے ہیں۔

کیلنڈولا (Calendula): یہ دوا بھی ٹاسوروں کو رفع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسے ۳۰ طاقت میں دینا چاہئے۔

ایسڈ سلف (Acid Sulph): عمر رسیدہ مریضوں میں رحم کی گردن کی ٹاسوری کیفیت ہوتی ہے۔

آر سینک الیم، کاربو لک ایسڈ (Ars Alb, Carbolic Acid): متعفن، خراش دار اخراج کے ساتھ رحم کی گردن کی ٹاسوری کیفیت۔


الیومن (Alumen): رحم کا ٹاسور یا سرطان۔ درد جماع کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ رحم کا وزن نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بار بار کے استقامت حمل کے نتیجے میں رحم کی سختی اور ٹاسوری کیفیت۔

اندام نسائی — Vagina

خشکی — Dryness

(دیکھئے ”جامعت“ کے ذیل میں)



## ہڈیوں، جوڑوں اور عضلات کے امراض (Diseases of Bones Joints & Muscles)

### حصہ اول — ہڈیاں اور جوڑ

#### ہڈیوں کا گلنا سڑنا Caries

**کلکیریا فاس (Calcareo Phos):** ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے نہ جڑنے کے لئے اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ جب کہ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں یا ٹاکارہ ہو جاتی ہیں۔ ہڈیاں خمیدہ ہو جاتی ہیں۔

**انگسٹا چورا ویرا (Angustura Vera):** لمبی ہڈیاں کھتی سڑتی ہیں اور جوڑ لوٹ جاتے ہیں۔ درد گودے تک سرایت کر جاتا ہے۔

**کلکیریا کارب (Calcareo Carb):** ریزہ کی ہڈی کے امراض، ریزہ کی ہڈی کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی نشوونما نہیں ہوتی اور دانت ظاہر نہیں ہوتے۔

**کلکیریا فلور (Calcareo Fluor):** ہڈیوں کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ کسی وجہ کے ساتھ یا بغیر کسی وجہ کے۔ یہ دوا کلکیریا فاس کے جالے میں دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی علامات ان علامات کے مماثل ہیں جو کلکیریا فاس میں دی گئی ہیں۔

**ایسڈ فلور (Acid Fluor):** لمبی ہڈیوں کا پیپ پڑنے کے ساتھ گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ جن میں اتھری اور بہتری کے دورے ہوتے ہیں۔ شدید قسم کی خفایت کے ساتھ رات کے وقت دروں میں اتھری ہوتی ہے۔ کانوں اور ناک سے ہڈیوں کے سڑنے کے باعث بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔

**پلاٹینم (Platinum):** خصوصاً فٹوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہو۔

**سیلیسا (Silicea):** ہڈیاں خمیدہ ہو جاتی ہیں۔ سوکھا مسان (Rickets) لاحق ہوتا ہے اور کولوں کے جوڑ کے امراض ہوتے ہیں۔ بدبودار پینٹ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ناسوری سوراخ ہوتے ہیں۔ جن سے بدبودار مواد خارج ہوتا ہے اور ان کے ارد گرد کے حصے سخت اور سوبے

ہوئے ہوتے ہیں۔

اورم میٹ (Aurum Met): پارے کے غلط استعمال کے بعد آتشکی مریضوں میں ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہو۔ سرویکل ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ نیز تالو کی ہڈیاں گلتی سڑتی ہیں۔ بدبو ہوتی ہے اور ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔

ایسافوئیڈا (Asafoetida): بدبودار مواد خارج ہونے کے ساتھ ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ دکن ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ناسوروں کے گرد دکن اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ پٹی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ درد مدہم، کھینچنے والے اور جلن دار ہوتے ہیں۔ آرام کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیکلا لادا (Hecla Lava): یہ دوا ہڈیوں کے امراض میں دی جاتی ہے۔ بشمول اوسٹیوسارکوما، خنازیری اور آتشکی ہڈیوں کی سوزش میں۔

کالچیکم (Colchicum): ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ خصوصاً جب ہڈیوں کے نشوونما پانے والے سرے متاثر ہوں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ جب سلیشیا مکمل شفا دینے میں ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاسکتی ہے یا جب مرض کا ٹھیک ہونا رک جائے۔

سٹیفنی سیگریا (Staphisagria): لمبی ہڈیوں میں جگہ بدلنے والا درد ہوتا ہے۔ اعصابی دردوں میں اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

### خمیدگی (ریڑھ کی) (Curvature (Spine)

ایسڈ فاس (Acid Phos): مہروں کے گلنے سڑنے کے باعث ریڑھ کی ہڈی کا خم کھا جاتا۔  
کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): ریڑھ کے مہروں کے علاقہ میں ریڑھ کی ہڈی کا خمیدہ ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ نیز لمبی ہڈیاں خمیدہ ہو جاتی ہیں۔ گردن اور کمر کی خمیدہ ہڈیوں میں سوجن ہوتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): یہ دوا ہڈیوں کی سوزش، ہڈیوں کے نرم ہو جانے اور ہڈیوں کے سڑنے کے امراض کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ امراض خواہ کہیں بھی پائے جائیں۔ ہڈیوں کے پھوڑے لاحق ہوتے ہیں۔ آخر کار ان پھوڑوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور بدبودار پیپ خارج ہوتی ہے۔

کلیکیریا فاس (Calcarea Phos): ہڈیوں کے ریشوں میں پیپ پڑنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ کولوں کے جوڑ کی ہڈیاں گلتی سڑتی ہیں۔ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو



جاتی ہے۔ ہڈیاں خمیدہ ہونے لگتی ہیں۔ خصوصاً بائیں جانب، بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتیں۔

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): جب کلکیریا کی دیگر اقسام ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دینی چاہئے۔

سلفر (Sulphur): کمر کے علاقہ میں مرہم لگانے سے ترخارش کے دب جانے کے بعد ریزہ کی ہڈی خمیدہ ہو جاتی ہے نیز پسلیاں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ 200 طاقت کی دوا ہر ہفتے دی جائے۔

کالی ہائیڈ (Kali Hyd): کولے کے امراض میں ہڈیوں کا خمیدہ ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ آتشک کے باعث ریزہ کی ہڈی گلنے سڑنے لگتی ہے۔

تھوجا (Thuja): فرش پر بیٹھنے میں سر گھٹنوں میں گھس جاتا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے برے نتائج، مریض پیچھے کی جانب جھک جاتا ہے۔ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔

### ہڈیوں کی سوزش (Osteitis)

(Inflammation of the Bones)

سیلیشیا (Silicea): کھوپڑی کی ہڈیوں کی سوزش۔

سٹیلنگیا (Stillingia): لمبی ہڈیوں کی سوزش، مثلاً ران کی ہڈی، پٹنی کی ہڈی، کندھے سے کہنی تک کی ہڈی وغیرہ۔ یہ مرض آتشک کے باعث ہو سکتا ہے۔

سٹرانٹیا کارب (Strontia Carb): ہڈیوں کی سوزش ہوتی ہے۔ خصوصاً ران کی ہڈی کے ناسوروں کے ساتھ جن سے زیادہ یا کم مقدار میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں خارج ہوتی ہیں۔

سٹیفنی سیگریا (Staphisagria): ہڈیوں کی سوزش اور جگہ بدلنے والے درد، لمبی ہڈیوں میں ہوتے ہیں۔ اعصابی دردوں میں نیز ہڈیوں کے گلنے سڑنے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): ہڈیوں کے دردوں کے لئے یہ ایک عظیم دوا ہے۔

اکیبریکس ایچ (Agaricus M): ٹانگوں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔

مینگانم (Manganum): ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ متاثرہ حصوں کو چھونے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): رات کے وقت جلن ہوتی ہے۔ جو کہ پارے والے آتشکی یا خنازیری زہروں کے باعث ہوتی ہے۔

روٹا (Ruta): چوٹ کے باعث ہڈیوں کی سوزش لاحق ہو۔

سمفی ٹم: (Symphytum): ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کے باعث یا ہڈیوں کی چوٹ کے باعث ہڈیوں میں سوزش لاحق ہوتی ہے۔  
 ہیپکلا لادا: (Hecla Lava): جسم میں کسی بھی جگہ ہڈیوں کی بڑھی ہوئی نشوونما کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مرض جڑے میں یا کہیں بھی ہو سکتا ہے۔

### درد کمر — Lumbago (backache)

(نیز دیکھئے ”سوزاک“ اور ”آٹنک“)

کولو سنٹس: (Colocynthis): کمر میں درد ہوتا ہے نیز پھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ جو آخر کار ران کے اوپر والے حصہ میں اور چوترا (سرین) میں ٹھہر جاتا ہے۔ شروع میں درد تھوڑی سی جگہ میں ہوتا ہے۔ جس کے باعث مریض لنگھتا ہے اور آخر کار اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ مریض نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ ٹکونی ہڈی کے ساتھ شدید جلن ہوتی ہے۔

رشاکس: (Rhus Tox): جبکہ چلنے سے درد میں افادہ ہوتا ہے اور آرام سے یا پہلی حرکت پر ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت بھی ابتری ہوتی ہے۔ ٹکونی ہڈی والا درد ہوتا ہے۔ اگر ایک طاقت سے مرض میں افادہ نہ ہو تو دوا کی طاقت کو بدل لیجئے۔

انٹیم ٹارٹ: (Antim Tart): تھکاوٹ کے باعث درد کمر ہوتا ہے۔ کمر کے نچلے حصہ میں اذیت ناک درد ہوتا ہے۔ حرکت کرنے کی معمولی کوشش کے باعث ابکیاں آتی ہیں۔ نیز ٹھنڈے اور چمچے پینے آتے ہیں۔ نیچے کی جانب وزن کے لگے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔  
 امونیا کارب: (Ammonia Carb): کمر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جاڑے اور بخار کے ساتھ دونوں گردوں میں تکلیف ہوتی ہے۔

اکٹیاریس موسا: (Actea Racemosa): بے چینی اور بے خوابی کے ساتھ عضلاتی درد ہوتا ہے۔ مریض اعصابی، مایخیائی اور بے چین ہوتا ہے۔

برائیونیا: (Bryonia): جب درد ہر حرکت سے ابتر ہو جائے اور لیٹنے سے نیز آرام کرنے سے بہتر ہو۔ جس کے ساتھ کمر میں خراشوں کا احساس ہوتا ہے۔ کمر کے نیچے مریض دباؤ یا کوئی سخت چیز رکھنا پسند کرتا ہے۔ رات کے وقت یا 3 بجے ابتری ہوتی ہے۔

بربرس ول: (Berberis Vul): وجع المفاصل یعنی درد کمر لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پیشاب کی تکلیفات ہوتی ہیں۔

ڈلکامارا: (Dulcamara): جب مرطوب تہ خانوں میں رہائش کے باعث درد کمر لاحق ہو یا جب 24 گھنٹوں کے دورانے میں درجہ حرارت بہت زیادہ کم و بیش ہونے کے باعث درد کمر

لاحق ہو۔

**کالی کارب:** (Kali Carb): کمر کے زیریں حصہ میں پیچھے کی جانب درد ہوتا ہے۔ کمر ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ درد نیچے کی جانب ٹانگوں کے پچھلی طرف جاتا ہے۔ مریض غبٹلی، مشکل، بلا ضرورت پریشان ہونے والا، ٹھنڈا اور زود حس ہوتا ہے۔

**میڈورینم 200:** (Medorrhinum 200): درد کمر لاحق ہوتا ہے۔ (یعنی وجع المفاصل) "انگریزی کمر ٹکونی ہڈی میں درد ہوتا ہے جو کہ اکثر پچھل کر ٹانگوں تک چلا جاتا ہے۔ گدی میں اور کمر میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ ساری کمر میں درد ہوتا ہے۔ یہ عمل انگیز دوا ہے۔"

**ایلو:** (Aloe): درد کمر جو درد سر کے ساتھ اولٹا بدلتا رہتا ہے۔

**نیٹرم میور:** (Natrium Mur): درد کمر لاحق ہوتا ہے جب کہ مریض درد کرنے والے حصہ میں دباؤ کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے کرسی میں کتاب رکھنا پسند کرتا ہے۔ بستر میں اپنے نیچے کوئی سخت چیز رکھنا چاہتا ہے۔ مریض کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کمر پر رکھنے کے ساتھ ادھر ادھر ہلتا ہے۔

**الومینا:** (Alumina): کمر میں درد ہوتا ہے جیسے کہ گرم لوہا ریزھ کی ہڈی کے نچلے سرے میں ٹکس گیا ہو۔

**نکس وامیکا:** (Nux Vomica): بڑے عضلات کا درد کمر، بستر پر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ صبح کے وقت درد میں اضافے کے ساتھ جاڑے کے باعث درد ہوتا ہے۔ گرنی سے بہتری ہوتی ہے۔

**ایسکولس ایچ:** (Aesculus H): سخت مشقت یا سخت کام کرنے کے باعث ٹکونی ہڈی میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ جس کے باعث کمر میں درد ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔

**کلکیریا فاس:** (Calcarea Phos): گردن کے پاس گدی میں درد ہوتا ہے نیز کھوپڑی کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ جب رشا کس اور ایسکولس تاہام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ شدید قسم کے درد کے ساتھ کولے کے جوڑ کے امراض۔

**ہائپرکیم:** (Hypericum): کولے کے جوڑ میں شدید اعصابی درد ہوتا ہے۔

**یوپاٹوریم پرف:** (Eupatorium): شدید قسم کی پیاس اور جاڑے کے ساتھ ہڈیوں کے اندر کمرائی میں درد کمر ہوتا ہے۔ طیر یا بخار وغیرہ کے مابعد اثرات کے باعث یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔

**کلکیریا فلور:** (Calcarea Flour): درد کمر آرام کرنے کے دوران اجتر ہوتا ہے اور گری سے بہتری ہوتی ہے۔ کمر میں درد ہوتا ہے جو کہ پچھل کر ٹکونی ہڈی تک چلا جاتا ہے۔ جب

رہیں تاکس ناکام ہو جائے تو اسے آزمایا جائے۔  
 سلفر: (Sulphur): جنسی خواہش رکھنے والوں میں درد کمر لاحق ہوتا ہے۔ سیدھے ہو کر نہیں چل سکتے۔ کندھوں کے درمیان کھینچنے والا درد ہوتا ہے۔ آرام سے بہتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت پاؤں کے تلوؤں میں اور ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے۔ پینے کی بوتل میں جیسی ہوتی ہے۔  
 روڈوڈنڈرون: (Rhododendron): بازوؤں اور ٹانگوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔  
 خشک سردی کے باعث درد کمر ہوتا ہے۔ آرام کرنے سے اور طوفان آنے پر بہتری ہوتی ہے۔  
 گرمی اور کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔

## ہڈیوں کا ٹوٹ جانا

(Osteogenesis Imperfecta)

(ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بے قاعدہ طور پر نشوونما پاتی ہیں)

کلکیریا فاس: (Calcareia Phos): نازک اور آسانی سے ٹوٹ جانے والی ہڈیوں کے لئے یہ ایک عمدہ ہے۔ سر کی ہڈیاں معیار اور مقدار کے اعتبار سے ناکافی ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ موٹی اور بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں۔ گردن کی ہڈیاں اتنی چھوٹی اور اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ سر کو سہارا نہیں دے سکتیں۔ جو کہ معمولی بڑا ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھی کمزور اور نازک ہوتی ہیں۔ پانچاٹنے سبز، غیر منہضم اور بدبودار ہوتے ہیں۔ بھوک نہیں لگتی۔ یہ دوا ہڈیوں کی تعمیر کرنے والی اور خون کے نئے خلیے بنانے والی ہوتی ہے۔ یہ دوا تمام نامیاتی جسم کے لئے عمومی طور پر قوت بخش ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب: (Calcareia Carb): یہ دوا کھلے تالو والے اور کھوپڑی کی ہڈیوں کے کھلے جوڑوں والے مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہڈیوں کی تعمیر کرنے والے مادے تو خوب مہیا ہوتے ہیں لیکن ان کی مناسب تقسیم نہیں ہوتی۔

کلکیریا آئیوڈ: (Calcareia Iod): جب عضلات میں کمزوری ہوتی ہے اور پکنائی کی کمی پائی جاتی ہے تو اس حالت کی وجہ سے ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں کلکیریا آئیوڈ کے متعلق سوچنا چاہئے۔ غدد کی غیر صحت مندانہ حالت ہمیشہ موجود ہوتی ہے چنانچہ اس حالت میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

کلکیریا فلور: (Calcareia Fluor): اس دوا کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اس میں دانتوں کا انجیل بہت جلد (یعنی قبل از وقت) تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی عضلاتی ریشے یا عضو کی ذیلی حالت۔ یہ دوا شریانوں اور وریدوں کے لچک دار ریشے تعمیر کرتی ہے۔

**سیلیسا (Silicea):** یہ دوا کلیریا فاس کے بعد دینی چاہئے۔ جب کری ہڈیوں کے ریشے مناسب طور پر ہڈیوں میں تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ سیلیسا اور کری ہڈی سے ہڈی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لئے سیلیسا اس مرض کے لئے ایک اہم دوا ہے۔ پینہ آتا ہے اور پیپ پڑنے کا رجحان ہوتا ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ علامات اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ سیلیسا کے مریضوں میں ٹھنڈے سے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

## ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی سوزش

(Osteomyelitis)

(نیز دیکھئے ”اعصابی نظام“ کے ذیل میں ”ریڑھ کی ہڈی کی سوزش“)  
**سیلیسا (Silicea):** زخموں کو دور کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے چھوٹے پھوٹے ٹکڑے بھی باہر نکال دیتی ہے۔ جو زخم کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

**میڈورینم (Mederrhinum):** جب سیلیسا ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ مریض چڑچڑاہٹ، گرم ہوتا ہے۔ اس کی ہتیلیاں گرم ہوتی ہیں۔ قبض لاحق ہوتی ہے۔ ٹھنڈی غذاؤں کو اور ٹھنڈے مشروبات کو پسند کرتا ہے نیز نمکین غذا پسند کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا پسند کرتا ہے حتیٰ کہ سرد ترین موسم سرما میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے۔ گھٹنوں کو چھاتی سے ملا کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ اس دوا کی طبی علامت ہے۔

**اکی نیٹیا (Echinacea):** یہ دوا اندرونی طور پر 3x طاقت میں دی جاسکتی ہے اور بیرونی طور پر پانی میں ملا کر لگائی جاسکتی ہے۔ پانی اور دوا کا تناسب یہ ہے کہ 10 قطرے دوا کے آدھے اونس پانی میں ملائے جاتے ہیں۔

## درد (جوڑوں کا درد، گشیا، وجع المفاصل)

Pain (Pneumatism, Gout and Arthritis)

**برائیونیا (Bryonia):** جب معمولی سی حرکت سے دردوں میں اضافہ ہو جائے اور معتدل قسم کی دواؤں اور گرمی سے افادہ ہو۔ جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے جو کہ گرم اور سوختے ہوئے ہوتے ہیں۔ مریض جاڑا محسوس کرتا ہے۔ یہ دوا 1x ڈاکی لیوشن میں دی جاسکتی ہے یا پھر 200 طاقت میں دی جائے جبکہ چھٹی طاقت کی دوائیں ناکام ہو جائیں۔

**لیڈم پال:** (Ledum Pal): یہ دوا گھٹیا اور جوڑوں کے درد کے لئے مخصوص ہے۔ جبکہ تکلیفات نیچے سے اوپر کی جانب سفر کریں۔ انگلیوں کے جوڑوں میں 'کلائی میں اور انگوٹھوں میں چاک جمع ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں سوزش ہو سکتی ہے۔ جاڑا ہوتا ہے حالانکہ درد ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتر ہوتا ہے۔ چڑچڑاہٹ ہوتا ہے اور تھارہٹ کی خواہش ہوتی ہے۔ شراب نوشی، حشرات الارض کے ڈنک، دھم، درد کا باعث ہو سکتے ہیں۔ گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

**کالمیا لوئی فولیا:** (Kalmia Lotifolia): یہ دوا گھٹیا کے دردوں کے لئے ہے جبکہ تکلیف نیچے کی جانب سفر کرتی ہے۔ جس کے ساتھ من ہو جانے کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور ست نبض کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ درد تیزی سے منتقل ہوتے ہیں۔ کلائی کے عصب میں درد ہوتا ہے۔

**کالچیکم:** (Colchicum): گھٹیا کے لئے یہ ایک عام دوا ہے۔ غذا سے بیزاری ہو سکتی ہے۔ غذا جیسے ہی پیش کی جاتی ہے۔ مریض کو اس کی بو آتی ہے۔ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جوڑوں کی سوجن لاحق ہوتی ہے جو کہ سرخ یا پیلی ہو سکتی ہے۔ پیٹ ہوا سے بھرا ہوتا ہے۔ پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے جو کہ سیاہی کی طرح کالا ہو جاتا ہے۔ استقلاتی سوجن کے ساتھ پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ دردوں یا بوؤں سے نمایاں بچوان ہوتا ہے۔ حرکت سے 'چھوٹے سے یا ذہنی مشقت سے بہتری ہوتی ہے۔ گرمی، آرام اور بیٹھنے سے بہتری ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشوں میں گھٹیا اور جوڑوں کا درد لاحق ہوتا ہے۔

**رشاکس:** (Rhus Tox): جب گرم ہو تو جاڑا لگنے کے باعث گھٹیا کے حملے عود کر آتے ہیں۔ مرطوب موسم کے باعث گھٹیا لاحق ہوتا ہے اور مرطوب ماحول میں بہتری ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے اور پہلی حرکت پر دردوں میں بہتری ہوتی ہے۔ مسلسل حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دیر حرکت کرنے کے بعد دوبارہ بہتری ہو جاتی ہے۔ جب مریض کے لئے رک جانا ضروری ہوتا ہے۔ IM ذائقی لیوٹن میں یہ دوا بہترین نتائج دیتی ہے۔

**کیکٹس جی:** (Cactus G): استسقاء کے ساتھ اور بازوؤں، ٹانگوں میں استقلاتی سوجن کے ساتھ گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ گردے اور آنتیں متاثر ہوتی ہیں۔ دل کا گھٹیا ہوتا ہے جبکہ دل میں تکلیف ہوتی ہے اور جوڑ درد سے آزاد ہوتے ہیں۔

**سٹیلاریا میڈ:** (Stellaria Med): جسم کے تمام حصوں میں دھن کے ساتھ منتقل ہونے والے دردوں کی نشاندہی اس دوا سے کی جاتی ہے۔ جگر میں دردوں کے ساتھ حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ گھٹیا والے جوڑ بڑھ جاتے ہیں اور ان میں سوجن ہوتی ہے۔ جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے۔

ہے۔ (یہ دوا اندر گچھر کو زخموں کے تیل میں ملا کر بیرونی طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔)  
ڈلکامارا: (Dulcamara): ٹھنڈے لگنے سے اور گیلا ہو جانے سے گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ مرطوب  
 تر خانوں میں رہائش رکھنے کے باعث یا ایسی جگہوں پر رہنے کے باعث جس 24 گھنٹے کے اندر  
 درجہ حرارت میں بہت زیادہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ گرمیوں کے گرم دنوں میں جو ٹھنڈی راتوں  
 کے بعد آتے ہیں۔ گھٹیا لاحق ہو جاتا ہے۔ پسینوں کے دب جانے کے باعث گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔  
پلساٹیل: (Pulsatilla): گھٹنوں میں، ٹخنوں میں اور ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں میں  
 تکلیفات ہوتی ہیں۔ درد مٹھل ہونے والا ہوتا ہے۔ جو کہ رات کے وقت آتا ہے۔ گرم کمرے  
 میں اور آرام کرنے پر یہ درد لاحق ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں اور حرکت سے اور گرم چیزیں لگانے  
 سے بہتری ہوتی ہے۔ ایڑیوں میں کیل ٹھونکنے جیسا درد ہوتا ہے۔ مریض شریف الطبع، بزدل  
 اور جلدی سے رو دینے والا ہوتا ہے۔

گولتھیریا آئل: (Gultheria Oil): 10 سے 20 قطروں کی خوراکیں کبھی کبھی درد روکنے میں  
 ناکام نہیں ہوتیں۔

اسکلی پاس ٹیوب: (Asclepias Tub): درد ترجہ چلتے ہیں (مثلاً ایک جانب کے بازو اور  
 ایک جانب کی ٹانگ میں درد ہو۔)

ملیریا آف: (Malaria Off): ملیریا بخار کے بعد گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔

فیرم پیک: (Ferrum Pic): چٹنے سے گھٹیا کے درد میں زیادتی ہوتی ہے یا درد پیدا ہو جاتا ہے۔  
لائکوپوڈیم: (Lycopodium): اچھارہ کے ساتھ انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیاوی درد ہوتا

لیکٹک ایسڈ: (Lactic Acid): ذیابیطس کے ساتھ گھٹیاوی درد لاحق ہو۔

گواکیم: (Guaiacum): آٹھک یا تپ دق والی طبیعتوں میں جوڑوں کا درد اور گھٹیا لاحق  
 ہو۔ گرمی اور حرکت سے دکھتے ہوئے اور سو بے ہوئے جوڑ اور بھی زیادہ درد ہو جاتے ہیں۔  
 جوڑوں میں گھٹیاوی پھوڑے ہوتے ہیں۔ ٹانگ اور ٹخنے کی ہڈیاں خصوصاً متاثر ہوتی ہیں۔ ٹانگوں  
 میں گولی لگنے جیسا درد پاؤں سے گھٹنے تک آتا ہے۔ چٹلی کی بڑی ہڈی میں درد ہوتے ہیں۔  
 ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

فارمیکا اور فارمک ایسڈ: (Formica and Formic Acid): گھٹیا یا جوڑوں کے درد  
 یوریمس اور الیومن کے پیشاب میں خارج ہونے کے باعث لاحق ہوتے ہیں۔ جوڑوں میں  
 سوزش ہوتی ہے جو بہت درد ہوتی ہے۔ حرکت سے، ٹھنڈے سے یا طوفان سے نکل دردوں میں  
 اتھری ہو جاتی ہے اور دہانے سے بہتری ہوتی ہے۔



**لیتھیم کارب (Lithium Carb):** پورک الیمنڈ کے باعث مزمن گھٹیا لاحق ہو۔ دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور دل میں جھکے لگتے ہیں۔ پاؤں کے ٹکڑوں میں درد ہوتا ہے اور پھوٹے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ان میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔

**کالی کارب: (Kali Carb):** ٹانگے لگنے جیسے، خنجر گھونپنے جیسے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ جن میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی طور پر آفاقہ ہو جاتا ہے لیکن آرام کرنے سے یا حرکت کرنے سے کوئی آفاقہ نہیں ہوتا۔ مریض درد کے باعث چلاتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری اور باافراط پسینہ آنے کے ساتھ کمر درد ہوتا ہے۔ اگر پردردھے کو ڈھانپ دیا جائے تو درد ایسے جیسے میں چلا جاتا ہے۔ جو ڈھانپا نہیں گیا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اور کپڑا اتارنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ IM ڈائلی لیوٹن کی صورت میں دوا دیجئے۔

**کلکیریا کارب: (Calcarea Carb):** ہڈیوں کے ریشوں کی ست نشوونما ہڈیوں کی نشوونما بے قاعدہ ہوتی ہے۔ ہڈی کا ایک حصہ پرورش پالیتا ہے جبکہ دوسرا حصہ محروم رہتا ہے۔ رہس ٹاکس کی طرح اس دوا میں بھی درد مسلسل چلنے سے رفع ہوتے ہیں اور لیٹنے سے یا آرام کرنے سے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجع المفاصل والی سو جن یا ہاتھوں اور انگلیوں کے جوڑوں کا گرہ دار گھٹیاوی درد یا گھٹنوں میں گھٹیاوی درد پر گوشت اور پسینے کی طبیعت رکھنے والے مریضوں میں لاحق ہوتا ہے۔ ٹھنڈ سے اتھری ہوتی ہے۔

**گنیشیا میور: (Magnesia Mur):** جب درد بیٹھنے سے اتر ہوں، چلنے سے بہتر ہوں اور لیٹنے سے مکمل طور پر جاتے رہیں۔

**سلی سلک الیمنڈ: (Salicyli Acid):** گھٹیاوی درد جوڑوں پر خصوصاً کہنی اور گھٹنے کے جوڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شدید قسم کی سو جن، سرخی ہوتی ہے اور اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ جلد اور پھیدے والادرد گرمی سے بہتر ہوتا ہے اور ٹھنڈ سے اتر ہوتا ہے۔

**سٹیکٹا پلمونیریا ون ایکس: (Sticta Pulmonaria 1x):** دائیں کندھے کی چھٹی ہڈی یا جوڑے میں گھٹیاوی درد ہوتا ہے۔ کلائی کے جوڑے میں 'ٹخنے یا گھٹنے کے جوڑے میں گھٹیاوی درد ہوتا ہے یہ جوڑوں میں رطوبت کو بھی کم کرتی ہے۔

**الیمنڈ ٹارٹارکیم: (Acid Tartaricum):** پاؤں کے ٹکڑوں میں ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ ٹرائی میتھائل ایمائنیم: (Trimethylaminum): کلائیوں میں اور ٹخنوں میں بخار کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ یہ دوا پورٹس کی مقدار کو گھٹاتی ہے۔

**سرساپاریلہ 200: (Sarsaparilla 200):** سانگولک لوگوں میں گھٹیاوی درد سوزاک کے دب جانے کے باعث لاحق ہوتے ہیں۔ یہ سوزاک کا دوا ٹیکوں کے ذریعے یا دیگر بیرونی استعمال



کے باعث ہوتا ہے۔

بربرس ولگ 200: (Berberis Vulg 200): ایڑیوں کے درد میں افادہ ایڑیوں پر زیادہ وزن ڈالنے سے ہوتا ہے۔ وجع الفاصل اور گھٹیا کی تکلیفات لاحق ہوتی ہیں۔ گردوں میں چپکنے والے درد اور گرد کے باعث۔

مارس ٹریکائیسی فیرا: (Myristica Sebilera): سوزش یا / اور پیپ پڑنا جوڑوں میں یا دیگر حصوں میں لاحق ہوتا ہے۔ انگلیوں کے ناخنوں میں اور ہاتھوں کی پھوٹی پڑیوں میں درد ہوتا ہے۔

چیلی ڈونیم: (Chelidonium): سو جن 'گرمی' نرمی اور سختی کے ساتھ گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔ قبض اور سفیدی مائل پاخانے ہوتے ہیں۔ معمولی حرکت یا چھو جانے سے درد میں افادہ ہو جاتا ہے۔ صرف گرم پانی سے مسلسل نہانے سے ہی افادہ ہوتا ہے۔

کیورم اسٹیکم: (Cuprum Acet): دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں عضلاتی تشنج ہوتا ہے۔ بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔

گنپالیم: (Gnaphalium): کھنڈ اور سن ہو جانے کی کیفیت کے اولے بدلنے کے نتیجے میں درد حقیقہ لاحق ہو۔ ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں بہتری ہوتی ہے۔

گریٹیولا: (Gratiola): تیزابیت اور قبض کے ساتھ گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ کندھوں میں 'بازوؤں میں' انگلیوں میں 'خصوصاً کہنی میں اور کلائی کے جوڑوں میں' جوڑوں کے درد اور گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔

یوپاٹوریم پرف: (Eupatorium Perf): مزمن گھٹیاوی حالت جس کے ساتھ انگلیوں کے جوڑوں میں 'کہنیوں کے جوڑوں میں' انگوٹھوں وغیرہ میں سوزش ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے ساتھ سر میں گھٹیاوی یا نفرتی درد اولتا بدلتا رہتا ہے۔

کالی آئیوڈ: (Kali iod): جوڑوں کی گھٹیاوی تکلیف ہر جوڑ میں ہوتی ہے۔ گھٹیا کے پرانے مریض جنہیں افادہ حاصل کرنے کے لئے کھلی ہوا میں حرکت میں رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ آرام سے بیٹھ جائیں تو تھک جاتے ہیں۔ مریض کرم مزاج 'بد مزاج' پڑ پڑا اور سخت مزاج ہوتا ہے۔

روڈوڈنڈرون: (Rhododendron): گھٹیاوی درد ہوتے ہیں جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں پھرتے رہتے ہیں۔ ساتھ میں جوڑوں کی سو جن بھی ہوتی ہے۔ طوفان باد و باران کے دوران یا پہلے بہتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے یا گیلا ہونے سے یا غیر مستحکم موسم سے بہتری ہوتی ہے۔ گرم کہڑوں میں لپٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ جوڑوں کا بوڑھ جانا گھٹیا کے باعث نہیں ہوتا۔ وجع الفاصل والی کانٹھیں ہوتی ہیں۔

**فانی ٹولا کا:** (Phytolacca): جسم کی مزمن خراش والی حالت، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ جسم دکھتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ بستر کی گرمی سے اتھری ہوتی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے اتھری ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈی چیزیں پسند کرتا ہے۔ جوڑوں کا گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ کان کے قریب کے غدود اور نچلے جڑے کے غدود بڑھ جاتے ہیں۔ دل دانے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ دائیں بازو میں گولی گئے جیسے درد ہوتے ہیں۔

**نیٹرم سلف:** (Natrium Sulph): جب پیشاب میں یورک ایسڈ کے باعث جوڑوں کا درد لاحق ہو۔ جس کے ساتھ معدہ کی تکلیفات بھی ہوں۔

**میگنولیا:** (Magnolia): دل کی تکلیف کے ساتھ گھٹیا کا مرض لاحق ہو۔ تلی اور دل میں درد اول بدل کر ہوتا ہے۔ مریض تھکا ہوتا ہے لیکن اکڑا ہوا نہیں ہوتا۔ بے قاعدہ خفقان ہونے والے درد ہوتے ہیں۔ ضیق انفسی ہوتی ہے۔ تیز چلنے سے دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے۔

**بیسنزوئک ایسڈ:** (Benzoic Acid): یوریک اور تھیمیک طبیعتوں میں جوڑوں کے درد اور گھٹیاوی درد لاحق ہوتے ہیں۔ جب پیشاب کم مقدار میں خارج ہو تو مریض زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ پیشاب زیادہ ہو اور باافراط خارج ہو۔ اس سے دردوں میں افادہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں پیشاب کا رنگ گہرا ہوتا ہے اور پو تیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ گھوڑے کے پیشاب کی پو ہوتی ہے۔ پیشاب میں مواد کے نہ آنے کے باعث درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا مادہ بناتا ہے۔ گھٹیاوی درد ٹھنڈ لگ جانے کے بعد رک جاتے ہیں اور زبان کی سوزش یا معدہ کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں مریض ہر کھانسی جانے والی چیز سے کڑھتا ہے۔ دپے ہوئے درد معدہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر بیسنزوئک ایسڈ انٹیم کروڈ اور سیگنولی نیہا یہ دوائیں مفید بن جاتی ہیں۔ دسہ کی پیچیدگیوں کے ساتھ ٹانگوں میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ لکھتے وقت الفاظ بھول جاتا ہے۔ جب پییدہ آتا ہے تو اداسی اور پریشانی ہوتی ہے۔ یوریکیا (خون میں پیشاب کا شامل ہونا) لاحق ہوتا ہے۔ جاڑا لگتا ہے۔ کپڑا اتارنے سے اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے 'موسم کی تبدیلی سے' حرکت سے اور شراب سے اتھری ہوتی ہے۔ گرمی سے یا باافراط پیشاب آنے سے بہتری ہوتی ہے۔ پھرے والے درد ہوتے ہیں جو اچانک حالت بدل لیتے ہیں۔ جوڑوں میں گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔ یہ دوا گھٹیاوی دردوں کو رفع کرتی ہے۔

**اوگزالیک ایسڈ:** (Oxalic Acid): بائیں جانب کا جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بائیں ہاتھ پھڑپھڑے کی ذریعہ لو میں تیز قسم کے درد ہوتے ہیں۔ یہ علامت اس دوا میں قابل غور ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مرض کا نام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ذات الجنب، نمونیا یا اسل

ہو۔ بہر حال جب یہ درد موجود ہو تو اوگزالک الیمڈ کام کرے گا۔ جوڑوں کا گھٹیاوی درد لاحق ہوتا ہے۔ خصوصاً پینے سے ابتری ہوتی ہے۔ یہ معدے کو خراب کر سکتا ہے۔ تھوک بہتا ہے۔ بے ذائقہ ڈکار آتے ہیں۔ معدہ میں جلن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوا اوگزیریا (وہ مرض جس میں براستہ پیشاب اوگزالیٹ خارج ہوں) کا بھی احاطہ کرتی ہے یعنی اسے شفا دیتی ہے۔ کندھے کے جوڑے کے نیچے درد ہوتا ہے۔ کندھوں کے درمیان میں درد ہوتا ہے۔ جو نیچے چھوٹی کمر تک پھیل جاتا ہے۔ شدید دکھن والا درد کمر میں نیچے رانوں تک ہوتا ہے۔ جس میں حالت کے بدلنے سے آفاقہ ہوتا ہے۔

**مینگانیم:** (Manganum): بازو اور ٹانگیں تکلیف سے پڑھتی ہیں۔ حتیٰ کہ گھٹیا لاحق ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں میں دکھن ہوتی ہے۔ ٹکڑوں میں جلن ہوتی ہے۔ وجع المفاصل والی بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے خلاف میں درد ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتے ہیں۔ یہ دوا عود کر آنے والی تکلیفات میں مفید ہے جبکہ پہلی دفعہ کے حملے میں کم ہی مفید ہوتی ہے۔

**کیمفر:** (Camphor): نیم ہوش مندی کی حالت کے دوران درد محسوس ہوتے ہیں لیکن جب مریض ان کے متعلق سوچتا ہے تو درد غائب ہو جاتے ہیں۔

**کیمومیل:** (Chamomilla): شدید قسم کا تیز درد اچانک آتا ہے جو مریض کو پاگل کر دیتا ہے۔ مریض کہتا ہے کہ وہ موت کو یا کسی اور تکلیف کو ان دردوں پر ترجیح دے گا۔ یہ دوا خصوصاً سن ہو جانے کے ساتھ درد کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

**سیکارم لیکٹس:** (Saccharum Lactis): برقی ٹھنڈے والے درد تمام اطراف میں سے گزر جاتے ہیں۔

**انٹیم کروڈ:** (Antim Crud): گھٹیا تے کے ساتھ اولٹا بدلتا رہتا ہے جب گھٹیا رک جاتا ہے تو تے شروع ہو جاتی ہے۔ اٹھکوں کے جوڑوں میں گرہ دار گھٹیاوی درد ہوتے ہیں نیز جگہ بدلنے والے گھٹیاوی درد ہوتے ہیں لیکن زبان پر سفید طبع ہوتا ہے۔ نحتوں میں شکاف ہوتے ہیں اور منہ کے کونوں میں شکاف ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے غسل سے نفرت ہوتی ہے۔

**میفٹس:** (Mephites): پیشاب کرنے کے دباؤ کے ساتھ پھرنے والے درد ہوتے ہیں۔

**فیسولس این:** (Phaseolus N): ذیابیطس کے ساتھ گھٹیا کے لئے یہ ایک اہم دوا ہے۔

**سابینا:** (Sabina): گھٹیا اور رحم سے سیلان خون ادل بدل کر آتے ہیں۔ سیلان خون کا آغاز ہو جاتا ہے جبکہ گھٹیا رک جاتا ہے اور اسی طرح سے اس کے برعکس ہوتا ہے۔

**سلفر:** (Sulphur): گرمیوں کے دوران دردوں میں ابتری ہوتی ہے۔ صاف غیر ابر آلود ایام میں ابتری ہوتی ہے اور مرطوب و سرد موسم کے دوران ابتری ہوتی ہے۔ مزمن وجع المفاصل

جس کے ساتھ تلووں کی جلن اور سر کی چوٹی کی جلن ہوتی ہے۔  
لائکوپس وی: (Lycopus V): جب دردوں میں بہتری گرم کمرے میں یا بستر میں ہوتی ہے  
 لیکن براہ راست حرارت کے باعث بہتری نہیں ہوتی۔  
اکونائٹ نیپ: (Aconite Nap): گولی لگتے جیسے درد ہوتے ہیں جو شراب نوشی یا کسی  
 دوسری محرک چیز سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت بہتری ہوتی ہے اور بیٹھنے کی حالت میں  
 عموماً درد غائب ہو جاتا ہے۔

اکٹیاریس موسا: (ActR): ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے جوڑوں میں گھٹیاوی تکلیفات ہوتی  
 ہیں اور خصوصاً گردن میں۔ گردن کی گدی میں درد ہوتا ہے۔ یہی اس دوا کی طبیعت علامت  
 ہے۔ جب گھٹیا میں بہتری ہوتی ہے تو دماغی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں یا اسہال لاحق ہو جاتے ہیں  
 جبکہ دماغ میں خلل واقع نہ ہو۔ تھوڑا سا اخراج افقہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اکٹیا سپاکی کاٹا: (Act Spicata): پھاڑنے والے اور کھینچنے والے درد چھوٹے جوڑوں میں  
 اور کلاسیوں میں ہوتے ہیں۔ معمولی تھکاوٹ کے بعد جوڑ سوج جاتے ہیں۔

ایپورٹینم: (Abortanum): اسہال رک جانے کے بعد جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔  
 گھٹیاوی درد جوڑوں سے دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا ریڑھ کی ہڈی کی طرف منتقل ہو جاتا  
 ہے۔ کمر میں اچانک دھکن والا درد ہوتا ہے۔ جس میں حرکت سے بہتری ہو جاتی ہے۔ رات  
 کے وقت اور ٹھنڈی ہوا میں علامات کے اندر بہتری واقع ہو جاتی ہے۔

آرسینک البم: (Arsenic Alb): جلن دار درد آدھی رات کے وقت اور درد دالی جانب  
 لینے سے اترتے ہیں جبکہ گرمی سے اور تکلیف والے حصے کو حرکت دینے سے افقہ ہوتا  
 ہے۔ گھٹیاوی درد کھنی سے کندھے تک ہوتے ہیں۔

جلی میم: (Gelsemium): جلن دار درد جن میں گرمی سے افقہ نہیں ہوتا۔ رات کے 10  
 بجے بہتری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت گھٹیاوی درد ہڈیوں اور جوڑوں میں پھرتے رہتے ہیں۔

ہائپرکیم: (Hypericum): گھٹیاوی وجع المفاصل کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ زخمی  
 عصب کو ٹھیک کرنے میں یہ دوا حیرت انگیز حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ گھٹنے میں کھنچاؤ ہوتا  
 ہے۔ ٹانگ، پاؤں، انگوٹھے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔

مرک سول: (Merc Sol): گھٹیاوی اور وجع المفاصل والے درد ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ  
 بدبودار پھینک آتا ہے۔ جتنا زیادہ پھینک آتا ہے، مریض اتنی ہی زیادہ بہتری محسوس کرتا ہے۔  
 تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بستر میں بہتری ہوتی ہے لیکن جیسے ہی مریض بستر میں گرمی محسوس کرتا ہے۔  
 دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے کپڑے اتار پھینکنا پڑتے ہیں تاکہ بہتری حاصل کر



پسند کرتا ہے یہ حالت اسے آرام بہم پہنچاتی ہے۔ ایزبوں میں درد ہوتا ہے۔ یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ 200 ذاتی لیوشن یا اوچی طاقتوں کی دوا دیجئے۔  
سفی لینم: (Syphilinum): آتشک والی طبیعتوں میں گھٹیاوی دردوں کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں۔ دردوں میں دوران شب اتھری ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 1000 طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

لیکسیس: (Lachesis): گھٹنوں اور کہنیوں میں گھٹیاوی درد ہوتا ہے۔ گھٹنے سوج جاتے ہیں۔ سیان خون کے باعث چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔

ڈروسرا: (Drosera): ران کی ہڈی میں اور لمبی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔  
پائیروجینیئم: (Pyrogenium): پہلی دفعہ حرکت شروع کرتا ہے تو درد میں بہتری ہوتی ہے لیکن جب حرکت وقفے کے ساتھ مسلسل ہوتی رہتی ہے تو اتھری ہو جاتی ہے۔ (رٹاکس کے برعکس) درد سے افاقہ حاصل کرنے کے لئے مریض کو تھوڑی سی حرکت کر کے رک جانا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ تھوڑی سی حرکت کرنا پڑتی ہے اور رک جانا پڑتا ہے اور اسی طرح سے کرتے رہتا پڑتا ہے۔

آرنیکا مونٹ: (Arnica Mont): گھٹیاوی درد کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ مریض چھوئے جانے سے یا کسی کے قریب آنے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے قریب اسے تکلیف پہنچانے کے لئے آ رہی ہے کیونکہ وہ دکھی اور نرم ہوتا ہے۔ گھٹیاوی بخار ہوتا ہے جبکہ دل بھی ملوث ہو سکتا ہے۔

اورم میٹ: (Aurum Met): درد جوڑ جوڑ پھرتے رہتے ہیں اور آخر کار دل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جن کے نتیجے میں انجاننا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں سوجن ہوتی ہے۔ کری ہڈیاں اور ہڈیوں کی تکلیفات ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کے غلاف کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔

اورم میور: (Aurum Mur): پھاڑنے والے، کھینچنے والے، دبانے والے اور سخت قسم کے درد ہوتے ہیں۔ جن میں ٹھنڈے سے بہتری ہوتی ہے اور گرمی سے نیز گرم چیزیں لگانے سے اتھری ہوتی ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ مریض زندگی سے تھک رہا ہوتا ہے۔

نیٹرم فاس: (Natrum Phos): پیٹ کے گول کیرڈوں کے ساتھ گھٹیاوی درد لاحق ہوتے ہیں۔ دل کے نچلے حصہ میں درد ہوتا ہے۔ جب بازوؤں اور ٹانگوں میں نیز انگوٹھوں میں درد دور ہو جائے نیز اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹ: (Argentum Met): اعصاب اور کری ہڈیوں کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں

گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔ خصوصاً کھنی اور گھٹنے میں۔ ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں اور کانپتی ہیں۔ سیدھیاں چڑھتے ہوئے ابتری ہوتی ہے۔ ٹخنوں کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ کری ہڈیوں میں سوزش ہوتی ہے نیز ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور ان میں سخت کانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔ کری ہڈیوں کا موٹا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔

کالوفائلیم: (Caulophyllum): چھوٹے عضلات کا گھٹیاوی درد اور بازوؤں اور ٹانگوں کے چھوٹے جوڑوں کا گھٹیاوی درد لاحق ہوتا ہے۔ کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑوں کا گھٹیاوی درد ہوتا ہے۔ حیض کے زمانہ میں گھٹیاوی درد میں ابتری ہوتی ہے۔ نخل ہونے والے درد ہوتے ہیں جو ہر چند منٹوں میں جگہ بدل لیتے ہیں۔

پتھرولیم: (Petroleum): ایڑیوں میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں جیسے کہ ان میں پھپھیاں پیوست ہوں۔ چلنے سے ابتری ہوتی ہے۔

ارٹیکا یورینس: (Urtica Urens): گاڑھے پیشاب کے ساتھ گھٹیا لاحق ہو۔ ہر پتھر کے 5 قطروں کی خوراک ہر دو یا تین گھنٹوں کے بعد دیجئے۔ یہ دوا ناصرف درد کو دور کر دے گی بلکہ بہت سی پتھریوں کو بھی پیشاب کے راستے خارج کر دے گی۔

نیٹرم میور: (Natrurn Mur): ایسے مریضوں میں گھٹیاوی درد لاحق ہوتے ہیں۔ جو ہمدردی، ہنگامہ، ٹھنڈ، مرغن غذا اور نمک کو ناپسند کرتے ہیں۔ مریض کے ہونٹ سرد موسم میں پھٹ جاتے ہیں۔ ایسے اشخاص میں گھٹیا لاحق ہو جنہوں نے کونین کی بہت زیادہ مقدار استعمال کی ہو یا جاڑے والے اشخاص میں ساحل سمندر پر ابتری ہوتی ہے۔

گلیکریا فاس: (Calcarea Phos): ہڈیوں کی کمزوری اور نرمی لاحق ہو۔ موسم سرما یا ٹھنڈے موسم میں گھٹیا عود کرتا ہے۔ گرم موسم کے لوٹ آنے پر بہتری ہوتی ہے۔

کاربونیئم سلف: (Carboneum Sul): مزمن جوڑوں کے درد اور گھٹیا میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ خصوصاً جوڑوں میں۔

کونیم: (Conium): بازوؤں اور ٹانگوں کو لٹکائے رکھنے سے جب درد میں بہتری ہو۔

اگریکس ایم: (Agaricus M): تریچے درد ہوتے ہیں مثلاً دائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں۔

ٹیرنٹولا: (Tarentula): دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کا درد۔

لائکوپرسیکم: (Lycopersicum): گھٹیاوی درد ہوتے ہیں جو کہ کمرے سے یا گھر سے باہر

کھلی فضا میں ابتر ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے کے پٹھے میں درد زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔

سیلیسا: (Silicea): دیگی کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ گاڑی میں لمبا سفر کیا ہو۔ دیگی کی

ہڈی میں ڈنک لگنے جیسے درد جو دباؤ سے ابتر ہوتے ہیں۔ گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ سختی



سے باندھ دیا گیا ہو۔

**سٹیفیسیگریا:** (Staphisagria): گھٹیا والا وجع المفاصل، تمام جوڑوں میں سختی اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ جوڑوں میں گرہ دار وجع المفاصل۔ معمولی پھوٹے سے ابھری ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی طبی علامت ہے۔

**الیومینا سلیکیٹ:** (Alumina Silicate): جوڑوں، بازوؤں اور ٹانگوں میں، کندھوں میں، کہنی میں، بازو کے اگلے حصے میں، رانوں میں، ٹانگوں میں، پاؤں وغیرہ میں درد ہوتا ہے۔ درد نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتا ہے۔

**امونیا فاس:** (Ammonia Phos): یہ گھٹیا اور جوڑوں کے درد کے لئے بنیادی دوا ہے جبکہ جوڑوں میں گرہیں ہوتی ہیں۔ جوڑوں میں ٹھوس جھٹکا ہوتا ہے اور ہاتھ مز جاتے ہیں اور ان کی ساخت خراب ہو جاتی ہے۔

**تھوجا:** (Thuja): ریشوں کے گھٹیا دی مرض میں یہ دوا مددگار ہوتی ہے۔ خصوصاً کندھوں کی پچھلی جانب اور کولہوں کے علاقہ میں۔ یہ دوا گھٹنوں کی رطوبت کو بھی رفع کرتی ہے۔ IM طاقت کی خوراک دیجئے۔ جوڑوں کا وجع المفاصل جس کی اصل سوزاک ہوتی ہے۔ یہ دوا جوڑوں کو ڈھیلا کرنے میں حیران کن کام کرتی ہے اور حرکت کرنے کے عمل کو بحال کرتی ہے۔ جبکہ دیگر نشاندہی کی کئی ادویات ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔

**ویلیریانہ:** (Valeriana): منتقل ہونے والے گھٹیا دی درد اوپر نیچے چلنے سے اور متاثرہ حصوں کو مسئلے سے رفع ہوتے ہیں۔ پیاس اور منگی کے ساتھ اچانک گرمی کی قہقہاہٹ ہوتی ہے۔ آدھی رات سے پہلے بے خوابی ہوتی ہے۔

**کلکیریا فلور:** (Calcaria Flour): ہڈیوں کی خراب نشوونما کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کی سوزش ہوتی ہے اور پھوڑے ہوتے ہیں۔ مریض گرمی سے بہتر ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ سے ابھری ہوتی ہے۔

**فلورک ایسڈ:** (Fluoric Acid): یہ دوا کانٹھوں کو نیز ہڈیوں کی دیگر غیر موزوں نشوونما کو نرم کرتی ہے اور جذب کرتی ہے۔ اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ متاثرہ حصوں میں کچھ کمزوری اور سرخی ہوتی ہے۔ ناخن تیزی سے نشوونما پاتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔

**پیکرک ایسڈ:** (Picric Acid): ڈاکٹر ایچ۔ بی ہالبرٹ کے تجربات کے مطابق اس دوا نے دوسری کسی بھی دوا کی نسبت بہتر نتائج پیدا کئے ہیں۔

**سمفنی نم:** (Symphytum): چوٹ کے باعث ہڈیوں کے ٹوٹ جانے میں یا دراڑ آ جانے میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کی دراڑوں کے لئے خواہ وہ سادہ ہوں یا بکثرت ہوں۔ یہ



ایک عمدہ دوا ہے۔ 1x یا IM طاقت کی دوا دیجئے۔

روٹا: (Ruta): لمبی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ خواہ چوٹ کے باعث ہو یا گٹھیا کے باعث ہو۔ یہ دوا چوٹوں میں اور ہڈیوں کی دراڑوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

یوفوربیم: (Euphorbium): ہڈیوں میں جلن دار درد ہوتے ہیں یا سرطان میں جیسے کہ بکلی کے جھٹکے لگیں۔ گلے کے غدود میں سوجن ہوتی ہے اور پیپ پڑ جاتی ہے اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ دہی کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

ٹیمس: (Tamus): ہڈیوں کے دردوں میں بیرونی استعمال کے لئے مدد نظر استعمال کیجئے۔

### رکٹس (ہڈیوں کا نرم پڑ جانا)

#### Rickets (Softening of Lones)

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): ہڈیوں کا خیدہ ہو جانا خصوصاً ریڑھ کی ہڈی کی خمیدگی یا لمبی ہڈیوں کا خم کھانا۔ خنازیری اشخاص میں ہڈیوں کی خراب نشوونما بازو اور ٹانگیں بدو شج ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی نشوونما مکمل ہوتی ہے۔ تالو کی ہڈیاں تاخیر سے ملتی ہیں اور دانت بہت دیر سے نکلتے ہیں اور بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ پھولے ہوئے پیٹ والا بچہ۔

کالی کارب: (Kali Carb): ہڈیوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

کلکیریا فاس: (Calcarea Phos): ہڈیوں کی ناموزوں ساخت جس کے ساتھ وزن کم ہو جاتا ہے۔ رکٹس کے لئے یہ بہترین اور منفرد دوا ہے۔ بچہ پتلا ہوتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ اندر کو دھنسا ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ پیٹ پھولا ہوا ہو سر بڑا ہوتا ہے اور تالو لمبے عرصہ تک کھلا رہتا ہے۔ بہ نسبت کلکیریا کارب والے بچے کے جس میں ایسا نہیں ہوتا۔

ٹیوبرکولینم 200 (Tuberculinum 200): علاج اسی دوا سے شروع کیا جائے اور ہر تین مہینے کے بعد اسے دہرایا جائے۔ اس دوا کو دینے سے دو دن پہلے اور دو دن بعد تک کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔

فلورک ایسڈ (Flouric Acid): یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً جب آتھکی اور ریڑھ کی ہڈی کی سوزش کا احتیاج پایا جائے۔ جسم کی ساخت کمزور ہوتی ہے اور رنگ زرد ہوتا ہے۔ عضلات نرم ہو جاتے ہیں اور پلپے ہو جاتے ہیں نیز پاؤں اور ہاتھ مسلسل پیسے سے بھیگے رہتے ہیں۔

سیلیشیا (Silicia): تالو کی ہڈی کھلی رہتی ہے۔ پیٹ سوجا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سر پر کھٹا لینہ بہتات کے ساتھ آتا ہے اور جسم خشک ہوتا ہے، آبلے ہوتے ہیں۔

پھوڑے ہوتے ہیں۔ جن غدد میں پیپ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہیں بھی اسی دوا سے آرام ملتا ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryta Carb): جب ذہنی اور جسمانی ہوتا پن لاحق ہو۔ ٹانسز اور گردن اور گلے کے عضلات لمبے ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں۔

کلکیریا فلور (Calcarea Flour): نوزائیدہ بچوں کی کھوپڑی کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں اور سوج جاتی ہیں۔ دانتوں پر ٹاکنی انیل ہوتا ہے۔ سرویکل غدد عموماً سخت ہوتے ہیں اور پیپ کے ساتھ ہڈیوں میں گاتھیں پڑ جاتی ہیں۔

کریوزوٹ (Kreosote): بچوں میں جب دانت بہت جلد تباہ ہوتے نظر آئیں خصوصاً دودھ کے دانت، ان دانتوں پر گہرے داغ دکھائی دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ دانت ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔

ارجنٹم مائٹ (Argentum): ذہن اور قبل از وقت دماغی طور پر نشوونما پانے والے بچے، پاخانے پکے ہوتے ہیں اور سفید اخراج ہوتا ہے۔ مٹھائیوں کی طلب ہوتی ہے۔

ہیرٹا میور (Baryta Mur): پیلے، ست اور سوکھا مسان والے بچے حتیٰ کہ جو بغیر مدد کے کھڑے بھی نہ ہو سکیں۔ ٹانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دلی کمزور ہوتا ہے اور سردی سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔

### عرق النساء — Sciatica

کولوسنٹھ (Colocynth): حاد عرق النساء کے درد کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ مدہم ٹانگے لگنے جیسے درد کولمے میں ہوتے ہیں۔ جو اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور کولی کی سی تیزی کے ساتھ ران کے پچھلے حصہ تک یعنی چوتھ تک چلے جاتے ہیں یا گھٹنوں تک چلے جاتے ہیں یا پاؤں تک چلے جاتے ہیں۔ درد میں گرمی سے بہتری ہوتی ہے اور چھونے سے یا حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ دوا اونچی طاقت میں دی جا سکتی ہے مثلاً 200 طاقت میں۔ چار سے پانچ گھنٹوں کے وقفہ کے ساتھ تین یا چار خوراکیں دی جا سکتی ہیں۔

رشاکس (Rhus Tox): جب درد ہوا لگنے سے یا عضلاتی تحکیم کے باعث لاحق ہو۔ رات کے وقت بہتر میں یا جب مریض آرام کرے بہتری ہو جاتی ہے۔ پہلی حرکت شدید قسم کے درد کا باعث بنتی ہے۔ جس میں اتفاقاً تھوڑا سا چلنے کے بعد ہوتا ہے۔

نیفالیم (Gnaphalinem): عصب میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اینفلمن ہوتی ہے یا اول بدل کر سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ پنڈلی اور پاؤں

میں درد ہوتے ہیں۔

**میکروٹاسٹم (Macrolinum):** کہا جاتا ہے کہ یہ عرق النساء والے درد کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ اسے 2x ٹرائی ٹوریشن میں دینا چاہئے۔

**ڈائیو سکوریا (Dioseorea):** ٹانگوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ جو حرکت کرنے سے یا بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے۔

**گنیشیا فاس (Magnesia Phos):** بجلی چمکنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جو گرمی سے بہتر ہوتے ہیں۔ دائیں جانب والی دوا۔

**ایسڈ سلف (Acid Phos):** اس دوا سے عرق النساء اور کمر درد کے بہت سے کیسوں کا علاج کیا گیا ہے جبکہ اچھی منتخب شدہ ادویات تکام ہو گئی تھیں۔

**آر سینیکم البم (Arsenicum Albe):** جب مریض کو لمبیرا اور وقفہ دار درد کے بار بار حملے ہو چکے ہوں۔ شدید قسم کا کھینچنے والا، جلن دار اور پھاڑنے والا درد بائیں کولے میں ہوتا ہے جو پھیل کر چوتھوں تک چلا جاتا ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے شدید قسم کی بے چینی کو افادہ ہوتا ہے۔

**روٹا (Ruta):** یہ رشاکس کے مماثل ہے۔ اس کی تمام علامات درد کے علاوہ ایک جیسی ہیں۔ روٹا میں درد کی لہریں گہری چلی جاتی ہیں اور اعصاب کی شاخوں میں اندر کی جانب گھسکتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ باہر کی جانب آئیں۔ ٹھنڈے اور لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

**کیمومیلا (Chammomilla):** عرق النساء کا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ ایک دماغی علامت ہوتی ہے۔ ”میں درد کی نسبت موت کو ترجیح دوں گا۔“

**کلکیریا کارپ (Calcarea):** پاؤں ٹھنڈے اور نیچے ہونے کے ساتھ عرق النساء کا درد لاحق ہوتا ہے۔ رشاکس کی طرح چلنے سے افادہ ہوتا ہے۔

**موربیلینم (Morbillinum):** اسے عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے جبکہ عرق النساء کا درد کھانا کھانے کے بعد شروع ہو۔ 1000 ڈائی لیوشن کی دوا دیجئے۔

**ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip):** درد عرق النساء جس کے ساتھ مدہم درد کمر ہوتا ہے۔ جو چلنے کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ مریض جھکتا ہے اور پھر تھکنے کے بعد اٹھنے سے بہت درد ہوتا ہے۔

**گلیسنی کم (Glinicum):** عرق النساء کے لئے یہ مخصوص دوا ہے جبکہ اچھی منتخب شدہ ادویات تکام ہو جائیں۔ تیزابیت ہوتی ہے۔ زبان طبع شدہ ہوتی ہے۔ ذائقہ کندہ ہوتا ہے اور سانس متعفن ہوتا ہے۔ IM طاقت کی دوا دیجئے۔

**امونیم میور (Amm Mur):** عرق النساء کا درد۔ جیسے کہ بند بہت چھوٹے ہو گئے ہوں۔ بیٹھنے

یا چلنے سے ابتری ہوتی ہے۔

میڈورنیم 200 (Medorrhinum 200): جب تمام منتخب شدہ ادویات ناکام ہو چکی ہوں اور مریض بستر پر ٹانگیں اوپر اٹھائے لیٹ جائے۔ یہ حالت درد میں اتفاق کا باعث ہوتی ہے۔  
 کاپچیکم (Colchicum): دائیں جانب چیز گولی نکلنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جو پھیل کر گھٹنے تک چلے جاتے ہیں۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ درد اچانک ہوتا ہے۔ مسلسل اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): گھٹیا کی اصل والا عرق النساء۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ سخت دہانے سے اتفاق ہوتا ہے۔  
 پلمبم (Plumbum): عضلات کی کمزوری کے ساتھ عرق النساء لاحق ہو۔ بجلی گرنے کے سے درد ہوتے ہیں نیز اینٹھن کے دورے ہوتے ہیں۔

### حصہ دوم — عضلات

پٹھوں کا ڈھیلا پن (جب پٹھے سکڑنے کے قابل نہ رہیں)

#### (Amyotonia)

جلسی میم (Gelsemium): عضلات ڈھیلے ہوتے ہیں۔ جلد تھک جاتے ہیں۔ کمزوری اور کپکپاہٹ عضلاتی نظام میں ہوتی ہے۔ عضلاتی ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی طاقت کھو جاتی ہے۔ گھٹنوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیاں اپنی جگہ پر نہ ہوں۔  
 کوکولس (Cocculus): جب چکروں کے ساتھ یہ مرض لاحق ہو۔  
 کاسٹیکم (Causticum): جب جلسی میم ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزما چاہئے۔ عضلات چھوٹے ہو جاتے ہیں نیز سخت ہو جاتے ہیں جو کہ ہاتھ لگانے سے سخت کھردرے محسوس ہو سکتے ہیں۔ عضلات اور بندھن کھینچ جاتے ہیں۔

#### اینٹھن — Cramps

(نیز دیکھئے ”لکھاریوں کی اینٹھن“)

بیسزڈنک ایسڈ (Benzoic Acid): حرکت سے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔  
 رشاکس (Rhus Tox): اینٹھن کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ آرام کرنے سے ابتری ہوتی ہے اور حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ حرکت سے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): رات کے وقت بستر میں اینٹھن میں اتھری ہوتی ہے اور بستر میں ٹانگیں اکڑتی ہیں۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): شدید قسم کی اینٹھن ہوتی ہے خصوصاً پندلیوں میں۔

سیکل کار (Secale Cor): پندلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

پٹرولیم (Petroleum): پنوں کی اکڑن (کڑل) ڈنک لگتے ہیں اور انگوٹھوں میں گولیاں لگتی ہیں۔

گنیشیا فاس (Magnesia Phos): اینٹھن ہوتی ہے، اکڑن ہوتی ہے۔ سن ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ بودا پن ہوتا ہے۔ اعصاب کی مرگی ہوتی ہے۔ ان سب علامات کا باعث تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کے طویل استعمال کے باعث مصنفین کی اینٹھن۔

نیٹرم فاس (Natum Phos): پندلیوں میں اور پاؤں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ لکھتے وقت ہاتھوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ جوڑوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔

کیمفر (Camphor): بازوؤں اور ٹانگوں کی برقی ٹھنڈک کے ساتھ اینٹھن لاحق ہو۔

### عضلات کی کمزوری Myasthenia

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب کمر کے لمبے عضلات بری طرح سے پھٹ چکے ہوں اور وہاں ریشہ دار نسج (ظیلے) بننے کا ثبوت موجود ہو۔ نتیجتاً کمر درد لاحق ہوتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): علاج اسی دوا سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ IM طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔ یہ دوا اس مرض میں بھی دی جاتی ہے۔ جس میں طبی طور پر رضاکار عضلات میں غیر معمولی تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے باعث ان کا قابو مکمل طور پر جاتا رہتا ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): پنوں کی قناعت کے لئے عمدہ دوا ہے۔ خون کی کمی وغیرہ کے ساتھ عضلات کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): عضلات کے فالج اور قبض کے ساتھ عضلات کی کمزوری لاحق ہو۔ یہ دوا ٹانگوں کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): آسانی کے ساتھ نقل و حرکت ہونے کے ساتھ پنوں کی کمزوری لاحق ہو۔ رضاکار عضلات مریض کی خواہش کے مطابق عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

ایٹاکارڈیم (Aacardium): رضاکار عضلات پر قابو نہیں رہ سکتا۔ فاطر العقلی کے ساتھ عضلات کا فالج۔

## عضلات کی سوزش — Myositis

**برائی اونیا (Bryonia):** یہ دوا سوزش کی نشاندہی کرتی ہے۔ عضلات میں فعلی اور ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں خصوصاً بازوؤں اور ٹانگوں میں۔ اول علامات یہ ہوتی ہیں کہ جھٹکے لگتے ہیں۔ ٹانگے لگنے جیسے، پھاڑنے جیسے اور چبھنے والے درد ہوتے ہیں۔ دوئم سوجن ہوتی ہے۔ حرارت اور سرخی ہوتی ہے۔ سوئم سختی ہوتی ہے اور حرکت میں غمبایاں دقت ہوتی ہے۔ یہ علامات عضلات کی جراثیمی سوزش میں پائی جائیں گی۔

**آرنیکا مونٹ (Arnica Mont):** جب عضلات کی سوزش کی وجہ زخم جراثیم ہو یا کد اوزار سے لگنے والا زخم ہو۔

**رشاکس (Rhus Tox):** جب مندرجہ ذیل حالت گھسیاوی پیچیدگیوں کے ساتھ لاحق ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

**تھوجا (Thuja):** عضلاتی سوزش میں ہڈی بننا شروع ہو جائے۔ یہ دوا اس طرح سے ہڈی بننے کے عمل کو روک دے گی۔

## ماسیوٹونیا (Myotonia)

(حرکت کرنے پر عضلات کی بڑھی ہوئی کچن)

**رشاکس (Rhus Tox):** یہ واحد دوا ہے جو حرکت کرنے پر عضلات کی بہت زیادہ کچن کے لئے آزمائی جاسکتی ہے۔

## عضلات کی لاغری (بڑھی ہوئی) Muscular Atrophy

**پلمبم (Plumbum):** یہ چونٹی کی دوا ہے اور عضلات کی مکمل جاتی والے سادہ پیمپن کی علامات کو شفا دیتی ہے۔ یہ نہ صرف دماغی عضلات کا احاطہ کرتی ہے بلکہ دھڑ، بازو، ٹانگیں اور دیگر اعضاء کے عضلات کو بھی شفا دیتی ہے۔ حسیت مکمل طور پر جاتی رہتی ہے۔ کمزوری ہو جاتی ہے۔ گردن میں کٹن، جکڑن، کپکپاہٹ، مروڑ اور گولی لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ کندھوں کے عضلات کا کھنچاؤ اور ناطاقتی ہوتی ہے۔ استقلالی سوجن ہوتی ہے۔ چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ عضلات کا اختصار لاحق ہو جاتا ہے۔ (یعنی عضلات چھوٹے ہو جاتے ہیں) رات کے وقت اور حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ 200 یا 1000 ڈالنی لیوشن میں دیجئے۔

**ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit):** ریڑھ کی حسیت، ریڑھ کی ہڈی میں بہت شدید درد ہوتا

ہے جس میں رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری اور عمومی کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چلا جاسکتا۔ پنڈلیوں میں سختی نیز لاغری ہوتی ہے۔ مریض چلنے میں اور کھڑے ہونے میں غیر متوازن ہوتا ہے۔ رات کے وقت اور سردی سے اتھری ہوتی ہے۔ تازہ ہوا سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryta Carb): سن بلوغ کو پہنچ کر عضلات میں ناطاقتی پیدا ہو جائے۔ فاسفورس (Phosphorus): بعض حصوں کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے اور دیگر میں ناطاقتی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کی ساخت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسے لبا ہونا چاہئے۔ کھوکھلی منفرد چھاتی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ تپ دق والا یا آتشک والا مزاج ہوتا ہے۔ کپکپاہٹ کے ساتھ جھلن ہوتی ہے۔ سن ہو جانا اور کمزوری نمایاں علامات ہیں۔

میورٹک ایسڈ (Mur Acid): یہ دوا فیون کے زیادہ استعمال کے بعد لاحق ہونے والی عضلاتی کمزوری کا علاج کرتی ہے۔

تھلیئم (Thallium): عضلاتی ناطاقتی لاحق ہو۔ چلنے میں درد ہوتا ہے۔ لرزہ ہوتا ہے۔ معدے میں درد ہوتا ہے اور آنکھوں میں بجلی کے جھکے لگنے جیسی کیفیت ہوتی ہے۔


کالی فاس (Kali Phos): عضلاتی ناطاقتی کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس حالت کے ساتھ تعلق رکھنے والے وائرس کو یہ دوا تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک طبعی دوا ہے جسے دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔

آرنیکا ایم، کیورم میٹ، ہیررا آیوڈ (Baryta Iod, Cuprum Met, Arnica M): متذکرہ بالا مرض کے لئے یہ دوائیں بھی مفید ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں دی گئی ترتیب کے مطابق مندرجہ بالا ادویات کے ناکام ہو جانے پر آزمائی جاسکتی ہیں۔

## پٹھوں کی سوزش ہڈی کے بننے کے عمل کے ساتھ

### Progressive (Ossifying Myositis)

کلکیریا فلور (Calcarea): یہ ایک عمدہ دوا ہے اور اسے طویل عرصہ کے لئے آزمانا چاہئے۔ یہ دوا مرض میں بہتری پیدا کرنے میں ناکام ہو جائے تو نیچے دی گئی ترتیب کے مطابق درج ذیل ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں: کلکیریا فاس، ایسڈ فلور، منہی ٹم۔





# جلد، بالوں اور ناخنوں کے امراض

(Diseases of Skin, Hair and Nails)

1- جلدی امراض ایک معالج کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں چنانچہ یہاں ان امراض کے متعلق اہم امور کا خصوصی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوائے چند امراض کے تمام جلدی امراض اندر سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ اسی لئے ان کا علاج بھی اندرونی طور پر استعمال ہونے والی ادویات کے ذریعے کرنا چاہئے۔ جلد کی کوئی اپنی خود منحصر زندگی نہیں ہوتی۔ پھوڑے پھنسیاں محض اندرونی انتہی کے باعث ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک مکمل صحت مند جسم کی جلد یقیناً مکمل طور پر صحت مند ہوتی ہے۔ نیز ایک بیمار جلد کسی مکمل صحت مند جسم کے اوپر نہیں ہو سکتی چنانچہ جلدی امراض کا علاج بیرونی استعمال کے ذریعے کرنا ایک سنجیدہ اور خطرناک پیشہ ورانہ غلطی ہے۔ بیرونی استعمال کے ذریعے مرض کو غائب کر دینا درحقیقت اس مرض کو دبا دینا ہے جو کہ جسم کے کسی دوسرے حصہ پر اندرونی طور پر حملہ کر سکتا ہے اور احتمالی برے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جلدی امراض کا علاج بیرونی طور پر چیزیں استعمال کرنے کے ذریعے یا لوشنوں کے ذریعے غلط اور خطرناک طریقہ کار ہے۔

2- جلد کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مادوں کو خارج کرنے والا ایک عضو ہے اور سارے جسم پر پھیلا ہوا ہے۔ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ وہ جسم کے اندرونی اعضاء کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جلد کا ہر حصہ کسی نہ کسی اندرونی عضو یا حصے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے چنانچہ جلدی امراض اکثر و بیشتر اندرونی امراض کا بیرونی تاثر ہوتے ہیں (یعنی اندرونی امراض اپنا اظہار بیرونی طور پر جلدی امراض کے ذریعے کرتے ہیں۔ مترجم)

3- جلدی امراض میں مبتلا ہونے والے اشخاص کے لئے دودھ اور سبزیاں پر ہمیزی غذا ہیں۔ گوشت یا انڈوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نظام انہضام کو درست رکھنے کے لئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

4- متاثرہ حصوں کو صابن کے ساتھ دھونے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ متاثرہ حصوں کو چو کر کے پانی کے ساتھ صاف کرنا چاہئے۔



## حصہ اول --- جلد

### دنبیل — Abscess

(دیکھئے ”پھوڑے“)

### مہاسے (چہرے پر کیل مہاسے) (Acne)

#### (Pimple on the Face)

ایسٹریاز رب (Asterias Rub): سن بلوغ کو پہنچنے پر چہرے پر نکلنے والے کیل مہاسوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

کالی بروم (Kali Brom): اگر ایسٹریاز رب ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔  
تھوجا (Thuja): چہرے اور ناک کے مہاسوں کے لئے نیز ناک کی جلدی سوزش کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

آر سینک آئیوڈ، سلفر آئیوڈ (Sulphur lod, Ars lod): راسخ قسم کے کیسوں میں ان دواؤں کو آزمایا جاسکتا ہے۔ ایسے کیسوں میں جو شدید قسم کے ہوتے ہیں۔

ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle): رحم کی خرابیوں کے ساتھ جب چہرے پر مہاسے ہوں۔  
اگیریکس (Agaricus): جب کیل مہاسوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں پھٹنے کا (بوائیوں کا) رجحان بھی ہو۔

بربرس (Berberis Aquifolium): لڑکیوں کے چہروں پر مہاسے، بدرنگ دھبے اور کیل ہوتے ہیں۔ یہ دوا جلد کو صاف بھی کرتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): حیض سے پہلے چہرے پر سرخ باد ہوتا ہے۔ مرطوب پھوڑے پھنسیاں اور بدرنگ دھبے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں ابتری ہوتی ہے۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): مہاسوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جن میں زیادتی انڈے کھانے سے اور موسم سرما کے دوران ہوتی ہے۔ پیشانی کا درد ٹھنڈی ہوا سے بہتر ہوتا ہے۔

اکونائٹ لائیگو ٹونم (Aconite Lycotonum): شدید تپ دق والے کیل مہاسے چہرے پر ہوتے ہیں۔ ہونٹوں پر کیل ہوتے ہیں۔

سورینم (Psorinum): مہاسے جن میں ابتری دوران حیض، چکلتائی سے، شکر، کافی اور گوشت

سے ہوتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcareo Phos): سن بلوغ کو پہنچنے پر خون کی کمی والی لڑکیوں میں کیل  
مہاسے ظاہر ہوتے ہیں۔ کھوپڑی کا درد سر ہوتا ہے اور اچھارے والی بد ہضمی ہوتی ہے۔ جس  
میں افادہ کھانے سے ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): مہاسے یا کیل چہرے پر ہوتے ہیں جبکہ مریض کی ہسٹری میں حفاظتی ٹیکوں کا  
نہ لگایا جاتا ہوتا ہے۔

بووٹا (Bovista): کاسیٹکس (سرخی پاؤڈر وغیرہ) کے استعمال کے باعث چہرے پر کیل مہاسے  
ہو جاتے ہیں خصوصاً موسم گرما کے دوران۔

اورم آرسینک (Aurum Ars): مہاسے کیل چہرے پر اور ماتھے پر ہوتے ہیں نیز پھوڑے  
ہوتے ہیں جلد کی دق لاحق ہوتی ہے۔

سینگلوکی نیریا سی (Sanguinaria C): چہرے پر مہاسے ہوتے ہیں جو حیض کے زمانہ میں ابتر  
ہو جاتے ہیں جبکہ حیض کم مقدار میں ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): جب اچھی منتخب شدہ ادویات افادہ دینے میں ناکام ہو جائیں یا جب ان کی  
افادت رک جائے تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): ایسے کیل مہاسوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے جن  
میں سفید رنگ کی پیپ پڑی ہوتی ہے۔

آرسینک سلف ربرم (Ars Sul Rubrum): یہ دوا مہاسوں کی نشاندہی کرتی ہے جب کہ  
ان کے ساتھ ایگزیمیا اور جلدی خارش بھی ہوتی ہے۔

## حجام کی خارش

(Barber's Itch)

(نیز دیکھئے دان)

لیتھیم کارب (Lithium): رخساروں پر کھربڑ والے پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں جن سے  
پہلے جلد سرخ ہوتی ہے اور اس میں دھکن ہوتی ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دیجئے  
شرطکہ 30 ڈائی لیوشن ناکام ہو جائے۔

پٹرولیم (Petroleum): جلد خشک، حساس، کھردری اور شکاف دار ہوتی ہے۔ شکافوں سے  
آسانی کے ساتھ خون بہتا ہے۔

سلفر آیوڈ (Sulphur Iod): چہرے کے مشہور پھوڑے، پھنسیاں، بال اکڑے ہوئے محسوس

ہوتے ہیں۔

رشاکس (Rhus Tox): یہ دوا حجام کی خارش کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ کسی دوسری دوا کے انتخاب سے پہلے اسی دوا کو آزمانا چاہئے۔

لیکیس (Lachesis): جب جلد پر شکاف ہوں جن سے مواد رستا ہو۔ یہ دب جانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): چمکوں والے پھوڑے پھنسیاں جو نیچے سے پہلے ہوتے ہیں اور ان کے منہ کے کناروں سے خون بہتا ہے۔

سلفر (Sulphur): خشک خارش ہوتی ہے جو ناک پر اور آنکھوں کے گرد ابتر ہوتی ہے۔

گرافائٹس (Graphites): انگیزیم کی قسم کی خارش ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ چھچھپاہٹ والا مادہ خارج ہوتا ہے۔

سکیوٹا وائروسا (Cicuta Vir): شیو کرنے کے باعث حجام کی خارش لاحق ہو۔

### پھوڑے — (Boils)

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے مرحلہ میں جب پھوڑے سرخ ہوتے ہیں۔ پیپ بننے کے عمل کے بغیر ٹپکن والا درد ہوتا ہے 'خون والے پھوڑے ہوتے ہیں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب پھوڑے سرخ نہ ہوں بلکہ پہلے ہوں اور پھر درد ہوں 'ہر چار گھنٹے بعد 200 طاقت کی دوا دیجئے 'تین یا چار خوراکیں کافی ہو سکتی ہیں۔

آرسینک البم (Ars Alb): گوشت خود پھوڑے کے لئے بہترین دوا ہے۔ ساتھ میں جلن ہوتی ہے۔ جیسی کہ متاثرہ حصے پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہو۔ کاٹنے والے اور جلن دار درد آدمی رات کے وقت ابتر ہو جاتے ہیں۔ پیپ انٹھریکس تکام ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulphur): پیپ بننے کے عمل کے ابتدائی مرحلہ میں متاثرہ حصوں کی حساسیت اعتدال سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ چھڑی لگنے جیسے تیز درد ہوتے ہیں۔ پھٹی ذاتی لیوشن کی صورت میں یہ دوا ہر آدمی گھنٹے کے بعد دیجئے۔ یہ پیپ بننے کے عمل کو روک دے گی یا چند گھنٹوں میں پیپ کو ساکن کر دے گی۔ پیپ لگانا شروع ہونے کے بعد اس کی نشاندہی کی جائے گی جب کہ پیپ گاڑھی زرد ہوتی ہے اور مریض چھونے سے حساس ہوتے ہے 'مریض جاڑا محسوس کرتا ہے 'لیکن سلیشا کے برعکس مرطوب موسم میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ یہ دوا پھوڑوں میں درد دور کرنے کی بہت بڑی دوا ہے۔ ناخنوں کی جڑ کے گرد اور انگلیوں

کے سروں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

سیلیا (Silicea): جب شفا یاب ہونے کی قوت بہت کم ہو، پیپ پتلی اور پانی والی ہوتی ہے، بغیر درد کے ناسور ہوتے ہیں جو تندرست ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، اونچی طاقت کی خوراک دیجئے مثلاً 200 یا 1000، ہر ہفتے یا مہینے کے بعد دوہرائی جائے۔ مریض جاڑا محسوس کرتا ہے۔ خشک اور گرم موسم میں بہتری ہوتی ہے اور مرطوب و سرد موسم میں ابتری ہوتی ہے۔

مرک آیوڈ (Mercuriod): پھوڑوں کے سوزش والے مرحلہ میں یہ ایک اچھی دوا ہے۔ جبکہ پیپ بننے کا عمل نہیں ہوتا، غدودی پھوڑوں میں یہ دوا دی جاتی ہے، جب پیپ بن چکی ہو تو یہ سبز پتلی اور پانی والی ہوتی ہے، شدید قسم کی چمکدار سرخی ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹپکن والا اور ڈنک لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): چھوٹے پُر درد پھوڑوں کا رجحان ہوتا ہے جو ایک کے بعد ایک بننے چلے جاتے ہیں اور جن میں انتہا درجے کی دکھن ہوتی ہے، بے شمار تعداد میں چھوٹے پھوڑے ہوتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): لاتعداد چھوٹے پھوڑے ہوتے ہیں، اگر آرنیکا مونٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

انتھراکسیئم (Anthraxinum): گوشت خود پھوڑوں میں یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اس میں جلن ہوتی ہے اور اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ ہر پندرہ روز کے بعد 1000 طاقت کی دوا دیجئے، ایک ہی خوراک سے شفا ہو جائے گی یا بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sulph): ایسے پھوڑے جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان سے مسلسل پیلے رنگ کی پیپ خارج ہوتی ہے، مریض کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے لیکن ہوا کے جھونکوں سے حساسیت ہوتی ہے۔ پھوڑوں کے بننے کا رجحان۔

لیکیسی (Lachesis): نظامت ماکل رنگ والے پھوڑے ہوتے ہیں جن سے خراش دار پیپ خارج ہوتی ہے جو کہ بدبودار ہوتی ہے۔ جلن دار درد ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔

ٹیرنٹولا سی (Tarentula C): دہل، پھوڑے، گوشت خور پھوڑے، قیلن (تھلین پھوڑے) جان لیوا ناسور اور فساد نیچا لاحق ہوتا ہے۔ سخت، نرم، سوزشی، بال توڑ لاحق ہو، یہ دوا خصوصاً پھوڑوں کے ہر مرحلہ کے لئے استعمال ہوتی ہے، بغل کے نیچے دہلوں کے لئے خصوصی دوا ہے۔

گن پائوڈر (Gunpowder): پھوڑے، داغ، کرموں کا جلد میں داخل ہونا اور خون میں زہر

پیدا ہو جانے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

مائرس ٹریکالیس (Myristica S): جوڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یہ پیپ پڑنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے اور اس کے دورانے کو کم کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے سروں پر دہل ہوتے ہیں نیز پوروں پر پھوڑے ہوتے ہیں 3x ڈائی لیوشن دیجئے۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): کمر کے علاقہ میں ڈیابیطس کے ساتھ گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں، بہت گندی بو کے ساتھ کئی جگہوں سے پیپ خارج ہوتی ہے، مریض سلی اور بدبودار تے میں جھلا ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی دوا دیجئے۔

سٹرامونیم (Stramonium): شدید دردوں کے ساتھ دہل یا پھوڑے ہوتے ہیں۔ سوزش ہوتی ہے، مزمن گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں، عام پھوڑے ہوتے ہیں، جوڑوں میں دہل ہوتے ہیں خصوصاً بائیں کولے کے جوڑ میں بدترین قسم کی زہریلی کیفیت ہوتی ہے اور پیپ بننے کا عمل ہوتا ہے۔

لیڈم پال (Ledum Pal): سوئی چھ جانے کے باعث پھوڑے یا بھریاں ہو جاتی ہیں۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): اندرونی کان میں پھوڑے ہوتے ہیں۔

موربین لینم (Morbillinum): کان کے بیرونی سو راخ میں بار بار پھوڑے نکلتے ہیں۔ شدید قسم کا درد ہوتا ہے، مریض کی ہسٹری میں قدیم جچک پائی جاتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): سبز مواد کے ساتھ چھوٹے اور درد کرنے والے پھوڑے نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ پکتے ہیں۔

## گوشت خور پھوڑے (دنبل)

(Carbuncles)

(دیکھئے ”پھوڑے“)

## کٹے پھٹے ہاتھ اور انگلیوں کے پوروں میں شکاف

(Chapped Hands & Cracks in Finger Tips)

پٹرولیم (Petroleum): انگلیوں کے سروں پر اور ہاتھ کی پشت پر شکاف ہوتے ہیں، جلد کھردری یا کٹی ہوئی ہوتی ہے، خون بہتا ہے، نیس سخت ہو جاتی ہیں، اکثر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ مختصر حصوں میں غصہ ک ہوتی ہے، منہ میں کمر میں پیٹ وغیرہ میں۔

**رٹاکس (Rhus Tox):** جھنجھناہٹ اور جلن کے ساتھ جلد میں بیجان ہوتا ہے۔ انگلیوں کے پوروں میں ریگن کا احساس ہوتا ہے۔ جلد سرخ اور سوجنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھنڈے مرطوب اور برسات کے موسم میں ابتری ہوتی ہے۔

**سیلیشا (Silicea):** نازک، پتلی اور موی جلد، انگلیوں کے سروں پر شکاف ہوتے ہیں، بدبودار پیپ ہوتی ہے، انگلیاں خشک محسوس ہوتی ہیں، خارش صرف دن کے وقت اور شام کو ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈا ہوتا ہے، اسے جاڑا لگتا ہے، آگ ٹاپتا ہے، ہوا کے جھونکوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

**سلفر (Sulphur):** بیرونی ادویات کے استعمال کے بعد جلدی تکلیفات لاحق ہوتی ہیں۔ کھانے سے اور دھونے سے ابتری ہوتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے، اس پر کھرچہ جھتے ہیں اور غیر صحت مند ہوتی ہے۔ خارش اور جلن ہوتی ہے، ہاتھوں پر گرم پینہ آتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، جلد جاگ جاتا ہے۔

**نیٹرم میور (Natrium Mur):** انگلیوں کے ناخنوں کے قریب خشکی ہوتی ہے اور شکاف پڑتے ہیں۔ ہتھیلیاں گرم ہوتی ہیں اور ان میں پینہ آتا ہے۔ ٹھنڈ لگتی ہے، بہت زیادہ کمزوری اور تھکاوٹ ہوتی ہے، معمولی باتوں پر مریض کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ہمدردی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے، جلد چکنی ہوتی ہے۔

**الیومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate):** ہاتھ مسلسل پھٹے رہتے ہیں، ہاتھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ناخنیں اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں اور انگلیاں ٹپکی ہوئی ہیں، ناخن بھر بھرے ہوتے ہیں۔

**چیلوئیڈ (زخم کے نشان پر دانے دار ابھار)**

(Cheloid)

(دیکھئے "کیلوئیڈ")

**بوائیاں — (Chilblains)**

**اگیریکس مس (Agaricus Mus):** چوٹی کی دوا ہے۔ ٹھنڈے موسم کے دوران زیادہ درد والی بوائیاں ہوتی ہیں یعنی ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ خارش ہوتی ہے، ٹھنڈ کے کانٹے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

**سورینم (Psorinum):** جلد کمزوری ہوتی ہے۔ آسانی کے ساتھ پھٹ جاتی ہے۔ مونی ہو جاتی

ہے اور چپکے جم جاتے ہیں 'شکاف پھٹ کر چھوٹی' بھوسی دار یا پرت دار پھوڑے پھٹیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بدو شمع، گندے اور غلیظ قسم کے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ پھوڑے گند سے ڈھانپے گئے ہوں۔

پیترو لیم (Petroleum): جلد پر شکاف ہوتے ہیں، انگلیوں کے سروں اور ہاتھوں کی پشت پر جلد گھردری کٹی پھٹی ہوتی ہے اور خون بہتا ہے، تسلیں سخت ہو جاتی ہیں، بوائیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مریض چڑچڑا ہوتا ہے اور جلد ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ بوائیوں میں خارش ہوتی ہے۔  
رہس وین (Rhus Ven): خارش زدہ، جلن دار، بوائیوں کے لئے یہ ایک دوا ہے، فوری آرام اور شفا کے لئے مدد گچر بیرونی طور پر لگایا جائے۔

رشاکس (Rhus Tox): سوزشی بوائیوں میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔  
ہیمپرس سلف (Hepar Sulph): جب بوائیوں میں پتھپ پڑنے کا خدشہ ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

سکس ٹس کین (Cists Can): سخت سطح پر شکاف ہوتے ہیں خصوصاً مزدوروں میں، سخت مزدوری کرنے کے باعث۔

سلفر (Sulphur): بھجائی جلد والے مریضوں میں یہ ایک مفید دوا ہے۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): لڑکیوں میں مؤخر اور کم مقدار والے حیضوں کے ساتھ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔ گرمی میں ابتری ہوتی ہے، پیاس نہیں رہتی، روغنیات سے نفرت ہوتی ہے، بوائیاں جو کہ نیلی یا نیلاہٹ مائل سرخ ہو جاتی ہیں۔

کروٹالیس (Crotalus): فساد نسج کا خدشہ ہوتا ہے، مزمن فساد نسج یا جسم کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے لیکن یہ مرض کم ملاقی کے باعث بہت گرم موسم میں لاحق نہیں ہوتا۔

ٹامس (Tamus): بوائیاں ہوتی ہیں اور ہاتھ کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔  
ایسڈ نائٹرک (Acid Nit): انگوٹھوں میں بوائیاں ہوتی ہیں، انگوٹھوں میں دھن کے باعث بیروں میں پسینہ ہوتا ہے۔ مریض چربی اور نمکین اشیاء پسند کرتا ہے۔

اندمال زخم کے بعد کا نشان — (Cicatrix)

(دیکھئے "زخموں کے نشان")

مکڑی کا جالا — (Cobweb)

گریفائٹس (Graphites): جلد پر مکڑی کے جالے کی موجودگی کا مسلسل احساس رہتا ہے۔

رینن کولس ایس (Ranunculus S): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا چہرہ کھڑی کے جالے سے ڈھکا ہوا ہے۔

### جلد کا رنگ — (Complexion)

آئیوڈیم (Iodium): جلد کے رنگ کو عمدہ رنگ کے ساتھ بدلنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ ہر پندرہ روز کے بعد چھ ماہ تک 1000 طاقت کی دوا استعمال کرنی چاہئے۔  
کاسٹیکم، لائیکوپوڈیم (Causticum, Lycopodium): جب آئیوڈیم ناکام ہو جائے تو دی گئی ترتیب کے مطابق ان دواؤں کو آزمانا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا ہر ہفتے استعمال کیجئے۔  
سرسپاریلا (Sarsaparilla): جلد کا رنگ صاف کرنے کے لئے۔

### چنڑیاں — (Corns)

فیرم پکریٹ (Ferrum Picrate): زردی مائل بھورے رنگ کی چنڑیاں ہوتی ہیں۔  
تھوجا (Thuja): یہ چنڑیوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے، مگر ٹکچر ہیرونی طور پر چنڑیوں پر لگایا جا سکتا ہے۔  
سلفر (Sulphur): دباؤ کے باعث چنڑیاں اور گئے پڑ جاتے ہیں۔ اگر جو تا کسی جگہ جلد کو دبا رہے اور اس کے نتیجے میں چنڑیاں یا گئے پڑ جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔  
رینن کولس بی (Ranunculus B): جب چنڑیاں چھوٹنے سے حساس ہوں۔  
اگنیشیا (Ignatia): چنڑیوں میں سوزشی دھنن کی طرح کا درد ہوتا ہے۔  
انٹیم کروڈ (Antim Crud): چنڑیوں میں سوزش ہوتی ہے، پاؤں کے ٹکڑوں کی جلد پر سینک دار جگہیں موجود ہوتی ہیں، پیروں کے ٹکڑے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، سارے جسم پر استسقاءئی سوجن ہوتی ہے، پاؤں کے ٹکڑوں اور پاؤں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے۔  
نیٹرم میور (Natrurn Mur): چنڑیاں ہوتی ہیں۔ پُر درد نشانات ہوتے ہیں۔

### حاد سوزش — (Dermatitis)

(ہیرونی بیجان کے باعث جلد کی حاد سوزش)

کیلنڈولا (Calendula): سوزشی طبیعت والے ہیرونی زخموں کے باعث یہ مرض ہوتا ہے۔  
 30 ذائق لیوشن کی دوا دیجئے۔ نیز مڈر ٹکچر کو آنکھ گننا پانی میں ملا کر متاثرہ جگہ پر بھی لگانا چاہئے۔  
 تاسوروں کے لاحق ہونے کے نتیجے میں جلد کی بہتری لاحق ہو۔



آرنیکا ایم (Arnica M): لاشی کے زخموں کے باعث جلد کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ مدد  
چکچکیر ہونی طور پر لگائیے اور 1000 طاقت کی خوراک ہر آٹھ گھنٹے کے بعد دیجئے۔ یہاں تک کہ  
افاق شروع ہو جائے تب دوا ہر پندرہ روز کے بعد دوہرائی جائے۔

ایپس ایم (Apis M): زہر کی حراروں والی خارش جو کہ ٹھنڈ یا گرمی کے باعث لاحق ہوتی  
ہے۔ جلد سرخ ہوتی ہے اور سوجن ہوتی ہے۔ پارے یا کاربولک ایسڈ کو پکڑنے کے باعث بھی  
یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): پیشاب کی تکلیفات کے ساتھ جلن ہوتی ہے، پیشاب جلتا ہے اور  
گرم ہوتا ہے گرمی کی خارش ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): پیشہ ورانہ طور پر پارے یا کاربولک ایسڈ کے پکڑنے کے باعث  
زہریلی خارش یا سوزش ہوتی ہے جس کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ دھوبی، رنگریز یا کان  
کن حضرات اس قسم کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔

### کھال کا اترنا — (Desquamation)

(دیکھئے چھلنا)

### بد رنگ ہونا (جلد کا)

(Discolouration)

آرسینک ایلم (Ars Alb): جلد سیاہی مائل یا نیلا ہٹ مائل دھبوں سے پر ہوتی ہے۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): جلد پر کالے یا نیلے دھبے ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): پیٹ پر چیلی یا بھوری دھبیاں ہوتی ہیں۔

آئیوڈیم (Iodium): جب زرد رنگ کی جلد بھورے رنگ میں تبدیل ہوتی ہو۔

لیکسیس (Lachesis): مار کھانے کے بعد یا بخار کے بعد جلد کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، جلد  
جامنی ہو جاتی ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): سارے جسم پر کالے اور نیلے دھبے ہوتے ہیں یا پورا جسم نیلا یا کالا ہو  
سکتا ہے۔

فائیولا کا (Phytolacca): جلد پیسے کے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

ہائپرکیم (Hypricum): سرخ لکیریں یا دھاریاں بازوؤں یا ٹانگوں تک پھیل جاتی ہیں۔

آرسینک آئیوڈ (Ars lod): جلد پیسہ میں کالی ہو جاتی ہیں۔

آئرس ویرا (Iris Ver): پیکش کے بعد جب جلد نیلی پڑ جائے۔  
کونیم (Conium): جلد سبز ہو جاتی ہے۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): جگر کے دھبوں کے لئے مخصوص دوا ہے۔  
کالی آرسینک (Kali Ars): کھجلی اور کوڑھ کے بعد جلد کا رنگ ختم ہو جاتا ہے۔  
نٹرم میور (Natrur Mur): جلد سلیٹی مائل ہو جاتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): جب جلد گندی نظر آتی ہے، مریض عادتاً گندا رہتا ہے، نمائے سے نفرت ہوتی ہے۔  
بربرس وگلیرس (Berb Vul): چہرہ زرد ہوتا ہے جس پر سلیٹی رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، رخسار دھسے ہوتے ہیں، آنکھیں گہرائی میں ڈھنکی ہوتی ہیں، جن کے گرد نیلاہٹ مائل یا سیاہی مائل سلیٹی رنگ کے حاشے ہوتے ہیں۔  
بسمتھ (Bismuth): چہرہ مردوں جیسا پیلا ہوتا ہے جس کے ساتھ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔  
کپسکیم (Capsicum): رخسار سرخ اور گرم ہوتے ہیں جو پیلاہٹ کے ساتھ اگلے بدلتے رہتے ہیں۔ چہرے پر سرخ نقطے ہوتے ہیں۔  
چائنا آف (China Off): چہرہ پیلا مرصایا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھیں دھنسی ہوتی ہیں اور ان کے گرد نیلے حاشے ہوتے ہیں۔  
سنا (Cina): چہرہ پیلا ہوتا ہے، بیماروں والا ہوتا ہے، منہ کے گرد سفید اور نیلاہٹ مائل جلد ہوتی ہے، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ہونے کے ساتھ بیماروں والی جلد ہوتی ہے۔  
سپیا (Sepia): چہرہ اور آنکھ کا سفید حصہ پیلاہٹ لیے ہوتا ہے۔ چھاتی پر پیلے دھبے ہوتے ہیں۔ رخساروں کے اوپر والے حصے پر اور ناک پر پہلی کاٹھی ہوتی ہے۔

### بد صورتی — (Disfigurement)

ویریولینم، سارا سینیا پی (Variolinum, Sarracenia P): چہرے کے بد صورت ہو جانے کے لئے جو کہ چیچک کے باعث ہوتا ہے، ویریولینم 200 کی خوراک ہر پندرہ روز کے بعد دیجئے اور سارا سینیا پی 6 دن میں تین مرتبہ لمبے عرصہ کے لئے دیجئے۔  
سلیشیا، کلکیریا فلور (Silicea, Calcarea Flour): چہرے کے بد ہیئت ہو جانے کے لئے جو کہ مہاسوں یا ناسوروں اور پھوڑوں کے نشانات کے باعث ہوتا ہے۔

## اگزیمیا (کھجلی، خارش)

(Eczema)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنسیاں“)

**سلفر (Sulphur):** شدید قسم کی جلن اور خارش کے ساتھ کھجلی لاحق ہوتی ہے۔ دھونے سے یا کھرچنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ جلد کھردری اور نالائتم ہوتی ہے۔ خشک ہوتی ہے اور اس پر چھلکے جمتے ہیں۔ تمام سوراخوں پر آگ کی طرح کی سرخی ہوتی ہے مثلاً آنکھ کے پونوں پر اور کانوں وغیرہ پر، جسم سے بہت گندی بو آتی ہے، معدے کے کڑھے میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ اور سر گرم ہوتے ہیں، بستر کی چادروں، نکیوں وغیرہ کی گرمی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے یا بیجان ہوتا ہے، بالوں کو ڈالی کرنے کے باعث کھجلی لاحق ہوتی ہے۔ مریض عموماً گندا اور ناصاف ہوتا ہے۔

**گرافائٹس (Graphites):** ایگزیمیا بننے والا ہوتا ہے۔ چپکنے والا، شد کی طرح کا مواد، کھجائے سے خارج ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر، چہرے پر، ہونٹوں پر اور کانوں کے پیچھے ایگزیمیا ہوتا ہے نیز جلد میں دھکن ہوتی ہے اور مسئلے پر سخت ہو جاتی ہے۔ گرمی سے اور رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ چھ ماہ تک روزانہ حاد کیسوں میں چھوٹی طاقت کی دوا دیجئے اور مزمن کیسوں میں اونچی طاقت کی مثلاً 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے، ہر ہفتے کے بعد یا ہر ماہ کے بعد علی الترتیب دوا کو دوہرایا جائے۔ اخراج چپکنے والا، چٹنے والا اور لیس دار ہوتا ہے۔

**رشاکس (Rhus Tox):** سرخی اور سوجن کے ساتھ خشک ایگزیمیا ہوتا ہے۔ ناقابل برداشت خارش اور جلن ہوتی ہے جس میں گرمی کے باعث ابتری ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں کھوپڑی پر ایگزیمیا ہوتا ہے۔ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں جن سے پتلا پانی والا اور گہرے رنگ کا بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ جو پھلکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیپ کار تھان ہوتا ہے۔ 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ شروع میں ہر ہفتے اور بعد میں ہر ماہ دوا دیجئے۔

**ارٹیکا یورینس (Urtica Urens):** حاد کیسوں میں جب کہ جلن اور خارش ہوتی ہے۔ **بوسٹا (Bovista):** ہاتھ کی پشت پر ایگزیمیا ہوتا ہے۔ نان پائیس کا ایگزیمیا، گھٹنوں کے جوڑوں میں مرطوب ایگزیمیا ہوتا ہے جو کہ پورے چاند کے دوران ظاہر ہوتا ہے۔ بے درد حیضوں والی مستورات میں توانر کے ساتھ لاحق ہو۔

**کالی بانیک (Kali Bick):** کھوپڑی کا ایگزیمیا، جس کے ساتھ مونے اور بھاری چھلکے ہوتے ہیں۔ جن سے پیلا، کاڑھا، چپکنے والا مواد رستا ہے۔

ایومینا (Alumina): قبض کے ساتھ خشک بہت زیادہ بیجان والا ایگزیمہ لاحق ہو۔

سکوکم چک (Skookum Chuek): ایگزیمہ خارش وغیرہ ہوتی ہے۔

سکیوٹاوائٹروسا (Cicuta V): پاؤں والے حصوں میں ایگزیمہ ہوتا ہے۔ پینسیاں اکٹھی ہوتی ہیں، پیپ دار ایگزیمہ ہوتا ہے جو خشک ہو کر سخت، چھلکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹوپی کی طرح سے سخت ہو جاتا ہے۔

سورینم (Psorinum): کھوپڑی اور چہرے پر خشک اور چھلکوں والا ایگزیمہ ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر پٹریاں ہوتی ہیں۔ بال گر جاتے ہیں، مواد کے رسنے سے پٹریاں اتر جاتی ہیں اور نئے پھوڑے ننگے ہو جاتے ہیں، رات کے وقت اور بستر کی گرمی سے اتھری ہوتی ہے، مریض کم حوصلہ ہوتا ہے، مایوس اور ناامید ہوتا ہے۔ پتلا، متعفن، چبھنے والا مواد خارج ہوتا ہے، ننگے سزے گوشت کی طرح کا تعفن ہوتا ہے، رسنے والے مواد سے متلی لاحق کرنے والی اور بیمار کر دینے والی بدبو اٹھتی ہے، یہ سورینم کی عام علامات کے برخلاف ہوتا ہے۔ جس میں ٹھنڈے سے اتھری ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrurn Sulph): اکثر دمہ کے باعث تنفس اور جلد کی علامات مل جاتی ہیں۔ مینگانم (Manganum): جلد صحت یاب نہ ہو۔ معمولی کھرپنے سے ناسوری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

انتھیری رم (Anantherum): کھوپڑی، عضو تناسل اور لب ہائے فرج پر ناسور ہوتے ہیں۔ ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): جلد کے لپٹے ہوئے حصوں میں مرطوب پھوڑے پینسیاں ہوتی ہیں۔ جن کے ساتھ جوڑوں میں خارش ہوتی ہے۔ جلد میں آسانی کے ساتھ پیپ پڑ جاتی ہے اور مہاسے بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پارا یا زنک پکڑنے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔ خشک، سرد ہواؤں میں اتھری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں اور گرمی میں بہتری ہوتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): چہرے اور گردن پر پیلاہٹ مائل سبز موٹے کھرنڈ ہوتے ہیں۔ جن سے مادہ باافراط خارج ہوتا ہے۔ خون والے شگافوں کے ساتھ ایگزیمہ کو یہ دوا شفا دیتی ہے۔ شگاف چھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے مواد خارج نہیں ہوتا۔ خشک چھلکوں والا یا زیادہ تر گرمی میں ظاہر نہ ہونے والا مرطوب قسم کا ایگزیمہ ہوتا ہے جو کہ سردیوں میں یا سرد موسم میں دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پر یا کانوں کے پیچھے ایگزیمہ اور چہرے لاحق ہوتے ہیں۔ پتلا اور پانی والا مواد خارج ہوتا ہے۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): سیلان خون والے شگافوں کے ساتھ بار بار لاحق ہونے والا ایگزیمہ، کھانے سے مریض کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ IM یا CM طاقت کی دوا دیتے ہیں۔

میزیریئم (Mezereum): ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے۔ بستر میں اور چھونے سے اجڑی ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں مواد خارج ہوتا ہے۔ مونے چڑے کی طرح کی پٹریوں سے سر دھکا ہوتا ہے۔ ان پٹریوں کے نیچے گاڑھی اور سفید پیپ جمع ہوتی ہے۔ بال آپس میں چپک کر جڑ جاتے ہیں۔ بالوں والے حصہ میں ایگزیریا ہوتا ہے۔

لونا (Luna): جلدی امراض ایگزیریا وغیرہ جو کہ پورے چاند کے وقت اجڑ ہو جاتے ہیں۔  
کلکیریا کارب (Calcaria Carb): ہر وقت شدید قسم کی خارش رہتی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے بستر میں اجڑی ہوتی ہے۔ مریض محسوس کرتی ہے کہ جیسے اس نے سرد اور گیلی جراثیم پین رکھتی ہیں۔ بوائیوں میں جٹلا ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔ کلکیریا کارب کا مزاج رکھنے والے بچوں میں ایگزیریا لاحق ہو۔ 200 طاقت کی دوا دیتے۔

ٹیلوریم (Tellurium): ہاتھوں اور پاؤں کی خارش، داد والے پھوڑے پھنسیاں، بدبودار مواد خارج ہونے کے ساتھ گول شکل کے گہرے زخم ہوتے ہیں۔ حجام کی خارش، جلد میں ڈنک لگتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے اور چاند پر ایگزیریا ہوتا ہے۔ پاؤں کا پینہ بدبودار ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کانوں کے ارد گرد اور کانوں کے پیچھے ایگزیریا ہوتا ہے۔  
کلکیریا سلف (Calcaria Sulph): بچوں میں خشک ایگزیریا، پیلے پیپ دار جھٹکے اور پٹریاں ہوتی ہیں۔ بالوں پر پھوٹے ماسے ہوتے ہیں۔ جن سے کھرپنے پر خون بہتا ہے۔

آر سینک البم (Arsenic Album): جلن اور بے چینی کے ساتھ ایگزیریا لاحق ہوتا ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ جلن اور سو جن ہوتی ہے جو کہ ٹھنڈ اور کھانے سے اجڑ ہو جاتی ہے۔ خشک کھردری اور پھٹکوں والی جلد۔ گرمی سے اور گرم مشروبات سے بہتری ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کے درمیان ایگزیریا ہوتا ہے اور انگلیوں کے بچوں پر ڈکاف ہوتے ہیں۔ کھوپڑی پر اور چہرے پر پھٹکوں والے پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ خراش دار اور متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔ شدید قسم کی جلن اور خارش ہوتی ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): معدہ کی خرابیوں کے ساتھ ایگزیریا لاحق ہو۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے پر حساسیت ہوتی ہے۔ گرم بستر میں خارش ہوتی ہے۔ مونے، سخت اور شمد کے رنگ والے جھٹکے ہوتے ہیں۔ جلن زیادہ ہوتی ہے۔ رات کے وقت اجڑی ہوتی ہے۔

کالی سلف (Kali Sulph): گہرے زخم ہوتے ہیں جو کہ زرد پیپ کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ پیپ پتکے مانع کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کی اندرونی طرف باافراط پیپ ہوتی ہے۔ ہونٹ پھٹے ہوتے ہیں۔ مضامیوں کی طلب ہوتی ہے۔ جس سے علامات میں زیادتی

ہو جاتی ہے۔ جلد کے موٹا ہو جانے کے ساتھ 'سخت سینک دار پٹریاں بنتی ہیں۔  
رینن کولس بی (Ranunculus B): جلد کے موٹا ہو جانے کے ساتھ نیز سینک دار چھلکوں  
 کے بننے کے ساتھ ایگزیمہ لاحق ہو۔

سٹیفنی سیگریا (Staphisagria): ایگزیمہ جس میں پیلا 'خارش دار مائع چھلکوں کے نیچے سے  
 رستا ہے۔ رطوبت کے لگ جانے سے نئے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرطوب خارش ہوتی ہے۔  
 سر پر اور کانوں کے پیچھے متعفن پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ کھانے سے خارش کی جگہ تبدیل  
 ہو جاتی ہے لیکن مائع کے رسنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): بالوں کے ساشے پر ایگزیمہ ہوتا ہے۔ خصوصاً سر کی پشت پر۔  
میسکی نیلا (Mancinella): بہت زیادہ تعداد میں چھالوں کے ساتھ جلد کی سوزش لاحق ہو۔  
 چکنے والا مواد رستا ہے اور چھلکے بنتے ہیں۔ بھاری اور بھورے چھلکے اور پٹریاں۔

کلیمٹس (Clematis): سوزشی اور پھوڑوں والا ایگزیمہ جس کے ساتھ پیپ دار یا پانی والا مواد  
 خارج ہوتا ہے۔ جس کے بعد چھلکے اور پٹریاں بن جاتی ہیں۔ جن میں زیادتی ہونے کے دوران  
 سوزش ہوتی ہے اور یہ چاند کے گھٹنے کے دوران خشک ہوتی ہے۔ گہرے رنگ والے کھردرے  
 اور تیزی سے بننے والے چھلکے کھوپڑی پر ہوتے ہیں۔ جن سے پیلاہٹ مائل مواد خارج ہوتا  
 ہے۔ بستر کی گرمی سے خارش میں اتتری ہوتی ہے نیز دھونے سے بھی۔

کالچیکم (Calchicum): بوڑھے لوگوں میں ریٹا داکمین شراب پینے والوں میں سرخ ایگزیمہ  
 جس کے ساتھ ان کے نظام میں یو ریٹیا کھار کی حالت نمایاں ہوتی ہے۔

اکیمریکس ایم (Agaricus M): جلن، کنسن اور انتہا درجے کی خارش کے ساتھ ایگزیمہ لاحق  
 ہوتا ہے۔ چھن ایسی ہوتی ہے جیسے کہ سوئیاں چھ رہی ہوں۔ بجلی لگنے جیسے ٹانگے جلد میں لگتے  
 ہیں۔ جلد کی گہرائی میں پھوٹی گرہیں ہوتی ہیں۔ ایگزیمہ موسم سرما میں اتر ہو جاتا ہے اور اس  
 کے ساتھ بوئیاں ہوتی ہیں۔

تھوجا (Thuja): سائیکوٹک مریضوں میں ایگزیمہ لاحق ہو۔ سوزاک کے دب جانے کے بعد یا  
 حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد ایگزیمہ لاحق ہوتا ہے۔ گندی 'بھوری جلد' خارش دار پھنسیوں سے  
 بھری ہوتی ہے۔ ٹیکے لگوانے سے ایگزیمہ دب جاتا ہے یا جب حفاظتی ٹیکے لگوانے کے باعث  
 ایگزیمہ لاحق ہوتا ہو۔

ایکس رے (X-Ray): ہاتھوں اور پاؤں میں گہرے خشکاف اور چیرے ہوتے ہیں۔ گھٹنوں  
 اور جوڑوں کی پھیلنے والی سطح پر بہت گہرے چرے ہوتے ہیں۔ گہرے نیلے رنگ کی پھوڑے  
 پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن کی مماثلت جلنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے۔ متاثرہ حصے

چھلکے دار، شکاف دار اور زیادہ سوجن والے ہوتے ہیں۔ یہ دوا سلفر کے غلط استعمال سے پیدا شدہ تکلیفات کو بھی رفع کرتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ اسے ٹھنڈ آسانی سے لگ جاتی ہے۔ کچے پن اور دکھن کے ساتھ جلد آتشی سرخ ہوتی ہے۔ سارے جسم پر انگیزہ ہوتا ہے۔ خارش رات کے وقت اتر ہو جاتی ہے۔ کپڑے اتارنے پر شدید ہو جاتی ہے۔  
گن پائوڈر (Gunpowder): یہ ایک بہت بڑی ایٹنی سورک دوا ہے اور بہت بڑی خون کو صاف کرنے والی دوا ہے۔ یہ جلد کی کئی تکلیفات کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دوا 3x طاقت میں لمبے عرصہ کے لئے دینی چاہئے۔

### ہاتھی کھال والی جلد — Elephantiasis

ہائیڈروکوتائل (Hydrocotyle): جب آدمی کی جلد ہاتھی کی کھال کی طرح سے ہو جائے۔ یہ دوا انگیزہ، کوڑھ، کیل مساسوں اور دیگر جلدی امراض کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

### سوکھا مسان، لاغری — Emaciation (Marasmus)

کلکیریا کارب (Calcaria Carbe): جلدی کمزوری، ٹانگوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب پھیلتی جاتی ہے۔

ایبروٹینم (Aberolanum): جلدی کمزوری، ٹانگوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب پھیلتی جاتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcaria Phos): یہ سوکھا مسان کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جلد مرجھا جاتی ہے۔ جلد خشک رہتی ہے اور جلد پر بھیریاں پڑ جاتی ہیں۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): جلدی کمزوری کے لئے اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا ہر ماہ دہرائی چاہئے۔ اس دوا کے دینے سے تین دن پہلے اور تین دن بعد تک دوسری کوئی دوا نہیں دینی چاہئے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): گردن کی کمزوری یا بازوؤں کی کمزوری ہو کہ سینے کی جانب پھیلتی ہے۔

آئیوڈیم (Iodium): جب بچہ چڑچڑا ہو جائے اور کسی کا بھی اپنے قریب آنا پسند نہ کرے۔ کھانا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): بے قاعدہ حیضوں کے بعد کمزوری لاحق ہوتی ہے۔  
 ہائیڈراستس (Hydrastis): خسرہ کے بعد لاغری ہو جاتی ہے۔  
 سیکیل کار (Secale Cor): لاغری سے جلد مرصحا جاتی ہے۔ غیر صحت مند جلد 'ارغوانی' نیلاہٹ مائل رنگ والی جلد۔ خصوصاً جب دوران خون کمزور ہو جائے۔  
 انورم میور (Anum Mur): آنتھک کے باعث لاغری ہو۔  
 پلمبرم (Plumbum): خون کی کمی کے باعث لاغری ہوتی ہے۔

### اپنی ڈرمولائی سس — Epidermolysis

(شاذ و نادر لاحق ہونے والا جلدی مرض جس میں معمولی چھونے سے جلد پر آبلے پڑ جاتے ہیں)  
 رینن کولس (Ranunculus): ناقابل علاج کملائی جانے والی اس بیماری کے لئے یہ واحد دوا ہے۔

### پھوڑے، پھنسیاں — Eruptions

(Itching, Hives, Urticaria and Pruritus)

(نیز دیکھئے "انگریزا")

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): چھپاکی یا خارش جب وہ تھوڑی سی تازہ ہوا لگنے سے غائب ہو جائے۔

رشاکس (Rhus Tox): بالوں والے حصے میں چھپاکی یا خارش ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں جو ٹھیک ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ جب خارش کے ساتھ تپ لرزہ (ملیریا) اور کھٹیا لاحق ہو۔ پانی کے بڑے بڑے پھالے ہوتے ہیں۔ مردوں یا عورتوں کے اعضاءے قائل پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔  
 کلورل (Chloral): بڑی جسامت کے سرخ باد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ استسقاءی سوخن میں ہوتے ہیں۔

سرساپاریل (Sarsaparilla): دوران حیض خارش والی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ دوران حیض دائیں جاگھ میں تر پھنسیاں ہوتی ہیں۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): کھوپڑی پر 'چرے' پر 'کانوں' کے پیچھے پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ قطعات کی صورت میں بال گر جانے کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں۔ ان پھوڑے پھنسیوں سے پانی والا یا جیلاہٹ مائل مائع رستا ہے۔ نوذائیدہ بچوں کا انگریزا۔



نیٹرم کارب (Natrurn Carb): انگلیوں کے پھوٹوں پر اور انگلیوں کے جوڑوں پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں نیز بچوں پر بھی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ گڑھے دار پھنسیاں ہوتی ہیں جو کھل جاتی ہیں اور ناسور کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔

کارڈوس ایم (Cardus M): جلد پر پھوڑے پھنسیاں ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جو کہ سینے کی اگلی جانب والی درمیانی ہڈی کے نچلے حصے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ جس کا باعث جگر اور دل کی خرابی ہوتی ہے۔ پسلیوں کی درمیانی ہڈی جس کے ساتھ پسلیاں جڑی ہوتی ہیں کے پھوڑے پھنسیوں والے ٹکڑے (یا قطعات)۔

کوریلیئم (Coralinum): آتشکی ہوشت خور پھوڑے جن سے بدبودار مادہ خارج ہوتا ہے۔ سرخ باد جو تانے کے رنگ کا ہوتا ہے۔

سورینم (Psorunum): چھلکوں والی پھوڑے پھنسیاں جو گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کنبیوں کے جوڑوں پر پھوڑے پھنسیاں نیز گھٹنوں پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ شدید قسم کی خارش بستر کی گرمی سے یا کھجانے سے ابتر ہو جاتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں یا خارش جو گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردیوں میں دوبارہ ظاہر ہو جائیں۔

کالی میور (Kali Mur): پھوڑے پھنسیاں، دہل اور مہاسے لاحق ہوتے ہیں۔ جن سے سفیدی مائل مادہ خارج ہوتا ہے اور زبان سفید ہوتی ہے۔

سلیئم (Selenium): جلد کی تھوں میں خارش ہوتی ہے نیز جوڑوں کے آس پاس خصوصاً ٹخنے کے جوڑوں کے آس پاس خارش ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): سارے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ دہلیوں والی پھوڑے پھنسیاں گھٹنوں کے آس پاس ہوتی ہیں۔ آہستہ ملنے یا کھجانے سے پھوڑے پھنسیوں کی خارش میں افادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

کاربونیئم سلف (Carboneum): پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ پٹریاں ہوتی ہیں۔ ایگزیریا ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے۔ چھلکوں والے تر مہاسے ہوتے ہیں۔ جن میں دکھن اور درد ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر سوزش والی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

ایلنٹھس گلینڈولوسا (Ailanthus Glandulosa): سرخ باد ٹکڑوں کی صورت میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ جلد کا رنگ جاسنی ہو جاتا ہے۔

اگیریکس ایم (Agaricus M): بالوں والی کھوپڑی کی خارش خصوصاً صبح کے وقت کھجانے کے بعد متاثرہ حصے برف کی طرح سرد ہو جاتے ہیں۔

انتھرا کوکالی (Anthrakokali): کھجلی 'پرائی خارش' 'پرائی داد' نشتوں میں شگاف اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ پورے چاند کے دور ان بہتری ہو جاتی ہے۔

سلفر (Sulphur): بیجان ہوتا ہے جو گرمی سے اور کپڑے اتارنے سے اتر ہو جاتا ہے اور بہتر سے پاؤں باہر نکالنے پر بہتری ہوتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): سلفر کی تمام علامات کے ساتھ خارش ہوتی ہے لیکن مریض زود رنج اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ ہمدردی کو پسند کرتا ہے۔ معدے یا رحم کے علاقہ کی سوزشی کیفیت۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): شدید خارش اور جلن کے ساتھ گہرے پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں اور چھوٹے پھوڑے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باعث مل جاتے ہیں۔ ان پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث خشک اور نہ رکنے والی کھانسی ظاہر ہوتی ہے۔

آنکھوں، کھوپڑی اور خصوصاً اعضائے تناسل، خیموں اور مردانہ عضو تناسل کے آس پاس پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں اور خارش ہوتی ہے۔ کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن کھایا نہیں جا سکتا کیونکہ اعضاء بہت حساس ہوتے ہیں۔

ڈولی کوس (Dolichos): پھوڑے پھنسیوں کے بغیر خارش ہوتی ہے۔ کھانے سے اور رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): انگلیوں کے درمیان ہاتھوں کی پشت پر اور بازوؤں کے اگلے حصوں پر چھوٹے چھوٹے آبلے ہوتے ہیں اور پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔

اولینڈر (Oleander): کھوپڑی پر شدید قسم کی خارش ہوتی ہے جیسے کہ جوؤں کے کانٹے سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سکڑن ہوتی ہے۔ بدبودار پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔

روٹا (Ruta): گوشت کھانے سے خارش لاحق ہوتی ہے۔

اینیگیلس (Anagallis): ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھوڑے پھنسیاں اور خارش ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں اور خارش ٹھیک ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اسی جگہ پر دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): پھوڑے پھنسیوں کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے باعث فاج ہو جاتا ہے۔ درد سر ہوتا ہے اور اعصابی درد ہوتے ہیں۔

الیومینا (Alumina): پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں نیز خارش ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کے بغیر جلد کی خارش لاحق ہوتی ہے۔ مریض یہاں تک کھجاتا ہے کہ جلد سے خون پنے لگتا ہے۔

کھانے سے کھرنڈ جم جاتے ہیں۔ پسے کوئی پھوڑے پھنسیاں نہیں ہوتیں لیکن مریض کے کھانے سے جلد کٹ پھٹ جاتی ہے۔ خون نکل آتا ہے اور پھر کھرنڈ جم جاتے ہیں۔ صحت یاب

ہونے کے وقت یا زخم ٹھیک ہونے کے وقت خارش میں اتھری ہو جاتی ہے۔ یہ خلوشی صرف اسی وقت دور ہوتی ہے۔ جب جلد کے زخم کچے ہوں، زخم دار ہوں یا ان سے خون بہتا ہو۔ بستر کی گرمی میں خارش ہوتی ہے۔

**ایپس میل (Apis Mel):** چھپاکی جسم کی سطح پر اچانک ظاہر ہو جاتی ہے۔ لمبے لمبے سرخی مائل سفید دھبے ہوتے ہیں۔ جو کہ ناقابل برداشت خارش، جلن اور ڈنک لگنے کے ساتھ جلد پر ابھر آتے ہیں۔ ٹھنڈ لگ جانے کے نتیجہ میں یا وقفہ دار بخار کے دوران پھوڑے پھنسیاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔

**گرافٹینس (Graphites):** پھوڑے پھنسی کے ساتھ یا پھوڑے پھنسی کے بغیر تمام جسم پر خارش لاحق ہوتی ہے۔ گرم بستر میں رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ داد و آکڑیما سے لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے۔

**آرسنک الیم (Arsenic Alb):** اس میں بھی علامات ایپس میل کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس میں دھبے ایپس میل کے دھبوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب مرض مچھلی کھانے کے باعث لاحق ہوا ہو۔ (جب چھپاکی گھوٹکا مچھلی کھانے کے باعث لاحق ہوئی ہو تو ایسی صورت میں نیری ستھ اور کویائیوا بھی آزمائی جائیں۔)

**ڈلکامارا (Dulcamara):** سارے بدن پر پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں جو جلد پر گڑھے بناتی ہیں اور کھرنڈ وغیرہ جم جاتے ہیں۔ ساتھ میں دکھن اور خارش ہوتی ہے۔ خارش کے ساتھ کھوپڑی پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ کھانے سے خارش دور ہوتی ہے۔

**کالی بروم (Kali Brom):** جب اعصابی مرض کے ساتھ سرخ بادہ لاحق ہو۔

**ہورالی (Hora B):** ہڈیوں کے ابھرے ہوئے حصے پر نیز داڑھ کی ہڈیوں وغیرہ والے حصوں پر مہاسے ہوتے ہیں اور خارش ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے پوروں میں ٹپکن ہوتی ہے۔

**میزیریئم (Mezereum):** جسم کی بیرونی سطح پر بیجانی کیفیت ہوتی ہے۔ اعصابی احساس ہوتا ہے۔ کھانے سے کانٹے کا، بھینجناہٹ کا احساس ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کھانے کے بعد متاثرہ حصے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ سرموٹے چمڑے کی طرح کے کھرنڈ کے ساتھ ڈھکا ہوتا ہے جس کے نیچے گاڑھی سفید رنگ کی پیپ جگہ جگہ جمع ہوتی ہے اور بال آپس میں جڑ جاتے ہیں۔

**سٹرامونیم (Stramonium):** جلد پر شدید قسم کی سرخ چھپاکی ہوتی ہے جو کہ سرخ بخار کے مشابہ ہوتی ہے البتہ اس میں چمک سرخ بخار سے زیادہ ہوتی ہے۔ جلد بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہے۔

ریجن کولس لی (Ranunculus B): نیلاہٹ مائل یا کالے رنگ کی پھوڑے پھنسیاں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر چھالوں کی مانند ظاہر ہوتی ہیں۔

بیریم سلف (Barium Sulph): کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے۔

ایناکارڈیم اور (Anacardium Or): شدید قسم کی جلن اور خارش کے ساتھ جلد پر پھوڑے پھنسیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کھجانے سے جلن اور خارش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): ناک کی نوک پر داد والی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

سفی لینم (Syphilinum): تانبے جیسے رنگ والے دھبے ہوتے ہیں۔

بووٹا (Bovista): اسال کے ساتھ چھپاکی لاحق ہوتی ہے۔ پاخانوں کے بعد اٹمنس اور نیچے کی جانب دباؤ لاحق ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): کھلی ہوا میں چھپاکی میں ابتری ہوتی ہے۔ ہونٹوں کا ناک کے نتھنوں کا اور آنکھوں کے پونوں کا سرطان لاحق ہوتا ہے یا رسولیاں ہوتی ہیں۔

تھائیرائیڈینم (Thyroidinum): جلد کی شدید قسم کی سرخی جس کے ساتھ شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ جلدی مرض جس میں چھوٹے چھوٹے جھلکے جلد سے اترتے ہیں۔

ریومکس (Rumex): کھلی ہوا میں ابتری ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کپڑے اتار رہا ہو۔

ونکا مینر (Vinca Minor): کھوپڑی پر چہرے پر اور کانوں کے چپچپ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن سے بدبو آتی ہے۔ آہستہ آہستہ جھلکے جم جاتے ہیں جو پیپ، وغیرہ مواد کو باہر خارج ہونے سے روک دیتے ہیں۔ بال گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ بھورے رنگ کے بال اگ آتے ہیں۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): یہ دوا پھوڑے پھنسیوں کے لئے اس وقت دی جاتی ہے جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔ زردی مائل رنگ والے جھلکوں کے ساتھ گڑھے سے بنتے ہیں۔ یہ جھلکے بعد میں کالے پڑ جاتے ہیں۔ جھلکوں کے نیچے سے خون بہتا ہے۔

پیکس لیکوئیڈا (Pix Liq): ہاتھ کی پشت پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن میں رات کے وقت ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے اور کھجانے سے خون بہتا ہے۔

بیرٹا کارب (Baryata Carb): بچوں کی کھوپڑی پر خشک پھنسیاں ہوتی ہیں۔ کھوپڑی پر مرطوب جھلکے ہوتے ہیں۔ بال گرتے ہیں۔ نیچے ذہنی خرابی کے ساتھ بولنے رہ جاتے ہیں۔

اسٹاکس ایل (Astracus El): چھپاکی کی مزمن قسم 'سارے جسم پر سرخ بادہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خارش ہوتی ہے۔ کپڑے اتارنے پر ابتری ہوتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): کھجانے سے پھوڑے پھنسیوں میں اور خارش میں ابتری ہوتی ہے۔

یہاں تک کہ جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر خون بننے لگتا ہے جس کے باعث خارش میں افادہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد کھردری ہوتی ہے۔ جس میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ انگلیوں کے پورے ہر موسم سرما میں کھردرے ہو جاتے ہیں۔ مردانہ یا زنانہ اعضائے تناسل پر پھوٹے پھوٹے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔

### پھوڑے پھنسیوں کا دب جانا

#### Eruptions: Suppression of

ایپس (Apis): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث دماغ کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ تنفس چھوٹا ہو جاتا ہے۔ استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ معدے کا درد لاحق ہوتا ہے۔ دماغ کے پردوں میں پانی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث مرگی لاحق ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث دانتوں میں تپکن والا درد ہوتا ہے۔ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ دمہ ہوتا ہے۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث تشنجی جھٹکتے ہیں۔

گرافائٹس (Graphites): درد سر لاحق ہوتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ نقاہت ہوتی ہے اور بھوک کھو جاتی ہے۔

### سرخی بادہ — Erysipelas

اکونائٹ (Aconite): یہ دوا مرض کے ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے جبکہ تبہجھناہٹ اور جلن ہوتی ہے۔ جلد سرخی چمک دار گرم ہو جاتی ہے اور سوج جاتی ہے۔

پسی فلورا انک (Passiflora Inc): یہ دوا سرخی بادہ کے لئے مخصوص ہے۔ اسے مدر پنچر کی صورت میں دینا چاہئے۔ 4 سے 5 قطروں کی ایک خوراک ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جلد سرخی ہموار اور تنی ہوتی ہوتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں جبکہ جلد چمک دار سرخی ہوتی ہے اس دوا کو دیا جاتا ہے۔ چہرے اور سر کا سرخی بادہ جو کہ خصوصاً دائیں جانب ہوتا ہے۔ تیز کانٹے والے درد ہوتے ہیں یا متاثرہ حصوں میں تپکن ہوتی ہے۔ بخار ہوتا ہے اور بعض اوقات ہڈیاں ہوتا ہے۔

**ایپس ایم (Apis M):** حلق کا سرخ بادہ جس کے ساتھ جسم کے کسی ایک حصہ میں بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے یا عمل جراحی کے بعد یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ہمراہ متاثرہ حصے پھول جاتے ہیں اور استسقاءئی سوجن ہوتی ہے جو بہت بڑھے ہوئے درد کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ درد جلن دار اور ڈنک لگنے جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں لگانے کی خواہش ہوتی ہے یا متاثرہ حصوں پر ٹھنڈی چیزیں لگانے سے آفاقہ ہوتا ہے۔ پیشاب جلن دار، کم مقدار کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ متواتر ایبوسن پیشاب کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

**آر سینک البم (Ars Alb):** بہت زیادہ نقاہت، بے چینی اور جلن دار درد کے ساتھ سرخ بادہ کا اچانک حملہ ہوتا ہے۔ چھوٹے وقفوں کے ساتھ کم مقدار پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ مرض ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ استسقاءئی سوجن، تے اور اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

**بوریکس (Borax):** چہرے کا سرخ بادہ، اس احساس کے ساتھ کہ جیسے چہرے پر مکڑی نے جالا دیا ہو۔

**کینتھرس (Cantharis):** گڑھے دار زخموں کی قسموں والا سرخ بادہ، خصوصاً چہرے پر ہوتا ہے جو کہ ناک سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بے چینی، جلن اور ڈنک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جلد کی شدید سوزش لاحق ہوتی ہے اور بڑے بڑے چھالے بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ گڑھے دار زخم اکٹھے ہو کر ایک بڑے پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

**گروتالیس ایچ (Grotalus H):** نیلا دکھائی دینے والا سرخ بادہ، حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد یا حشرات الارض کے کاٹنے کے باعث لاحق ہونے والے سرخ بادہ کے لئے یہ مفید دوا ہے۔

**رشاکس (Rhus Tox):** ٹائیفائیڈ کی علامات کے ساتھ گڑھے دار زخموں والی پھوڑے پھسیاں۔ جلد سرخ ہونے کی بجائے سیاہ ہو جاتی ہے۔ ہموار ہونے کی بجائے کھردری ہو جاتی ہے۔ خشک ہونے کی بجائے تر ہو جاتی ہے۔ شدید قسم کی جلن اور خارش ہوتی ہے۔ کمر میں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ بالوں والے حصوں کے کنارے زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ اسہال کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔ عضلات، بندھنوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔

**لیکیسیس (Lachesis):** جلد کا رنگ گہرا نیلا اور جامنی ہو جاتا ہے۔ قوت حیات کا بہت زیادہ دباؤ لاحق ہوتا ہے۔ دماغی نقاہت ہو جاتی ہے۔ چہرہ پھول جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے جبکہ بلاڈوٹا ناکام ہو جائے۔ متاثرہ حصوں میں کیسکریں (جسم کا گلنا) ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خلیاوی ریشے خصوصاً ملوث ہوتے ہیں۔

**ایکی نیسیا (Echinacea):** پھوڑوں کے رجحان کے ساتھ سرخ بادہ لاحق ہو۔ پھوڑوں میں

درد ہوتا ہے۔ 3x ڈاکٹی لیوشن کی خوراک قطروں کی صورت میں دیجئے۔  
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ دار اجمار (پھوڑے) ٹھیک نہ ہو رہے ہوں حتیٰ کہ پیپ بھی خشک  
 چاہئے۔  
سلیشیا (Silicea): جب پیپ دار اجمار (پھوڑے) ٹھیک نہ ہو رہے ہوں حتیٰ کہ پیپ بھی خشک  
 ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں یہ ایک عمدہ دوا ہوتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): نقل مکانی کرنے والے قسم کے کیسوں میں جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں۔ یہ  
 ایک مناسب عمل انگیز دوا ہے۔  
گریفائٹس (Graphites): بار بار لاحق ہونے والے مزمن قسم کے کیسوں کے لئے یہ ایک  
 مفید دوا ہے۔  
روٹا اور فاسفورک ایسڈ (Ruta and Phosphoric Acid): جب سرخ بادہ زخموں  
 کے ساتھ ہو تو یہ دوا دی جائے۔

### سردی کا کاٹنا — (Frost Bite)

(دیکھئے ”سردی سے جلد کا پھٹنا“)

### چکنی (جلد) — (Greasy)

(دیکھئے ”تیل والی جلد“)

### سخت (جلد) — (Hard)

انٹیم گروڈ (Antim Crud): سخت موٹی اور شمد کے رنگ والی جلد، جب مریض بستر میں گرم  
 ہو جاتا ہے تو خارش ہونے لگتی ہے۔ دوران شب ابتری ہوتی ہے۔  
ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle): جلد ہاتھی کی جلد کی طرح سے موٹی ہو جاتی ہے۔  
رینن کولس بی (Ranunculus B): انگیزیم میں جلد موٹی ہو جاتی ہے نیز سخت اور سیبک  
 دار پھلکے بھی ہوتے ہیں۔

### داد — (Herpos)

رشاکس (Rhus Tox): خارش، جلن اور جھنجھٹ والے دروں کے ساتھ لاحق ہونے  
 والی داد کے لئے یہ ایک معمول کی دوا ہے۔ جو اکثر کیسوں کو شفا دینے والی ہے اور مرض کا



علاج بھی اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ حجام کی خارش کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے جبکہ جلن یا خارش بھی ہو۔

رینن کولس بی (Ranunculus B): جلن دار، خارش دار اور ٹانگے لگنے جیسے (سویاں چھنے جیسے) دردوں کے ساتھ داد لاحق ہو، خارش بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ پھوڑے پھنیوں کے خشک ہو جانے پر ہوتی ہے۔ گڑھے نیلاہٹ مائل رنگ کے ہوتے ہیں۔ کھلی ہوا میں حرکت کرنے سے، مرطوب موسم میں، موسم کی تبدیلی کے وقت یا درجہ حرارت کی تبدیلی سے ابتری ہوتی ہے۔ پھونے سے اور ٹھنڈی ہوا سے حساسیت ہوتی ہے۔

آر سینکیم البم (Arsenicum Alb): جلن دار اور گولی لگنے جیسے درد کے ساتھ داد لاحق ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے خصوصاً رات بارہ بجے سے صبح چار بجے تک، پچھلے ہے اور گھرے ہوتے ہیں جن سے کھرپنے پر خون بہہ نکلتا ہے، پھونے و قنوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔

مرک سول، نائٹرک ایسڈ، نیٹرم میور (Merc Sol, Nitric Acid, Natrum Mur): پیڑوں کی داد، قیام کی خارش۔ بیرونی طور پر فائیڈ لاکالگائی جاسکتی ہے۔

اسٹس کس ایف ایل (Astacus Fl): چھپاکی کی مزمن صورت کے لئے۔ خارش کے ساتھ چھپاکی سارے بدن پر پھیلی ہوتی ہے۔

میزیریئم (Mezereum): پیلیوں کے بیچ والے عصب یا آنکھ کے بالائی اعصاب کی بیماری کا دورہ مکمل ہو جانے کے بعد داد لاحق ہوتی ہے۔ درد تیز بجلی کے کوندے کی طرح کا ہوتا ہے، بعض اوقات گھس کر سوراخ کرنے جیسا درد ہوتا ہے۔

سیکونڈا وائروسا (Cicuta Vir): حجام کی خارش، یہ تکلیف شیبہ کرنے کے باعث ہوتی ہے۔  
تھوجا (Thuja): بہت بڑھے ہوئے اعصابی درد کے ساتھ داد ہر کہیں ہوتا ہے۔ ایگزیمہ کی طرح کی یا پھوڑوں جیسی داد ہوتی ہے۔

آئرس ور (Iris Ver): ایگزیمہ جیسی یا دہلیوں جیسی پھوڑے پھنیوں کے ساتھ سیاہ قسم کی داد لاحق ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اور مرطوب مکانوں میں رہنے کے باعث دھب دار داد لاحق ہوتی ہے۔

کینٹھرس (Cantharis): جکڑن والے اور جلن دار دردوں کے ساتھ بڑے بڑے پچھالے ہوتے ہیں، یہ دوا اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے۔

پرونس سپائی نوسا (Prunus Spinosa): داد لاحق ہوتی ہے، استقاء ہوتا ہے، انگلیوں کے



پاروں پر خارش ہوتی ہے، جیسے کہ وہ سردی سے جم گئی ہوں۔  
سورینم (Psorinum): داد کی قسم کے پھوڑے پھنسیاں خصوصاً جوڑوں کے مڑنے والے  
 حصوں پر اور کھوپڑی پر۔ خارش کے ساتھ بدبو ہوتی ہے۔ قوت حیات کی کمزوری لاحق ہوتی  
 ہے۔ پھوڑے پھنسیاں خشک ہوتے ہیں، چھوئے نوک دار نیز پرت دار گڑھوں والی پھنسیاں  
 ہوتی ہیں جن کے کنارے سرخ ہوتے ہیں۔ ٹھنڈ میں / بستر کی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔

چھپاکی — (Hives)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنسیاں“)

خارش — (Itch)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنسیاں“)

زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار ابھار — (Keloid)

سیلیشا (Silicea): 200 طاقت کی یہ دوا سب سے پہلے آزمانی چاہئے۔ چھ مہینے تک یا کم : بیش  
 یہ دوا ہر ہفتے دینی چاہئے۔

الہڈ فلور (Acid Flour): جب سیلیشا ناکام ہو جائے تو یہ دوا 30 طاقت کی روزانہ تین مرتبہ  
 دی جاسکتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): جب مندرجہ بالا ادویات کے استعمال سے افادہ نہ ہوا ہو یا  
 بہت کم بہتری ہوئی ہو تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے۔

جدام — (Leprosy)

ہائیڈروکوٹائل (Hydrocotyle): اس مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

بیسیلینم (Bacillinum): یہ دوا 200 طاقت کی ذاتی لیوشن کی صورت میں ہر پندرہ روز کے  
 بعد عمل انگیز کے طور پر دینی چاہئے۔ اس دوا کے استعمال سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد  
 کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب ناک سے ایک بدبو دار مادہ خارج ہو تو یہ دوا دی جائے۔

آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): نیچن کا احساس ہوتا ہے، مریض گندا دکھائی دیتا ہے،  
 انگلیاں اور انگوٹھے سو جاتے ہیں۔ نعوذ بڑھ جاتے ہیں۔

ہوانگ نان (Hoang Nan): ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھناہٹ اور سن ہو جانے کے ساتھ جذام لاحق ہو۔

ہورابراز (Hura Braz): جذام لاحق ہو جبکہ جلد کسی ان دیکھے بندھن کے ساتھ بندھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

گرافائٹس (Graphites): شکافوں سے چپکنے والا مواد خارج ہوتا ہے۔

انٹ تارٹ (Ant Tart): نیچے جذام میں اندر کی جانب جھک جاتے ہیں۔

تھائیرائیڈینم (Thyroidinum): آشکی پھوڑے پھنیوں کے ساتھ جذام لاحق ہو۔ جلد کی پرانی سوزش ہوتی ہے۔ شدید قسم کی سرخی ہوتی ہے اور ناگوں پر چھلکے یا پرت ہوتے ہیں۔

### برص — (Leucoderma)

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): اس مرض کا علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ درج ذیل ادویات کے ساتھ اس دوا کی 200 طاقت کی ایک خوراک ہر ماہ دینی چاہئے۔

آرسینک سلف فلیو (Arsenic Sul Fl): برص کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا طاقتیں بدل بدل کر ڈائی لیوشن کی صورت میں ایک لمبے عرصہ تک دی جاتی ہے۔ سہ ماہ سے پہلے 3x نرانی نوریشن دی جائے اور پھر دو ماہ کے بعد 30 طاقت کی ڈائی لیوشن دیجئے۔ بشرطیکہ کم درجے کی ڈائی لیوشن سے مرض میں اتفاق نہ ہو یا کم ہو۔ اگر 30 ڈائی لیوشن بھی ناکام ہو جائے یا مکمل طور پر دو سے چار ماہ کے دوران شفا نہ ملے تو پھر ہر ہفتے 200 ڈائی لیوشن آزمائیں۔

آرسینک الیم (Ars Alb): خنازیر میں جلد کا سفید ہو جانا۔

ایپس ایم (Apis M): بچہ دانی کے استسقاء کے ساتھ جلد سفید ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا بچہ بے ترتیب ہو جاتا ہے، سفید دھبوں کے ارد گرد سرخی ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): جب جلد دودھ جیسی ہو جائے۔

ہائیڈروکوتا کل (Hydrocotyle): اگر آرسینک سلف فلیو ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جا سکتی ہے۔ اسے نچلے درجے کی طاقتوں میں دینا چاہئے مثلاً 3x یا 30 دن میں تین مرتبہ۔ اس دوا کو لمبے عرصہ کے لئے آزمانا چاہئے۔

بوریکس (Borax): سرخ دھبوں کے ساتھ جلد کا سفید ہو جانا۔

سورینم (Psorinum): جلد پر سفید دھبے ہوتے ہیں جس کے ساتھ بالوں کے کچھے بھی سفید ہوتے ہیں۔ اس دوا سے قدرتی رنگ آ جاتا ہے۔

## لیور سپاٹس — (Liver Spots)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کلہی رنگ کے دھبوں کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے، خصوصاً یہ دھبے پیٹ پر ہوتے ہیں۔

ایپس ایم (Apis M): جسم پر قطعات کی صورت میں ہلکے سفید رنگ کے لیور سپاٹس (Liver Spots) ہوتے ہیں۔

سپیا (Sepia): اگر لائیکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔  
پلمبرم (Plumbum): سن یاس کے عرصہ کے دوران یا کثرت حیض میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔

میزیریئم (Mezereum): چھاتی اور بازوؤں پر بہت گہرے رنگ کے لیور سپاٹس ہوتے ہیں۔  
کیورارے (Curara): پیلے بھورے رنگ کے دھبے (لیور سپاٹس)۔

## پچھوا کھچوٹ، چھٹے (Nettlerash)

(دیکھئے "داد" اور "پھوڑے پھنیاں")

## تیل والی (جلد) — (Oily)

برائی اونیا (Bryonia): بہت چکنی جلد ہوتی ہے خصوصاً بال۔ چہرہ زرد ہوتا ہے، پیلا اور سوجا ہوا، استسقاء، گرم اور پُر درد ہوتا ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): مسلسل تر اور چکنی جلد ہوتی ہے۔ بے رنگ، لیس دار پسینہ اعتدال سے زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrur Mur): جلد چکنی ہوتی ہے، تیل والی ہوتی ہے، خصوصاً بالوں والے حصوں پر چکناہٹ ہوتی ہے۔

پلمبرم (Plumbum): چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار ہوتی ہے۔

## جلد اترنا — (Peeling Off)

ہیلی بوریس (Helleborus): ناخنوں اور بالوں کے گرنے کے ساتھ جلد اترتی ہے۔

انٹھراکسینم (Anthraxinum): بڑے بڑے پرتوں کی صورت میں جلد اترتی ہے۔

آئیوڈیم (Iodium): اس مرض میں جلد اترتی ہے اور پرت یا تھلکے ڈھیلے ہوتے ہیں، چکناہٹ کا اخراج ہوتا ہے۔

مزریع (Mezereum): جلد پر توں کی صورت میں اترتی ہے۔

اپیس ایم (Apis M): استسقالی سوجن کے ساتھ جلد اترتی ہے۔

ایلیئم سیٹیوا (Allium Sat): ہاتھوں کی جلد اترتی ہے۔

### کھجلی (Psoriasis) —

سلفر (Sulphur): کھجلی کا علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے جو کہ CM طاقت میں دینی

چاہئے۔ اس دوا کے استعمال کے چند روز بعد تک کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

کالی بروم (Kali Brom): آنکلی کھجلی، جلد ٹھنڈی، نیلی، داغ دار، جھریوں والی ہوتی ہے۔

بڑے بھدے اور نرے درد پھوڑے ہوتے ہیں۔

کالی آرسینکیم (Kali Arsenicum): کمر، بازوؤں اور کہنیوں سے پھیلتی ہوئی کھجلی کے

قطعات ہوتے ہیں۔ چھلکے اترنے والی خارش ہوتی ہے۔ چھلکے اتر جانے کے بعد نیچے سے جلد

سرخ نکل آتی ہے۔ بازوؤں اور گھٹنوں کی مڑنے والی جگہیں مرجھا جاتی ہیں۔

تھائیرائیڈینم (Thyroidinum): سرد اور کی خون والے اعضاء میں کھجلی ہوتی ہے۔ جلد

خنک اور کمزور ہوتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سرد ہوتے ہیں۔

ریڈیم بروم (Radium Brom): دھاسل کی کھجلی، کھجلی والی پھوڑے پھنسیاں چہرے پر

ہوتی ہیں۔ جن سے مواد رستا ہے، ماتھے پر سرخ دھبوں کے قطعات ہوتے ہیں۔ سارے جسم پر

جلن اور خارش کا احساس ہوتا ہے۔

کورلیئم ربرم (Corallium Rubrum): ہتھیلیوں اور ٹکڑوں کی کھجلی۔ مسطح سرخ ٹاسور

ہوتے ہیں۔ مونگے کے رنگ والے دھبے ہوتے ہیں جو گہرے سرخ رنگ میں بدل جاتے ہیں

اور پھر ان کا رنگ تانبے کی طرح کا ہو جاتا ہے۔

آرسینک بروم (Arsenic Brom): یہ ایک عمدہ دوا ہے اور 3x ڈائی لیوشن کی صورت

میں دینی چاہئے۔

ایسڈ کرائسوفارکیم (Acid Chrysopharicum): اس دوا کو مرہم کے طور پر استعمال کیا

جائے۔ ترکیب اس کی یوں ہے کہ 4 سے 8 گرین اونس ویزلین میں ملا کر چرونی طور پر لگائی

جائے۔ اندرونی طور پر 3x یا تیسری ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔

آرسینک سلفر ربرم (Ars Sulph Rub): جلدی امراض کے لئے خصوصاً کھجلی اور

اگزیم کے لئے بھی مہاسوں اور پھوڑوں کے لئے بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔

سلینینم (Selenium): ہتھیلیوں کی آنکلی کھجلی، ہتھیلیوں میں خارش ہوتی ہے۔ ہاتھ مرجھا

جاتے ہیں، ہاتھوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے، اگر اس دوا سے افادہ نہ ہو تو دیگر ادویات علامات کے مطابق دیجئے۔

ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle): جلد کے بہت زیادہ موٹا ہو جانے اور جلد کے اکھڑنے کے ساتھ۔

میزریم (Mezereum): ہتھیلیوں کی کھجلی، گرمی سے خارش میں بہتری ہوتی ہے۔  
پٹرولیم (Petroleum): چھروں کے ساتھ ہاتھوں کی کھجلی، ٹھنڈے موسم میں بہتری ہوتی ہے۔

آرسینک ایلیم (Arsenic Alb): ٹھنڈی چیزیں نے سے اور تری سے کھجلی میں بہتری ہوتی ہے، گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں یہ دوا ہر ہفتہ دی جائے۔  
آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں کھجلی میں بہتری ہوتی ہے یا ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ ٹپلی طاقت کی خوراکیں دیجئے۔ 6 سے 30 طاقت کی دوا مناسب ہوتی ہے۔ البتہ جب ٹپلی طاقت کے ڈائی لیوشن تکام ہو جائیں تو اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن مثلاً 100 یا 1000 بھی ممنوع نہیں ہیں۔  
مینگانم (Manganum): حیض کے وقت کھجلی ظاہر ہوتی ہے یا کھجلی میں بہتری ہو جاتی ہے، پُر درد شکاف ہوتے ہیں۔

### رنگ ورم — (Ringworm)

بیس لینیم (Bacillinum): رنگ ورم (ایگزیمہ) کی طرح کی ایک جلدی بیماری جو دائروی قطعات بناتی ہے) کے لئے چوٹی کی دوا ہے اور 200 طاقت میں دینی چاہئے، اسے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ دینا چاہئے۔ اگر دو یا تین ہفتوں میں بہتری کی صورت پیدا نہ ہو تو مندرجہ ذیل ادویات آزمائی جائیں۔

سپیا (Sepia): مندرجہ بالا دوا کے تکام ہونے کے بعد اگلی دوا سپیا ہونی چاہئے بشرطیکہ علامات مختلف نہ ہوں جو کہ کسی دوسری دوا کی نشاندہی کریں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یہ دوا ٹھنڈے، پیلے، حد سے موٹے اشخاص میں اس مرض کے وقت زیر غور لانی چاہئے۔ ہاتھ اور پاؤں تر رہتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): جب رنگ ورم کے ہمراہ تیزابیت، بد ہضمی، ڈکار، بھوک کا جاتے رہنا اور بے چینی لاحق ہو۔

ایپس مل (Apis Mel): خارش اور جلن کے ساتھ رنگ ورم لاحق ہو، ٹھنڈی چیزیں لگانے

سے بہتری ہوتی ہے۔ 100 یا 1000 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک دیجئے۔  
ٹیلوریم (Tellurium): رنگ ورم خصوصاً چہرے پر اور جسم پر لاحق ہو جسم سے بدبو آتی ہے۔ اور بدبودار پیوستہ خارج ہوتا ہے نیز لہسن کی طرح کی بو آتی ہے۔

### کھردری (جلد) — (Rough)

سورینم (Psorinum): جلد کھردری ہوتی ہے، شگاف پڑ جاتے ہیں جن سے خون بہتا ہے اور پھلکے جھڑتے ہیں، مریض دھونے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مریض میلہ، گندا اور غلیظ ہوتا ہے، پیسے کہ گندگی سے ڈھکا ہوا ہو۔ نہانے سے اور بستر کی گرمی سے جلد کی تکالیف میں بہتری ہوتی

سلفر (Sulphur): شگافوں کے بغیر جلد کی خشکی لاحق ہوتی ہے۔

### خارش، کھجلی — (Scabies)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنسیاں“)

### سرخ بخار — (Scarlatina)

بیلادونا (Belladonna): سرخ بخار کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ ہموار، سرخ اور چمکدار پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، حلق گرم، خشک اور سرخ ہوتا ہے، معدہ میں بہت زیادہ بھجان ہوتا ہے جس کے باعث تھکی اور تھکتے ہوئی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ دوا حفظ مائع کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔

ایلین تھرس گلیٹنڈ (Ailanthus Gland): بہت زیادہ خراش والا نزل ہوتا ہے جبکہ پھیپھائی باقاعدہ باہر نہیں نکلتی۔ جان لیوا قسم کا بخار ہوتا ہے، منہ اور ناک سے متعفن بو آتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے جس سے باہر لانا مشکل ہوتا ہے، قدرتی اخراج دب جاتے ہیں، ارشکاز توجہ کی قابلیت نہیں رہتی، یادداشت کھو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ سرخ بخار کے دب جانے کے بعد ہریان لاحق ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): جب باقاعدہ سرخ بخار کے ساتھ گڑھے دار پھوڑے پھنسیوں کا بھی اضافہ ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بو بڑا بہت والے ہریان کے ساتھ غنودگی طاری ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔

ایپس مل (Apis Mel): یہ دوا صرف اسی صورت میں مفید ہوتی ہے جب گردوں کی تکالیف

کے ساتھ استحقاقی سو جن ہوتی ہے۔ جلد دھبوں والی سرخ اور سفید قسم کے بدرنگ داغ ہوتے ہیں۔ چہرہ پیلا اور پھولا ہوا ہوتا ہے، 'ڈنک لگنے جیسے تیز درد کے ساتھ حلق میں سو جن ہوتی ہے۔ پیاس کا غائب ہو جانا اور گرمی سے تکلیفات میں اضافہ ہو جانا نظر انداز نہیں ہونا چاہئے۔

**لیکسیس (Lachesis):** خون کی تکلیف اول اور بلغمی جھل دوم، اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ حلق کی دلدلی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ ناسلز میں درد ہوتا ہے۔

**سکارلیٹینا نم (Scarlatinum):** اسے عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ نیز سرخ بخار سے حفاظت کے لئے حفظ ماقدم کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ 200 ڈائی لیوٹن کی صورت میں استعمال کیجئے۔

### زخموں کے نشان (Scars)

**لیکسیس (Lachesis):** زخموں کے نشانات جن سے آسانی کے ساتھ خون بہتا ہے اور جو ٹوٹ کر کھل جاتے ہیں۔ سرخ رنگ کے نشانات۔

**کالی آیوڈ (Kali Iod):** چہرے پر، گردن پر، کھوپڑی پر، سینے پر اور کمر پر چھوٹے پھوڑوں کے بعد زخموں کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔

**دیریولینیم 'سرایسینیا پی (Sarracenia P. Variolinum):** چہرے پر چچک کے بعد نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ چند روز کے بعد دیریولینیم 200 دیجئے اور سرایسینیا پی ix دن میں دو مرتبہ دیجئے۔ سوائے اس دن کے جب دیریولینیم دی گئی ہو۔

**کاسٹیکم (Causticum):** مگرے زخموں کے نشان، زخم دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں۔

**لائی سین (Lyssin):** کتے کے کانٹے کے بعد زخم کا نشان رہ جاتا ہے۔

**گرافٹیس (Graphites):** پرانے سخت زخموں کے نشانات۔

**ایسڈ فلور (Acid Flour):** زخموں کے پرانے نشانات جن کے کنارے سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانات گڑھے دار پھٹیوں سے ڈھکے ہوتے ہیں یا کھرے ہوتے ہیں۔

**تھائیوسینامینم (Thiosinaminum):** زخموں کے ریشوں کو گھلانے کے لئے۔ غدود بڑھ جاتے ہیں۔ چہرے کا دق ہوتا ہے۔ زخموں کے نشانات سکڑے ہوئے اور مسلے ہوئے ہوتے ہیں۔

**فائی ٹولا کا (Phytolacca):** جب مندرجہ بالا آیات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

**کروکس (Crocus):** پرانے مندمل شدہ زخم بار بار کھل جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

**سیلیشا (Silicea):** پھوڑوں یا ناسوں کے پھوڑے ہوئے زخموں کے نشانات۔

## بچوں کی جلد کے ایک حصہ کی سختی

(Scleroma-Neo-Natorum)

**لیکھیس (Lechesis):** یہ دوا 200 یا 1000 ڈالی لیوشن کی صورت میں ہفتہ وار یا مہینہ وار دی جاسکتی ہے۔

**شنگل (سمندر کے کنارے چھوٹے گول پتھر جیسی داد) Shingles**  
(دیکھئے ”داد“)

**پٹیاں — (Stripes)**  
(دیکھئے ”دھاریاں“)

**موٹی (جلد) — (Thickened)**  
(دیکھئے ”سخت جلد“)

**ناسور — (Ulcers)**

**سلیشیا (Silicea):** ایسے ناسور جو تیزی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ دوا ست قسم کے ناسوروں کے ٹھیک ہونے کی رفتار میں اضافہ کرتی ہے۔ گرم ٹیوں سے بہتری ہوتی ہے۔ اندام مشکل ہوتا ہے۔ گوشت اکڑا ہوتا ہے۔

**ایسڈ فلوور (Acid Flour):** ٹھنڈی ٹیوں سے ناسوروں میں افادہ ہوتا ہے۔

**ہیرپیر سلف (Herpar Sulph):** ناسوروں کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

**گن پائوڈر (Gunpowder):** ایسے ناسور جن کا آغاز ٹخنوں کے ارد گرد سے ہوتا ہے اور ٹخنوں کی طرف پھیلتے ہیں۔ ان سے بدبودار پیپ بہتی ہے۔ سوجن کم ہوتی ہے۔ یہ ناسور سرخ اور چمک دار ہوتے ہیں۔

**ارانیایڈیاڈ (Aranea Diad):** متحرکین والے ناسور، جب کلکیریا اور سلیشیا سے مرض میں اضافہ ہو جائے اور آرسینک الیم سے صرف جزوی افادہ ہو تو ارانیایڈیاڈ مکمل طور پر شفا دیتا ہے۔ مریض کو جاڑا لگتا ہے اور دن بدل بدل کر ابتری ہوتی ہے۔

**ہائیڈراسٹس کین (Hydrastis Can):** گہرے خالے والے اور پھیلنے والے ناسور جلد پر



ہوتے ہیں یا باغی بھلیوں پر ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ جلن ہوتی ہے اور گاڑھی لیس دار پیلے رنگ کی پیپ ہوتی ہے۔

کو موکلاڈیا ڈینٹاٹا (Comocladia Dentata): سخت کناروں والے ناسور، مسک قسم کی پھسیاں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے۔ شدید خارش ہوتی ہے۔

کاربووتیج (Carbo Veg): جلد کی کھنوں میں ناسور ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پوٹنے والے ناسور جن سے بہت زیادہ مقدار میں مسلسل خون بہتا رہتا ہے۔ جلن دار، خارش دار اور پتلا مواد خارج ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): شدید قسم کی کھلی کے ساتھ ناسور ہوتے ہیں۔ شیشی سیکریا (Staphisagria): رکنس (سوکھا مسان) والے بچوں کی جلد میں ناسوری کیفیت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): ہسٹریائی مریضوں میں ناسوری کیفیت۔ ٹیٹرم کارب (Nat Carb): پیدل چلنے کے بعد ایزیوں میں ناسور ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

سٹس کین (Cistus Can): آہستہ آہستہ بننے والے ناسور اور گنگرین والے ناسور۔ گمرے ناسور جو گوشت خور ہوتے ہیں۔ یہ ناسور فحشوں کے ارد گرد ہوتے ہیں اور چمک دار ہوتے ہیں۔ ان سے باافراط خارش دار مواد خارج ہوتا ہے۔ نمائے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں حساسیت ہوتی ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔

کالی سلف (Kali Sulph): کئی منہ والے ناسور، مریض کھلی ہوا میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ کروکس (Crocus): پرانے متدمل زخم جو بار بار کھل جائیں اور ان میں پیپ پڑ جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): ایسے زخم جو ٹھیک ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن بار بار پھٹ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ جلد پر سکری سی جم جاتی ہے۔ جلد میں جلن ہوتی ہے۔

پائیونیا (Paeonia): جوتوں کے کانٹے کے باعث لاحق ہونے والے ناسوروں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

ٹیرنٹولا کیوب (Tarentula Cub): مسک قسم کے گنگرین والے ناسور، گوشت خور پھوٹوں اور عام پھوٹوں کے لئے بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جب سلیشیا ٹاکام ہو جائے تو یہ دوا دوبارہ پیپ پڑنے کے عمل کو روکتی ہے۔

کونڈوراگو (Condurango): گندی بو کے ساتھ ناسور، پتلا مواد رستا ہے۔ خدی قسم کے

اور پرانے ناسور ہوتے ہیں۔ گوشت اکڑ جاتا ہے یا کھرہ بن جاتا ہے۔  
 اوبیم (Opium): ایسے ناسور جو مطلقاً بے درد ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ نہیں ہوتے اور ٹھیک  
 نہیں ہوتے یا پھیلتے بھی نہیں ہیں۔ متاثرہ حصوں کی بے حسى لاحق ہوتی ہے۔ جو کہ اونچے  
 درجے کی سوزش میں مبتلا ہوتے ہیں۔  
 سنٹی کیولا (Sanicula): انگوٹھوں کے درمیان ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

### پتی — (Urticaria)

(نیز دیکھئے ”پھوڑے“ پھنسیاں“)

ایپس ایم (Apis M): پتی اچھلنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ بستر کی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔  
 خارش اور جلن ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی۔ دائروی سوجن ہوتی ہے جو کہ سرخ یا ہیلی ہو  
 سکتی ہے جس کے ساتھ شدید خارش ہوتی ہے۔ 1x یا 6th ذاتی لیوشن دیجئے۔  
 اریٹیکا پورینس (Urtica Urens): جب ایپس ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ اس  
 کی علامات ایپس کی علامات سے مماثل ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ اس میں پیشاب متواتر آتا  
 ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): معدوی علاقہ کی چھپاکی کا بہترین علاج کرتی ہے۔ تھوڑے اور اسال کے  
 ساتھ پتی اچھلنا لاحق ہوتا ہے۔

انٹیم گروڈ (Antim Crud): جب معدوی نزلہ کے باعث پتی اچھلتی ہو یا تیزابیوں کے استعمال  
 کے باعث پتی اچھلنے کا مرض لاحق ہو۔ گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔

اسٹاکس فلیو (Asterac Fl): پتی اچھلنے کی مزمن صورت 'سارے' جسم پر خارش کے ساتھ  
 چھپاکی ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): جلن اور خارش کے ساتھ پتی اچھلتی ہے۔ حرارت اور گرمی سے  
 بہتری ہوتی ہے۔ کپڑے اتار پھینکنے سے جلن اور خارش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نیرم میور (Nat Mur): قبض اور نمیالی رنگت والی جلد کے ساتھ ضدی قسم کے کیسوں میں  
 یہ دوا دی جاتی ہے۔

ریڈیم (Radium): رات کے وقت سارے جسم پر خارش ہوتی ہے۔ جلد آگ کی طرح جلتی  
 ہے۔

ڈولکامارا (Dulcamara): سارے جسم پر پتی اچھلتی ہے۔ کھانے کے بعد جلن دار خارش  
 ہوتی ہے۔ گرمی میں ابتری ہوتی ہے اور سردی میں بہتری ہوتی ہے۔ حیض سے پہلے چھپاکی نکلتی

آرسینک البم (Arsenic Alb): جب چھوٹے وقتوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس ہو تو اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ خصوصاً جب گھوٹکا پھل کھانے کے باعث یہ تکلیف لاحق ہو۔ دائروی خارش ہوتی ہے۔ جلن شدید قسم کی ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر جتی اچھلا لاحق ہوتا ہے۔

### کیل — (Warts)

(نیز دیکھئے "مفرقات" کے ذیل میں "مے")

تھوجا (Thuja): تل یا کیل ہوتے ہیں۔ اعضائے قائل پر یا اعضائے قائل کے قریب کیل وغیرہ ہوتے ہیں۔ 200 طاقت کی دوا دن میں دو مرتبہ صبح شام دی جائے۔  
کاسٹیکم (Causticum): چرے، ہاتھوں یا آنکھوں پر کیل ہوتے ہیں۔  
ڈلکامارا (Dulcamara): لمبے گوشت والے اور ہموار یا چھنے کیل ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں پر چرے پر یا انگلیوں پر ہو سکتے ہیں۔  
سٹیفی سگریا (Staphisagria): کیل، مے۔ اعضائے قائل والے کیل اور پھول گو بھی کی طرح کے اگاؤ ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

### بہسری — Whitlow

(نیز دیکھئے "پھوڑے")

مارس ٹیکا (Myristica): بہسری کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا پیپ بننے کے عمل کو تیز کرتی ہے اور تیزی سے اسے خارج کرتی ہے۔  
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): یہ دوا بہسری کے پھٹنے کے بعد دینی چاہئے۔ یہ بہسری کو شفا دینے میں مدد دے گی۔ ناخنوں کی جڑوں کے گرد اور انگلیوں کے سروں پر تنگی ہوتی ہے۔ ناخنوں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ ناخن ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اکھڑ جاتے ہیں۔  
سیلیا (Silicea): جب ہیپیر سلف ناکام ہو جائے یا جب شفا یابی میں رکاوٹ آجائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

لیڈم پال (Ledum Pal): سوئی چھ جانے کے باعث بہسری لاحق ہو۔

ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): یہ دوا بھی بہسری میں مفید ہے۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو اسے آزمانا چاہئے۔

## گنجا پن — (Baldness) (دیکھئے ”بالوں کا مرگنا“)

### سکری — (Dandruf)

سینی کیولا 200 (Sanicula 200): کھوپڑی پر آنکھ کی بھنوں پر اور دیگر بالوں والے حصے پر پرت دار سکری ہوتی ہے۔ ہر ہفتے ایک خوراک دیجئے۔

فاسفورس 200 (Phosphorus 200): سکری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالوں سے بافراط سکری گرتی ہے۔ جیسا کہ بادل ہوتے ہیں۔ بالوں کے کچلے کچلے گرتے ہیں۔ کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے۔

گریفائٹس (Graphites): داو والی سکری ہوتی ہے۔ (ایسی سکری جس کے ساتھ ایگزیمایا پھوڑے پھسی وغیرہ ہوتے ہیں) بے چین کر دینے والی خارش اور مرطوب قسم کی پرت دار سکری ہوتی ہے۔ بال گرتے ہیں۔ چاند پر جلن ہوتی ہے۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sul): کھوپڑی پر سکری ہوتی ہے۔ جس کے باعث مونے پیلے رنگ کے چھلکوں کے ساتھ پھوڑے پھسیاں ہو جاتی ہیں۔ ایگزیمایا لاحق ہوتا ہے۔ سکری کے باعث مہاسے بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ بال گرتے ہیں۔

تھوجا (Thuja): سفید رنگ کی پرت دار سکری، بال خشک ہوتے ہیں اور گرتے ہیں۔ سیپیا (Sepia): دائروں کی صورت میں سکری ہوتی ہے جیسا کہ گول کینزے ہوتے ہیں۔ کھوپڑی رطوبت دار ہوتی ہے۔ بال گرتے ہیں۔ ماتھے پر بالوں کے قریب مہاسے ہوتے ہیں۔

کاربونیئم سلف (Carboneum Sul): کھوپڑی پر سکری ہوتی ہے۔ پھوڑے پھسیاں ہوتی ہیں۔ چھلکے ہوتے ہیں۔ ایگزیمایا لاحق ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے۔ مرطوب پرت دار مہاسے ہوتے ہیں۔ دکھن اور درد ہوتا ہے۔

سورینم (Psorinum): بدبودار سکری ہوتی ہے۔ نیٹرم میور (Natrum Mur): سفید سکری ہوتی ہے جس کا تباہی نزلے سے یا قوت شکر کے کھو جانے سے ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ آرسینک البم (Arsenic Alb): کمزور مریضوں میں، ایسے مریضوں میں جن کی جلد خوش نما ہوتی ہے۔ کھوپڑی پر ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے۔ تنگے حصوں پر دائروی قطعات ہوتے ہیں۔ خشک چھلکے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت جلن اور خارش ہوتی ہے۔

ایسڈ فلور (Acid Flour): کھوپڑی پر خشک بھوسی ہوتی ہے نیز بیجانی کیفیت ہوتی ہے۔ بال گرتے ہیں۔

میزیریئم (Mezereum): بہت زیادہ خارش اور بالوں کے گرنے کے ساتھ سکری ہوتی ہے۔

### بالوں کا گرنا (Hair-Falling of)

تھوجا (Thuja): برت دار سفید رنگ کی خشک سکری کے باعث بال گرتے ہیں۔  
گریفٹائٹس، اینٹن تھیرم (Anantherum, Graphites): داڑھی کے بال اور بھنوں کے بال گر جاتے ہیں۔

سفنکوریس (Sphingurus): بالوں کا گرنا خصوصاً داڑھی کے اور مونچھوں کے بال گرتے ہیں۔

اسٹیلگوائیم (Ustilago M): آتشک کے باعث کنچاپن لاحق ہوتا ہے۔ بال گر جاتیں کے اور پھر نہیں آئیں گے۔

وائٹز بیڈن (Wiesbaden): اس دوا کے استعمال سے بال تیزی کے ساتھ آئیں گے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ 200 طاقت کی خوراک دیجئے۔

کالکیریا فاس (Calcarea Phos, Phosphorus): بال پٹھوں کے کچھے کرتے ہیں۔ جس سے ادھر ادھر قطعات خالی جلد کے بن جاتے ہیں۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات آزمائیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): سر سے بالوں کا گرنا نیز آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کا گرنا۔ آنکھوں کی پٹکوں کے بال اور اعضائے تناسل کے بال گرتے ہیں۔ غم کے باعث بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔

سلینینم (Selenium): سارے سر سے بال گر جاتے ہیں اور کھوپڑی ہموار اور بالوں کے بغیر صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ ایروؤں کے بال گر جاتے ہیں اور چہرہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔

ایلوچینا (Alumina): کھوپڑی پر سے بال بہت زیادہ مقدار میں گرتے ہیں چنانچہ کھوپڑی جگہ جگہ سے نکلی ہو جاتی ہے۔ تمام جسم پر سے پٹکوں سمیت بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔

ایسڈ فلور (Acid Flour): آتشک کے باعث بالوں کا گرنا لاحق ہو۔ بال خشک ہوتے ہیں۔ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بال پھٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالوں کے کچھے بن کر الجھ جاتے ہیں اور ان میں چمک نہیں ہوتی۔

نٹرم میور (Natrum Mur): حمل میں بالوں کا گرنا، مزمن درد سر کے بعد بال گر جاتے

ہیں۔  
**لیکسیس (Lachesis):** دورانِ حمل بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔  
**بوریکس (Borax):** بال کھردرے اور سخت ہوتے ہیں۔ کنگھی سے ہموار نہیں ہو سکتے۔  
 بالوں کے سرے آپس میں الجھ جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ اگر بالوں کے ان کچھوں کو کاٹ دیا جائے تو یہ دوبارہ بن جاتے ہیں۔  
**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** آنکھوں میں بال ہونے کا احساس۔  
**نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid):** بال یا افراطِ گرتے ہیں خصوصاً چاند سے۔ جس کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت آتشک، اعصابی درد سر، کمزوری یا نقاہت کے باعث ہو سکتی ہے۔ کھوپڑی حساس ہوتی ہے۔  
**وینکا مینور (Vinca Minor):** جلد پر خارش ہونے کے ساتھ بالوں والے حصے بالکل صاف شفاف ہو جاتے ہیں یعنی بال گر جاتے ہیں۔ رطوبت رستی ہے۔ بال آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ کھانے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔  
**امونیم میور (Ammonia Mur):** سکری کے ساتھ بالوں کا گرنا۔  
**مینسی نیلا (Mancinella):** شدید قسم کے حاد امراض کے بعد بال گر جاتے ہیں۔  
**کالی کارب (Kali Carb):** آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔  
**رٹاکس (Rhus Tox):** پٹکوں کے بال گر جائیں۔  
**مرکیوریس (Mercurius):** آتشک کے باعث بالوں کا گرنا۔  
**سلفر (Sulphur):** بہت ہی بے قاعدہ بال۔۔۔ ریتلے بال، سخت اور بغیر چمک والے بال۔۔۔ یہ بال ہر سمت کو اگتے ہیں۔  
**میڈورینم (Medorrhinum):** کھوپڑی پر خارش کے ساتھ بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بہتری ہوتی ہے۔  
**سیپیا (Sepia):** موقوفیِ حیض اور حمل کے دورانِ بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔ درد سر کے دورانِ بال گرتے ہیں۔ مباشرت کی خواہش نہیں ہوتی۔

### بالوں کا اگاؤ (Hair Growth)

**تھوجا (Thuja):** ایسی جگہوں پر بال بہت زیادہ مقدار میں اگ آتے ہیں جہاں قدرتی طور پر عموماً بال نہیں ہوتے۔ IM طاقت کی ایک خوراک ہر ماہ دی جائے۔  
**اولیم جیکو (Oleum Jac):** یہ دوا گرمیوں میں 30 طاقت میں دی جا سکتی ہے اور سردیوں

میں تھو جا IM کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ 3x طاقت میں دی جا سکتی ہے۔ تھو جا دینے کے 2 دن پہلے یا 2 دن بعد تک یہ دوا نہیں دی جا سکتی۔  
نوٹ: آرسینک کا زرد سفید اور ان بجھا چونا ہم مقدار لے کر گرم پانی میں ملا کر مرہم تیار کر لیں۔ چہرے پر اس مرہم کو لگا کر خشک ہونے دیں۔ کئی ہفتوں تک چہرے پر کوئی بال نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی بھی نظر نہ آئے۔

### قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا

(Hair- Premature Grey)

تھائی رائیڈین (Thyroidin): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ ایک ماہ تک دن میں 3 مرتبہ 30 طاقت کا ڈائی لیوشن دینا چاہئے اور بعد میں 200 ڈائی لیوشن کی خوراک ہر ہفتے ایک ماہ تک دینی چاہئے۔

ایسڈ فاس 'لائیکو پوڈیم' وائز بیڈن (Wiesbaden, Lycopodium, Acid Phos): یہ ادویات 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں بدل بدل کر ہر ہفتے تقریباً چھ ماہ تک دینی چاہئیں۔  
پائیلو کارپنی نم (Pilocarpinum): 1000 ڈائی لیوشن کی صورت میں اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ بشرطیکہ مندرجہ بالا دیگر ادویات تکام ہو جائیں۔ خوراک ہر ماہ دہرائی جائے۔  
نیٹرم میور 'فاسفورس' (Phosphorus, Natrum Mur): تھکا دینے والی بیماریوں کے باعث بالوں کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے۔ (یا سفید ہو جاتا ہے) یہ ادویات ہر ہفتے 200 ڈائی لیوشن میں بدل بدل کر دی جائیں۔

آرسینک ہائیڈ (Ars Hyd): اعضاء کی مرگی کے باعث بالوں کا برف کی طرح سفید ہو جاتا۔  
نکس وامیکا (Nux Vom): بال سفید ہو جاتے ہیں۔ (رحم کا اعصابی درد)

### حصہ سوم۔۔۔ ناخن

#### عمومی تکلیفات (Affections in General)

تھو جا (Thuja): انگلیوں کے ناخن بیمار ہو جائیں، ساتھ میں بد ہیئت ہو جائیں، موی ناخن۔  
مارس ٹیکا میبی فیرا (Myristica Sebilera): سوجن کے ساتھ انگلیوں کے ناخنوں میں درد ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ناخن گوشت میں گھس جاتے ہیں جو کہ ناہموار

مڑے تڑے اور بے قاعدہ ہوتے ہیں۔  
سلیشیا (Silicea): انگوٹھے کے ناخن اندر کی جانب اگتے ہیں۔ بدھیت ہوتے ہیں۔ یہ دوائے نئے ناخن اگانے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔  
فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): ناخنوں میں پہاڑی نما چرے ہیں پڑ جاتی ہیں۔  
کریفائٹس (Graphites): جب ناخن موٹے ہو جائیں۔ ناخن سینگوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔  
ایپس ایم (Apis M): ناخنوں کے نیچے خون جم جاتا ہے۔  
کاسٹیکم (Causticum): ناخن اندر کی جانب اگتے ہیں۔ جب سلیشیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔  
لیکسیس (Lachesis): ناخن اندر کی جانب اگتے ہیں۔ گوشت سخت ہو جاتا ہے۔ ناخن جامنی رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں میں ڈنک لگتے ہیں۔  
میگنیٹس پولس آسٹ (Magnetis Polus Aust): ناخن کی اندرونی جانب دکھن والا درد ہوتا ہے جیسے کہ ناخن گوشت کے اندر آگ آیا ہو۔ چھوٹے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے انگوٹھوں اور ناخنوں کے جوتے سے دبنے کے باعث درد ہوتا ہے۔

### ناخنوں کا لٹکنا (Hang Nails)

نیٹرم میور (Natrur Mur): انگلیوں کے ناخنوں کی گرد خشکی اور شکاف ہوتے ہیں۔ انگلیوں میں من ہونا اور جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔ بازوؤں اور گھٹنوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ نچلا ہونٹ وسط سے پھٹ جاتا ہے۔ پتی اچھلتی ہے۔  
سلفر (Sulphur): خشک چھلکوں والی غیر صحت مند جلد 'خارش ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ کھانے سے اور دھونے سے اجڑی ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں اور ناخنوں کی ہیزوں میں بپ پڑ جاتی ہے یا کپکپاتے ہیں اور گرم پسینے آتے ہیں۔  
کلیکیریا کارب (Calcareia Carb): غیر صحت مند جلد 'ناسوری کیفیت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہوتے ہیں۔ کیل اور بوئیاں ہوتی ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے مرطوب ہوتے ہیں۔ رات کے وقت ٹھنڈے اور مردہ محسوس ہوتے ہیں۔

### پھٹنے والے اور دھبوں والے ناخن (Splitting & Spotted Nails)

انٹیم کروڈ (Antim Crud): ناخن بھر بھرے ہوتے ہیں۔ غیر مناسب شکل میں اگتے ہیں۔



ہاتھوں پر اور پاؤں کے تلوؤں میں سینک دار کیل ہوتے ہیں۔ جلد خشک ہوتی ہے۔ بستر میں گرم ہونے پر خارش ہوتی ہے۔ زبان بہت زیادہ پر پیچان ہوتی ہے اور اس پر سفید موٹا طبع ہوتا ہے۔ گرمی سے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سیلیشیا (Silicea): انگلیوں کے ناخنوں کی تکلیفات خصوصاً جب ناخنوں پر سفید رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ پاؤں خشک اور ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان پر پھیند آتا ہے۔ ناخن بے ڈھنگے ہوتے ہیں۔

الیومینا (Alumina): ناخن بھر بھرے ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے کترنے کا احساس ہوتا ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے اور آسانی سے پھٹ جاتی ہے۔ بستر میں گرم ہونے پر خارش ہوتی ہے۔ انگلیوں کی جلد بھر بھری ہو جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): ناخن ٹھنڈے اور نیلے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر کیل ہوتے ہیں جن سے دھونے پر خون بہتا ہے۔ شور سے درد سے اور چھونے سے حساس ہوتے ہیں۔


تھوچا (Thuja): ناخن نرم اور بھر بھرے ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں۔ ہاتھوں پر اور بازوؤں پر بھورے داغ ہوتے ہیں۔ جلد چکنی ہوتی ہے۔ بالوں میں سکری ہوتی ہے۔ پھیند مینھا اور تیز بو والا ہوتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): ناخن موٹے اگتے ہیں۔ پھٹ جاتے ہیں اور ان کی ہیئت خراب ہو جاتی ہے۔ مریض اداس ہوتا ہے۔ ناامید ہوتا ہے 'روتا ہے' صرف موت سے متعلق سوچتا رہتا ہے۔

ہیلے بوزرس (Helleborus): جلد اترنے کے ساتھ ناخنوں کا گر جانا لاحق ہوتا ہے۔

الیومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): ناخنوں کا بھر بھرا ہو جانا۔ ہاتھ مستقل پھٹتے رہتے ہیں۔ ہاتھوں اور پاؤں میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ناخنوں کے ساتھ ساتھ سوزش ہوتی ہے۔

ایسڈ فلوورک (Acid Fluoric): ناخن مزے مزے ہوتے ہیں۔ ناخنوں میں لمبائی کے رخ پر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناخن بہت تیزی سے اگتے ہیں اور بد وضع ہو کر اگتے ہیں کیونکہ وہ بد ہیئت اور مزے مزے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بہت موٹے اور بعض جگہوں پر بہت پتلے ہوتے ہیں۔ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں اور بھر بھرے ہوتے ہیں۔



## حمیات (Fevers)

### عام بخار — (Fever-General)

**اکونائٹ این (Aconite N):** اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس بہت شدید ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے۔ یہ دوا صرف ابتدائی مراحل میں دینی چاہئے۔

**بپٹیشیا (Baptisia):** پیاس اور بھوک کے ساتھ بخار لاحق ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سارے جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے یا بستر پر پلو بدن رہتا ہے۔ مریض باتونی ہوتا ہے جبکہ بخار کا درجہ حرارت بلند ہو جائے۔ اسہال متعفن بودالے ہوتے ہیں۔ گرمی بے ہوشی کے ساتھ بخار کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ چہرے پر چمک اور سرخی ہوتی ہے۔ بخار اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔ مریض خاموش رہنا چاہتا ہے۔ یہ اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ درد سر ہوتا ہے۔ خون کی ٹالیوں میں ٹپکن ہوتی ہے۔ دھوپ میں کام کرنے کے باعث یا پیدل چلنے کے باعث بخار لاحق ہوتا ہے۔

**جلسمی میم (Gelsemium):** چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ گردن کی گدی سے شروع ہو کر درد سر تک چلا جاتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی اور مریض خاموش لیٹ جانا چاہتا ہے۔

**نکس دامیکا (Nux Vom):** مریض جاڑا محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ دن کے گرم ترین حصے میں بھی۔ حالانکہ جاڑا محسوس کرتا ہے لیکن کپڑے اتار دینا چاہتا ہے۔ ضدی قسم کی قبض ہوتی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ بخار دس سے گیارہ بجے دن کے دوران زیادہ ہو جاتا ہے۔

**آرسینک البم (Arsenic Alb):** بے چینی کے ساتھ بخار لاحق ہو۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مقدار پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ کمزوری اور نفاہت ہوتی ہے۔ کپکپاہٹ

ہوتی ہے اور جاڑا لگتا ہے اور اس میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون کی نالیوں میں دوڑنے والا خون نہیں بلکہ برف کا پانی ہو۔ گرمی محسوس ہونے کے مرحلہ کے دوران یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون کی نالیوں میں ابلتا ہوا پانی دوڑ رہا ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): خشک کھانسی۔ سارے جسم میں درد کے ساتھ بخار لاحق ہوتا ہے۔ مریض خاموش لیٹ جانا چاہتا ہے۔ کسی شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ لمبے وقفوں کے ساتھ بڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

ٹرائی اوکسیم (Triosteum): معدوی (گیس والا) یا ٹائیٹانیئم بخاروں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ تمام بخاروں کے لئے خصوصی طور پر کام دیتی ہے۔

کیلڈیئم (Caladium): ہر شام مریض دوران بخار سو جاتا ہے اور بخار اترنے کے بعد جاگتا ہے۔

نکٹین تھس (Nyctanthes): تپ کے ساتھ صفراوی بخار ہوتا ہے۔ معدہ میں جلن ہوتی ہے۔ منگی ہوتی ہے۔ جاڑے کے ساتھ شدید قسم کی پیاس ہوتی ہے۔ وقفہ وار بخار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ استسقاء سوجن ہوتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): جاڑے کے دوران پیاس اور جاڑے کے علاوہ کسی دوسرے مرحلہ میں پیاس نہ ہونے کے ساتھ بخار لاحق ہو۔ بیرونی گرمی سے جاڑے میں افادہ ہوتا ہے۔ بیرونی طور پر مریض کو ڈھانپنے سے گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جاڑے کے دوران چہرہ سرخ ہوتا ہے۔

الستونیا (Alstonia): اسال کے ساتھ ست بخار۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ہلکی قسم کا بخار۔

کیڈمیم سلف، کروٹیلز ہوور (Crotalus Hor, Cadmium Sulph): شدید قسم کی تپ اور منگی کے ساتھ زرد بخار ہوتا ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): رات کے پینے کے ساتھ ست بخار ہوتا ہے۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے۔

ایبیس کین (Abies Can): ٹھنڈ سے سارے بدن میں کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ٹون بریلے پانی میں تبدیل ہو چکا ہو۔ جاڑا کمر میں نیچے کی طرف جاتا ہے۔

سورینم (Psorinum): بخاروں میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ حرارت اور پسینہ شدید ہوتا ہے۔ بخاروں میں ابلتا ہوا پسینہ ہوتا ہے جیسے کہ گرم بھاپ نکلتی ہے۔

ایپس ایم (Apis M): خشک حرارت اور پسینے کے ساتھ اولٹے بدلنے کی کیفیت کے ساتھ بخار، کالا زار بخار جس کے ساتھ تلی بوجھ جاتی ہے۔ پیاس کے ساتھ یا بغیر پیاس کے ساتھ۔

## آبلے — Blisters (Hydora)

نیٹرم میور (Natrur Mur): بخار کے آبلوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اسے مرض کے کسی بھی مرحلہ میں دیا جاسکتا ہے لیکن اگر یہ افادہ دینے میں ناکام ہو جائے تو دیگر ادویات آزمائی جائیں۔ وقفہ وار بخاروں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): وقفہ وار بخار ہوتے ہیں۔ جب نیٹرم میور ناکام ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ٹائیفائیڈ بخار میں پرت دار آبلے ہوتے ہیں۔  
لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): سرخ بنیاد والی گڑھے دار پھٹیوں کے ساتھ آبلے ہوتے ہیں۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): کیل مہاسے ہوتے ہیں۔ جن میں دکھن ہوتی ہے اور تیز درد ہوتا ہے۔ سفید پھوڑے ہوتے ہیں جو اندر سے سرخ ہوں۔

سیلیشیا (Silicea): کانوں سے مواد خارج ہونے کے ساتھ پرت دار آبلے (یا پھوڑے) ہوتے ہیں۔

رشاٹکس (Rhus Tox): بخار والے آبلے ہوتے ہیں۔

بپٹیشیا (Baptisia): پھول مانا (ٹائیکس) میں گندے آبلے ہوتے ہیں۔

## گردن توڑ بخار

(Cerebro Spinal Meningitis)

(نیز دیکھئے ”گردن توڑ بخار“ ”اعصابی نظام“ کے ذیل میں)

## لاکڑا کا کڑا — (Chicken Pox)

وریولینم (Variolinum): یہ دوا علاج کے آغاز میں دینی چاہئے۔ 200 طاقت کی صرف ایک خوراک دیجئے۔ اس دوا کا دیا جانا لازمی ہے کیونکہ یہ دوا مرض کے دورانیہ کو مختصر کر دیتی ہے۔  
انٹیم ٹارٹ (Antim Tort): وریولینم دینے کے 48 گھنٹوں کے بعد اس دوا کو شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا ہر دو گھنٹوں کے بعد دینی چاہئے۔ یہاں تک کہ بخار جاتا رہے۔  
برائی اونیا (Bryonia): اگر بخار اور خشک کھانسی ہو تو یہ دوا دینی چاہئے۔ مریض خاموش لیٹے رہنا پسند کرتا ہے۔

مرک سول (Merc Sol): بخار طے جانے کے بعد اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔  
 کلکیریا فاس (Calcarea Phos): لاکڑا کا لڑا، پیچک اور خسرو کے بعد لاحق ہونے والی  
 کمزوری کے لئے اسے مقوی دوا کے طور پر دینا چاہئے۔

### ڈینگو (کمر توڑ بخار)

#### Dengue (Breakbone Fever)

برائی اونیا (Bryonia): سارے جسم میں درد ہوتا ہے۔ لیکن ہڈیوں کے اندر گہرائی میں نہیں  
 ہوتا۔ مریض خاموش لیٹتا چاہتا ہے۔ لمبے وقفوں سے زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔  
 یوپٹیوریم پرف (Eupat Perf): کمر توڑ بخار کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ درد گہرائی میں  
 ہڈیوں کے اندر تک پایا جاتا ہے۔  
 رشاکس (Rhus Tox): کمر توڑ بخار میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے جبکہ عضلات میں  
 درد ہو۔

#### خناق — (Diphtheria)

(دیکھئے ”ناک، گلا، حلق اور جھڑہ“ کے ذیل میں ”خناق“)

#### سرخ بادہ — (Erysipelas)

(دیکھئے ”جلد“ کے ذیل میں ”سرخ بادہ“)

#### ہائی پر پائی ریکسیا (جسم کا بہت شدید بخار)

#### (Hyperpyrexia)

بیلادونا (Belladonna): مقابلتا خون میں زہریلے مادے کی عدم موجودگی کے ساتھ اونچے  
 درجے کے بخار کا مرحلہ، جلن دار، چہن والی بھاپ نکلتی حرارت ہوتی ہے۔ بازو اور ٹانگیں  
 برقی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پیاس نہیں ہوتی۔  
 وریٹرم ویرائیڈ (Veratrum Viride): بہت زیادہ کمی اور زیادتی کے ساتھ اونچے درجہ کی  
 حرارت ہوتی ہے۔

## انفلو سنزا (Influenza)

**آرسنک الیم (Ars Alb):** یہ انفلو سنزا کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بغیر سوچے سمجھے بھی دے دی جائے تو یہ دوا 95 فیصد کیسوں کو شفا دے دیتی ہے۔ اس کی علامات یوں ہیں: چھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی ٹھنڈی مقدار کی پیاس کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔ چھینکلیں آتی ہیں اور ناک سے خراش دار پتلا مواد بہتا ہے۔ یہ دوا انفلو سنزا کے بعد میں بھی دی جاسکتی ہے۔ جب کاربو ورج ناکام ہو جائے تو انفلو سنزا کی یہ دوا علامات ہوتی ہیں۔

**سلفر (Sulphur):** یہ عمل انگیز دوا ہے جسے انفلو سنزا کے علاج کے وقت کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ اگر جسم کا درجہ حرارت 48 گھنٹوں کے اندر کم نہ ہو تو یہ دوا 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں صبح کے وقت خالی پیٹ دینی چاہئے۔ یہ علاج کو مکمل کر سکتی ہے یا علامات کو واضح کر کے دیگر ادویات کے انتخاب میں مدد دے سکتی ہے۔ جب یہ دوا دی جائے تو کم از کم بارہ گھنٹوں تک اور کوئی دوا نہیں دینی چاہئے۔

**جلسیم میم (Gelsemium):** فلو کے ابتدائی مراحل میں اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ اس میں چھینکلیں آتی ہیں۔ کمر کے اوپر اور نیچے شدید قسم کا متواتر جاڑا ہوتا ہے۔ چہرہ خون سے سرخ ہوتا ہے۔ سرخی گہری ہوتی ہے۔ ناک سے پانی جیسا مواد خارج ہوتا ہے جو کہ خراش کے بغیر ہوتا ہے۔ عضلات میں درد ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی لیکن درد سر شدید ہوتا ہے۔ 1x دیجئے۔

**یو پیے ٹوریم پرف (Eupatorium Perf):** یہ دوا ایسے بخار کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس کے ساتھ جاڑا ہوتا ہے۔ جس کے بعد صفراوی قے ہوتی ہے۔ کپکپاہٹ کمر کے ٹپلے حصے کی طرف جاتی ہے اور پھر ہاتھوں اور پاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ ہڈیوں میں گہرا درد ہوتا ہے۔ جس میں افادہ دہانے سے اور حرکت سے ہوتا ہے۔ پیاس ہوتی ہے لیکن پانی کا ذائقہ نمکین یا تیل والا ہوتا ہے۔ چھینکوں کے ساتھ زکام ہوتا ہے۔ گلابیٹھ جاتا ہے اور ڈھیلی کھانسی ہوتی ہے۔ 2x ڈائی لیوشن دیجئے۔ جسم میں خشکی ہوتی ہے۔

**برائی اونیا (Bryonia):** اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب فلو نمونیا کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے۔ عضلات میں گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جن میں اضافہ معمولی حرکت سے ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ جس کے باعث پھیپھڑوں میں اور چھاتی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جسم پر پسینے آتے ہیں۔

**کالی بانیکرام (Kali Bich):** یہ دوا بخار کے بعد کھانسی کے لئے ہوتی ہے جو کہ خشک نہیں ہوتی۔ چپکنے والا بلغم ہوتا ہے۔ یہ دھالکے کی طرح سے کھینچا جاسکتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔ ناک کی ہانسی جھلی میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ ناک کی بڑ میں درد کے ساتھ خشکی ہوتی ہے

اور اس جگہ مواد جم جاتا ہے۔ (سینڈھ)  
نیٹرم سلف (Nat Sulph): یہ دوا دبائی انفلوئنزا کے لئے مخصوص ہے۔  
رشاکس (Rhus Tox): مسلسل جازا کے ساتھ فلو لاحق ہوتا ہے جیسا کہ سارے جسم پر  
 ٹھنڈا پانی اندر لیا گیا ہو یا جیسا کہ خون سرد ہو کر ٹالیوں میں دوڑ رہا ہو۔ اس کے ساتھ بازوؤں  
 اور ٹانگوں میں درد ہوتے ہیں۔ بے چینی ہوتی ہے اور مریض بٹتا رہتا ہے۔ جس سے اسے افاقہ  
 ہوتا ہے۔ زبان کی عکونی نوک کے ساتھ زبان کی خشکی لاحق ہوتی ہے۔ سخت قسم کی سرسراہٹ  
 والی کھانسی ہوتی ہے۔

ڈاکامارا (Dulcamara): انفلوئنزا کی حاد قسم کے لئے بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔  
 آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ گلے میں دکھن ہوتی ہے۔ عضلاتی سوزشی دکھن کے باعث  
 تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت مرطوب موسم کے باعث یا سرد موسم کے آنے پر ہوتی

کاسٹیکم (Causticum): اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ چہرہ خون سے بھرا ہوتا ہے۔ جازا  
 نہیں ہو سکتا۔ نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مریض مشکل ہی سے بستر سے اٹھتا ہے۔ ناک بند ہو  
 جاتا ہے۔ زکام آزادانہ بہتا ہے۔ ناک سے بننے والا مواد پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔ گلا بیٹھ جاتا  
 ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ جو کہ متواتر ہوتی رہتی ہے ۱۸ کی ایک خوراک دیتے۔  
کارڈوس ایجم (Cardus M): یہ فلو کے لئے مفید دوا ہے جبکہ جگر بھی متاثر ہو۔

انفلوئنزینم (Influenzinum): یہ ایک نوسوز (بیماری کے مواد سے تیار کردہ دوا) ہے اور  
 اسے عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے جبکہ دیگر اچھی منتخب شدہ ادویات حالت کو بہتر بنانے  
 میں ناکام ہو جائیں۔ اس دوا کو دبائی فلو سے بچنے کے لئے حفظ ماقدم کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ  
 شفا بھی دیتی ہے۔ علاج اس دوا سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): یہ دوا انفلوئنزا کے بعد ظاہر ہونے والی علامات کے لئے ایک  
 عمدہ دوا ہے۔ یہ علامات اس طرح سے ہوتی ہیں مثلاً نقاہت، طاققت کا فقدان، ورم زخردہ کی  
 باقیات، پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن جیسا کہ سرخ مریضوں کی جلن ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی دوا  
 دن میں دو مرتبہ دیتے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): انفلوئنزا کے بعد کھانسی ہوتی ہے۔ جب برائی اویٹا اور  
 دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ ایسی کھانسی کے لئے سب سے پہلے امونیا  
 کارب کو آزمانا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا دیتے۔

بپٹیشیا (Baptisia): مدہوش چہرے کے ساتھ دبائی انفلوئنزا میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ آنکھیں

چندھی ہوتی ہیں۔ سر میں درد ہوتا ہے۔ گلے میں دکھن ہوتی ہے۔ سارے جسم میں درد ہوتے ہیں اور دکھن ہوتی ہے اور بہت زیادہ نفاہت ہوتی ہے۔ بے ہوشی کے ساتھ چہرہ احقرانہ دکھائی دیتا ہے۔ مریض کو اس بے ہوشی سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): جب ادبی لوگ قلو کے بعد دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے تو یہ دوا انہیں شفا دے گی۔

### ملیریا — Malaria

چائنا (China): ملیریا کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں جاڑا ہوتا ہے لیکن پہلے دو مراحل کے دوران پیاس نہیں ہوتی یعنی جاڑے میں اور گرمی میں۔ دوسرے مرحلے کے اختتام پر پیاس شروع ہو جاتی ہے جبکہ بخار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوا پینے کے مرحلہ کے دوران کے لئے خاص ہے۔ دوسرے الفاظ میں جاڑے سے پہلے اور جاڑے کے بعد پیاس ہوتی ہے۔ ہر تیسرے روز علامات میں اتتری ہو جاتی ہے۔ منہ متلی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ بھجان 'دل کی دھڑکن' درد سر اور بھوک کا احساس بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ ہر ٹچر دیتے یا 1x ڈائی لیوشن حادہ کیہ دن میں دیتے۔ مزمن کیسوں میں اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن دیتے یعنی 200 یا 1000۔

چینی نم سلف (Chinium Sulph): اس دوا میں مرض کا دورہ 10 یا 11 بجے صبح یا 3 بجے شام اور 10 بجے رات کو ہوتا ہے۔ سخت قسم کا ہلانے والا جاڑا پیاس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گرمی والا مرحلہ بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں متواتر ہمایاں اور پھیپھیلیں آتی رہتی ہیں۔ اس مرحلہ کے دوران پیاس بھی موجود رہتی ہے۔ جیسا کہ پینے کے مرحلہ کے دوران ہوتی ہے۔ پینے تھکاوت پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور لمبے عرصہ تک آتا رہتا ہے۔

آر سینک البم (Ars Alb): شدید قسم کی نفاہت 'پریشانی' بے چینی اور شدید قسم کی جلن دار پیاس ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ معدہ میں بھجان ہوتا ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس دوا کے متعلق مزمن کیسوں میں سوچنا چاہئے۔ رات بھر کی بے چینی سے پہلے عموماً جاڑا لگتا ہے۔ کبھی جاڑا لگتا ہے اور کبھی گرمی لگتی ہے۔ جاڑا شدید قسم کا ہلانے والا ہوتا ہے۔ جو سارا دن بھی رہ سکتا ہے۔ پھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ جاڑے کے مرحلہ کے دوران مریض محسوس کرتا ہے کہ جیسے خون کی ٹالیوں میں دوڑنے والا خون برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور پیاس بالکل ختم ہوتی۔ گرمی کے مرحلہ کے دوران مریض محسوس کرتا ہے جیسے خون کی ٹالیوں میں ابلتا ہوا پانی دوڑ رہا ہو۔ اس کے ساتھ پیاس بھی ہوتی ہے۔ یہ پیاس پھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی مقدار پانی کے لئے ہوتی ہے۔ پینے والے مرحلے کے دوران



پیاس زیادہ مقدار پانی کے لئے ہوتی ہے۔ کونین کے غلط استعمال کے بد اثرات 'جب مرض کے تین مراحل واضح نہ ہوں تو یہ دوا مناسب ہوتی ہے۔

یوپے نوریم پرف (Eupatorium Perf): ہڈی میں درد ہوتا ہے جیسے کہ ٹوٹ گئی ہو۔ جاڑا کے بعد منگی اور قے ہوتی ہے۔ جاڑا کمر سے شروع ہوتا ہے۔ اور دیگر اعضاء میں اس کی لہریں جا سکتی ہیں۔ ایسا جوڑا جو چھوٹی کمر سے شروع ہو حرکت سے اجتر ہو جاتا ہے۔ نیز پیٹ سے اور کپڑا اتارنے سے بھی اجتری ہوتی ہے۔ جاڑے کے قریب ہونے پر منگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض کڑوے پانی جیسے مواد والی قے کرتا ہے۔ گرمی کے دوران شدید پیاس ہوتی ہے۔ اکثر کیسوں میں پیدہ آتا ہے۔ کڑوے ذائقے کے ساتھ زبان پر بھاری طبع ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر دباؤ ہوتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): تپکن والا اور ہتھوڑے نکلنے جیسا درد سر ہوتا ہے اور شدید پیاس ہوتی ہے جو مریض کو مرض کے دورے سے جھگمکا مطلع کر دیتی ہے۔ مریض طویل 'شدید اور سخت قسم کے بلا دینے والے جاڑے سے ڈرتا ہے۔ جس کے ساتھ پیاس ہوتی ہے۔ درد سر کے ساتھ جاڑے کے دوران سبز رنگ کے صفراوی مادے کی قے ہوتی ہے۔ ہر بخار باافراط پسینے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرض کا دورہ دس اور گیارہ بجے دن کے دوران عود کر آتا ہے۔ یہ علامت اس دوا کی نمائیاں اور سرخ روشنائی سے لکھی جانے والی علامت ہے۔ 'جاڑا انگلیوں' انگوٹھوں اور کمر سے شروع ہوتا ہے جو گھنٹوں تک رہتا ہے۔ انگلیوں کے پور اور ہونٹ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ گرمی طویل 'متواتر اور شدید ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ درد سر میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اکثر اس کے باعث بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ چہرہ پیلاہٹ مائل بحور ہوتا ہے۔ تلی اور جگر بڑھ جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر آبلے ہوتے ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): معدے کی معمولی خرابی مرض کے حملے کو لے آتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا بلغم والی کھٹی قے ہوتی ہے یا صفراوی قے ہوتی ہے۔ حملے کے دوران پیاس معدوم ہو جاتی ہے یا پیاس محض گرمی کے مرحلے کے دوران ہوتی ہے۔ حملے شام کے وقت ہوتے ہیں۔

برائی اونیا (Bryonia): جب معدے میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ابکائیاں آتی ہیں۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ زبان پشم والی ہوتی ہے۔ قبض یا اسہال ہوتے ہیں۔ ہمائیاں آتی ہیں اور گرمی کے دوران پہلو میں جھین ہوتی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے یا جاڑا سے پہلے گرمی لگتی ہے۔ ٹھنڈے والے مرحلے میں رخسار سرخ ہوتے ہیں۔

جلسی میم (Gelsemium): جب جاڑا ریزھ کی ہڈی کی طرف دوڑتا ہے یا پاؤں سے شروع

ہوتا ہے۔ گردن کی گدی میں درد ہوتا ہے۔ دن کے وسط میں جاڑا ہوتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔  
ذہن میں پراگندگی ہوتی ہے اور اونگھ آتی ہے پیاس نہیں ہوتی۔ یہ دوا بچوں کے لئے بہت  
مناسب ہے۔

وتھیا (Wyethia): گیارہ بجے صبح جاڑا ہوتا ہے۔ جاڑے کے دوران برف کے پانی کی پیاس  
ہوتی ہے۔ گرمی کے ساتھ پیاس نہیں لگتی۔ تمام رات افراط کے ساتھ پسینہ آتا ہے۔ پسینے کے  
دوران شدید درد سر ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹھنڈ کے مرحلہ میں ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے اور گرمی کے مرحلہ  
میں گرمی کا احساس ہوتا ہے جو کہ خون کی ٹالیوں میں کھسکتی چلی جاتی ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے۔  
جاڑے سے پہلے خشک کھانسی ہوتی ہے۔ پیشانی اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ منہ تر ہوتا  
ہے۔ بے پختگی ہوتی ہے۔ جس میں حرکت کرنے سے آفاقہ ہوتا ہے۔ پانی والے زرد پانخانے  
ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک نکونی ہوتی ہے۔ جاڑا رانوں سے شروع ہوتا ہے یا کندھوں کے  
درمیان سے شروع ہوتا ہے۔

ایپس مل (Apis Mel): اچانک اور شدید قسم کی قے کے ساتھ جاڑا ہوتا ہے۔ بخار شام چھ  
بجے اور سات بجے کے درمیان آتا ہے۔ جاڑا چھاتی سے اور پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جس  
کے ساتھ چھاتی پر وزن محسوس ہوتا ہے۔ جلد خشک اور گرم ہوتی ہے۔ چھاتی میں جلن اور  
کھٹن ہوتی ہے جو کہ نمایاں علامت ہے نیز ضیق انفسی خطرناک ہوتی ہے۔

سینڈرون (Cedron): بخار گھڑی کی طرح سے وقت مقررہ پر عود کر آتا ہے۔

میناٹھس (Menyanthes): بہت زیادہ بڑھے ہوئے جاڑے کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ ہاتھ  
اور پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔

فیرم آرسینک (Ferrum Ars): جگر اور تلی کے بڑھ جانے کے ساتھ لمبیرا بخار لاحق ہوتا  
ہے۔ یہ دوا مزمن قسم کے مرض کا بھی علاج کرتی ہے۔ 6th ذائقہ لیوشن دیجئے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): شدید قسم کا دیر تک رہنے والا اور کپکپاہٹ طاری کرنے  
والا انگلیوں اور چہرے کا جاڑا خصوصاً ہونٹوں اور انگلیوں کے پوروں کا جاڑا بہت بے قاعدہ۔  
جاڑے کے دوران پیاس نہیں ہوتی اور گرمی کے مرحلہ کے دوران شدید پیاس ہوتی ہے۔  
بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ جس میں آفاقہ پسینہ کے باعث ہوتا ہے۔ غنودگی طاری  
ہوتی ہے جیسے کہ شراب پی رکھی ہو۔ پیٹ کے عضلات اور ٹانگوں کی پٹلیوں میں اینفمن ہوتی  
ہے۔

وربٹرم البم (Veratrum Alb): شدید قسم کے جاڑے اور بہت زیادہ پسینے کے ساتھ صبح کے

وقت بخار ظاہر ہوتا ہے۔ جو مریض کو کمزور اور لاغر کر دیتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں مردوں کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔

**ملیریا آف (Malaria Off):** یہ ایک نوسوڑ ہے اور مزمن کیسوں میں اونچی طاقتوں میں دیا جا سکتا ہے یا جب اچھی منتخب شدہ ادویات دینے کے باوجود شفا نہ مل رہی ہو تو اسے دینا چاہئے۔ یہ علاج کو مکمل بھی کرتا ہے۔ درمیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ جو بخار کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ یہ دوا اس تکلیف کا ازالہ کر دے گی۔

**کیلڈیم (Caladium):** مریض ہمیشہ دورے کے دوران شام کے وقت سو جاتا ہے اور دورہ ختم ہونے کے بعد جاگتا ہے۔

**نک ٹین تھرس (Nyctanthos):** صفراوی تھ، قبض، معدے میں جلن کے ساتھ ملیریا بخار لاحق ہوتا ہے۔ جاڑے اور استسقاء سوجن کے ساتھ شدید پیاس ہوتی ہے۔

**میمیکس (Cimex):** جاڑے سے پہلے پیاس ہوتی ہے۔ جاڑے کے دوران جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ کھنچاؤ ہوتا ہے جیسا کہ جوڑوں کے بندھن بہت چھوٹے ہو گئے ہوں۔ ٹانگیں پھیلائی نہیں جاسکتیں۔ پانی پینے سے کھانسی یا درد سر یا دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یا تحریک ہوتی ہے۔

### خسرو — (Measles)

**برائی اونیا (Bryonia):** یہ خسرو کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ 2x ڈائی لیڈن میں دینی چاہئے۔ یہ مرض کو ساقط کر دیتی ہے اور اس کے دورانیہ کو مطلقاً مختصر کر دیتی ہے۔ یہ کچھ بچروں کی تکالیف کی مدافعت کرتی ہے جو کہ ایک عام تکلیف ہے۔

**سیلیشا (Silicea):** یہ دوا خسرو کے بعد لاحق ہونے والی کھانسی کے لئے دینی چاہئے۔  
**پلساٹیل (Pulsatilla):** یہ دوا بھی مرض کے ابتدائی مراحل میں مفید ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ زکام اور آنکھوں سے بہت زیادہ پانی کا اخراج بھی ہوتا ہے۔

**جلسی میم (Gelsemium):** جب مریض ادھنسا ہو اور بے پردہ ہو۔ چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے اور چہرے میں خون بھرا ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔ نبض بھرپور ہوتی ہے اور نبض نرم لیکن ست ہوتی ہے۔

**ڈروسرا (Drosera):** خسرو کے دوران اور بعد تشخیصی کھانسی ہوتی ہے۔  
**ایپس ایم (Apis M):** خسرو کے دب جانے کے باعث چیخ کے ساتھ گردن توڑ بخار لاحق ہوتا ہے۔

**کالی بائی (Kali Bi):** اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب پلساٹیل کی طرح سادہ

نزلے کی بجائے آنکھ کے قرنیہ میں پھنسیاں پیدا ہو جائیں۔ مطلق سے کانوں تک درد ہونے کے ساتھ گلے کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ نزلاوی بہرہ پن بھی لاحق ہو سکتا ہے۔  
میلینڈرینم (Malandrinum): خسرو کے لئے مداخلتی دوا ہے۔ ہر ہفتہ 30 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک دیجئے۔

یوفرزیا (Euphrasia): آنکھوں اور ناک کی باغی جھلی کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ ناک سے نرم مادہ خارج ہونے کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے خراش دار مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا خسرو کو عام قسم میں بدل دیتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ بخار پر قابہ پاتی ہے اور کھانسی کو آرام دیتی ہے۔

آر سینک الیم (Ars Alb): جب نقابت بہت زیادہ ہو اور پھوڑے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس لاحق ہو۔ بے چینی ہوتی ہے۔ گہرے سبز اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ جن میں آدمی رات کے وقت اضافہ ہو جاتا ہے۔

الین تھس (Alanthus): خسرو کے دب جانے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خسرو کے دب جانے کے باعث گردن توڑ بخار میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بے ہوشی ہوتی ہے جو کہ رطوبات کے اخراج کے باعث ہو سکتی ہے۔ سرخ باز اچانک ظاہر ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔

### کن پڑے — (Mumps)

بیلادونا 3x (Belladonna 3x): یہ کن پیڑوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ اسے مرکب آئیوڈ 30 کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں ادویات ہر آدھے گھنٹے کے بعد بدل بدل کر دینی چاہئیں۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمانا چاہئے اور جب رسولی سخت تر ہو اور جلد زیادہ چیلی ہو تب بھی اس دوا کو دینا چاہئے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب کان ملوث ہوں اور درد بہت زیادہ شدید ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ جب کن پیڑے خیموں یا پستانوں کو متاثر کریں اور ان میں سوزش ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

ایبروٹینم (Abrotanum): جب کن پیڑے خیموں یا پستانوں کو متاثر کریں اور جب پلساٹیل ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

پیروٹیدینم (Parotidinum): یہ ایک نوسوڈ ہے اور متعدی مرض کے لئے حفظ مائعہم کے

طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسے 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دو تین ہفتوں تک حفظ ماتقدم کے طور پر ہفتہ میں ایک بار دیا جاسکتا ہے۔ یہ دوا علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور اسے دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔ ایسی صورت میں دیگر ادویات کو ایک روز کے لئے روک کر صرف ایک خوراک دینی چاہئے۔

پائیلوکارپنی نم (Pilocarpinum): حفظ ماتقدم کے طور پر دی جانے والی ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا دن میں دو مرتبہ ایک ہفتہ تک دی جاسکتی ہے۔

### طاعون — (Plague)

اگنیشیا (Ignatia): حفظ ماتقدم کے طور پر اور علاج کے طور پر استعمال ہونے والی ایک شاندار دوا ہے۔ یہ دوا دردِ دل کے طور پر دینی چاہئے۔ ایک قطرے کی ایک خوراک۔

اوپرکیولینا ٹیور (Opereculina Tur): جب Lymphatic غدود بڑھ جائیں اور سخت ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ پھوڑے اور ذہل ہو جاتے ہیں۔ بخار کے ساتھ 'بے چینی' بسیار گوئی اور ہڈیاں ہوتا ہے۔

ٹیرنٹولا کیوب (Tarentula Cub): جراثیمی اور خون میں زہر پھیل جانے کی حالت میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ سوزش کی شدید ترین قسم اور درد کے ساتھ پھوڑے (ذہل وغیرہ) ہوتے ہیں۔

آر سینیکم (Arsenicum): اسہال کے ساتھ اعتماد بے کی نقاہت ہوتی ہے۔

کروتالیس ہور (Crotalus Hor): دائیں جانب کی نکالیف۔ جریان خون کا رتخان ہوتا ہے۔ مریض اپنی علامات کے اندر سو جاتا ہے۔

پائیرو جینیم (Pyrogenium): شدید بے چینی کے ساتھ عفوئی کیفیت ہوتی ہے۔ دہشت ناک قسم کا بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ خواہ اسہال کے راستے ہو، تے کے راستے ہو یا پسینے کے راستے ہو یا پھر خواہ سانس بدبودار خارج ہو۔ متاثرہ حصوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ بخار کے ساتھ 'ہڈیاں کے ساتھ اور زہر دیئے جانے کے خوف کے ساتھ۔

پیسٹینم (Pestinum Plaguinum): مرض کے دورے کے دوران اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے۔

بیلادونا (Belladonna): مرض کے ابتدائی مراحل کے دوران دی جائے جبکہ حاد قسم کا ہڈیاں

لاحق ہو۔ خشک جلن دار حرارت اور گولی گٹنے جیسے دردوں کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ چہرہ اور آنکھیں چمک دار ہوتی ہیں۔

لیکیس (Lachesis): بہت زیادہ بے چینی اور نفاہت ہوتی ہے۔ سارے جسم میں خراش دار دھن کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھیں زرد ہوتی ہیں۔

ناجا (Naja): ہندوستان میں طاعون کے لئے اس دوا کو مفید بتایا جاتا ہے۔ لیکیس کی جگہ یہی دوا دینی چاہئے۔

فاسفورس (Phosphorus): جب طاعون کے ساتھ نمونہ بھی ہو۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): مرض سے نڈھال ہو جانے کی حالت کے دوران یہ دوا دی جاتی ہے۔

### خسرے کا بخار — Scarlet Fever (Scarlatina)

بیلادونا (Belladonna): خسرے کے بخار کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ ہموار 'سرخ اور چمک دار دانے' پھنسیاں، یعنی خسرے کے دانے نکلتے ہیں۔ حلق گرم 'خشک اور سرخ ہوتا ہے۔ معدہ بہت زیادہ بھجائی ہوتا ہے۔ جس کے باعث مٹلی اور تے ہوتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ دوا حفظ مائع کے طور پر بھی عمل کرتی ہے۔

ایلن گنڈ (Ailanthus Gland): خراش دار زکام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب دانے باقاعدہ نہیں نکلتے۔ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جس سے باہر لانا مشکل ہوتا ہے۔ مرض کا فطری اظہار دب جاتا ہے۔ ارتکاز توجہ کی قابلیت نہیں رہتی۔ یادداشت کھو جاتی ہے۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ خسرے کے دب جانے کے بعد ہڈیاں لاحق ہو جاتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): جب باقاعدہ خسرے کے ساتھ گڑھے دار بھنیدوں کا بھی اضافہ ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بڑبڑاہٹ والے ہڈیاں کے ساتھ غنودگی ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔

اپیس میل (Apis Mel): یہ دوا صرف اسی وقت مفید ثابت ہوتی ہے جب گردوں کی تکالیف کے ساتھ استمقانی سوجن لاحق ہو۔ جلد بچ رنگی (دھبوں والی) سرخ اور سفید داغوں والی ہوتی ہے۔ چہرہ زرد اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔ ذنک گٹنے جیسے درد کے ساتھ گلے میں سوجن ہوتی ہے۔ پیاس کی عدم موجودگی اور گرمی سے علامات میں اضافہ جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

لیکیس (Lachesis): پہلے خون کا متاثر ہونا اور پھر بلغمی جھلی کا متاثر ہونا اس دوا میں نمایاں

علامات ہیں۔ گلے کی دلدلی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ ٹانسز میں درد ہوتا ہے۔  
 سکارلی ٹیفم (Scarlatinum): اسے عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے نیز خسرو کے  
 بخار سے قبل از وقت حفاظت کے لئے بھی استعمال کرنا چاہئے۔ 200 ڈائی لیوشن کی خوراک  
 دیجئے۔

### عفونتی بخار (خون میں زہر) (Septicaemia)

کاربو ویج (Carbo Veg): عفونتی کیفیت کے لئے حیرت انگیز دوا ہے۔ خون میں زہر پھیل  
 جانے کے لئے بھی یہ ایک حیران کن دوا ہے۔ خصوصاً عمل جراحی کے بعد اور صدمہ لگ جانے  
 کے بعد۔ جلد کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے اور جلد چرکھی ہو جاتی ہے۔

پائیروجن (Pyrogen): عفونتی بخار کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ بستر سخت محسوس ہوتا  
 ہے۔ جسم کے جن حصوں کے بل مریض لیٹتا ہے انہی میں دکھن اور خراش محسوس ہوتی ہے۔  
 بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ مسلسل حرکت کرتے رہنا پڑتا ہے۔ زبان لمبی 'پلمپی' صاف  
 ہموار جیسے کہ سرخ دار لاش کی گئی ہو ' ایسی ہو جاتی ہے۔ نبض غیر معمولی تیز ہو جاتی ہے۔ درجہ  
 حرارت ہر قسم کے تناسب سے باہر ہو جاتا ہے۔ جنین رکاوٹ کا رہتا ہے یا گل سڑ جاتا ہے۔ وضع  
 حمل کے بعد بدبودار اخراج ہوتا ہے۔ زچگی (وضع حمل کے بعد) والے بخار کے لئے مخصوص  
 دوا ہے۔ کمزوری اور تھکاوٹ (سستی وغیرہ) ہوتی ہے۔ بدبودار پسینہ آتا ہے۔ جیسے ہی بخار ہوتا  
 ہے متواتر پیشاب آتا رہتا ہے۔

امونیئم کارب (Ammonium Carb): تخمیر جراثیم کے ساتھ جانور کے کالے کے باعث  
 خون میں زہر پھیل جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کے سیلان خون کا رجحان ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Ars Alb): خون کی عفونتی کیفیت 'چھوٹے وقفوں میں تھوڑی مقدار پانی کی  
 بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ بہت زیادہ نفاہت ' بے چینی اور اذیت ہوتی ہے۔ مقامی اور عمومی  
 جلن ہوتی ہے۔ متعفن اخراج ہوتے ہیں۔

ایکی نیکیا (Echinacea): زخموں کے باعث عفونتی کیفیت پیدا ہونے میں اس دوا کے متعلق  
 سوچنا چاہئے۔ وریدیں پھول جاتی ہیں جو کہ سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہیں۔ بدن کے درجہ حرارت  
 میں بہت زیادہ تغیر ہوتا ہے جو کہ  $97^{\circ}$  سے  $105^{\circ}$  تک ہوتا ہے۔ سر اور ہاتھوں پاؤں میں مدہم  
 دکھن ہوتی ہے۔ جراثیمیت رحم سے پھیلتی ہے۔ ہیٹ پھول جاتا ہے اور حساس ہوتا ہے۔ متعفن  
 قسم کا اخراج ہوتا ہے۔

بپتیشیا (Baptisia): متعفن اخراج ہوتے ہیں۔ سارے بدن میں خدت ہوتی ہے۔ عضلات

میں دکھن ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ لاغری اور نفاہت ہوتی ہے۔  
لیکیسیس (Lachesis): انتہا درجے کی حساسیت ہوتی ہے۔ متاثرہ حصوں کا نیلا پن اور سونے  
 کے بعد علامات میں اضافہ اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ خراشیں اور چیر پھاڑ والے زخم اس دوا  
 کو آواز دیتے ہیں۔ خون میں پیپ، گنگرین اور گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں۔ کم مقدار میں  
 متعفن اخراج ہوتے ہیں۔

آرنیکا (Arnica): خراشوں کے باعث عفونی کیفیت کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ ٹائیفائیڈ  
 کا رجحان ہوتا ہے۔ ڈھیلے پاخانے ہوتے ہیں۔ گندی بدبو آتی ہے۔ ذہنی بے چینی ہوتی ہے۔  
رشاکس (Rhus Tox): عمل جراحی کے کیسوں کے لئے یہ ایک بہترین احتیاطی دوا ہے۔ یہ  
 ازتالیس گھنٹوں تک 30 ڈائی لیوش میں ہر تین گھنٹے کے بعد دینی چاہئے۔ یہ عفونت کو روک  
 دے گی۔ کنٹریاوی تکلیفات کے ساتھ خون کی عفونی سمیت والے کیسوں میں موزوں دوا ہے۔  
 جراثیمیت والے حصے میں سرخی ہوتی ہے اور دکھن دسوزش ہوتی ہے۔ جاڑا ہوتا ہے۔ زبان  
 خشک ہوتی ہے۔ اسال ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔

انتھراکسیس نم (Anthraxinum): عفونی سوزش اور ٹاسوری کیفیت ہوتی ہے۔ خون میں  
 پیپ ہوتی ہے۔ گنگرین والے گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں۔ تحلیل ہونے میں تیزی ہوتی  
 ہے۔ جلن دار درد آرسنک کی نسبت زیادہ شدید ہوتا ہے۔

### چھچک — (Small Pox)

ویریولیئم (Variolinum): یہ دوا علاج کے لئے بھی اتنی ہی شاندار ہوتی ہے جتنی کہ حفظ  
 ماتقدم کے لئے۔ علاج کے آغاز میں اس دوا کی ایک خوراک دینی چاہئے۔ اس کے چوبیس گھنٹے  
 کے بعد دیگر ادویات سے عمومی علاج شروع کرنا چاہئے۔ حفظ ماتقدم کے طور پر یہ دوا 200 ڈائی  
 لیوشن میں ہفتے میں ایک بار دینی چاہئے۔ اسے کبھی 200 طاقت سے کم نہیں دینا چاہئے۔ چھچک  
 کے بعد یہ دوا چہرے کی بد صورتی کا علاج کرتی ہے۔ دیگر نشاندہی کی گئی ادویات کے ساتھ اس  
 دوا کی تین چار خوراکیں اس طرح سے دی جائیں کہ ہر ہفتے 200 طاقت کی ایک خوراک دی  
 جائے۔ جس روز ویریولیئم دی جائے۔ اس روز کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

برائی اونیا (Byonia): اونچے درجے کے بخار اور بہت زیادہ پیاس کے ساتھ یہ دوا مرض کے  
 پہلے مرحلے کی ہے۔ پھنسیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تمام علامات حرکت سے اتر ہوتی ہیں۔  
انتیم ٹارٹ (Antim Tart): کہا جاتا ہے کہ یہ دوا مرض کے پورے دورانیے کو کم کر دیتی  
 ہے۔ عمومی طور پر یہ دوا دوسرے مرحلے میں دی جاتی ہے جبکہ پھوڑے بن چکے ہوں۔



**تھوجا (Thuja):** پھنسیوں والے مرحلے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ سیاہ سوزشی علاقہ پر دودھیا ہموار پردرد اور بدبودار پھنسیاں ہوتی ہیں۔ سائیکوٹک مریضوں میں خصوصاً موزوں دوا ہے۔  
**ساراسینیا (Sarracenia):** چیچک کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ اسے کسی بھی مرحلہ میں دیا جاسکتا ہے۔ یہ نہ صرف مرض کے دورانیہ کو کم کرتی ہے بلکہ چیچک کے داغوں کو بھی روک دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوا جتنی زیادہ چیچک کے علاج کے لئے کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ اتنی ہی زیادہ حفظ باققدم کے طور پر بھی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔

**وریرٹرم ویر (Veratrum Ver):** نبض بھرپور ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے۔ درد سر ہوتا ہے جو کہ سر کے پچھلے حصہ میں ابتر ہوتا ہے۔ پسینے کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سرگرم ہوتا ہے اور ہاتھ و پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

**میلینڈرینم (Maladrinum):** چیچک کے لئے یہ ایک اور حفاظتی دوا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ جلد کھردری رہتی ہے۔ غیر صحت مند اور خشک ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے اگر حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ یہ دوا دی جائے تو حفاظتی ٹیکے اثر نہیں کریں گے۔

**مرکیوریس (Mercurius):** جب غدد خصوصاً کان کے نیچے والے غدد ملوث ہوں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ تھوک باافراط آتا ہے اور سبزی مائل باغی پاخانے آتے ہیں۔ یہ اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ یہ دوا بھی چیچک کے داغوں کو روک دے گی۔

**کیوپرم ایٹشک (Cuprum Acet):** تیز نبض کے ساتھ چیچک ہوتی ہے۔ چھاتی میں اینٹھن والے گتھی دورے ہوتے ہیں۔ شخص میں دقت ہوتی ہے 'نقاہت ہوتی ہے' بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ اور سوجا ہوا ہوتا ہے۔ ہڈیاں ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ پھنسیاں مختلف جسامت کے دھبوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔

**بیلادونا (Belladonna):** ٹیکن والا درد سر ہوتا ہے۔ چہرہ ارغوانی ہو جاتا ہے۔ خلق خشک ہوتا ہے۔ نبض بھرپور اچھلتی ہوئی ہوتی ہے۔ بچہ سر پکڑنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کپڑے کے ساتھ کس کر باندھ دیا جائے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** جب چیچک نمودیہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے یا نمایاں جریان خون لاحق ہو یا یہ دونوں امراض چیچک کے ساتھ مخلوط ہوں۔ پیچھے پھڑوں سے چمک دار سرخ خون آتا ہے۔ جو اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے غشی اور شدید تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے داغوں سے خون بہتا ہے۔

**ہیمامیلس (Hamamelis):** جریان خون والا چیچک جس کے ساتھ کمرے رنگ کا خون رستا

ہے۔ مسوڑھوں سے 'ٹاک سے' امعاء مستقیم سے اور اعضائے کاسل سے خون جاری ہوتا ہے۔  
 ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): آنتوں سے جریان خون ہوتا ہے اور ٹاک سے شدید قسم کا سیلان خون ہوتا ہے۔ خون چمک دار اور سرگرم ہوتا ہے۔  
 میورٹیک ایسڈ (Muriatic Acid): مرض کے آخری مرحلہ میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ ہیمنٹ بے انتہا آتا ہے اور مریض ڈوبنے والی 'تھکان والی اور دھڑن تختہ ہو جانے والی حالت میں ہوتا ہے۔ خون کی بد نظمی کے نتیجہ میں مریض اپنے افعال پر قابو کھو دیتا ہے۔  
 ٹیکسیس 'کرونیلس (Crotalus, Lachesis): متعفن قسم کے امراض کے لئے موزوں ترین دوا میں ہیں۔ ایسے امراض میں عمومی تھکان بے ہوشی اور خون کی بد نظمی پائی جاتی ہے۔  
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): یہ دوا مرض سے متاثرہ غدود یا پھوڑوں کی پیپ تیزی کے ساتھ بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

### لو لگنا (Sunstroke)

گلوٹائین (Glonoine): لو لگ جانے کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ اسے عملہ ہونے پر فوری دے دینا چاہئے۔ بخوک نہیں رہتی۔ آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں۔ شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔ جڑے سختی سے بھینچ جاتے ہیں۔  
 بیلاڈونا (Belladonna): چہرے میں خون بھر جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھی خون اتر آتا ہے اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ ٹیکن والا درد سر ہوتا ہے۔  
 اوپیم (Opium): تنفس میں دقت ہوتی ہے یا تنفس رک جاتا ہے۔ چہرہ پھول جاتا ہے۔  
 ٹیکسیس 'اناکارڈیم (Anacardium, Lachesis): یادداشت کھو جاتی ہے۔

### تپ دق (Tuberculosis)

(دیکھئے "چھاتی" کے ذیل میں "تپ دق")

### ٹائیفائیڈ (Typhoid)

آرسنک البم (Ars Alb): ٹائیفائیڈ بخار میں اس دوا کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر چکا ہوں۔ تین قطروں کی خوراکیں ہر دو گھنٹے کے بعد دی جاتی ہیں۔۔۔ روزانہ چھ خوراکیں۔ اگر بدن کا درجہ حرارت کم نہ ہو تو سلفر 200 دیجئے۔۔۔ ایک خوراک خالی معدہ دی جائے اور اس

دن کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ پھر دوبارہ آرسنک 30 اگلے روز سے شروع کر دی جائے۔ اگر آئندہ چار روز کے دوران کوئی بہتری دکھائی نہ دے تو سورینم 200 صبح سویرے دی جائے۔۔۔ تیسرا دن۔ اس روز کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ پھر آرسنک 30 اگلے روز سے دوبارہ شروع کر دی جائے۔ اگر یہ بھی اگلے چار روز کے دوران ناکام ہو جائے تو ٹیوبرکولینم 200 یا 1000 صبح سویرے تیسرا دن سلفریا سورینم کی طرح سے دی جائے۔ دو دن انتظار کیجئے اور پھر دوبارہ آرسنک 30 سے شروع کیجئے۔ آرسنک الیم کی عام علامات یوں ہیں۔۔۔ بے چینی ہوتی ہیں، پھوٹے وقفوں کے ساتھ کم مقدار پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ تھابت ہوتی ہے۔ اختہار بے کی سرخ زبان اسہال کے ساتھ ہوتی ہے۔ منہ میں سوزشی دکھن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خشک چھلکے ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا صرف اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب ٹائیفائیڈ نمونیہ کے ساتھ مخلوط ہو چکا ہو۔ اتفاقاً شروع ہو جانے کے بعد یہ دوا اسہال میں بھی قابل قدر ہوتی ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): دماغ کا فالج ہوتا ہے۔ نچلے درجے کا ہڈیان ہوتا ہے۔ عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے۔ نچلا جڑا کر جاتا ہے اور ہلاا راہہ پاخانے خارج ہوتے ہیں۔ ہیپیشیا (Baptisia): جب ٹائیفائیڈ کے ساتھ اسہال بھی لاحق ہوں تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پاخانے کھنی بو والے ہوتے ہیں اور ایسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جس سے مریض کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اچانک تھابت طاری ہو جاتی ہے۔ مریض یک سو (لاپرواہ) ہو جاتا ہے۔ نیز ذہنی کابلی ہوتی ہے۔ یہ دوا مرض کے دورانیہ کو مختصر کر دیتی ہے۔ بشرطیکہ ابتدائی مرحلہ میں دی جائے۔ غیر معمولی طور پر تیز اور اچانک لاحق ہونے والے والا ٹائیفائیڈ۔

جلسیم (Gelsemium): یہ دوا ٹائیفائیڈ کے ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے۔ پیاس نہیں ہوتی لیکن درد سر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مریض خاموش، یک سو اور غیر جذباتی ہوتا ہے۔ آنکھوں کے پوٹے گرے رہتے ہیں، کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ جاڑا لگتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔ حرکت سے خوف کھاتا ہے۔ تھابت ہوتی ہے۔

آرم ٹریپ (Arum Trip): یہ ایک اہم دوا ہے۔ جس کے متعلق اس وقت سوچنا چاہئے۔ جب مریض ناک، ہونٹوں یا انگلیوں کے ناشوں کو کاٹتا یا رگڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ان سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ اس دوا کی ایک اہم علامت ہے اور اکثر ٹائیفائیڈ کے کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ لشیس (Lachesis): اس میں ہیپیشیا کی مشابہہ علامات پائی جاتی ہیں۔ سوائے اس کے کہ ٹیکسیس کا مریض سونے کے بعد ابتر ہو جاتا ہے اور اس میں سیاہ خون کے جریان کا رجحان ہوتا

ہے۔ وہ گردن اور کمر کو چھونے سے خاص طور پر حساس ہوتا ہے۔ قوت گویائی جاتی رہتی ہے۔ دماغ کے فالج کی نشانیاں پائی جاتی ہیں یعنی نچلے جڑے کا گر جانا۔ بدبودار اخراج، ہلکی بڑبڑاہٹ کا ہڈیاں، خشک کپکپاتی زبان۔

ایسڈ میورٹک (Acid Muriatic): آنتوں کے جریان خون میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ متعفن بو والا ہوتا ہے۔ انتہا درجے کی نقاہت ہوتی ہے۔ بے ہوشی کے ساتھ متواتر پانخانے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جڑا نیچے لٹک جاتا ہے۔ حقیقت میں مریض قبر کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے اور منہ میں لڑکھڑاتی ہے۔ نبض وقفہ دار ہوتی ہے۔

سفی لینم (Syphilinum): ٹائیفائیڈ بخار کے بعد جب مریض بہت آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا ہو جو کہ آتشک کے باعث ہو سکتا ہے۔ سفی لینم اونچی طاقتوں میں مثلاً 200 یا 1000 کی طاقت میں آزمائی جاسکتی ہے۔

ابیسینٹیم (Abisinthium): ٹائیفائیڈ میں بے خوابی لاحق ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بنیاد میں خون کا اجتماع ہوتا ہے۔

اوپیم (Opium): فالجی حالت ہوتی ہے۔ گہرا سرخ چہرہ اور خراٹے دار سانس ہوتا ہے۔ کلکیر یا کارب، بیلادونا (Belladonna, Calcarea Carb): آنکھیں بند کرنے پر مریض چیزیں اور اشخاص دیکھتا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ٹائیفائیڈ بخار کے بعد نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ کیسٹوریم (Castoreum): ٹائیفائیڈ کے بعد خصوصاً عورتوں میں۔ کمزوری اور تھکاوٹ کے ساتھ چیز چڑا پن ہوتا ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): بے ہوشی کے ساتھ ٹائیفائیڈ بخار ہوتا ہے۔ نبض کھو جاتی ہے۔ پیشاب دب جاتا ہے۔ پیٹ ذہول کی طرح پھول جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ کئی کئی روز تک مریض فرش پر لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے اور اعصابی اشتعال انگیزی یا جوش ہوتا ہے۔ 200 طاقت ذاتی لیوشن کی صورت میں یہ دوا ہر بارہ گھنٹے کے بعد دیتے۔ یہاں تک کہ بہتری کا آغاز ہو جائے۔

سٹرامونیم (Stramonium): منہ سے خون رسنے کے ساتھ ٹائیفائیڈ بخار لاحق ہوتا ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے اور سوجی ہوتی ہے۔ جس سے منہ بھر جاتا ہے۔ زبان سرخ اور پھلپھلہ شدہ ہوتی ہے۔ سرخ ایسی جیسے کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو۔


ٹریبنتھینا (Terebenthina): ہموار چمکتی ہوئی سرخ زبان ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پیٹ

بے انتہا پھولا ہوتا ہے۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): قورنج کے ساتھ اسہال کی تکالیف کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): خشک بھوری زبان ہوتی ہے۔ دانتوں پر خشک چھلکے ہوتے ہیں۔ ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ ہریان ہوتا ہے گندے اور بدبودار اخراج ہوتے ہیں۔

ویکیسی نم مرٹلس (Vaccinum Myrtillus): زرد رنگ کے ڈھیلے پاخانے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پیاس اور جاڑا ہوتا ہے۔



## باب پانزدہم

### متفرقات

(Miscellaneous)

اضافہ (علامات میں) — (Aggravation)

اینٹیم کروڈ (Antim Crud): شام کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ تیزابوں سے 'گری سے' شراب سے 'پانی سے' نہانے اور دھونے سے اتھری ہوتی ہے۔

سیپیا (Sepia): قبل از دوپہر اور رات کے وقت دھونے سے 'گیلا ہونے سے' یا نمی سے اتھری ہوتی ہے۔ دائیں جانب اتھری ہوتی ہے۔ پسینے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے اور گرج چمک والے طوفان سے پہلے اتھری ہوتی ہے۔ تسلی دلاس دینے سے اور آنکھیں بند کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

نکس و امیکا (Nux Vom): صبح کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ ذہنی اشتعال انگیزی سے 'ذہنی تھکاوٹ سے' اتھری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 'چھونے سے' شور سے 'مصالحوں سے' بیجان خیزی سے اتھری ہوتی ہے۔ غشی اشیاء سے 'خشک موسم سے' اتھری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں 'سردی سے' ٹھنڈی بیڑھیوں پر بیٹھنے سے 'سگریٹ نوشی سے' اتھری ہوتی ہے۔ بستر میں پہلو بدلنے سے 'آزمودہ ادویات سے' نیز دیگر ادویات سے اتھری ہوتی ہے۔ خوشبودار اشیاء سے 'کڑوی نباتاتی کولیوں سے' سستی کی عادت سے اتھری ہوتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): مرطوب موسم میں سردی کے وقت اور آدھی رات کو یا آدھی رات کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے سے 'ٹھنڈے مشروبات یا ٹھنڈی غذا سے' اتھری ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر 'اندھیرے میں' پھلوں سے 'چھینکوں سے' اتھری ہوتی ہے۔

برائی اونیہ (Bryonia): حرکت سے 'حرارت سے' صبح کے وقت کھانے سے 'گرم موسم میں' اتھری ہوتی ہے۔ تھکاوٹ سے 'چھونے سے' بٹنے سے 'بخیر درد والی جانب لیٹنے سے' اتھری ہوتی ہے۔

چائنا (China): معمولی چھونے سے اتھری ہوتی ہے۔ ہوا کے جھونکے سے اتھری ہوتی ہے۔ ہر

دوسرے روز ابتری ہوتی ہے۔ سیلان خون سے اور اسہال وغیرہ سے رطوبات زندگی ضائع ہوتی ہیں۔ رات کے وقت 'پھل کھانے کے بعد' شور سے ابتری ہوتی ہے۔ ہوا چلنے پر ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت اور بغیر درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

کیو میلا (Chamomilla): گرمی سے 'غصے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں ابتری ہوتی ہے۔ ہوا چلنے پر ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت اور بغیر درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

سکس کین (Cistus Can): ٹھنڈی ہوا میں بغیر کپڑا لئے تھوڑا سا نکلنے پر ابتری ہو جاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ اور جوش سے ابتری ہوتی ہے۔

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): رات کے وقت یا آدمی رات سے پہلے ابتری ہوتی ہے۔ نمی سے مرطوب موسم سے 'دائیں جانب لیٹنے سے' 'پینے سے' گرم کمرے سے اور گرم بستر سے ابتری ہوتی ہے۔ درجہ حرارت انسانی بلند اور انسانی کم ہونے سے ابتری ہوتی ہے۔ گرمی اور سردی دونوں سے ابتری ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے سے 'خشکی سے' صاف اور عمدہ موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے اور گاڑی کی حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): مجامعت کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں 'بخنی اور کافی سے ابتری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت تقریباً تین بجے ابتری ہوتی ہے۔ بائیں جانب لیٹنے سے اور درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

سورینم (Psorinum): کافی سے ابتری ہوتی ہے۔ جس سے پرہیز کرنا چاہئے جبکہ یہ دوا دی جائے۔ موسم کے بدلنے سے 'گرم دھوپ میں اور ٹھنڈے ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے معمولی جھونکے سے خوف آتا ہے۔

سلیشیا (Silicea): نئے چاند کے وقت یا پورے چاند کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت 'صوتے سے' حیض کے دوران 'کپڑے اتارنے پر' 'نیچے لیٹنے پر' نمی سے 'بائیں جانب لیٹنے سے' 'ہنڈ سے' دلجوئی سے ابتری ہوتی ہے۔

زینک میٹ (Zincum Met): شراب پینے سے تمام تر تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شراب مریض پر نشہ طاری کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ تھوڑی سی مقدار میں پینے پر بھی نشہ ہو جاتا ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): بہت زیادہ بلائے جانے پر تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ رطوبات زندگی ضائع ہو جانے سے 'جنسی بے اعتدالیوں سے' تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

فسفورس (Phosphorus): چھوٹے سے 'جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ سے' بہت زیادہ روشنی

سے 'گرم غذا یا گرم مشروبات سے' موسم کی تبدیلی سے 'گرم موسم میں گھٹا ہو جانے سے' شام کے وقت 'بائیں کروٹ لیٹنے سے یا درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہو جاتی ہے۔ کمرچ چمک والے طوفان کے دوران اور بیڑھیاں چڑھنے پر علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**لائی سین (Lyssin):** چلتے پانی کو دیکھنے سے یا اس کی آواز سننے سے یا پانی انڈیلنے سے یا حتیٰ کہ مائعات کے متعلق سوچنے سے ابتری ہوتی ہے۔ چندھیا دینے والی روشنی سے یا منعکس ہونے والی روشنی سے 'سورج کی گرمی سے' جھکنے سے ابتری ہو جاتی ہے۔

**سٹرامونیم (Stramonium):** اندھیرے کمرے میں جب کہ اکیلا ہو ابتری ہو جاتی ہے۔ چمک دار یا روشن اشیاء کو دیکھنے سے 'سونے کے بعد اور نکلنے پر ابتری ہوتی ہے۔

**کونیئم (Conium):** نیچے لیٹنے سے 'بستر میں کروٹیں بدلنے سے' تجرد (غیر شادی شدہ) والی زندگی سے 'حیض سے پہلے اور حیض کے دوران' ٹھنڈ لگ جانے سے 'جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔

**سلفر (Sulphur):** آرام سے ابتری ہوتی ہے اور جب مریض کھڑا ہو تب ابتری ہوتی ہے۔ بستر کی گرمی سے 'دھونے سے' نہانے سے 'صبح کے وقت گیارہ بجے ابتری ہوتی ہے۔

**نیٹرم میور (Natrium Mur):** شور سے 'موسیقی سے' گرم کمرے سے 'نیچے لیٹنے سے' تقریباً دن کے دس بجے 'سائل سمندر پر' ذہنی تھکان سے 'ہمدردی سے' گرمی سے 'گھنگلو سے ابتری ہوتی ہے۔

**لیکیسیس (Lachesis):** سونے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ مریض مرض میں اضافہ کے اندر ہی سو جاتا ہے۔ سونے کے دوران لائق ہونے والی تکلیفات میں بائیں جانب اور پھر دائیں جانب ابتری ہوتی ہے۔ موسم بہار میں 'گرم غسل سے' گرم مشروبات سے 'آنکھیں بند کرنے سے' تنگ کپڑے پہننے سے ابتری ہوتی ہے۔ حیض کے شروع ہونے پر اور حیض کے اختتام پر ابتری ہوتی ہے۔

**ڈلکامارا (Dulcamara):** رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ عام طور پر سردی سے ابتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم بردسات میں ابتری ہوتی ہے۔

**ارائیا ڈیاڈ (Aranea Diad):** مرطوب موسم میں 'سہ پہر کے آخری حصہ میں اور آدھی رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

**نیٹرم سلف (Natrium Sulph):** موسیقی سے ابتری ہوتی ہے۔ جو مریض کو اداس کر دیتی ہے۔ بائیں جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں یا مرطوب - خانہ سے ابتری ہوتی ہے۔ طوفان سے ابتری ہوتی ہے۔



**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** گرمی سے، پیسٹری کی طرح کی بھاری مرغن غذا کھانے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد، شام ہوتے ہوتے، گرم کمرے میں، بائیں کروت لیٹنے سے یا بغیر درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ جب پاؤں نیچے اٹکا دیئے جائیں تو ابتری ہوتی ہے۔ مٹکون مزاج، مسلسل تبدیل ہونے والا۔ حیض سے پہلے اور حیض کے دوران۔

**لیڈم پی (Ladium P):** رات کے وقت اور استری گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔ اوپر کی جانب حرکت کرنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**سنی کیولا (Sanicula):** نیچے کو حرکت کرنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**امبرا گریشیا (Ambra Grisea):** دوسرے لوگوں کی موجودگی اور گفتگو سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسیقی سننے سے اضافہ ہوتا ہے۔

**لائیکو پوڈیم (Lycopodium):** دائیں جانب ابتری ہوتی ہے۔ دائیں سے بائیں جانب ابتری ہوتی ہے۔ اوپر سے نیچے کی جانب ابتری ہوتی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے ابتری ہوتی ہے۔ سوائے حلق اور معدہ کے جن میں گرم مشروبات سے ابتری ہوتی ہے۔ دفتر سے جذبات کو ٹھیس پہنچنے پر ابتری ہوتی ہے۔

**الیومینا (Alumina):** نمک، شراب، سرکہ، مرچ اور نشہ آور مشروبات کے پینے سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوروں کی صورت میں ابتری ہوتی ہے۔ سر پہرے کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ آلوؤں سے ابتری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت چمچل قدمی سے ابتری ہوتی ہے۔ گرم کمرے سے ابتری ہوتی ہے۔

**لیک کینیم (Lac Can):** ایک روز صبح کے وقت اور ایک روز شام کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ مٹکون مزاج، جگہ بدلنے والا اور مسلسل تبدیل کرنے والا۔

**کروکس سیٹ (Crocus Sat):** نیچے لیٹنے سے، گرم موسم سے، گرم کمرے سے، صبح کے وقت، روزہ رکھنے سے، ناشتہ کرنے سے پہلے اور ایک ہی چیز کو متواتر دیکھتے رہنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** چھوٹے سے، ملنے سے، شور سے، ہوا کے جھوٹے سے، سر پہرے کے وقت، نیچے لیٹنے سے اور بال کانٹے سے ابتری ہوتی ہے۔

**ہیپیر سلف (Hepar Sul):** خشک سرد ہواؤں سے اور ٹھنڈی ہوا سے ابتری ہوتی ہے۔ معمولی جھوٹے سے، پارے سے اور چھوٹے سے ابتری ہوتی ہے۔ درد والے پہلو پر لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**سٹیفیسیا (Staphisagria):** غصے سے، جذبات کے مجروح ہو جانے سے، غم سے، جذبات

کو نہیں لگ جانے سے 'رطوبات کے ضائع ہو جانے سے' 'حلق سے' 'جنسی ہے' اعتدالیوں سے اور تمباکو نوشی سے ابتری ہوتی ہے۔ متاثرہ حصوں کو ہلکا سا چھونے سے 'دوسروں کے غلط افعال کی وجہ سے ابتری ہوتی ہے۔

کاربو ووج (Carbo Veg): شام کے وقت 'رات کے وقت اور کھلی ہوا میں 'سردی سے ابتری ہوتی ہے۔ مرغن غذا سے 'کھسن سے' 'پیشہری سے' 'کافی سے اور دودھ سے ابتری ہوتی ہے۔ گرم مرطوب موسم سے 'پیشاب سے ابتری ہوتی ہے۔

کولو سنٹس (Colocynthis): فیسے سے اور جذبات کے مجروح ہو جانے سے ابتری ہوتی ہے۔

بوریکس (Borax): نیچے کی جانب حرکت کرنے سے ابتری ہوتی ہے۔ شور سے ابتری ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے 'گرم موسم سے' 'حیض کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

انیشیا (Ignatia): بری خبروں کے سننے سے 'صبح کے وقت' 'کھلی ہوا میں' 'کھانا کھانے کے بعد' 'کافی سے' 'سگریٹ نوشی سے' 'مائعات سے' 'بیرونی گرمی سے اور شور سے ابتری ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum): سورج غروب ہونے سے 'سورج طلوع ہونے تک ابتری ہوتی ہے۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ نیند کھو جانے سے ابتری ہوتی ہے۔ غذا کی بوسے سے ابتری ہوتی ہے۔

صبح کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ ذہنی تھکان سے ابتری ہوتی ہے۔ شور سے ابتری ہوتی ہے۔

کوکولس (Cocculus): کھانا کھانے کے بعد 'نیند اچٹ جانے کے بعد' 'کھلی ہوا میں' 'سگریٹ نوشی سے' 'گھڑسواری سے' 'جراکی سے' 'چھونے سے' 'شور سے اور بٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

پہر کے وقت 'حیض کے دوران ابتری ہوتی ہے۔ جذباتی غلط اندازی سے ابتری ہوتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): داڑھی مونڈنے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ حیوانی رطوبت کے ضائع ہونے سے ابتری ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): رات کے وقت 'دوران نیند' مرطوب برساتی موسم میں اور بارش کے بعد 'آرام کرنے کے دوران' جب کمر کے بل لیٹا جائے یا دائیں کروٹ لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): آندھی کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ خراب موسم میں تمام علامات دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت اور صبح ہوتے ہوتے ابتری ہوتی ہے۔

کوکا (Coca): بلند جگہ پر چڑھنے سے ابتری ہوتی ہے۔

کلکیر یا فاس (Calcarea Phos): مرطوب سرد موسم میں 'کپڑے اتارنے سے' 'برف کے پگھلنے پر ابتری ہوتی ہے۔

**فیرم میٹ (Ferrum Met):** آرام کرنے کے دوران مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ خفقان، تنگی اور کمزوری میں آرام کرنے سے ابتری ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے لیکن ذرا سی تھکان سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**مگنیشیا میور (Magnesia Mur):** سونے کے لئے آنکھیں بند کرنے پر ابتری ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کرنے پر مریض بہت زیادہ پریشان، بے چین اور چلبلا ہو جاتا ہے چنانچہ وہ ضرور کبیل یا چادر وغیرہ جو کچھ اوڑھا ہوتا ہے، اتار پھینکتا ہے۔ ایک لمبا سانس لیتا ہے یا کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ نمکین چیزوں سے اور سمندر کی ہوا میں سانس لینے سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

**مگنیشیا فاس (Magnesia Phos):** دائیں کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈے سے، رات کے وقت پھوٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**جیلی میم (Gesemium):** مرطوب موسم سے، طوفان باد و باران کے آنے سے پہلے، جذبات سے، جوش سے، بری خبروں سے، تباہ کنوشی سے اور جب مریض اپنی بیماری کے متعلق سوچے تو ابتری ہوتی ہے۔

**ڈائی سکوریا (Dioscorea):** شام کے وقت اور رات کے وقت، نیچے لیٹنے سے اور جھک کر دہرا ہونے سے ابتری ہوتی ہے۔

**برومیم (Bromium):** شام سے آدھی رات تک ابتری ہوتی ہے۔ جب گرم کمرے میں بیٹھے تو ابتری ہوتی ہے۔ گرم مرطوب موسم میں، جب آرام کر رہا ہو اور بائیں کروٹ لیٹا ہو تو ابتری ہوتی ہے۔

**سائیکلے من (Cyclamen):** کھلی ہوا میں، شام کے وقت، بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، ٹھنڈے پانی سے ابتری ہوتی ہے۔

**اناکارڈیم (Anacardium):** گرم پانی پینے سے یا لگنے سے ابتری ہوتی ہے۔

**کیوپرم میٹ (Cuprum Met):** حیض سے پہلے ابتری ہوتی ہے۔ قے سے اور لمس سے ابتری ہوتی ہے۔

**ایپس مل (Apis Mel):** گرمی کی کسی بھی قسم سے ابتری ہو جاتی ہے۔ پھوٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ دباؤ سے ابتری ہوتی ہے۔ سہ پہر کے آخری حصہ میں ابتری ہوتی ہے۔ سونے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ تنگ اور گرم کمرے میں ابتری ہوتی ہے۔

**ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit):** حدت کی ہر قسم کے باعث ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی غذا سے ابتری ہوتی ہے۔ منھائیوں سے ابتری ہوتی ہے۔ کھانے

کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ حیض کے زمانے میں ابتری ہوتی ہے۔ جذباتیت سے ابتری ہوتی ہے۔  
یا میں جانب ابتری ہوتی ہے۔

## ہوائی سفر کی تکلیفات — (Air-Sickness)

(دیکھئے "سمندری سفر کی تکلیفات")

## الرجی — (Allergy)

الرجی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں مریض پر کسی چیز کا غیر معمولی یا مبالغہ آمیز مخصوص اثر مرتب ہوتا ہے حالانکہ وہ چیز لوگوں کی اکثریت کے لئے انہی حالات اور اسی مقدار میں غیر نقصان دہ ہوتی ہے مثلاً مچھلی، بیری (رس بھری وغیرہ)، انڈے، سفید روٹی یا دیگر بہت سی غذائیں درج ذیل قسم کی علامات پیدا کر دیتی ہیں مثلاً چھپاکی، متلی، تے، درد، جلاب، درد شقیقہ، دمہ اور کئی دیگر بہت سے مزاہوں کی علامات۔ بعض ادویات جنہیں لوگوں کی اکثریت برداشت کر لیتی ہے۔ ایسے اشخاص میں الرجی کی علامات پیدا کر دیتی ہیں۔ (حتی کہ زہریلے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں) جو کہ مخصوص قسم کی غذا یا دوا سے حساس ہوتے ہیں۔

ٹیوبرکولینم، سلفر (Sulphur, Tuberculinum): یہ ادویات دودھ، دودھ سے بنی ہوئی چیزوں، انڈوں، سارڈائن، مچھلی، جانوروں کی پکی ہوئی غذا اور بالوں کے رنگنے وغیرہ سے لاحق ہونے والی الرجی کے لئے چوٹی کی ادویات ہیں۔ سب سے پہلے ٹیوبرکولینم 200 ڈائی یوشن کی صورت میں دینی چاہئے اگر ہر ہفتے دو خوراکیں دینے پر بہتری کی صورت پیدا نہ ہو تو سلفر 200 کی ایک خوراک ہر ہفتے دی جائے۔ اگر اس طاقت سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اسے بڑھا کر 1000 کیا جاسکتا ہے اور ہر چندہ دن میں ایک دو خوراکیں دینی چاہئیں۔ (نیچے دی گئی سلفر کی علامات بھی دیکھئے۔)

تھائی رائیڈین (Thyroidin): الرجی والی سوزش کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ اس سوزش میں بے انتہا جھینکیں آتی ہیں اور ناک کی بلنتی تھلی میں استسقاءی سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ غیر کسی ظاہری وجہ کے ضیق النفسی ہوتی ہے۔ یہ دوا شدید قسم کی ضیق النفسی کے ساتھ الرجی آلے دے میں بھی دی جاتی ہے۔ چھپاکی ہوتی ہے۔ اگر نیمالاحق ہوتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ درد مر ہوتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور اعصابی درد وغیرہ اور یہ سب کچھ الرجی کے باعث ہوتا ہے۔

پسورینم (Psorinum): گندم کی الرجی جس کے باعث اگر نیمالاحق ہوتا ہے۔ یہ ٹیوبرکولینم کی زمین دوا ہے اور اس جگہ دینی چاہئے۔ جہاں ٹیوبرکولینم ناکام ہو جائے یا صرف جزوی طور پر

مدد دے۔ اسے سلفر کے ٹاکام ہو جانے پر بھی دینا چاہئے۔

اپیم گریو (Apium Grav): ایک خاص قسم کی اجوائن کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ جس کے باعث خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ 200 یا 1000 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہفتے کے بعد یا پندرہ دن کے بعد یہ دوا دی جائے۔

فریگریا وسکا (Fragaria Vasca): رس بھری کی الرجی 'جو چھپاکی کو پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات سانس میں بھی دقت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ چھاتی پر وزن رکھا ہوا ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): مچھلی کے تیل کی الرجی 'چکنائی اور سنگترے کے رس کی الرجی 'مریض پر دہین پر مشتمل غذا سے حساس ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں تیل یا چکنائی سے صفرا پیدا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کھانے کا رجحان ہوتا ہے اور مریض آسانی سے تھک جاتا ہے۔

تھوجا (Thuja): پیاز کی الرجی جو کہ مریض کے لئے زہری کی حیثیت رکھتا ہے۔  
لائکوپوڈیم (Lycopodium): کستورا مچھلی کی الرجی 'کستورا مچھلی کا استعمال مریض کے لئے زہری کی حیثیت رکھتا ہے۔

سیکارم آف (Saccharum Off): شکر یا مٹے سے الرجی ہوتی ہے۔  
رٹیکا یورینس (Urtica Urens): دودھ سے الرجی ہوتی ہے۔ جس کے باعث چھپاکی نکل آتی ہے۔

نیٹرم یور (Natrium Mut): انڈوں 'نشاستے' دودھ 'شہد' 'ریگ بیج' کے دانے 'پیاز' 'مکندم' جانوروں کی غذا وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): انڈوں سے الرجی ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): پروں سے اور چاکلیٹ سے الرجی ہوتی ہے۔ ایک مریض کے چپ کاٹی کا علاج پروں والے نکیے کے علاج سے کیا گیا۔ مریض بالوں کے رنگنے سے حساس ہوتا ہے جو کہ اگر بڑھا پیدا کر دیتا ہے۔ جانوروں کی پکی ہوئی غذا سے الرجی ہوتی ہے۔ بالوں کے رنگنے سے پیدا ہونے والی تکالیف کے لئے جب سلفر ٹاکام ہو جائے تو فیور کو لینم 200 دینی چاہئے۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum): الرجی کے تمام امراض کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جن کا تعلق جلد سے 'ہاضمی بھلیوں سے اور دیگر حصوں اور اعضاء سے خصوصاً کچھ بھڑوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

کمی (علامات میں) — (Amelioration)

نکس وامیکا (Nux Vom): نیند سے بہتری ہوتی ہے اگر نیند کو پورا ہونے دیا جائے۔ شام

کے وقت سونے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔ آرام کرنے سے 'مرطوب تر موسم میں' بہت زیادہ دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): حرارت سے بہتری ہوتی ہے۔ سر اوپر اٹھانے سے بہتری ہوتی ہے۔ گرم مشروبات پینے سے 'پینے سے' کمر کے بل لینے سے جبکہ کندھے اٹھائے ہوئے ہوں۔ بہتری ہوتی ہے۔

مینگانم (Manganum): نیچے لینے سے تمام علامات میں بہتری ہوتی ہے۔ لینے سے مریض کے درد 'خوف' پریشانی اور بے چینی غائب ہو جاتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): درد والے پہلو پر لینے سے 'دباؤ سے' آرام سے 'ٹھنڈی چیزوں سے' بہتری ہوتی ہے۔

چائنا (China): جبکہ کردہرا ہونے سے 'سخت دباؤ سے' کھلی ہوا سے 'گرمی سے' علامات میں کمی ہوتی ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): اٹھا کر لے جائے جانے سے 'گرم مرطوب موسم میں' پینے سے علامات میں کمی ہوتی ہے۔

سکس ٹس کین (Cistus Can): کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔  
کاسٹیکم (Causticum): نمی سے 'مرطوب موسم میں' بہتری ہوتی ہے۔ گرمی سے 'بہتری گرمی سے' نہانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): گرم موسم میں گو نمدار ہو بہتری ہوتی ہے۔ دن کے دوران 'حرکت کرنے سے' بہتر بیٹھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

سورینم (Psorinum): حرارت سے 'گرم کپڑوں سے' حتیٰ کہ گرمیوں میں بھی بہتری ہوتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): گرمی سے 'سر کو لپیٹنے سے' موسم گرما میں علامات میں کمی ہوتی ہے۔  
ایسڈ فاس (Acid Phos): گرم رہنے سے اور پیشاب کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): اندھیرے میں 'دائیں کروٹ لینے سے' 'ٹھنڈی غذا سے' سرد کھلی ہوا میں 'ٹھنڈے پانی سے' دھونے پر 'سونے سے' بہتری ہوتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): تیز روشنی سے 'رفاقت سے' گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔

کونیم (Conium): روزہ رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔ اندھیرے میں بہتری ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کو ٹٹکانے سے بہتری ہوتی ہے۔ حرکت سے اور دبانے جانے سے بہتری ہوتی ہے۔ پاؤں کرسی پر رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): خشک گرم موسم میں 'دائیں کروت لینے سے' متاثرہ بازوؤں اور ٹانگوں کو اوپر کی جانب اٹھانے سے بہتری ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): کھلی ہوا میں 'ٹھنڈے پانی سے' نہانے پر 'ہاتھ دھو کر' بغیر رہنے سے 'دائیں کروت لینے سے' کمر کو دہانے سے 'کے ہوئے کپڑے پہننے سے' بہتری ہوتی ہے۔

لیکیسس (Lachesis): اخراج کے ظاہر ہونے پر 'دوران حیض بہتری ہوتی ہے'۔ ٹھنڈی ہوا سے 'لازمی طور پر کھڑکیاں کھلی رکھنے سے' بہتری ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ بیرونی گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔

ارانیڈیاڈ (Aranea Diad): تمباکو نوشی سے بہتری ہوتی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): کھلی ہوا میں 'لازمی طور پر کھڑکیاں کھلی رکھنے سے' حرکت سے 'ٹھنڈی چیزیں لگانے سے' یا ٹھنڈے پانی سے دھونے سے 'نہانے سے' ٹھنڈی غذا اور مشروبات سے گو پیاس بالکل نہ ہو 'آدھی رات سے دوپہر تک' سر اوپر اٹھا کر لینے سے بہتری ہوتی ہے۔

لیڈم پی (Ladum P): ٹھنڈے سے 'پاؤں برف کے ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے' بہتری ہوتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): حرکت سے 'آدھی رات کے بعد' گرم غذا اور گرم مشروبات سے 'ٹھنڈے کھانے سے' کپڑے اتارنے سے بہتری ہوتی ہے۔

اگریکس (Agaricus): سونے سے افادہ ہوتا ہے۔

کاربو ویتج (Carbo Veg): ڈکاروں سے 'پٹکھا کرنے سے' سردی سے بہتری ہوتی ہے۔

کولوسینٹھس (Colocynthis): جھک کر دوہرا ہونے سے ' سخت دباؤ سے' گرمی سے 'سر آگے کو جھکا کر لینے سے' بہتری ہوتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): ٹھنڈے سے 'کپڑے اتارنے سے' مسلنے سے ' بازو اور ٹانگیں پھیلانے سے' بہتری ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے بہتری ہوتی ہے۔ شام کے وقت اور ایک ایک دن کے وقفے سے بہتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں بہتری ہوتی ہے۔

اگنیٹیا (Ignatia): مریض جب کھانا کھا رہا ہو تو بہتری ہوتی ہے۔ حالت بدلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ کوئی ٹھوس چیز نگلتے ہوئے بہتری ہوتی ہے۔ سخت دباؤ سے بہتری ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): گرم خشک موسم میں 'حرکت سے' چلنے سے 'حالت بدلنے سے' مسلنے سے 'گرم چیزیں لگانے سے' بازو اور ٹانگیں پھیلانے سے بہتری ہوتی ہے۔ درد کے باعث بے چینی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): بہتری ہوتی ہے 'مسلل حرکت کرنے سے یا حالت بدلنے سے جو کہ دکھن کے باعث ہوتی ہے نہ کہ درد کے باعث۔

روڈوڈنڈران (Rhododendron): طوفان باد و باران کے وقتوں میں 'گرمی اور کھانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کوکا (Coca): شراب پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ گھڑ سواری سے بہتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں تیزی سے حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): خشک گرم موسم میں 'موسم گرما میں' خشک فضا میں بہتری ہوتی ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): گرمی سے 'جھک کر دوہرا ہونے سے' دباؤ سے 'رگڑ سے' مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔

جیلسمیم (Gelsemium): باافراط پیشاب آنے سے 'آگے کو جھکنے سے بہتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں 'مسلل حرکت سے' محرکات سے بہتری ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum): بے حس و حرکت ہونے سے یعنی بے ہوشی سے بہتری ہوتی ہے۔

ڈائی سکوریا (Dioscorea): اکثر کرکڑے ہونے سے بہتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔

برومیم (Bromium): کسی بھی حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ ورزش سے بہتری ہوتی ہے۔ سمندر میں بہتری ہوتی ہے۔

جگ یلنر سینی را (Juglans Cinera): گرم ہونے سے 'ورزش سے' کھانے سے 'صبح کو جاگنے پر بہتری ہوتی ہے۔

یوفوربیا لیتھ (Euphorbia Lath): پینے سے 'کیل لگانے سے اور بند کمرے سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیلونیا (Helonias): کچھ بھی کرنے سے (ذہنی انتشار) بہتری ہوتی ہے۔

سپاکی جیلیا (Spigelia): دائیں کروٹ لیٹنے سے جبکہ سر بلند ہو 'سانس اندر کھینچنے وقت بہتری ہوتی ہے۔

سائیکل من (Cyclamen): حیض کا خون جاری ہونے کے دوران بہتری ہوتی ہے۔ حرکت



کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ اعضاء کو مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ گرم کمرے میں بہتری ہوتی ہے۔ لیہوں کا پانی پینے سے بہتری ہوتی ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): کھانے سے بہتری ہوتی ہے۔ کمر کے بل لیٹنے سے 'مسلمے سے بہتری ہوتی ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): بیہوش آنے کے دوران 'ٹھنڈا پانی پینے سے اور سونے سے بہتری ہوتی ہے۔

ایپیس ایم (Apis M): کھلی ہوا میں 'کپڑے اتارنے سے 'ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بہتری ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ڈکاروں سے 'تازہ ہوا سے 'ٹھنڈے اور دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): مرطوب موسم میں 'سر کو لپیٹنے سے 'گرمی سے 'کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔

### قلت خون — (Anaemia)

فیرم ایسی ٹیسٹ (Ferrum Acetate): شدید قسم کی قلت خون لاحق ہوتی ہے۔ یہ دوا قلت خون کے لئے مخصوص ہے اور اس کو آزمانے میں دوسرے فیرم کپاؤنڈوں پر ترجیح دینی چاہئے۔ IM یا GM ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جائے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): وقفہ دار بخاروں کے بعد قلت خون لاحق ہوتا ہے۔ بے ہوش ہو جانے کے ساتھ دماغی قلت خون لاحق ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں قلت خون کا لاحق ہونا جو کبھی بھر پور خون والے ہوتے تھے لیکن اب ہاتھوں اور پاؤں میں بھراؤ کے ساتھ پیلے پڑ چکے ہوں۔ اعضاء کے بہت پیلے پڑ جانے کے ساتھ قلت خون کا لاحق ہونا۔ اس کے ساتھ اچانک چہرے میں آگ کی طرح سے خون بھر جاتا ہے۔ مریض پھولا ہوتا ہے اور استسقاء ہوتا ہے۔ داغوں کے ساتھ جلد پیلی پڑ جاتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): اعتماد ہے کی نگاہت اور پریشانی ہوتی ہے۔ استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن شدید ہوتی ہے۔ شدید قسم کی پیاس معدے کے ہیجان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیبریا یا اعتدال سے زیادہ کونین کے استعمال کے باعث دماغ کی قلت خون لاحق ہو۔

نکس وامیکا (Nux Vom): دماغ کی قلت خون جو کہ بہت زیادہ ہوش کے باعث اور ذہنی کام کی زیادتی کے باعث لاحق ہوتی ہے نیز دماغ کے نرم پڑ جانے کے باعث۔

زکم میٹ (Zincum Met): قالمی حالت کے ساتھ دماغی قلت خون کے مریضوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): سر میں شدید چکن والے درد کے ساتھ قلت خون لاحق ہو۔ جس کے ساتھ کھوپڑی کی انتہا درجے کی حساسیت بھی ہوتی ہے۔ دماغ خون سے بھرا ہوتا ہے لیکن یہ خون پانی والا ہوتا ہے۔

چائینم آرس (Chininum Ars): سونے کے دوران باافراط اور رسنے والا پسینہ آنے کے ساتھ قلت خون لاحق ہوتی ہے۔

چائنا (China): جب قلت خون، خون اور دیگر رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث لاحق ہو۔ درد سر اور کانوں میں گرجن کے ساتھ دماغ کی قلت خون لاحق ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): طویل عرصہ تک رہنے والے دباؤ کے باعث قلت خون لاحق ہو۔ چھاتی کے کساؤ اور دھکن کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ ذہنی کھنچاؤ کے باعث دماغ کی قلت خون لاحق ہو۔

نیرم میور (Natrium Mur): کم مقدار میں اور مؤخر شدہ حیض کے باعث قلت خون لاحق ہو۔ مریض نزلہ ہوتا ہے۔ جب خون اور رطوبت کے ضائع ہو جانے کے نتیجے میں قلت خون لاحق ہو۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): بوجھنے والی مسلک قلت خون۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): کمزوری، لاغری، بھوک کی عدم موجودگی، موروثی سل، جلن دار پیاس اور باافراط پیلا پیٹاب آنے کے ساتھ قلت خون لاحق ہو۔

مینگانم (Manganum): بکڑی ہوئی جسمانی صحت، قلت خون، موی اور بیمار شکل و صورت اس وقت ہوتی ہے۔ جب اس کی وجہ سیلان خون یا دیگر زائد مادوں کا اخراج نہ ہو۔

لیسی تھین (Lecithin): یہ دوا سرخ جیسوں کی تعداد اور جیسو گلوبین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔

الیومینا سیلی کیٹ (Alumina Silicate): نمایاں قسم کی لاغری اور قلت خون، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور مریض ہر وقت بستر پر لیٹے رہتا چاہتا ہے۔ گوشت کم ہو جاتا ہے۔

ٹرینٹی ٹرونولوئین (ٹی۔ این۔ ٹی) (Trinitrotoluene (T. N. T.)): اسلحہ کی فیکٹری میں کام کرنے والے کارکنوں میں، جو ٹی۔ این۔ ٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، سنگین قسم کی قلت خون اور یرقان کے لئے ایک موزوں دوا ہے۔ سانس پھول جاتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔ درد سر، بے ہوشی، دل کی دھڑکن اور پیلا یرقان ہو جاتا ہے۔

ایسٹریس فاری نوسا (Aletis Farinusa): سبزیرقان، جسم اور ذہن کی تھکان کے باعث بننے والی طبیعت جو کہ طول پکڑ جانے والی بیماری کے باعث ہو۔ سبز بھس والی لڑکیوں اور حاملہ عورتوں کے لئے موزوں ہے۔ اسقاط حمل کی علوت ہو جاتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): بچپن سے لاحق ہونے والی قلت خون، خصوصاً سفید بانہی مزاج والوں کے لئے یہ دوا موزوں ہے۔ موٹا ہونے کے رجحان کے ساتھ نرم ریشے ہوتے ہیں۔ حرکت میں اور دانت نکالنے میں مریض ست ہوتا ہے۔ بد قسمتی کے آنے کا احساس ہوتا ہے۔ ناقابل ہضم چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔

تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): گلنڈ والے مریضوں میں خون کی کمی ہوتی ہے جو اعصابی لرزہ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اعصابی لرزہ چہرے، ٹانگوں اور بازوؤں میں ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور جاڑا لاحق ہوتے ہیں۔ لاغری ہوتی ہے۔ عضلاتی کمزوری ہوتی ہے۔ پسینہ آتا ہے اور جھنجھناہٹ کا احساس ہوتا ہے۔

### تریاق — (Antidote)

لیڈم پی (Ledum P): کیزوں اور جانوروں کے زہر کا تریاق۔

تھوجا (Thuja): چائے اور حفاظتی ٹیکوں کا تریاق۔

الیومن، الیومینا (Alumina, Alumen): یہ سیسے کی تریاق دوائیں ہیں۔ یہ دوائیں پچھلے خانوں میں کام کرنے والوں میں جو کہ سیسے میں کام کرتے ہوں۔ سیسے کے زہر کے رجحان کو ختم کرتی ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ کلوروفام کے اثر کو تقریباً لحات میں ختم کر دیتی ہے اور تے کو روک دیتی ہے۔

### سانس رک جانا — (Asphyxia)

انٹیم ٹارٹ (Antim T): زرد چہرے یا گہرے سرخ چہرے اور نیلے ہونٹوں کے ساتھ بے ہوشی (قود) ہوتی ہے۔ عضلاتی پھڑکن ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں جبکہ حلق اور سینے سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔

اوپیم (Opium): کاربوئک الیڈ گیس سانس کے ذریعے اندر لے جانے سے سانس رک جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں جب انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ نبض محسوس نہیں ہوتی۔ چہرہ اور خواتی ہو جاتا ہے۔

بووٹا (Bovista): کونکے کی گیس (کاربن مونو آکسائیڈ) کے باعث سانس کا رک جانا لاحق ہوتا ہے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sul): جب کونکے کی گیس میں سانس لینے کے باعث یا الکوحل کے باعث سانس رک جائے۔

کوپلریا (Cochlearia): بظاہر مرگی والی موت ہوتی ہے۔ پیچھڑوں اور ناک سے سیلان خون ہونے کے بعد (بچوں میں کالی کھانسی)۔

چائٹا (China): نوزائیدہ بچوں میں ماں کے ذریعے بہت زیادہ خون ضائع ہو جانے کے بعد یا جب نوزائیدہ بچہ زرد ہو۔

کیمفر (Camphor): بظاہر موت واقع ہو جاتی ہے جبکہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

### بے ڈھنگے (Awkward)

اگریکس ایم (Agaricum M): جسم کے عضلات کی حرکات کو متوازن بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ دماغ اور حرام مغز کی عدم مطابقت مریضہ جو چیزیں کھڑتی ہے انہیں گرا دیتی ہے۔ رکابیاں وغیرہ توڑ دیتی ہے۔ کیونکہ وہ انہیں گرا دیتی ہے۔ مریض گرمی سے بہتر ہو جاتا ہے یا آگ کے قریب بیٹھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

ایپس ایم (Apis M): اگریکس کے مماثل علامات سوائے اس کے کہ ایپس کی مریضہ ٹھنڈ سے بہتر ہوتی ہے اور آگ کی گرمی سے بچنے کے لئے باورچی خانے سے باہر رہنا پسند کرتی ہے۔ کیپسکیم (Capsicum): بچے بے ڈھب اور بھدے ہوتے ہیں۔ انہیں گھر کی یاد ستاتی رہتی ہے اور سکول سے گھر چلے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بچے گول منول ہوتے ہیں اور ان میں برداشت نہیں ہوتی۔

### پس ماندہ (Backward)

(بچے جن کی نشوونما مناسب طور پر نہیں ہو پاتی اور وہ احمق اور ضعیف العقل دکھائی دیتے ہیں) (نیز دیکھئے "بونا پن")

بیرٹا کارب (Baryata Carb): ذہانت کا فقدان ہوتا ہے۔ ذہنی الجھاؤ ہوتا ہے۔ فاطر العقل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھنے میں سستی ہوتی ہے۔ حرکت کرنے میں سستی ہوتی ہے۔ مریض ہر آدمی سے ڈرتا ہے۔ اجنبیوں سے اور بھی زیادہ۔ غیر متوجہ اور غیر مستعمل ہوتا ہے۔ بچہ اپنے والدین اور ساتھیوں کے لئے سخت دل ہوتا ہے اور تکلیف کا اظہار نہیں کرتا۔ وجہ

عمل اور عمل میں ربط نہیں ہوتا۔

سٹرامونیم (Stramonium): اعتماد رے کا تشدد اور اعصابی، مضطرب اور خفصیل ہوتا ہے۔ روتا ہے اور چلاتا ہے، مارتا ہے اور کاٹتا ہے۔ بھاگ جانا چاہتا ہے۔ جلد خوف زدہ ہو جانے والا اور خواب میں خوفناک چیزیں نظر آنے پر چونک کر جاگ جاتا ہے۔ رفاقت پسند کرتا ہے۔ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ روشنی کو پسند کرتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): مریض نرم، ست اور بے ہمت ہوتا ہے۔ ست قسم ہوتا ہے اور ست عمل ہوتا ہے۔ تمام ذہنی کام اسے تھکا دیتے ہیں۔ سر اور ہاتھ پر باقراط پھیند آتا ہے۔ سر اور پیٹ بڑے ہوتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت ہوتی ہے۔ قبض میں بہتری ہوتی ہے۔ جلد، پیلی، سفید اور ٹیالی ہوتی ہے۔ باتیں کرنا دیر سے سیکھتا ہے۔

سفی لینم (Syphillinum): بچوں کے بے ڈھب ہونے میں بیرٹا کارب اور سٹرامونیم کے ساتھ اس دوا کو لازماً عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے۔ مزاج تبدیل ہونے والا ہوتا ہے۔ ہنسی بچوتی ہے اور گہری اداسی ہوتی ہے۔

ٹیوبرکیولینم (Tuberculinum): مندرجہ بالا دیگر ادویات کے ساتھ اس دوا کو بھی بچوں کے بے ڈھب ہونے میں عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے۔ بچوں کے بے ڈھب ہونے میں علاج کے آغاز میں اس دوا کو دینا ہمیشہ مفید رہا ہے۔ ذہنی اور جسمانی نشوونما رک جاتی ہے۔ دانت ظاہر نہیں ہوتے۔

اورم میٹ (Aurum Met): کم حوصلہ، زندگی سے عاری، بری یادداشت والے مریضوں کے لئے۔ لڑکپن والی باتونی کا فقدان ہوتا ہے۔

سیلیسا (Silcea): زرد بیمار بچے جو کہ چڑچڑے ہوتے ہیں جو سیکھتے نہیں اور کھیلتے نہیں۔ معمولی ذمہ داری سے بھی بھاگتے ہیں۔ خود اعتمادی اور خود پر بھروسہ بالکل نہیں ہوتا۔

اگیرنیکس ایم (Agaricus M): دیر سے بولنا سیکھنے والے اور دیر سے چلنے والے بچے۔ ست روی سے نشوونما پانے والا دماغ۔ ایسے بچے جو یاد نہیں رکھ سکتے۔ غلطیوں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔

نیٹرم میور (Natrum Mur): دیر سے باتیں سیکھنے والے۔

یوفو (Bufo): ذہانت کی ترقی کا فقدان، بچکانہ حالت باقی رہتی ہے۔ جبکہ جسم نشوونما پا جاتا ہے۔ خوف اور سادہ پن ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): ذہنی پسماندہ بچے، بہت گندے ہوتے ہیں۔ رات کے دوران پاشانہ اور پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے۔ کتے کا فضلہ کھا جاتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکوں کی بے اعتدالی کے

باعث جو کہ گلوے نہیں گئے۔ پسامدگی لاحق ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات۔  
کیلنڈولا (Calendula): ذہنی پسامدہ بچوں کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔  
نوٹ: اوپر دی گئی تمام ادویات 200 ڈاکی لیوشن کی صورت میں استعمال کی جائیں اور انہیں ہر  
 ہفتے بدل بدل کر دیا جائے۔ ایک کورس میں جو کہ تین سے چار مہینوں تک کا ہوتا ہے، دو سے  
 زیادہ ادویات استعمال نہ کی جائیں۔ سوائے نیور کولینم اور سخی لینم کے جن میں سے ہر ایک کو  
 ایک ماہ کے وقفے کے ساتھ دو ادویات کے ساتھ دینا چاہئے۔ 200 سے اوپر والی طاقت کے ڈاکی  
 لیوشن صرف اسی صورت میں استعمال کرنے چاہئیں۔ جب کہ بہتری نظر نہ آئے یا جب اتفاقہ  
 میں ترقی رک گئی ہو۔

### داڑھی — (Beard)

(ہیز دیکھئے ”بال“)

انین تھیرم (Anantherum): داڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔  
سفنکورس (Sphingurus): بال گر جاتے ہیں۔ خصوصاً داڑھی اور مونچھوں کے بال۔

### بستر کے زخم — (Bedsore)

لیکسیس (Lachesis): نیلے کناروں کے ساتھ (ٹائیفائیڈ میں)  
سلفر (Sulphur): بستر کے زخم ٹھکرین کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ کترنے والا درد ہوتا  
 ہے۔

کروٹیل (Crotalus): خون کی حالت خراب ہو جانے کے باعث۔  
ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): سچ میں سے ڈھکے ہوئے زخم۔ خشک خون والے چھلکوں  
 کے ساتھ۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): یہ دوا خصوصی طور پر کولہوں اور پیٹھ والے علاقہ پر ہونے  
 والے بستر کے زخموں کے لئے موزوں ہے۔  
نوٹ: بیرونی طور پر کیلنڈولا اور سچ زخموں پر لگانا چاہئے۔ خواہ اصلی حالت میں یا ڈاکی لیوشن کی  
 صورت میں۔

### کالٹا (کالٹے کے زخم) — (Bites)

ہائپرکیم (Hypericum): کیزے مکوڑوں کے کالٹے سے ہونے والے زخم۔ کتوں یا دوسرے

جانوروں کے کانٹے سے ہونے والے ایسے زخم جو بھرتے نہ ہوں اور جن میں جلن دار اور ڈنک لگنے جیسا درد ہو۔ اس کے ساتھ ان زخموں کے کنارے چمک دار سرخ ہوتے ہیں۔  
ایٹک الیڈ (Acetic Acid): ملی کے کانٹے سے ہونے والے زخم (مٹی خواہ پاگل ہو یا پاگل نہ ہو) پھٹا ہوا زخم، ٹانگ کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ سوج جاتا ہے۔ (یہ دوا بیرونی طور پر بھی لگائیں۔)

لائی سین (Lyssin): کتے کے کانٹے کا زخم، جلن ہوتی ہے۔ گرم بھاپ سے بہتری ہوتی ہے۔ کتے کے کانٹے کے باعث درد سر ہوتا ہے۔ چوڑوں پر اور ان کے قریب والے حصوں میں عجیب احساس ہوتا ہے۔ زخم میں جلن اور کھودنے کا احساس ہوتا ہے۔  
لیکیسس (Lachesis): جو ٹکوں کے کانٹے سے منکرین والے زخم ہوتے ہیں۔ یہ دوا کتے کے کانٹے کے لئے بھی مخصوص ہے۔

گولون ڈرینا (Golondrina): سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ سانپ کے زہر کے اثر کی مدافعت کے لئے استعمال ہوتی ہے اور حفظ ماتقدم کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔  
لیڈم پی (Ledum P): چوہوں یا بچھوؤں کے کانٹے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ لیڈم پال مدر ٹچر بیرونی طور پر لگائیں۔ یہ ٹچروں کے کانٹے میں فوری آرام دے گی۔ نیز شمد کی کھبیوں وغیرہ کے ڈنک میں بھی فوری آرام دیتی ہے۔ غصیلے جانوروں کے کانٹے کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔

سکس کین (Cistus Can): پاگل جانوروں کے کانٹے کے لئے اور زہریلے زخموں کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

ارٹیکا یورینس (Urtica Urens): شمد کی کھبیوں کے ڈنک لگنے کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ یہ دوا مدر ٹچر کی صورت میں بیرونی طور پر لگائی جاتی ہے۔ جس سے فوری طور پر آرام ملتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ آرنیکا مونٹ کی طرح سے بھڑکے کانٹے میں کام کرے گی۔ کینتھرس 200 بھی اندرونی طور پر دیجئے۔

ہوانگ نان (Hoang Nan): سانپ کے کانٹے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔  
سیڈرون (Cedron): ٹانگ کے کانٹے کے لئے یا دیگر زہریلے حشرات الارض کے کانٹے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): بھڑکے کانٹے کے لئے آرنیکا مدر ٹچر بیرونی طور پر لگائیں نیز کینتھرس 200 اندرونی طور پر دیں۔

ایپس ایم (Apis M): شمد کی کھبیوں کے ڈنک لگنے کے باعث استسقاکی سوجن اور عام سوجن

ہوتی ہے۔ جس کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا شد کی کھیں پالنے والے لوگوں میں شہد کی مکھی کے اثرات سے ممانعت پیدا کرتی ہے۔ اس باب میں یہ دوا 1x یا 6 ڈاکی لیوشن کی صورت میں کچھ عرصہ کے لئے دینی چاہئے۔

اگنیشیا (Ignatia): باتیں کرتے ہوئے چپاتے ہوئے جب کہ رخسار اندر کی طرف سے کٹ جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ کھاتے ہوئے زبان کے کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔  
آرم ٹریپ (Anum Trip): ناخنوں کے کاٹنے پر حتیٰ کہ ان سے خون نکل آئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): سوتے میں بلا ارادہ زبان کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔  
سینگا (Senega): غصے میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔  
کاسٹیکم (Causticum): چپاتے ہوئے زبان اور رخسار کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔  
اویم انیلس (Oleum Ani): کھاتے ہوئے رخسار کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔  
پائی اونیا (Paeonia): تنگ جوتے کے باعث زخم ہو جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ عمومی پھوڑے کے لئے بھی یہ دوا دی جاتی ہے۔  
بینزونیٹک ایسڈ (Benzoic Acid): کھاتے ہوئے غیر ارادی طور پر نچلا ہونٹ کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔

یوفوربیا پروستاتا (Euphorbia Prostata): زہریلے کیڑوں اور سانپوں کے کاٹنے کے لئے ایک حتمی دوا ہے۔ خصوصاً رینٹل (ایک امریکی سانپ جو اپنی دم سے کھڑکڑاہٹ کی آوازیں نکالتا ہے) سانپ کے کاٹنے کے لئے۔  
فائی ٹولاکا (Phytolacca): دانتوں اور مسوڑھوں کو اکٹھے کاٹنے کی ناقابل مزاحمت خواہش۔

### سیلان خون — (Bleeding)

(نیز دیکھئے "ناک" کے ذیل میں "سیلان خون" اور "اسعلائے مستقیم اور پانخانے" کے ذیل میں "جریان خون" اور "آنکھیں")  
لیکیسی (Lachesis): جسم کے کسی بھی سوراخ سے 'مسوڑھوں سے' منہ سے اور آنکھوں وغیرہ سے خون بہتا ہے۔ ہر خراش یا معمولی کٹنے سے یا زخم سے خون بہہ نکلتا ہے۔  
گروتالوس ہور (Grotalus Hor): جریان خون کی طبیعت۔ خون آنکھوں سے 'کانوں سے' ناک سے اور جسم کے ہر سوراخ سے بشمول رحم کے بہتا ہے۔ سیاہ بدبودار خون رہتا ہے جو کہ بہتا نہیں۔ خون والا لچینہ خارج ہوتا ہے۔



کریو زوٹ (Kreosote): گردوں سے، آنکھوں سے، ناک سے، رحم وغیرہ سے سیلان خون ہوتا ہے۔ بہت دیر تک رہنے والا جریان خون۔ انگلی مارنے سے بہت زیادہ سیلان خون ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک قطرہ خارج ہو۔ جب آنکھیں سرخ اور سوزشی ہوں تو ان سے آسانی کے ساتھ خون بہہ نکلتا ہے۔

ملی فویم (Milefolium): خون کی ٹالیوں کی ناطاقتی والی حالت۔ کسی بھی حصہ سے، زخموں سے، ناسوروں سے، پچھڑوں سے، معدے سے، اسعائے مستقیم سے، ناک سے اور دانت ٹکائے کے بعد خون بہتا ہے۔ خون عموماً چمک دار یا سرخ ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): معمولی زخموں سے بہت زیادہ خون بہتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): معمولی زخموں سے ہفتوں خون بہتا رہتا ہے۔ Sanious مانع خارج ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں بھجننا ہٹ ہوتی ہے۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): سوزشی سطح سے خون رستا ہے۔ ناسوروں سے سیاہ خون بہتا ہے۔ کسی بھی سوراخ سے خون بہتا ہے یعنی پچھڑوں سے، رحم سے، مثانہ وغیرہ سے۔ یہ سب نرم دوران خون کے باعث ہوتا ہے۔ خون آہستہ آہستہ رستا ہے اور جیز بھاؤ کے ساتھ نہیں آتا۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): جریان خون والی طبیعت۔ چمک دار سرخ خون جو آسانی سے جم جائے۔

سنامونم (Cinnamonum): ناک سے، آنٹوں سے، پچھڑوں سے یا معدے سے خون بہتا ہے۔ کسی بھی سوراخ سے سیلان خون کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔

### تنفس — (Breathing)

تیز یا دقت کے ساتھ — (Fast or Difficult)

(دیکھئے ”ضیق النفس“)

جلن — (Burning)

(نیز دیکھئے ”گرمی، حدت“)

## آگ سے جلنا اور مائعات سے جلنا

(Burns and Scalds)

**کینتھرس (Cantharis):** آگ سے جلنے اور گرم مائعات یا بھاپ وغیرہ سے جلنے کے تمام مراحل کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ یہ آبلے پڑنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ گردوں کی جراثیمیت اور ضیق النفسی نیز پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے جس کے ساتھ مٹانے سے خون بھی خارج ہوتا ہے۔ درد ہونے پر بھی اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس دوا کے مدد دہندہ کے چند قطرے پانی میں ملا کر زخم والے حصے کو اس میں ڈبونا چاہئے یا دھولینا چاہئے۔  
**آرسنک البم (Ars Alb):** جب کنگرین ہونے کا احتمال ہو۔

**کاسٹیکم (Causticum):** جب زخم تیسرے مرحلہ میں داخل ہو جائے اور مزمن صورت اختیار کر لے اور ناسور ٹھیک نہ ہوں تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ 6th ڈائی لیوشن کی صورت میں استعمال کیجئے۔ جو کہ فوری طور پر درد میں افتادہ کر دے گی۔ 1 اور 10 کے تناسب میں ہائپرکیم لیوشن بیرونی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

**ارٹیکا یورینس (Urtica Urens):** حادہ اذیت ناک درد، جلنے میں چھپاکی کی طرح کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدد دہندہ کالوشن 1 اور 15 کے تناسب سے بیرونی طور پر لگائیں۔

**پٹرولیم (Petroleum):** دکھن اور درد کے ساتھ جب جلد میں شکاف پڑنے کا رجحان ہو۔  
**سٹرامونیم (Stramonium):** جلنے میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے جبکہ ڈیوڈنیم کی ناسوری کیفیت پائی جائے اور اعصابی مریضوں میں بھی۔

**کیڈمیم سلف (Cadmium Sol):** ریڈیم سے جلنے کا تریاق ہے۔ ایسا ریڈیم سے کینسر کے علاج میں ہوتا ہے۔ IM ڈائی لیوشن کی صورت میں دیجئے۔

**ہائپرکیم (Hypericum):** جلنے میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے یا متاثرہ حصہ ٹھنڈی ہوا میں رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔ کائنیتی ہوئی آواز کے ساتھ اعصابی مریضوں میں شدید چڑچڑاہٹ ہوتا ہے۔ ذہنی خلفشار کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ IM ڈائی لیوشن دیجئے۔

**نوٹ:** فوری طور پر بیرونی استعمال کے لئے ٹینک ایمنڈ 5% یا کینتھرس مدد دہندہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد میں ٹھنڈے پانی میں ایک ڈرام اور ایک اونس پانی کے تناسب سے ملا دینا چاہئے۔ جلے ہوئے حصے کو تر رکھنا چاہئے تاکہ چھالے نہ بن سکیں۔ اگر یہ دوا مسلسل کم و بیش ایک گھنٹہ تک لگائی جائے تو صرف یہی دوا ہی جلے ہوئے مریض کا علاج کر دے گی۔ مولین تیل بھی بٹی کے ساتھ جلنے میں مفید ہوتا ہے۔

## جوڑوں کی جھلیوں سے برآمدہ چکنائی

(Bursae)

آرنیکا (Arnica): جب زخم لگنے کے باعث ہو۔  
 غلٹاٹل (Sticta Pul): سادہ یا پھیلا ہوا (Patella) پر۔  
 سیلیشا (Silicea): پیپ بڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ قھیلی (Patella) پر۔  
 آیوڈیم (Iodium): قھیلی۔

## سرطان (Cancer)

کینسر کا علاج کرتے وقت سب سے پہلے کینسر کی طبیعت کا تریاق سکریم 200 یا 1000 کی خوراک سے کیا جائے۔ اس کے کم از کم چوبیس گھنٹے کے بعد باقاعدہ علاج شروع کرنا چاہئے۔ دیگر ادویات جو کہ عمل انگیز دواؤں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ سورنم 200 اور میڈورنم 200 ہیں۔ یہ دونوں ادویات اینٹی سورک اور اینٹی سائیکلوٹک ہیں۔ سورا اور سائیکلوکس دو غلیں ہیں جو کہ کینسر پیدا کرتی ہیں۔ نیور کیولینم 200 بھی عمل انگیز دوا کے طور پر دی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ خاندان میں بی۔ بی کی ہسٹری پائی جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): متاثرہ حصے میں خون اور پیپ کے ساتھ پھاڑنے والے اور جلن دار دردوں کے ساتھ جھریاں پڑی ہوئی سطح پر ہڈی کے ظاہر ہونے سے کھلی ہوئی سوزش کے آغاز کے ساتھ ماتھے کا کینسر لاحق ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن دیجئے اور ہر ہفتے کے بعد دہرائیے۔ زبان کا کینسر ہوتا ہے۔ جیسا کہ زبان کے درمیان میں ایک سوراخ کر دیا گیا ہو۔ اوپر کواٹھے ہوئے اور سخت کناروں کے ساتھ۔ مریض گھٹنوں سے کمبیاں جوڑ کر سوتا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): جلد کی خشکی اور جلن دار حدت کے ساتھ معدے کا سرطان لاحق ہو۔ پیاس لگتی ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندیشے ہوتے ہیں۔ 200 ڈائی لیوشن دیجئے اور ہر ہفتے دہرائیے۔

ناکٹرک ایسڈ (Nitric Acid): کچھ کترنے والے دردوں کے ساتھ چھنے والا درد ہوتا ہے۔ جلن دار درد اور پیاس کے ساتھ معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ پانی ناقابل بیان حد تک متلی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ معدہ میں غذا اپنے اندر رکھنے کی قابلیت نہیں رہتی چنانچہ جزوی طور پر ہضم شدہ غذا کو واپس نکال دیتا ہے۔ لیس دار مادے اور خون کی قے ہوتی ہے۔ چہرہ پیلا ہوتا ہے۔ لاغری ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): چبھنے والے درد کے لئے۔

الیومن (Alumen): پستانوں کا سرطان۔

ایپس ایم (Apis M): جب ڈنک لگتے جیسے درد ہوں اور درد کے ساتھ خارش بھی ہو۔

کلیٹس (Clematis): ہونٹ کا کینسر۔ اگر اس کے ساتھ سے بھی آگ آئیں۔ ذکاوار اس دوا کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔

سپیا (Sepia): سرطان کی تختی ہوتی ہے۔ ہونٹوں کا سرطان۔

سلیشیا (Silicea): جلد کی بیرونی سطح پر آہستہ آہستہ بننے والے ناسور ہوتے ہیں جو کہ چبھنے، کم گرمی، نپلاہٹ، مائل سفید بنیاد اور صاف کٹاؤ والے کناروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مریض کو کندھوں کے درمیان ٹھنڈ کے ساتھ جاڑا لگتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ یہ دوا CM ڈائی لیوشن میں دی جا سکتی ہے۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): معدہ میں کئی قسم کے درد ہوتے ہیں۔ جن میں گرم چیزیں لگنے سے اور پیچھے کی جانب جھکنے سے افادہ ہوتا ہے۔ درد معدہ سے شروع ہوتا ہے اور پستانوں اور دائیں کندھے کی ہڈی کے نچلے زاویے تک پھیل جاتا ہے۔ گرم پانی میں CM ڈائی لیوشن ملا کر دیتے اور کئی مہینوں تک دوہراتے رہتے۔ یہاں تک کہ درد قویٰ عتاب ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اس دوا کے بعد آر سینک البم علاج کی تکمیل کے لئے دینا چاہئے۔

یوفوربیم (Euphorbium): شدید قسم کا جلن دار درد ہوتا ہے۔ جس میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔ بجلی کے جھٹکے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ جس سے مریض اچھل کر بستر سے باہر آ جاتا ہے۔ پیڑ کی ہڈیوں کا کینسر جس میں اس دوا کی خوراکیں بار بار دینے سے افادہ ہو جاتا ہے۔

سلفر (Sulphur): معدے کے گڑھے میں غشی میں ڈوبنے کا احساس ہونے کے ساتھ معدے کا کینسر لاحق ہوتا ہے۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے بسوک لگی ہوئی ہو۔ تیز دواؤں کے استعمال سے مرض دب جاتا ہے۔ بیرونی بو اسیر ہوتی ہے۔ جس میں خارش ہوتی ہے لیکن خون نہیں بہتہ اسماعائے مستقیم کا خروج ہوتا ہے۔ جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو CM ڈائی لیوشن کی صورت میں محل انگیز دوا کے طور پر بھی دینا چاہئے۔

کریوزوٹ (Kreosote): رحم کا سرطان جس کے ساتھ رحم کی بو اسیر ہوتی ہے۔ چند ماہ کے لئے حیض رک جاتے ہیں اور پھر خراش کے ساتھ سیاہ اور گندی بو والے خون کے ساتھ دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں۔ پتلا مواد خارج ہوتا ہے۔ کٹن اور خارش رحم میں ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ وزن اور نیچے کی طرف دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اخراج میں خوفناک بو کے ساتھ کمپڑی کا

سرطان لاحق ہوتا ہے۔

فائی ٹولا کا (Phytolacca): پستانوں کا سرطان۔ اندر کو دھسنے ہوئے سرہائے پستان کے ساتھ بے قاعدہ اور سخت رسولیاں ہوتی ہیں۔ سوزشی دکھن کا احساس بازوؤں تک پھیل جاتا ہے۔ سر پستان میں درد ہوتا ہے۔ جس میں چیرا ہوتا ہے۔ جو پوری چوٹی پر پھیلا ہوتا ہے۔

کونیم (Conium): ہونٹوں کے سرطان کے لئے یہ ایک رہنما کن دوا ہے۔ تیز درد کے ساتھ پتھر کی طرح سخت رسولی کے ساتھ سرطان ہوتا ہے۔

کیلنڈولا (Calendula): اس دوا کو جرمنی میں سرطان کے علاج کے لئے آزمایا جا چکا ہے۔ سرطان کے ہر مرحلہ پر اس دوا کو کامیابی کے ساتھ آزمایا گیا ہے۔ یہ دوا درد کو کم کرتی ہے اور مریض کو بہت زیادہ آرام پہنچاتی ہے۔

کونڈورانگو (Condurango): یہ دوا حقیقی طور پر شفا کی طاقت رکھتی ہے۔ سرطان کے بعض کیسوں میں خصوصاً ہونٹوں اور معدہ کے سرطان میں جبکہ مریض کو منہ کے زایوں میں شکافوں کے اندر درد ہوتا ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): کینسر کے ختم ہو جانے کے بعد جب جلد ٹھیک ہوتے ہوئے زخم کے اوپر سختی سے کھینچ جاتی ہے۔

ہوانگ نان (Hoang Nan): غدودوں کا سرطان اور سانپوں کے کاٹے کے لئے سرطان میں جریان خون کو دور کرتی ہے۔ مرض کے رفع ہونے کے عمل کو دہراتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): اگر مریض کے خاندان میں ٹی۔ بی کی ہسٹری ہو تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر دیا جاسکتا ہے۔

اورم آئیوڈ (Aurum Iod): کینسر کی تکلیفات اور ہڈیوں کے ٹکٹے سڑنے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ غدودوں اور اعضاء میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ ٹھنڈ سے بہتری ہوتی ہے اور گرمی سے اجڑی ہوتی ہے۔

نیرم میور (Natrium Mur): تاک کا سرطان اور جلد کا سرطان جو رنخساروں اور آنکھ کے پتوں تک پھیل جاتا ہے۔ کونین کی بھاری خوراکیں کھانے کے باعث لمبریا کے دب جانے کے بعد یہ سرطان لاحق ہو۔ نمک کی طلب ہوتی ہے۔ دوسروں کی موجودگی میں پیشاب کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔

ہائیڈراسٹس (Hydrastis): خنازیری اور سرطانی تکلیف۔ ہونٹوں یا پستانوں کا سرطان۔ سرطان سخت ہو۔ چٹنے والا ہوتا ہے۔ پستانوں میں چاقو سے کاٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے سرطان میں اس دوا کا مدد کن پتھر بیرونی طور پر لگایا جاسکتا ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): چہرے اور ہونٹوں کا سرطان۔ ہونٹوں پر شکاف ہوتے ہیں۔  
پھوڑے ہوتے ہیں۔ چہرے کی جلد کا دق ہوتا ہے۔ جلد بد رنگ، نیلاہٹ مائل یا نیلاہٹ مائل  
جیسی نیالی زرد ہوتی ہے۔

### وجوہات (تکلیفات کی) — (Causations)

کیسفر (Caphor): ٹھنڈی ہوا سے۔  
کینڈیم سلف (Lachesis, Cadmium Sulph): ٹھنڈی ہوا کے جھونکے  
سے۔

مرکیورس پروٹو (Mercurius Proto): سانس لیتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگنے سے۔  
کاربووج (Carbo Veg): آگ سے، گرم ہوا سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے  
باعث۔ گرم ہوا سانس کے ذریعے اندر جانے کے باعث۔

کوشیم، سپیا (Sepia, Conium): برقی ہوا سے۔  
سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): بازو اور اٹھانے سے۔  
رشاکس (Rhus Tox): چیزیں اٹھانے کے لئے بازوؤں کو بلند کر کے اٹھانے سے۔ تازہ یا  
تکین پانی سے نہانے سے۔

کاربووج (Carbo Veg): خراب انڈے کھانے سے، خراب شراب پینے سے، گلی سڑی  
چربی اور ٹھن کھانے سے، مرطوب گرم موسم سے، عیاشی سے۔  
پلاٹینا (Platina): سوگ سے۔

پانی اونیا (Paeonia): تنک پوٹوں اور جوتوں سے۔ دباؤ کے باعث بستر کے زخموں سے۔  
پترویلیم (Petroleum): گوبھی سے۔  
روٹا (Ruta): بھاری وزن اٹھانے سے۔

نیرم میور (Natrur Mur): چاند سے جلن ہوتی ہے اور نامیاتی ریشوں میں کھن لگ جاتا  
ہے۔

اوپیم (Opium): کونکے کے بخارات سے، شرم سے۔  
آرسنک البم (Arsenic Alb): پہاڑوں پر چڑھنے سے۔  
کالی سلف (Kali Sulph): جاڑا جب گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہو۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): سرد مٹی کے ساتھ کام کرنے سے، پانی میں کھڑے ہونے  
سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، ٹھنڈی ہوا سے۔

کاربو انیملس (Carbo An): گلی سڑی سبزیاں اور خراب مچھلی کھانے سے۔  
 پائیروجینم (Pyrogenum): زخموں کی چر پھاڑ سے 'خون میں زہر پھیل جانے سے' جانوروں  
 کے گل سڑ جانے سے پیدا ہو جانے والے تعفن سے۔ گندے نالے کی گیس سے۔  
 ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): پرہیز میں غلطی کرنے سے 'روزہ رکھنے سے۔  
 اکتیاریس (Actea Rac): کاروبار میں ناکامی سے۔  
 ریوم (Rheum): کچے پھل کھانے سے 'شک آلو بخارا کھانے سے۔  
 فاسفورس (Phosphorus): گیس سے 'بال کٹوانے یا بال کاٹنے سے۔ کپڑے دھونے سے'  
 لانڈری کا کام کرنے سے 'تیز بوؤں سے' بارش میں بھیگنے سے۔  
 نیٹرم کارب (Natrium Carb): گیس کی روشنی سے۔  
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): افراط و تفریط کی عادات سے۔  
 وریٹرم البم (Veratrum Alb): عزت نفس بھروسے سے یا غرور سے۔  
 سلینینم (Selenium): لیموں کے پانی سے۔  
 کالچیکم (Colchicum): دوسروں کے برے سلوک سے۔  
 گروتالیس ہور (Grotalus Hot): گندی بو آتی ہے اور گیس بدبودار ہوتی ہے۔  
 تھوجا (Thuja): پیاز۔  
 کونیم (Conium): جنسی عمل سے احتراز کرنے سے۔  
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): شکر۔  
 سول (Sol): لو لگنے سے یا دھوپ میں چلنے سے۔  
 کافیا (Coffea): لمبے سفر سے۔  
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): کیتھیز کے استعمال سے۔

### سبزیرقان — (Chlorosis)

مینگانم (Manganum): تھکی ہوئی کم خون واپی اور کمزور مستورات میں حیض کا خون ایک یا  
 دو روز تک جاری رہتا ہے۔ جو کہ کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن جلدی جلدی آتا ہے۔ حیض میں  
 پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے یا معمولی لیکوریا ہوتا ہے۔ حجرہ میں کچا پن ہوتا ہے۔ گلابیٹھ جاتا ہے  
 اور آواز کھو جاتی ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): کمی خون والا چہرہ 'شدید درد سر چکروں کے ساتھ ہوتا  
 ہے۔ متواتر تے ہوتی ہے۔ زبان طبع شدہ ہوتی ہے۔ پیاس ہوتی ہے۔ بھوک کم لگتی ہے۔

حیض بندم موجود ہوتے ہیں۔ تخفس میں اختصار ہوتا ہے۔ ہر حرکت سے دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ نبض کمزور اور ست ہوتی ہے۔

۱۔ مسم کروڈ (Antm Crud): متواتر درد سر ہوتا ہے۔ مریض قہقہی اور غصے والے مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ بھوک نہیں رہتی۔ بہت زیادہ سستی ہوتی ہے جو مریض کو دن کے وقت زیادہ سونے پر مجبور کرتی ہے۔ حیض رک جاتے ہیں جو کہ پہلے باقاعدہ ہوتے ہیں۔ جلد پیلی ہوتی ہے اور ہونٹ اور زبان اپنا قدرتی رنگ کھو دیتے ہیں۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): سبزیرقان کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ لرزہ ہوتا ہے۔ غشی کے متواتر دورے ہوتے ہیں۔ شدید قسم کی جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے۔

کوکولس (Cocculus): کافی یا دیگر مسکن ادویات کے غلط استعمال کے باعث سبزیرقان لاحق ہوتا ہے۔ دبے ہوئے یا کم مقدار والے اور بے قاعدہ حیض ہوتے ہیں۔ لیکوریا ہوتا ہے۔ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ چھاتی میں اینٹھن ہوتی ہے۔ اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ کھلی ہوا سے حساسیت ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcerea Carb): کم مقدار والے اور مؤخر حیضوں کے ساتھ سبزیرقان کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ شدید قسم کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ دل کے دھڑکنے کی آواز ساری چھاتی پر سنی جاسکتی ہے۔ کینٹی کی شریانوں میں شدید تنگی ہوتی ہے۔ معدے میں دبانے والا درد ہوتا ہے۔ ٹانگیں جلد ہی تھک جاتی ہیں۔ ٹانگوں میں استقامتی سوجن ہوتی ہے۔ جو رانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ چند قدم چلنے سے ضیق النفسی ہو جاتی ہے۔ پیلے، موسی، پیار، چہرے والے مریض ہوتے ہیں۔ ہونٹ پیلے ہوتے ہیں۔ کان پیلے ہوتے ہیں اور انگلیاں پیلی ہوتی ہیں۔ یہ پیلا پن اس دوا کے استعمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خصوصاً قلت خون والی لڑکیوں میں۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): کلکیریا کارب کے مفید عمل کے بعد یہ دوا دینی چاہئے یا جب مکمل طور پر حیض دب چکے ہوں۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ اور سن ہو جانے کے ساتھ سستی لاحق ہوتی ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔ مائلولیا ہوتا ہے۔ رفاقت سے نفرت ہوتی ہے۔ بال گرتے ہیں۔ مٹھائیوں کی خواہش ہوتی ہے۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): لیکوریا اور ترخارش کے ساتھ سبزیرقان ہوتا ہے۔ سوڑھے سکروی ہوتے ہیں۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

چائنا آف (China Off): بازوؤں اور ٹانگوں میں استقامتی سوجن کے ساتھ سبزیرقان ہوتا ہے۔ خصوصاً پاؤں کے ٹکڑوں میں سوجن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔



پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے دردوں کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔ بد ہضمی ہوتی ہے۔ تیزابی ذخائر آتے ہیں۔ ناقابل ہضم اشیاء کی طلب ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو زردیرقان کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہوتی ہے۔ سبزیرقان کے لئے فولاد بیٹھ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مرکبات بھی مفید ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: فیرم سلف اور فیرم کارب۔ فیرم کے مریض پیلے اور پھولے ہوئے چروں والے ہوتے ہیں۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دبانے سے جلد پر گہرے نشان پڑ جاتے ہیں۔ خصوصاً ٹخنوں کے گرد۔ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تھکنے کا احساس ہوتا ہے۔ مریض جلدی رونے لگتا ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ غذا سے نفرت ہوتی ہے۔ معدہ میں تیزابیت ہوتی ہے۔ حیض کم مقدار میں ہوتے ہیں یا دب جاتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): حیضوں کے دب جانے سے سبزیرقان لاحق ہو۔ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ روزانہ توازن کے ساتھ تے ہوتی ہے۔ غذا جلد تحلیل نہیں ہوتی۔ جب فیرم ناکام ہو چکی ہو تو اس کے بعد یہ تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔

سپیا (Sepia): جنسی اعضاء میں بہت سی اقسام کے مہبان کے ساتھ۔ اس مرض کی وجہ ہمیشہ جنسی نظام میں قابل تلاش ہوتی ہے۔ بیڑو میں نیچے کی جانب درد بھرا تاؤ ہوتا ہے۔ بشرطیکہ رحم اندام نسائی سے باہر نکلا ہوا ہو۔ اندام نسائی میں اوپر کی جانب پھڑکن ہوتی ہے اور سونیاں چبھتی ہیں۔ خون کا ایک ہی قطرہ خارج ہونے کے ساتھ۔ بیڑو والے علاقہ میں سوجن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ جلن ہوتی ہے اور بلیغم خارج ہوتی ہے۔ چہرہ پیلا ہوتا ہے۔ موم کی طرح کا چہرہ ہوتا ہے۔ ذہنی کلاہی کے تاثرات ہوتے ہیں۔ مریض ہمیشہ جاڑا محسوس کرتا ہے۔ سر میں ٹپکن اور جھنجھٹا ہوتی ہے۔ معمولی سی تھکاوٹ شدید دھڑکن کا باعث بن جاتی ہے۔

سلفر (Sulphur): بطور عمل انگیز دوا کے استعمال ہوتی ہے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیا جا سکتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): فولاد کے غلط استعمال کے باعث۔ کانوں میں جلن ہوتی ہے۔ ٹانگیں ہماری ہوتی ہیں۔ ضیق النفس ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ مصلحوں والی چیزوں کی تمایاں خواہش ہوتی ہے۔ مریض ڈرپوک یا شریف الطبع ہوتا ہے۔

نکس دامیکا (Nux Vom): بیٹھے رہنے کی عادت کے باعث سبزیرقان ہوتا ہے۔

نیرم میور (Natrium Mur): سانس دب جاتا ہے یا مشکل سے آتا ہے۔ دیر تک رہنے والا زردیرقان۔

اگنیشیا (Ignatia): ذہنی جذبات کے باعث زردیرقان ہوتا ہے۔ غم، خوف اور محبت میں

ناہی کے باعث زردیرقان لاحق ہو۔

ہیضہ — (Cholera)

(نیز دیکھئے ”امعائے مستقیم اور پانخانے“ کے ذیل میں)

انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا

(Clubbing of Fingers)

لاروسیرا کس (Laurocerasus): انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا اس مرض کی عام علامت ہے اور  
سل میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔

بے ڈول — (Clumsy)

(نیز دیکھئے ”بے ڈھنگ“)

ٹھنڈک — (Coldness)

کیوپرم آرس (Cuprum Ars): اینٹھن اور ضدی قسم کی ہنگی کے ساتھ برقی ٹھنڈک جسم  
میں ہوتی ہے۔ متواتر آتی ہے۔ جلاب آتے ہیں اور ٹھنڈے پیسے آتے ہیں۔

ہیلوڈرما (Haloderma): سارے جسم کی ٹھنڈک، ٹھنڈک تمام اندرونی حصوں میں ہوتی ہے  
مثلاً دل، دماغ، پیچھے، گردے وغیرہ۔ حتیٰ کہ سانس بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قلع  
اور لرزہ ہوتا ہے۔ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے جیسا کہ برف کی طرح جم گیا ہو۔ اس کے ساتھ نبض  
ست اور ڈوبنے والی ہوتی ہے۔ 200 ذاتی لیوشن دیجئے۔

سپیا (Sepia): کھوپڑی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

ورٹرم البم (Veratrum Album): پورے بدن میں ٹھنڈک رہتی رہتی ہے۔ ہاتھ برقی  
ٹھنڈے اور نیلے پڑ جاتے ہیں۔ ساتھ میں ناخن بھی نیلے ہوتے ہیں جبکہ پاؤں گرم محسوس  
ہوتے ہیں یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ باافراط اخراج ہوتے ہیں۔

وتھیا (Wyethia): گیارہ بجے جاڑا لگتا ہے۔ جاڑا کے دوران برف کے پانی کی پیاس ہوتی  
ہے۔ گرمی کے مرحلہ میں پیاس نہیں ہوتی۔ تمام رات پینہ باافراط آتا ہے۔ پینہ آنے کے  
دوران شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): دھبوں کی صورت میں ٹھنڈک اس دوا کی بہت بڑی علامت ہے۔

معدہ میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ رحم میں اور پیٹ میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کندھے کی ہڈیوں کے درمیان ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔

سیکیل کار (Secale Cor): پھوٹے سے ٹھنڈ لگتی ہے لیکن لپیٹنا جانا برداشت نہیں کرتا۔

روتا (Ruta): ریزہ سے نیچے کی جانب ٹھنڈک ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): پوری ریزہ کی ہڈی میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بازوؤں میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ قطعات میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ٹھنڈی مرطوب ہوا سے حساسیت ہوتی ہے۔ پینہ قطعات میں آتا ہے۔ ٹھنڈے پسینے کے ساتھ دن میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

لکسیس (Lachesis): دوران شب ٹھنڈ سے چہرہ سرخ ہوتا ہے اور دن میں گرمی سے چہرہ سرخ ہوتا ہے۔

کیمفر (Camphor): جسم کی بیرونی جانب ٹھنڈ ہوتی ہے اور اندرونی جانب گرمی ہوتی ہے۔ ہاتھوں میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نمایاں مٹلی ہوتی ہے۔

ویلیریانہ (Valeriana): سر میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

لاروسیرا کس (Laurocerasus): بہت زیادہ عام ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اگر مریض آرام حاصل کرنے کے لئے گرم کمرے میں جائے تو اسے مٹلی ہوتی ہے اور ماتھے پر پینہ بہہ نکلتا ہے جو اسے دوبارہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ صرف کھلی ہوا میں گرم ہو سکتا ہے۔

امونیا موریٹیکم (Ammonia Muriaticum): کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان برقی ٹھنڈک ہوتی ہے جس میں افادہ گرم کپڑے لپیٹنے سے بھی نہیں ہوتا۔ کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

سیکرم (Sacharum): ٹھنڈک اور گرمی دونوں کا احساس ہوتا ہے۔ برقی ٹھنڈے درد ہر سمت جاتے ہیں۔

نٹرم فاس (Natrurn Phos): ہاتھ، ٹانگیں اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت جیس کے دوران پاؤں برقی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جبکہ رات کے وقت بستر میں چلتے ہیں۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): برقی ٹھنڈک کا احساس آنکھ کے ذیلیوں میں اور پھیاتی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ خصوصاً جب 4 سے 8 بجے شام کے دوران علامات میں اضافہ ہو جائے۔

حالت نزع، غشی — (Collafse)

کیمفر (Camphor): بڑھال ہو جانے کی حالت، سارے جسم میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

اس کے باوجود مریض خود کو ڈھانپنا نہیں چاہتا۔ اچانک طاقت ڈوب جاتی ہے۔ نبض چھوٹی اور کمزور ہو جاتی ہے۔

کاربو وِج (Carbo Veg): رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث۔ دوا کھانے کے بعد۔ قوت حیات میں کمی ہو جانے سے مدحال ہونے کی حالت لاحق ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگوں میں۔ مریض بے جان ہو جاتا ہے۔ سرگرم ہوتا ہے۔ بدن بھی گرم ہوتا ہے اور سانس ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پگھلا چلایا جانا پسند کرتا ہے اور کھڑکیاں کھولنا بھی یقیناً پسند کرتا ہے۔

وریمٹرم البم (Veratrum Alb): حالت نزع کی مکمل تصویر ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ انتہا درجے کی ٹھنڈک کمزوری اور نیلا پن ہوتا ہے۔ عمل جراحی کے بعد صدمہ جس کے ساتھ ماتھے پر ٹھنڈا پیمند ہوتا ہے۔ چہرہ زرد ہوتا ہے اور تیز نرم نبض ہوتی ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): پھپھڑوں کی کسی خراب حالت کے باعث نزع کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ دل کے مرض کی وجہ سے نزع کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تشنگی جھٹکے لگتے ہیں یا ویسے ہی جھٹکے لگتے ہیں۔

## انگلیوں کا ہتھیلی کی جانب کھینچ جانا

(Contraction- Duputrons)

سلفر (Sulphur): یہ دوا اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے لمبے عرصہ تک دینی چاہئے۔  
لیکیسی (Lachesis): جب یہ مرض درمیانی عصب کے باعث لاحق ہو۔

## قبل از وقت موت — (Death- Premature)

الفالفا (Alfalfa): بچے یا پروان چڑھے ہوئے لڑکے جو ویسے تو صحت مند ہوتے ہیں لیکن اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچنے پر مکمل مکمل کر مر جاتے ہیں۔ تقریباً چھ ماہ تک اس دوا کے مددگار کے دو قطروں کی خوراک دیجئے۔

سلفر، کلکیریا فاس (Calcarea Phos, Sulphur): اگر بچے شیر خوارگی کے دوران مر جائیں تو سلفر 6 اور کلکیریا فاس 6 روزانہ بدل بدل کر ایک خوراک دوران حمل ماں کو دی جائیں۔

واہیرنم پرونس (Viburnum Pru): جب بچے آٹھ ماہ کے بعد پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے کے بعد جلد ہی مر جائیں تو یہ ایک شاندار دوا ہوتی ہے۔ یہ آٹھویں ماہ کے اسقاط حمل کو بھی روکتی ہے۔ 1x طاقت کی دوا ماں کو تین وقت روزانہ تین ماہ تک کے لئے متوقع وضع حمل سے

پہلے دی جائے۔

## لاغری — (Debility)

(نیز دیکھئے ”تھکاوٹ“)

انڈول (Indol): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی غنودگی۔ کام کرتے کرتے مریض سو جاتا ہے۔ غنودگی کے ساتھ درد سر ہوتا ہے یا غنودگی کے ساتھ ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔  
بیلنس پیرینس (Bellis Perennis): تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ لیٹ جانے کی خواہش کے ساتھ نیز گنٹھیا یا جوڑوں کے درد کے حملے کے بعد لاغری میں بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔  
کارل سیڈ (Carlsbad): نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ کیکپاہٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔  
کیورارے (Curare): رطوبت کے ضائع ہو جانے سے اور عمر کی زیادتی سے لاغری ہوتی ہے۔

فارمیکا (Formica): ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے۔  
مرکب ڈل کس (Merc Dulcis): ڈھیلے اور پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ مردوں جیسی زردی ہوتی ہے۔ پیٹے بچے جن میں سر د کس کے غدد اور دیگر غدد کی سوجن ہوتی ہے۔  
نکس موسکاٹا (Nux Mosch): جائے کے ساتھ غنودگی ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی۔  
ٹیرنٹولا (Tarentula): کمزوری ہوتی ہے، سن ہو جاتا ہوتا ہے، بازوؤں اور ٹانگوں کی بے چینی، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ فالج ہوتا ہے۔ کیکپاہٹ ہوتی ہے۔ جھٹکے لگتے ہیں۔ جلد پر ریگنے اور کیزوں کے چلنے کا احساس ہوتا ہے۔  
سلیسینیم (Selenium): معمولی سی تھکاوٹ سے شدید کمزوری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً گرمی کے موسم میں، بیماری کے بعد بھی اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد بھی۔  
گریٹیولا (Gratiola): اعصابی نقاہت ہوتی ہے۔ نمایاں سستی ہوتی ہے جس کے ساتھ ذہنی اور جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): لاغر، مرجھائی ہوئی، جھریاں پڑی ہوئی، غیر صحت مند جلد نظر آتی ہے۔ اندرونی طور پر ہر طرف جلن ہوتی ہے لیکن جب اعضاء کو چھوا جائے تو وہ ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ خون رستا ہے جبکہ سوزش نہیں ہوتی۔ حلق سے، پیچھڑوں سے، مثانے سے اور اسمائے مستقیم سے خون رستا ہے۔ مریض کپڑے یا چادر وغیرہ اتار دیتا چاہتا ہے۔  
سرساپاریلا (Sarsaparilla): شراب اور عورتوں کی وجہ سے لاغری، مرجھاؤ اور کمزوری

لاحق ہوتی ہے۔ بچوں کی لاغری۔ چہرہ کے بوڑھے شخص کا دکھائی دینا ہے۔ پیٹ بڑا ہوتا ہے۔  
موروٹی آشک کے باعث بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔

**پکریک ایسڈ (Picric Acid):** جسمانی اور ذہنی دونوں حوالوں سے نقاہت ہوتی ہے۔ جسمانی  
تھکان درد سر اور بازوؤں و ٹانگوں میں درد کو لاتی ہے۔

**ناجا (Naja):** بہت زیادہ ناتوانی اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ صحن کا احساس ہوتا ہے۔ ذہنی اور  
جسمانی طاقتیں دب جاتی ہیں۔ کھلی ہوا میں چلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈے سے بہت  
زیادہ حساس ہوتا ہے۔ بہت دنوں اور راتوں کے لئے مریض بستر پر لیٹے رہنا چاہتا ہے۔ صرف  
ایک دن یا رات کا آرام اسے ناکافی محسوس ہوتا ہے۔ نقاہت ہوتی ہے، خصوصاً ٹانگوں میں۔  
چلنے وقت لڑکھڑاتا ہے۔

**سٹرکولیا (Sterculia):** یہ دوا بغیر غذا کھائے اور بغیر تھکاوٹ محسوس کئے طویل عرصہ تک  
جسمانی تھکان کو دور کر کے طاقت مہیا کرتی ہے۔ درختی پتھر کے 10 سے 12 قطروں کی ایک خوراک  
دیتے۔

**کاربووج (Carbo Veg):** دودھ پلانے کے باعث نقاہت اور لاغری لاحق ہوتی ہے۔ کسی  
بھی حاد مرض کے بعد لاحق ہونے والی لاغری کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے مثلاً 'انفلوئنزا'، 'اسہال'  
وغیرہ۔ ہر چار گھنٹوں کے بعد 200 طاقت کی دوا دیجئے۔ دن میں تین مرتبہ تقریباً دو ماہ تک اور  
پھر طاقت کو بڑھا کر 1M کر دیجئے اور روزانہ اگلے دو ماہ تک دیجئے۔

**کوکا (Coca):** یہ مقوی اور طاقت کا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ مریض گرمیوں کی گرمی  
برداشت کرنے کی زیادہ استعداد رکھتا ہے۔ بہ نسبت سردیوں کی ٹھنڈ برداشت کرنے کے۔  
**الیومینا (Alumina):** سارے جسم میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے۔ آہستہ لڑکھڑاہٹ والی چال  
چلتا ہے۔ بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے خصوصاً بولنے وقت۔ اعتدال سے زیادہ خشکی اور تھکاوٹ  
ہوتی ہے۔

**کیمفرا (Camphora):** نبض انتہا درجے کی سست ہوتی ہے جسے محسوس نہیں کیا جاسکتا اور  
گنا بھی نہیں جاسکتا بہت تیز ہوتی ہے۔ چہرے پر موت کی طرح کی زردی کے ساتھ سارے  
جسم میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ٹھنڈا چھپچھپا اور کمزور کر دینے والا پینہ آتا ہے۔ چہرہ زرد یا  
نیلاہٹ مائل ہوتا ہے۔ ہونٹ سبزی مائل نیلے ہوتے ہیں۔

**ایسڈ فاس (Acid Phos):** اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ ذہنی کمزوری کے بعد جسمانی کمزوری  
لاحق ہو جاتی ہے۔ پہلے دماغ ٹھکتا ہے۔ دماغ بھول جانے والا ہو جاتا ہے اور پھر جسمانی کمزوری  
نشوونما پاتی ہے۔ نامعلوم وجوہات کے باعث لاغری لاحق ہو۔

**میورٹک ایسڈ (Muriatic Acid):** یہ دوا ایسڈ فاس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس میں جسمانی کمزوری پہلے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ذہنی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

**الیومن (Alumen):** عضلات کی قافیہ کمزوری، قوت کا فقدان ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں۔

**نیٹرم میور (Natrum Mur):** کمزوری، لاغری، اعصابی نقاہت اور چڑچڑاہٹ ایسے مریضوں میں ہوتا ہے، جن کی جلد چمک دار، پیلی، موی اور ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے اس پر گریس ملی گئی ہو۔

**سٹینم میٹ (Stannum Met):** بڑھتی ہوئی کمزوری، جسمانی خلل، نزلہ وی کیفیات اور اعصابی درد برسوں سے لاحق ہوتے ہیں۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ کمزوری یا آواز دالی ٹالی کی قافیہ کمزوری کے باعث آواز کھو جاتی ہے۔

**الفالفا (Alfalfa):** یہ دوا چربی پیدا کرتی ہے اور نسیجوں کے ضیاع کو درست کرتی ہے۔ یہ اعصابی کمزوریوں، یوریمیا، اعصابی بد ہضمی، اعصابیت وغیرہ کا علاج کرتی ہے۔ تپ دق یا ذیابیطس کے باعث ہونے والی لاغری کا علاج کرتی ہے۔ 5 سے 10 قطرے مددِ نظیر روزانہ تین مرتبہ لیے عرصہ تک دیجئے۔

**کاربونیم سلف (Carbonium Sul):** نمایاں سستی اور لینے رہنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ خصوصاً جب مسکن شرابوں کے باعث ہو۔ کمزوری اور بیڑھیاں چڑھنے کے باعث دم گھٹتا ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے لیکن ہوا کے جھونکے سے ابتری ہو جاتی ہے۔

**آئیوڈیم (Iodium):** چلنے اور بہت زیادہ لیٹنے آنے کے باعث حتیٰ کہ معمولی محنت سے انتہا درجے کی تھکان ہو جاتی ہے۔ (کالی آئیوڈ کے مریض بغیر ٹھکے لیے فاصلے پیدل طے کر سکتے ہیں۔)

**کوکولس انڈ (Cocculus Ind):** دودھ پلانے کے بعد جسمانی اور ذہنی نقاہت لاحق ہوتی ہے۔ یہ دوا ایسے لوگوں کے لئے ہے جو فکر مند، پریشانی اور نیند کے بکھو جانے کے باعث ٹھکے ہوئے ہوں۔ جسمانی کمزوری فالج کی طرف لے جاتی ہے۔ مریض ذہنی یا جسمانی تکاؤ کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنے تمام افعال میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں۔

**ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid):** کئی سالوں کی کمزوری، قلت خون، لاغری ہوتی ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ درشتی سل ہوتی ہے۔ جلن دار پیاس ہوتی ہے اور پیشاب بافراط زرد رنگ کا خارج ہوتا ہے۔

**سنا (Senna):** تانسروجن کے بہت زیادہ ضائع ہو جانے کے ساتھ جب نظام ہی ٹوٹ پھوٹ

جائے تو ایسے میں لاحق ہونے والی لاغری کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ تھکاوٹ ہوتی ہے۔  
کھانوں کے بعد ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): ذہنی تھکاوٹ کے باعث لاغری۔

چائنا آف (China Off): مادوں کے زیادہ اخراج اور خون کے ضائع ہو جانے کے باعث لاحق ہونے والی لاغری۔ قلو، اسہال اور دوسری بیماریوں کے حملے کے بعد لاحق ہونے والی لاغری۔ مائع ضائع ہو جانے کے باعث مثلاً خون، منی اور اسہال وغیرہ کے باعث لاغری ہوتی ہے۔ مریض پیلا، بے وقوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی ہے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حاشیے ہوتے ہیں۔

ایلسٹریس ایف، ہیلونیاس (Helonias, Aletris F): رحم کے خروج کے باعث لاغری لاحق ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): ایلوپتھک دواؤں کے استعمال سے لاغری ہو جاتی ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): نفاہت ہوتی ہے۔ توانائی، طاقت، قوت وغیرہ کا فقدان ہوتا ہے۔ جسم اور دماغ کمزور، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ حرکت کرنے سے دھڑکن ہوتی ہے اور سانس میں دقت ہوتی ہے۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): ہمائوں کے بغیر سستی اور غنودگی ہوتی ہے۔ کالہی، ماندگی اور طبی سستی ہوتی ہے۔ مریض یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اچھا محسوس نہیں کرتا۔ لاغری اور سستی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): چونٹوں کے باعث، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور عضلاتی تھکن کے باعث لاغری لاحق ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): قلت خون کے باعث لاغری لاحق ہو۔

الیومینا سیلی کیٹ (Alumina Silicate): اعصابی نفاہت، ذہنی جوش کے باعث اور غصے اور تھکاوٹ کے باعث ہوتی ہے۔ غیر حاضر دماغی ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ مریض میزبیاں نہیں چڑھ سکتا، جیسے کہ اس کا جسم بہت بھاری ہو۔

سورینم (Psorinum): حاد امراض کے بعد لاغری لاحق ہوتی ہے۔ افسردگی ہوتی ہے۔ مریض ناامید ہوتا ہے۔ رات کو پسینے آتے ہیں۔ تمام قسم کے اخراجات سے بدبو آتی ہے۔ کانوں سے آنتوں سے، نیکوریا، پسینے اور بلغم وغیرہ سے بدبو آتی ہے۔



## دانت (نکلنے کا عمل) — (Dentition)

کیو میلا (Chamomilla): دانت نکالنے کی تکلیف کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ سبزی مائل اور بدبودار اسہال کے ساتھ بچہ چڑھا ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ سوڑھے سرخ اور نرم ہوتے ہیں۔ بچہ درد سے چلاتا ہے اور غذا لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ نیز پینے سے اور کھلونوں سے جب اسے فراہم کئے جائیں تو انکار کر دیتا ہے۔ کپڑے میں لپٹا رہنا پسند کرتا ہے۔  
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): دانت نکلنے میں سستی ہو یا جمل دانت نکلنے میں بہت زیادہ تیزی ہو۔ پچھلے دانت نکلنے میں جب سوڑھے پیلے اور چمک دار ہوں۔ ماتھے پر پینٹ اس دوا کی رہنما کن دوا ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): کمزور بچوں میں یہ دوا موزوں ہے۔ اس میں تالو کھلا ہوتا ہے اور دانت آہستہ آہستہ نکلتے ہیں اور دانت بہت تیزی سے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہڈی کے ریشوں میں کمی ہوتی ہے۔ دانت نکلنے کے دوران اسہال لاحق ہوتے ہیں۔  
کولوسنتھ (Colocynth): جب بچہ اپنی خوراک جلدی جلدی نگل جائے یا پھر اسے ناپسند کرتا دکھائی دے۔ ہوا بھری ہونے کے باعث پیٹ میں درد ہوتے ہیں۔  
پلساٹیل (Pulsatilla): جب بچہ شریف ہو۔ عمدہ قسم کا ہو۔ ڈرپوک ہو اور تھپتھپانے سے پرسکون ہو جائے۔

توبریکولینم (Tuberculinum): لاغر بچوں کے لئے جبکہ ذہنی اور جسمانی نشوونما رک گئی ہو۔ کمزوری کے باعث دانت ظاہر نہیں ہوتے۔  
فائی ٹولاکا (Phytolacca): جب بچہ دانت اور سوڑھے کاٹتا ہو۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب دانت نکلنے میں تکلیف ہو اور مشکل سے دانت نکلتے ہوں تو یہ ایک عمدہ دوا ہوتی ہے۔ سوڑھے اسٹفھی اور پردرد ہوتے ہیں۔ جب دانت اس حالت میں ظاہر ہوں کہ ان پر چبھی کے نشانات نظر آئیں۔ بے چینی اور ہلے رہنا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے اور غیر منظم غذا ادا لے پاخانوں کے اسہال ہوتے ہیں۔

زنگم میٹ (Zincum Met): وقت کے ساتھ دانت نکلنے کے دوران سوڑھوں کو آپس میں دبائے کا رجحان ہوتا ہے یا دانت پینے کا رجحان ہوتا ہے۔ دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور سوڑھوں سے خون بہتا ہے۔

## زیابیطس — (Diabetes)

ایٹک الیٹڈ (Acetic Acid): شکر کے ساتھ یا شکر کے بغیر بافراط پانی کی طرح کا میٹاب

آنے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہوتی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔ پیلا پن ہوتا ہے اور گوشت کم ہو جاتا ہے۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vaco Defl): بہت زیادہ پیاس کے ساتھ باافراط پانی کی طرح کا پیشاب ہوتا ہے۔ گاڑھا پیشاب بھی باافراط ہوتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔ قلت خون ہوتی ہے۔  
آر سیکیم بروم (Arsenicum Brom): قبض اور پیاس کے ساتھ ذیابیطس کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ 1x ڈائی یوشن کی صورت میں تین قطروں کی خوراک دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

تھائی رائیڈین (Thyroidin): جب علامات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اور بے انتہا کمزوری کے ساتھ ظاہر ہوں تو ذیابیطس کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): اعصابی مریضوں میں ذیابیطس، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ دودھیا رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں شکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ تھکات ہوتی ہے اور عضلات میں خراش کا احساس ہوتا ہے۔ غم، انسوس اور پریشانی کے باعث لاحق ہونے والی ذیابیطس۔ اس دوا سے ذیابیطس کے ابتدائی مراحل میں یقینی علاج ہوتا ہے۔ اس میں پھوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔

سائی زیمیم (Syzygium): یہ دوا ذیابیطس اور خونی ذیابیطس میں بہت پر اثر سمجھی جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے اور پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ یہ مخصوص دوا ہے۔ اس دوا کے مدر ٹیچر کے 5 سے 10 قطرے ہر تین گھنٹے کے بعد دن میں چار مرتبہ دیجئے۔

یورینیم نائٹ (Uranium Nit): قوت جاذبہ میں خرابی کے باعث ذیابیطس لاحق ہو۔ نظام ہضم کمزور ہو جاتا ہے۔ سستی ہوتی ہے۔ لاغری ہوتی ہے اور پیشاب میں بہت زیادہ شکر ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ کی خرابی کے باعث لاحق ہونے والی ذیابیطس میں اس دوا کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یوریا کی کثرت ہوتی ہے اور زبان خشک ہوتی ہے۔ زبان کی خشکی اور شدید بھوک ہوتی ہے حتیٰ کہ جب معدہ بھرا ہوا ہو تب بھی۔

ار جینٹم میٹ (Argentum Met): نینچے سوچے ہوئے ہونے کے ساتھ اگر ذیابیطس ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

ار جینٹم نائٹ (Argentum Nit): پیشاب میں شکر کے ساتھ پیشاب اعتدال سے زیادہ آتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): گنٹھیا کے مریضوں میں ذیابیطس، جلد کی خشکی کے ساتھ۔

سارے جسم میں خارش ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ جمائیاں آتی ہیں اور افسردگی ہوتی ہے۔ ہر گھنٹے میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔

**لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid):** گنٹھیا کے ساتھ ذیابیطس۔

**تھوجا (Thuja):** سوزاک میں جٹلا مریضوں میں ذیابیطس۔ اعصابیت ہوتی ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ بعض اوقات دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ پیشاب میں شکر ہوتی ہے۔

**گلیسرین (Glycerine):** کمزوری، درد سر، ضیق النفسی، ایسی ٹون کے ساتھ پیشاب میں شکر آنے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہوتی ہے۔ البیومن یا مھلیوں کے ساتھ یا ان کے بغیر اور گنٹھیا کے ساتھ یا اس کے بغیر لاحق ہونے والی ذیابیطس۔

**پکریک ایسڈ (Picric Acid):** شدید پیاس اور باافراط پیشاب رات کے وقت خارج ہونے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔

**موسکس (Moschus):** نامردی کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔

**ٹیریکسی لم (Taraxacum):** پیشاب کی حاجت کے ساتھ ذیابیطس ہوتی ہے۔ پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

**البومن (Alumen):** ضدی قسم کی قبض کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔ پاخانے چپٹے اور پتلے ہوتے ہیں۔ مکمل طور پر آنتوں کے خالی ہونے کے لئے بہت وقت لگتا ہے۔

**چوئنٹھس ویر (Chionanthus Virg):** ذیابیطس سے پہلے کا مرحلہ اور ذیابیطس کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ ایسے مریضوں میں جو جگر کے امراض میں مبتلا ہوں۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صفراوی مادوں اور گلوکوز کی موجودگی کے ساتھ گہرے رنگ کا پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا انسولین کی مزاحمت کرتی ہے۔

**البومینیم میٹ (Aluminium Met):** غنودگی کے ساتھ ذیابیطس والی بے ہوشی میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ مریض لوگوں کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا یا سوالات کے جوابات دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ قبض ہوتی ہے لیکن پیشاب خارج ہوتا ہے اور بلا ارادہ خارج ہوتا ہے۔ 200 ڈالری لیوشن کی صورت میں دیجئے۔

**کاربوانٹیلس (Carbo Animalis):** بہت زیادہ پیاس اور بار بار پیشاب خارج ہونے کے ساتھ فربہ مریضوں میں ذیابیطس لاحق ہو۔ اچھارہ اور قبض موجود ہوتی ہے۔

**آرسینک البم (Arsenic Alb):** یہ ایک عمدہ دوا ہے لیکن ذیابیطس کے علاج میں معالجین نے اسے بہت زیادہ نظر انداز کیا ہے۔ اس میں جلد بھر بھری، چھلکوں والی خشک ہوتی ہے۔ منہ خشک ہوتا ہے۔ زبان اور سانس کی نالی میں خشکی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ نہ بچھنے والی پیاس

ہوتی ہے۔ بھوک کھو جاتی ہے اور قبض ہوتی ہے۔ پیٹ میں جلن کا احساس ہوتا ہے جو منہ تک پھیل جاتی ہے۔ مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے اور بعض اوقات دانت نکل جاتے ہیں۔ مریض نازک طبع ہوتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ ہر چیز مناسب جگہ پر رکھنا چاہتا ہے۔

کینتھرس (Canthris): البیومن کے اخراج کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔

کاربودیج (Carbo Veg): صبح سویرے منہ میں بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے۔ اعتدال سے بڑھی ہوئی پیاس اور بھوک ہوتی ہے۔ جگر میں درد ہوتا ہے جیسے کہ وہ زخمی ہو۔ اچانک کمزوری اور غشی ہوتی ہے۔ جسمانی افسردگی اور سستی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): جگر پر گھونسا لگنے کے باعث ذیابیطس لاحق ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

نکس دامیکا (Nux Vom): بے ہوشی اور پکر آنے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔ کانوں میں جھنجھٹ ہوتی ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ دماغ اور حرام مغز کی تکالیف کے باعث ہوتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): ذیابیطس میں صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ گنٹھیا اور جوڑوں کا درد لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لاغری اور عمومی نقاہت ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں پھرن ہوتی ہے۔ جوڑوں میں فالجی کمزوری ہوتی ہے۔ بے خواب راتوں کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): قبض کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔ پیشاب میں البیومن اور بھلیاں ہوتی ہیں۔

فسفورس (Phosphorus): یہ دوا ذیابیطس اور لبلبے والے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ خصوصاً آپ دن یا گنٹھیا کے مزاج والے مریضوں میں۔ بے چینی ہوتی ہے اور منہ کی خشکی لاحق ہوتی ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں 4 سے 5 ہنٹ کی مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

رٹانہیا (Ratanhia): ذیابیطس میں پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

پچیدہ بچے — (Difficult- Child)

کیمومیل (Chamomilla): مضطرب، بے چین، بے صبرے بچے لیکن جب انہیں اٹھایا جائے تو مطمئن اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک چیز کی شدید خواہش کرتے ہیں لیکن جب وہ

فراہم کی جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں اور کوئی دوسری چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں ناقابل برداشت درد اور حساسیت اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔

**اگنیشیا (Ignatia):** اعصابی اعتدال سے زیادہ جذباتی، مانگولیائی اور اداس بچے، خاموشی میں غم کا رجحان ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد موسمی ہوتی ہے۔ بلا ارادہ آہیں بھرتے ہیں۔ مسلسل جمانیاں لیتے رہتے ہیں اور بلاوجہ روتے رہتے ہیں۔ دماغی افسردگی ہوتی ہے یا ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔

**پلساٹیلہ (Pulsatilla):** غیر متوازن، بدلتا رہنے والا مزاج، ڈرپوک اور جذباتی مریض۔ بچے بلاوجہ روتا ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ مسکراتا ہے۔ ذہنی تھکان ہوتی ہے۔ غیر حاضر دماغی ہوتی ہے۔ ارادے کا کچا، پریشان اور ناشکرا ہوتا ہے۔ صنف مخالف سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔ پیاس کی کھل طور پر عدم موجودگی ہوتی ہے۔ کیل مہاسے نکلتے ہیں۔

**سپیا (Sepia):** غمگین، کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ہر چیز سے یک سو ہوتا ہے۔ کھیل ہویا انعام ہو یا کوئی نمایاں پوزیشن ہو وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا۔ کوئی چیز اسے دلچسپ نہیں لگتی اور کوئی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔ کم حوصلہ ہوتا ہے اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ایک کونے میں جا کر خاموشی سے رو لیتا ہے۔ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ ناک پر زرد دھبے ہوتے ہیں۔ سر کے کی خواہش ہوتی ہے۔ گوشت سے نفرت ہوتی ہے۔ دودھ ہضم نہیں کر سکتا۔

**آئیوڈیم (Iodine):** لالچی، چڑچڑاہٹ اور ٹھنڈا نہ رہ سکے۔ بیٹھ بھوکا رہتا ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ خوب کھانے کے باوجود بڑی تیزی سے دبلا ہوتا رہتا ہے۔ غدود سے رطوبات کا غیر ضروری اخراج ہوتا ہے مثلاً تھائیرائیڈ، بھل کے غدود، ماساریتی غدود اور جاتگہ کے غدود وغیرہ۔

**ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph):** شرارتی (شیطان قسم کا) بچہ۔ غلط کام کرنے کی تحریک ہوتی ہے مثلاً مارنے کی، آگ وغیرہ لگانے کی۔ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بیٹھ جگہ بدلتا رہتا ہے۔ غیر صحت مند جلد ہوتی ہے۔ خراش دار پیمند باافراط خارج ہوتا ہے۔

**اناکارڈیم (Anacardium):** تحریکی بچہ، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جن کا ادب کرتا ہے ان سے کبھی متفق نہیں ہوتا۔ جانتا ہے کہ ایسا ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتا۔ سنجیدہ مواقع پر ہنستا ہے اور معمولی باتوں پر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پریشان، چڑچڑاہٹ، بد معاش، قسمیں کھانے والا اور لعنتیں بھیجنے والا کھانے کے بعد بہتر ہو جاتا ہے۔

**لائکوپوڈیم (Lycopodium):** غصیلا، انتہا درجے کا چڑچڑاہٹ اپنا مدعا پر تشدد الفاظ میں بیان کرے۔ اچانک پھٹ پڑتا ہے اور اسے خود پر قابو نہیں رہتا۔ خود اعتمادی کھو جاتی ہے۔ ذمہ داریوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ جاگنے پر بد مزاج ہوتا ہے۔ یادداشت کھو جاتی ہے۔ لکھتے وقت حروف بھول جاتا ہے۔ اپنا مدعا بیان کرنے کے لئے اسے مناسب الفاظ نہیں مل سکتے۔

**کاسٹیکم (Causticum):** ڈرپوک، غیر نشوونما یافتہ بچہ، دیر سے چلنا ہے اور دیر سے بولنا ہے۔ شام کی ملگجی روشنی میں پریشان اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ بچہ بستر پر نہیں جاتا۔  
**سین کیولا (Sancula):** ضدی، مضبوط سردالا بچہ۔ بڑھتی ہوئی کمزوری کے ساتھ بچہ گندہ، عمر رسیدہ اور میلا دکھائی دیتا ہے۔ گردن کے قریب جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہے اور جلد تھوں میں ٹھکنے لگتی ہے۔

**ار جینٹم ٹائٹ (Argentum Nit):** بچہ سکول جانا پسند نہیں کرتا۔ اس دوا کو 30 ڈائی لیوشن کی صورت میں دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے سکول جانے کی عادت بن جائے گی۔  
**سلفر (Sulphur):** مخمور بچہ، مسلسل دم، 'ایگزیمیا'، صبح کے اسہال، بے خوابی اور کمزوری میں مبتلا رہتا ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جسمانی مشقت سے نفرت ہوتی ہے۔ نہانے اور دھونے سے نفرت ہوتی ہے۔ جلن ہوتی ہے۔

### خواب — (Dreams)

(نیز دیکھئے "برے خواب")

**نکس وامیکا (Nux Vom):** حادثات کے خواب مریض کو نیند سے بیدار کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مادہ منویہ کے اخراج کے ساتھ ہر تیسرے یا چوتھے روز جنسی خواب آتے ہیں۔ علیحدہ کوٹے میں بیٹھ کر کڑھتا ہے۔ کافی یا شراب پینے کے خواب آتے ہیں۔  
**پلساٹیل (Pulsatilla):** کالی بلاؤں کے خواب، بائیں جانب لیٹنے سے دل میں اور پھیپھائی میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

**مرکیوریس (Mercurius):** جانوروں کے خواب آتے ہیں۔

**مگنیشیا میور (Magnesia Mur):** جب مریض دوران نیند باتیں کرے اور چلائے۔ پریشانی والے خواب۔

**رشاکس (Rhus Tox):** ٹائیفائیڈ میں کاروبار کے خواب آتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے کے خواب آتے ہیں۔

**ڈیپھنی (Dephne):** کالی بلیوں کے خواب آتے ہیں۔

**چیلی ڈونیم (Chelidonium):** جنازوں کے خواب آتے ہیں۔

**تھوجا (Thuja):** مردہ لوگوں کے خواب آتے ہیں۔ خوابوں کے ساتھ غیر آرام دہ نیند ہوتی ہے۔ بلندی سے گرنے کے خواب ہوتے ہیں۔ جنگلوں کے خواب ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ حفاظتی ٹیکے تواتر کے ساتھ لگوانے کے باعث ہوتا ہے۔ IM ڈائی لیوشن کی صورت میں دوا

دیجئے۔

**سلفر (Sulphur):** یہ خواب آتے ہیں کہ ایک کتا اسے کاٹ چکا ہے۔ مریض خواب میں پیشاب والی جگہ پر بیٹھتی ہے لیکن حقیقت میں بستر والی جگہ کو گھبرا کر دیتی ہے۔

**بیلادونا (Belladonna):** آگ کے خواب آتے ہیں۔

**کالی کارب (Kali Carb):** بھوتوں کے خواب آتے ہیں۔ مریض تصور آتی ہوتا ہے۔ بد قسمتی کے خواب آتے ہیں۔

**کیمفر (Camphor):** روحوں کے خواب آتے ہیں۔

**سیلیشیا (Silicea):** قتل کے خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں، لاشوں کے اور مردہ لوگوں کے

خواب آتے ہیں۔ زہر دیئے جانے کے خواب آتے ہیں، دم گھٹنے کے خواب آتے ہیں۔ چوروں

کے گھر میں گھس جانے کے خواب آتے ہیں جس سے نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ IM ذائقہ

لیوشن کی صورت میں دیجئے۔

**کریو زوٹ (Kreosote):** بڑے منہ ب انداز میں مریض، خواب میں پیشاب کرتا ہے اور

حقیقت میں بستر کو گھبرا کر دیتا ہے۔

**گلوٹائن (Glonoine):** آنسوؤں کے ساتھ رونے کے خواب، خوفناک قسم کے خواب۔

**برائی اونیا (Bryonia):** پریشان کن اور کاروبار میں پُر احتیاط توجہ دینے کے خواب تمام رات

آتے ہیں۔ گھریلو کاموں میں منہمک رہنے کے خواب آتے ہیں۔

**لیک کینیئم (Lac Caninium):** سانپوں کے خواب، پیشاب کرنے کے خواب اور حادثے کو

روکنے کے لئے تیزی کرنے کی خاطر جاگ بائے۔

**چائنا آف (China Off):** زندہ کیڑوں کی قے کے متواتر خواب آتے ہیں۔

**پیکرک ایسڈ (Picric Acid):** مریض خواب دیکھتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔

**آرنیکا ایم (Arnica M):** ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بھیانک خواب آتے ہیں۔ کچھڑ والے

پانی، لیروں وغیرہ کے خواب آتے ہیں۔ رات کے وقت خوف آتا ہے۔

**جیہوراندی (Jaborandi):** حادثوں اور لڑائیوں کے خواب آتے ہیں۔

**اریک تھاٹس (Erechthites):** ننگے پن اور شرم کے خواب آتے ہیں۔

**مگنیشیا کارب (Mag Carb):** آگ، خون، لیروں، جھگڑوں، روپوں، خوشیوں، بد قسمتیوں،

مردہ لوگوں کے خواب آتے ہیں۔

**کوکولس (Cocculus):** نادیدہ چیزوں کے خوفناک خواب آتے ہیں۔ یہ نادیدہ چیزیں آنکھیں

بند کرنے پر مریض کے اوپر بھینتی ہیں۔



**اگنیشیا (Ignatia):** ایک ہی موضوع پر تمام رات خواب آتے ہیں۔  
**نیٹرم میور (Natrur Mur):** ڈاکوؤں، قاتلوں، چوروں اور آگ کے خوفناک خواب آتے ہیں، بطن دار پیاس کے خواب آتے ہیں۔  
**ایلو (Aloe):** پاخانہ کرنے کے خواب آتے ہیں۔  
**کروٹیلس ہور (Crotalus Hor):** قتل کے دہشت ناک خواب آتے ہیں، موت کے لاشوں کے اور مرے ہوئے لوگوں کے خواب آتے ہیں۔ موت اور لاشوں سے متعلق خواب آتے ہیں۔ قبرستان میں ہونے کے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ لاشوں کی بو بھی خواب میں محسوس ہوتی ہے۔ مریض خوف کے باعث نیند سے جاگ جاتا ہے۔  
**لیکسیس (Lachesis):** عجیب و دم غریب خوابوں اور دم کھٹنے کے حملوں سے بہت دیر تک سونے کے بعد نیند میں خلل پڑ جاتا ہے۔  
**نیٹرم سلف (Natrur Sulphur):** لڑائی کے خواب آتے ہیں۔  
**نیٹرم فاس (Natrur Phos):** بہت زیادہ خواب دیکھنے والا۔ پریشانی کے، ماتم کے، مردہ لوگوں کے، رنجیدگی کے، گزرے ہوئے واقعات کے، آگ کے، خوفناک، برے خواب، خوشی کے، پریشانی کے، واضح قسم کے خواب آتے ہیں۔  
**فیرم آیوڈینم (Ferrum Iodatum):** چوروں کے خواب۔

### بونا پن — (Dwarfishness)

(نیز دیکھئے "پس ماندہ")

**ٹیوبرکولینم (Tuberculin):** یہ دوا اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن میں دینی چاہئے جو 200 سے کم نہیں ہونا چاہئے۔ تواتر کے ساتھ اسے نہیں دہراتا چاہئے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیجئے۔

**سفی لینم (Syphilinum):** ٹیوبرکولینم کے متبادل میں یہ دوا دیجئے، (ٹیوبرکولینم اور سفی لینم 200 یا 1000 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر ہفتے یا پندرہ دن کے بعد ڈائی لیوشن کی طاقت کے مطابق بدل بدل کر دیجئے۔ یہ بمولے پن کا علاج کر دیں گی۔)

**برٹا میور (Baryta Mur):** رکی ہوئی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ 200 ڈائی لیوشن دیجئے۔ ٹیوبرکولینم دینے کے ایک ہفتہ بعد اسے استعمال کیجئے۔

**ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum):** پیلاہٹ مائل سبز اسہال کے ساتھ رکش (سوکھا مسان) میں یہ دوا 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دیجئے۔



سلفر، کلکیریا فاس (Sulphur, Calcareia Phos): اگر بچے شیرخوارگی میں انتقال کر جائیں تو دوران حمل مدد چھ سلفر 6 اور کلکیریا فاس 6 روزانہ ایک خوراک بدل بدل کر دیجئے۔  
 زیرو فائلم (Xerophyllum): غبی، تعلیم پر توجہ نہ دے سکے۔ نام بھول جائے، لفظ کا آخری حرف پہلے لکھ دے۔ عام لفظوں کے حروف بھول جائے۔

بریٹا کارب (Baryta Carb): جسم اور دماغ کا بونا پن، دماغی یا اعضا کی پسماندگی، بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں حالانکہ ان کے بازو اور ٹانگیں طاقت ور ہوتی ہیں۔ دیر سے باتیں کرنا یا سمجھنا سیکھتے ہیں۔ ایک عضو پروان چڑھنے میں تاخیر ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے اعضاء کی نشوونما ہوتی رہتی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بچہ بزدل اور شرمیلا ہوتا ہے جس کے ساتھ اجنبیوں سے خوف کھاتا ہے۔ جیسے ہی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے خود کو چھپا لینا چاہتا ہے۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے اور انگلیوں کے بیچ میں سے شرابے ہوئے جھانکتا ہے۔ سن بلوغ کو پہنچنے پر لڑکیاں ایسی حرکات کرتی ہیں جیسی ایک بچہ کرتا ہے اور بچوں والا رویہ اپنالتی ہیں اور گڑبازوں سے کھیلتی ہیں۔

نٹرم میور (Natrium Mur): بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں۔  
 کلکیریا کارب (Calcareia M): بچے دیر سے چلنا اور بولنا سیکھتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں اور بازو کمزور ہوتے ہیں۔ دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ تالو آہستہ آہستہ ملتا ہے۔ سوکھا مسان اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا پایا جاتا ہے۔

اگیریکس ایم (Agaricus M): بچے دیر سے بولنا اور چلنا سیکھتے ہیں۔  
 الفالفا (Alfalfa): بچے یا پروان چڑھے ہوئے لڑکے جو ویسے تو صحت مند ہوتے ہیں لیکن اٹھارہ سال کی عمر میں گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ اس دوا کے مدد چھ کے دو قطروں کی خوراک چھ ماہ تک دیجئے۔

کلکیریا فاس (Calcareia Phos): یہ دوا لمبے، کمزور، پیلے اور بہت بڑے ہاتھوں والے بچوں میں بھولے پن کی نشاندہی کرتی ہے۔ تالو بڑا ہوتا ہے۔ کھلا اور باہر کو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ جڑے کی ہڈیاں پگی ہوتی ہیں اور دباؤ سے کڑکڑاتی ہیں جیسے کہ پتلا شوہر ہوتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): ریزھ کی ہڈی میں ہتھی تہلیلوں کے باعث جسم کی بناوٹ خراب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور ٹانگیں نشوونما نہیں پاتیں۔ وہ بڑھاپے کی سنگرین کی طرح گر بھی جاتے ہیں۔

## ضیق النفسی — (Dyspnoea)

(نیز دیکھئے ”دم“ ”دل“ اور ”کالی کھانسی“)

ناجا (Naja): دم گھٹنے کے ساتھ چھاتی میں دباؤ ہوتا ہے اور سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔  
کلورالم (Chloralum): انتہا درجہ کی ضیق النفسی ہوتی ہے۔ چھاتی پر وزن اور چھاتی میں کھنچاؤ کے ساتھ ”بے خوابی کے ساتھ دم لاحق ہو۔

نکس وامیکا (Nux Vom): ہیٹ میں ہوا جمع ہو جانے کے باعث ضیق النفسی ہوتی ہے۔  
نٹرم میور (Natrium Mur): جاڑا کے ساتھ سانس کا نہ آنا اندرون خانہ بہتری ہوتی ہے اور باہر چلنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تھکان سے ابتری ہوتی ہے۔

کاربووتج (Carbo Veg): سانس میں تنگی ہونے پر مریض پگھلا کرنے کو پسند کرتا ہے۔  
سڈرون (Cedron): مجامعت کے دوران ضیق النفسی ہوتی ہے۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): مجامعت کے اختتام کو پہنچتے پہنچتے ضیق النفسی ہو جاتی ہے۔  
آرسنک آلم (Arsenic Alb): المیومن کے اخراج کے ساتھ ضیق النفسی لاحق ہو۔

ایپس ایم (Apis M): دماغی بھلیوں میں پانی آ جانے کے باعث ضیق النفسی لاحق ہو۔  
پٹرولیم (Petroleum): سارا دن شدید قسم کی ضیق النفسی رہتی ہے۔  
گلونائین (Glonoine): لو لگ جانے سے ضیق النفسی ہوتی ہے۔ المیومن کا اخراج بھی موجود ہو سکتا ہے۔

لیکیسیس (Lechesis): دوران نیند دم گھٹ جاتا ہے۔ یا جاگنے پر مریض سانس کے لئے جھپٹتا ہے۔ شراب نوشی کے بعد ضیق النفسی ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): معمولی غذا کھانے سے ضیق النفسی ہو جاتی ہے۔  
امونیا کارب (Ammonia Carb): تھکاوٹ اور کمزوری کے باعث لیکن بغیر کسی افعالی یا نامیاتی خرابی کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دم کے بغیر ضیق النفسی، معمولی حرکت سے ضیق النفسی ہوتی ہے۔ گرم کمرے میں ابتری ہوتی ہے اور ٹھنڈی کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔

کاربونیم سلف (Carboneum Sulph): تیز یا مشکل تنفس، شراب (الکوحل) یا کونکے کی گیس کے باعث ضیق النفسی ہوتی ہے۔ شام کے وقت یا بلندی پر چڑھتے ہوئے ابتری ہوتی ہے۔ بند کمرے میں ابتری ہوتی ہے۔ جب کھانے کے بعد کھانسی ہو تو ابتری ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔

گرافائٹس (Graphites): جب مریض سو جائے تو دم گھٹنے لگے اور رات کے وقت سانس کے لئے ہانپتے ہوئے بیدار ہو جائے۔

ایس پی ڈوسپیرما (Aspidosperma): عارضہ قلب کے باعث ضیق النفسی ہو۔ پیچھے پڑے کی شریان میں خون جم جاتا ہے۔ عارضہ بول کے باعث ضیق النفسی۔ یہ دوا خون میں آکسیجن کا اضافہ کرتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): ٹھکنے پر ضیق النفسی ہو جائے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): آرام کے دوران تنگی تنفس میں مبتلا ہوتی ہے۔ دھیمی آہستہ اور خاموش حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ تیز حرکت سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سورینم (Psorinum): بیٹھنے سے ضیق النفسی میں بہتری ہو، بازو کھول کر پورے بستر پر پھیلا کر لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ جب بازو جسم کے قریب لائے تو بہتری ہو جائے۔

میڈوہرینم (Medocherrinum): سانس کی نالی کے منہ کا تشنج لاحق ہوتا ہے۔ ہوا باہر نکالنے میں دقت ہوتی ہے جبکہ اندر لے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ چہرے کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

اکوناٹم فیروکس (Aconitum Ferox): ضیق النفسی اس درجہ کو جا پہنچتی ہے کہ مریض کو سانس لینے کے لئے آدھا اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے اس طرح سے کہ اس کے دونوں ہاتھ سر کو تھامے ہوتے ہیں یعنی سر ہاتھوں پر رکھا ہوتا ہے۔

### بجلی کے جھٹکے (Electric Shocks)

ایلن تھرس (Ailanthus): بجلی کی رو سے بازوؤں اور ٹانگوں تک اندر سے گزرتی محسوس ہوتی ہے۔

یوفوربیم (Euphorbium): بجلی کے جھٹکے لگنے جیسا درد ہوتا ہے اور مریض اچھل کر بستر سے باہر آ جاتا ہے۔

سٹرائکنک (Strychninum): جب مریض لیٹا ہوتا ہے تو جب اسے چھوا جائے یا جب اس کے بستر کو چھوا جائے تو اسے بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مریض موٹر کار میں ہو تو اسے چھونے سے بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں۔

بیریم سلف (Barium Sul): سر میں بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں۔ کہنیوں میں لہریں اٹھتی ہیں۔ نوٹ: اگر بجلی لگنے کا حادثہ پیش آجائے تو ایسی شوگر آف ملک جس میں سے بجلی کی رو گزاری گئی ہو، مریض کو دینی چاہئے۔

دبلاپا — (Emaciation)

(دیکھئے ”سوکھامسان“ اور ”جھریاں“)

شریانوں میں خون کے لو تھڑے — (Embolism)

کیکٹس جی (Cactus G): جب خون کے لو تھڑے پھاتی سے آتے ہوں تو یہ دوا خون کے لو تھڑوں کے بار بار بننے کے عمل کو روک دیتی ہے۔ مریض ہذباتی اور اعصابی ہوتا ہے۔ تیز گولی لگنے جیسی اور دم گھٹنے جیسی لہریں ہوتی ہیں۔ چلنے سے یا بائیں کروٹ لینے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھنچاؤ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فولادی ہاتھ بھینچ رہا ہو۔

زنم فاس (Zincum Phos): بافراط جریان خون کے باعث دماغی ابتری لاحق ہوتی ہے۔ یہ جریان خون مری کے دوروں کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں اور اس کی وجہ پرومائیڈز کا غلط استعمال ہوتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): جب دماغی ابتری شراب (الکوحل) اور تمباکو کے استعمال کے باعث لاحق ہو۔

کالچیکم (Colchicum): سارے جسم میں دردوں کے ساتھ دماغ کی نرمی لاحق ہو۔ قوت شامہ میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔

تھکاوٹ — (Fatigue)

(نیز دیکھئے ”لاغری“)

جنسنگ (Ginseng): یہ دوا قوت کے خوش کن احساس کو پیدا کرتی ہوئی تھکاوٹ کے احساس کو دور کر دیتی ہے نیز بازوؤں اور ٹانگوں میں لچک پیدا کر دیتی ہے اور دماغ کو سانس شفاف کر دیتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): حد اعتدال سے زیادہ محنت کے باعث تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ مشقت طلب کھیل کھیلنے سے تیز چلنے سے اور بھاری وزن اٹھانے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ چیلیدونیم (Chelidonium): معمولی مشقت سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ حرکت سے نفرت ہوتی ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ یادداشت اور دلیل دینے کی قوت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوا کاروباری لوگوں، طلباء، قارئین اور مفکرین کے لئے اچھی دوا ہے۔ چلنے کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): تھوڑی دور تک چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔  
 سیپیا (Sepia): تھوڑی دور تک چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے یا معمولی مشقت سے تھکاوٹ ہو جائے۔  
 پیکرک ایسڈ (Picric Acid): معمولی مشقت سے تھکاوٹ ہو۔  
 سٹرکولیا (Sterculia): کسی بھی وجہ سے تھکاوٹ ہو تو یہ دوا دی جائے۔ خوراک پانچ قطرے درنچھردن میں دو مرتبہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد دیجئے۔

### انگلیوں کا سن ہو جانا (Fingers Numbness)

نیفرم میور (Nat. Mur): اعصابی کمزوری کے باعث مریض چیزیں گرا دے۔  
 میگزیریم (Megerium): ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا۔  
 کالی بروم (Kali Brom): مریض کچھ پکڑ رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جلدی سے چیزیں نیچے رکھ دیتا ہے یا انہیں گرنے دیتا ہے۔

### ہڈیوں کا ٹوٹ جانا (Fractures)

آرنیکا (Arnica): ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد یہ دوا فوری طور پر دینی چاہئے لیکن ہڈی کو اپنی جگہ بٹھانے کے لئے مریض کو جراح کے پاس لے جانا چاہئے۔ پہلے بارہ گھنٹوں یا کم و بیش وقت کے لئے یہ دوا 1000 ڈائی لیوشن ہر چار گھنٹے کے بعد دینی چاہئے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل ادویات ہڈی کے جلد جڑ جانے کے لئے دی جائیں۔  
 کلکیریا فاس (Calcarea Phos): یہ دوا 6x ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر دو گھنٹے کے بعد دن میں چھ مرتبہ روزانہ ایک ہفتہ تک دی جاسکتی ہے۔  
 سمفیٹم (Symphytum): یہ دوا کلکیریا فاس 6x کے تبادلے میں دی جاسکتی ہے۔ ایک ہفتہ تک کلکیریا فاس دی جاسکتی ہے اور اگلے ہفتہ کے دوران سمفیٹم 3x دی جاسکتی ہے۔  
 روٹا (Ruta): ٹوٹی ہوئی ہڈی کے الگ ہو جانے کے بعد یہ دوا بہت قابل قدر ہے جو سختی اور نکلنے پر پن کے لئے دی جاتی ہے۔ 1x ڈائی لیوشن کی صورت میں یہ دوا دی جاسکتی ہے اور رٹاکس 30 کے ساتھ بدل بدل کر ایک ایک ہفتہ کے لئے دی جاسکتی ہے۔  
 اگنیشیا (Ignatia): المناک ہڈیان، تمکینی، سکیپاٹ، پھڑکن، شور برداشت نہ ہو سکے، گھٹنی ہوئی اور بے چینی والی نیند اور درد سے بڑھی ہوئی حساسیت۔  
 رٹاکس (Rhus Tox): جب ہڈیوں کو باندھنے والے پٹھے (Ligaments) پھٹ جائیں اور

مریض گنٹھیاوی مزاج کا ہو جائے۔

**لیکیسس (Lachesis):** بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ مریض باتونی، چلبلا اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔ بے چینی کے ساتھ مریض بے قرار ہوتا ہے۔ ان علامات کے لئے اس دوا کو آرنیکا اور گلکیریا فاس کے ذریعے ٹوٹی ہوئی ہڈی میں بہتری آجانے کے بعد دی جاتی ہے۔

**گلکیریا کارب (Calcarea Carb):** قریب اشخاص میں ہڈی کے اس طرح سے ٹوٹ جانے کے لئے جس میں ہڈی ایک طرف سے ٹوٹ کر مڑ جاتی ہے، یہ دوا دی جائے۔ اس کے ساتھ یہ علامات بھی ہوتی ہیں۔ ہیٹ کی سوچن اور سر پر پسینہ۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

### پھپھوندی — (Fungus Affections)

**لیکیسس (Lachesis):** گرم پسینے کے ساتھ نیلاہٹ مائل اور غوائی پھپھوندی ظاہر ہوتی ہے۔ نیلاہٹ مائل اور غوائی کناروں کے ساتھ ناسور ہوتے ہیں۔

**فاسفورس (Phosphorus):** پھپھوندی اور چھوٹے ناسور جن سے بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ تھو جا، آرسینک الیم (Thuja, Arsenic Alb): اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو دی گئی ترتیب کے مطابق ان ادویات کو آزمایا جاسکتا ہے۔

### ملفوف رسولی — (Ganglion)

روٹا، بیسنزوک ایسڈ، سیلیشا (Ruta, Benzoic Acid, Silicea): کلائی کی پشت پر۔

### فساد نیچ — (Gangrene)

**آرسینک الیم (Arsenic Alb):** بوڑھے لوگوں میں خشک فساد نیچ (مٹکیرین) سوزشی دکھن اور جلن میں گرمی سے افاقہ ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ یہ دوا اکثر پھپھوندی کے فساد نیچ میں دی جاتی ہے۔ متعفن اسہال بہت زیادہ نقاہت کے ساتھ ہوتے ہیں۔

**لیکیسس (Lachesis):** زخموں یا چوٹ لگ جانے کے بعد خون میں زہر پھیل جاتا ہے۔ متاثرہ حصہ نیلا اور ارغوائی ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے خون اور پیپ ملا گاڑھا مادہ رستا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں برقی ٹھنڈک کے ساتھ جاڑا ہوتا ہے۔

**سیکیل کار (Secale Cor):** مہنجناہٹ اور کھنکھنے کے احساس کے ساتھ بوڑھے لوگوں میں کھنکھن گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ اس اور پیروں کی خشک مٹکیرین، پنچے اور انگلیاں

نوٹ جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور جلد خشک ہوتی ہے۔ سکڑی ہوئی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کوئی حساسیت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے داغ اور خونی پھوڑے ہوتے ہیں جو کہ انگلی بن جاتے ہیں اور اس دوا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مریض ٹھنڈک سے افاقہ پاتا ہے اور آرسینک البم کے برخلاف ڈھانپ نہیں سکتا۔

کروٹالس ایچ (Crotalus H): 'گرم' پیلاہٹ ماسل' ترنگرین۔ بازو اور ٹانگیں کالے پھوڑوں اور بہت زیادہ سوجن سے پُر ہوتی ہیں۔ گندی بو آتی ہے۔ کریو زوٹ (Kreosote): پھپھڑوں کی ترنگرین۔

کاربوووج (Carbo Veg): گوشت خور پھوڑے اور آبلے انگلی بن جاتے ہیں۔ متاثرہ حصے ارغوانی دکھائی دیتے ہیں اور برفلے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ نقامت کے ساتھ بدبو دار افرازات ہوتے ہیں۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): مٹینی زخموں کے بعد ترنگرین ہو جائے۔

### عمومی تکلیفات (عام علامات) — (Generalities)

بیلز پیرینس (Bellis Perennis): ٹھنڈا پانی پینے کے باعث یا آکس کریم کھانے کے باعث جبکہ جسم گرم ہو۔ کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے۔ مرطوب ٹھنڈک کے باعث اچانک جاڑے کے اثرات اس وقت لاحق ہوں جب کوئی شخص گرم ہو یا اسے پھینک آیا ہو۔

بوریکس (Borax): پیشاب سے پہلے 'پاخا' خارج کرنے پر تکلیف ہو جائے۔ ایسڈ میور (Acid Mur): مریض بستر کی پانچلتی کی طرف پھسل جائے اور اکثر لازماً اٹھایا جائے۔ بستر نیچے کی جانب پھسلتا۔

رینن کولس لی (Ranunculus B): گرمی سے 'ٹھنڈک' میں اور ٹھنڈے سے گرمی میں آنے جانے پر بہتری ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی کے باعث لاحق ہونے والی کوئی بھی بیماری۔

سٹرامونیم (Stramonium): میڑھیوں سے نیچے جاتے ہوئے مریض ایک کی بجائے دو زینے نیچے اترتا ہے اور ٹاکام ہوتا ہے۔

آرسینک البم، کلکیریا کارب، سیلیشیا (Arsenic Alb, Calcarea Carb, Silcea): ٹھنڈے مریضوں کے لئے جو ٹھنڈے موسم میں بہتر ہوتے ہیں اور گرم موسم میں بہتر ہوتے ہیں اور گرم چیزیں لگانے سے بھی بہتری ہوتی ہے۔

فلورک ایسڈ، کالی آئیوڈ (Fluoric Acid, Kali Iod): گرم مریضوں کے لئے جو گرمیوں

میں ابتر ہوتے ہیں یا گرمی سے ابتری ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔  
مرک سول (Merc Sol): غیر معمولی گرمی یا سردی برداشت نہیں ہو سکتی۔ مریض معتدل  
موسم میں بہتری محسوس کرتا ہے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): غیر منذب حركات کرے، جسم کو ہکاڑے۔

ابسنٹیم (Absinthium): تشدد، ظالم اور غیر انسانی رویے والا مریض۔ بلا مقصد مسروف  
رہتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): دوبارہ ثبوت پر ہنپے، تنگ کرنا۔

### غدد (Glands)

#### (Myxedema) (Hypothyroidism)

ٹیوبر کیولینم بووشا (Tuberculinum Bov): گردن میں دق کے غدد۔ 200 سے 1M یا  
Cm طاقت تک خوراکوں میں یہ دوا دی جائے۔ تھامی دوا غدد کی سوزش کے علاج کے لئے  
کافی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات آزمائیے۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea lod): 30 طاقت میں یہ دوا دن میں تین مرتبہ دی جاسکتی ہے۔  
ٹیوبر کیولینم بووشا کو عمل انگیز دوا کے طور پر 200 طاقت میں ہر ماہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔

کلکیریا فلور (Calcarea Flo): غدد، خلیاتی نیچ اور ہڈیوں کی بنادلوں کی سختی اور سوزش،  
عضلات پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں۔ گرمی ہڈیوں میں چاولوں جیسے اجسام ہوتے ہیں۔

برشا آئیوڈ (Baryta lod): جب غدد کی سوزش کے ساتھ ٹائسلز کی سوزش موجود ہو۔  
ہیپپر سلف (Hepar Sul): لفیفیک غدد کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ یہ غدد سخت اور پیپ  
کے بھجے ہوتے ہیں۔ موسم سرما کے آنے پر کسی مخصوص غدہ میں پیپ پڑ سکتی ہے۔

سس کس کین (Cistus Can): غدد کی سوزش، سوجن اور غدد میں پیپ کا پڑنا، گرہ دار  
رسی کی طرح گردن کے غدد ایک قطار میں بڑھ جاتے ہیں۔

تھائرائیڈین (Thyroidin): تھائی رائیڈ غدد کا عمل جراحی کے ذریعے دور کرنے اور غدد کی  
نشوونما نہ ہونے کے باعث لاحق ہونے والے امراض۔ تین مہینے یا کم و بیش عرصہ تک یہ دوا  
30 ڈائی یوشن کی صورت میں دینی چاہئے۔

کالی آئیوڈ (Kali lod): ناکارہ غدد جن کے کنارے سخت اور سوہے ہوتے ہیں۔ دہی کی  
طرح کی پتل اور خراش دار رطوبت کے اخراج کے ساتھ غدد میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ غدد کی



نطاقاتی۔ غدود سخت ہونے سے پہلے سوج جاتے ہیں، آتشکی غدود۔  
 کالی میور (Kali Mur): غدود کا عمل درہم برہم ہو جانے کے باعث کیل مہاسے چہرے اور گردن وغیرہ پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوزش کے بعد لمفینک افرازات ہوتے ہیں۔

رشاکس، پلساٹیل، ہیوزاٹکا، سیلیشیا (Pulsatilla, Hippozaenia, Silicea),  
 (Rhus Tox): لمفینک غدود کی سوزش۔ ایسیر سلف ٹاکام ہو جانے کے بعد دی گئی ترتیب کے مطابق ان ادویات کو استعمال کیجئے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): لمفینک غدود کی سوزش، معمولی جوش کے باعث چہرہ خون سے بھرا، چمکدار، سرخ ہو جاتا ہے۔ حیض بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ قلت خون لاحق ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): اسہال اور پسینے میں مبتلا رہنے والے کمزور مریضوں میں غدود کی تکلیفات۔

آئیوڈین (Iodine): تھائی رائیڈ غدود کی سوزش یا بڑھوتری۔ میٹریٹرک غدود ایک گرہ کی طرح محسوس ہو سکتے ہیں۔ جڑے کے ذریعے غدود کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ سے دل کی دھڑکن لاحق ہو جاتی ہے۔ غدود بڑھ جاتے ہیں جبکہ جسم مرجھا جاتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے۔

سپونجیا (Spongia): غدود کی خارش، سوجن اور سختی، خشکی، گرمی اور بے چینی۔  
 لائیکوپس ویر (Lycopus Vir): دل کی نمایاں علامات کے ساتھ غدود کی سوجن لاحق ہو۔ یہ فشار خون کو گرا دیتی ہے۔ نبض کی رفتار کو کم کر دیتی ہے اور سس ٹول کی لمبائی کو بہت حد تک بڑھا دیتی ہے۔

کاربو انیملس (Carbo Animalis): حلق، پستانوں اور بعض کے غدود اور غوائی ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ نرم ہونے کا رجحان نہیں ہوتا یا پیپ پڑنے کا رجحان نہیں ہوتا۔ غدود اتنے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں لیکن وہ سخت ہوتے ہیں اور کونٹے کی آگ کی طرح سے جلتے ہیں۔ یہ دوا سرطانی تکلیف کا علاج بھی کرتی ہے۔

کونیم (Conium): غدود سخت اور سوزشی ہو جاتے ہیں۔ بازو کے نیچے والے غدود میں سوزش اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ گردن کے غدود میں اور جانگھ کے غدود میں سوزش ہوتی ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لمفینک غدود کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سوزش ہوتی ہے کہ گروہوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔

## غدد کی سوجن — (Glandular Swelling)

برومیئم (Bromium): غدد بڑھ جاتے ہیں۔ خضیوں میں سوجن ہوتی ہے، پیپ پڑنے کے رجحان کے بغیر۔ غدد میں سختی واقع ہو جاتی ہے۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Iod): غدد کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ غدد میں سختی لاحق ہوتی

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): سروریکل اور لمفٹک غدد کی سختی کے ساتھ بلا درد غددی بڑھوتری لاحق ہو۔ بروٹکائی اور میزینٹرک غدد کی بڑھوتری لاحق ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ گرم ٹیوں کے کرنے سے اور مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ 6x طاقت استعمال کیجئے۔

بیلادونا (Belladonna): غددی سوجن، پیپ کا خدشہ پیدا کرے۔ جڑے کی ہڈیوں کے علاقہ میں ہو سکتی ہے یا سوجن پستانوں میں ہو سکتی ہے جو کہ بھاری، سرخ اور حساس ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ حرارت اور سونیاں چبھتے جیسے دردوں کے ساتھ، سوزشی غدہ کے باعث سرخ دھاریوں کی لہریں چلتی ہیں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): غدد کی سوجن جن میں پیپ پڑنے کا رجحان ہوتا ہے۔ سر پر پھیند آتا ہے جو کہ کھٹا اور بدبودار ہوتا ہے۔

گریفائٹس (Graphites): بغل، جانگھ اور گردن کے غدد کا بڑھ جانا جلد کی علامات کے ساتھ لاحق ہو۔ پیٹ بڑا اور سخت ہو جاتا ہے۔

سکروفولیریا (Scrophularia): یہ غدد کی سوزش اور پیپ پڑنے کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ پستانوں میں گرہیں ہوتی ہیں۔

مرک آئیوڈ (Merc Iod): درد کے ساتھ غدد کی سوزش لاحق ہو۔ غدد سخت اور سرخ ہوتے ہیں۔ یہ بیلادونا کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔

لیپس البس (Lapis Albus): یہ بہت سی اقسام کے اگاؤ کا احاطہ کرتی ہے۔ غدد بڑے ہو جاتے ہیں، ایک خاص حد تک نری کے ساتھ۔ کلکیریا فلور کے برعکس، جس میں پتھرلی سختی ہوتی ہے۔ میزینٹرک غدد کی بڑھوتری۔

آئیوڈم (Iodum): غدد کا بڑھ جانا (بشمول ٹائسلن) پورے جسم کے دہلا ہو جانے کے ساتھ علامات سکڑ جاتے ہیں اور جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ سوائے چھاتیوں کے غدد کے جو کہ گھٹتے گھٹتے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، تمام غدد بڑھ جاتے ہیں۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): غددی سوجن، غدد آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں

اور پھر وہیں رک جاتے ہیں۔ ان میں پیپ نہیں پڑتی اور وہ بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے۔ وہ سخت ہوتے ہیں۔

جلسی میم (Gelsemium): دس سے گیارہ بجے صبح کے دوران آنے والے بغیر پیاس کے بخار کے ساتھ لمفیکل غدود کی سوزش اور بوھوتری کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ بخار شام کے وقت مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دماغی علامات ہوتی ہیں جیسے کہ سر میں بے چینی، چکر وغیرہ موجود ہو سکتے ہیں۔ مملک قسم کا گومڑ۔

اکونائٹ لائیگوٹونیم (Aconite Lycotonum): سرویکل، بغل کے اور پستانوں کے غدود کی سوجن اور حتیٰ کہ جس مقام پر ہاکن کے امراض کا خدشہ لاحق ہو۔  
ایتھوزا (Aethusa): گردن کے گرد تسبیح کے دانوں کی طرح کی غدودی سوجن۔

### گلنڈز (Goiter)۔

آئیوڈم (Iodum): یہ گلنڈز کے لئے چوٹی کی دوا ہے اور کافی زیادہ سیاہ، چاق و چوبند مریضوں میں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ 1M ڈائی لیوشن کی صورت میں دینی چاہئے۔ نمایاں سختی کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں کنارے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر فیض کے آنے پر رسولی مزید سوج جاتی ہے اور مزید پردرد ہو جاتی ہے۔ جسامت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً دائیں جانب۔ نرم اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔ بغیر لو کا گومڑ، اندرونی اور درمیانی حصہ بچے کے سر جتنی بڑی جسامت کا ہوتا ہے۔ گلابی سرخ، وزن میں بہت بھاری اور نرم ہوتا ہے۔ اس دوا سے آرام آ جاتا ہے۔ مریض پتلا ہوتا ہے لیکن رغبت سے کھاتا ہے۔ حرارت اور تیز نبض کے ساتھ نرم گلنڈز ہوتا ہے۔ آئیوڈم کے مریض افسردہ، کم ہمت اور خودکشی کے رجحان والے ہوتے ہیں۔

برومیوم (Bromium): جب آئیوڈم 1M ڈائی لیوشن کی صورت میں ناکام ہو جائے تو یہ دوا اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن یعنی 1M کی صورت میں آزمانی چاہئے۔ نرمی کے ساتھ غدود کا بڑھ جانا۔ مریض دھڑکن کے باعث دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا۔ مریض کے چہرے کا رنگ ہلکا ہوتا ہے۔ خنازیری مزاج اور خوش باش ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): دائیں جانب سخت، ہموار، چمکدار صورت والا گلنڈز، کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھنچاؤ کا احساس رسولی میں ہوتا ہے گو یہ رسولی بہت بڑی نہیں ہوتی۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): یہ دوا ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے۔ مریض طوفان بادو

پاراں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت تنہا ہونے سے گھبراتا ہے۔ دل کی دھڑکن ست ہو جاتی ہے جبکہ سنبھل سکوپ استعمال کی جائے اور جب نبض گنی جائے تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کسٹھ مالا لاغری کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ کمزوری، کیکپاہٹ، دل کی دھڑکن، پیاس، اعصابی بھان اور بے خوابی ہوتی ہے۔

**لیکیسیس (Lachesis):** چہرے میں خون بھر جانے اور چہرہ گرم ہو جانے کے ساتھ ہلکا ریشہ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور گرمی کے احساس کے ساتھ مریض نیند سے جاگ جاتا ہے۔ اس دوا کے متعلق بھی ابتدائی مراحل میں سوچنا چاہئے۔

**فیوکس ویس (Fucus Ves):** مدور ٹنگھڑ قطروں والی خوراکوں کی صورت میں دیتے۔ یہ گلنر کی بنیادی دوا ہے۔ بد ہضمی ہوتی ہے۔ اچھارہ اور قبض عمومی علامات ہیں۔

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** سر اور گردن پر پسینہ آنے کے ساتھ فربہ اشخاص میں عام گلنر ہوتا ہے۔ یہ دوا 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر دو گھنٹے کے بعد روزانہ چھ مرتبہ دی جائے۔ یہاں تک کہ بہتری کا آغاز ہو جائے۔

**ایڈرینالین (Adrenalin):** کسٹھ مالا تیز نبض کے ساتھ نیز دل کے فعل میں تیزی اور ضیق انسانی کے ساتھ آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکلے ہوتے ہیں اور گردن کی پشت پر شریانوں میں تنگن ہوتی ہے۔ ایڈرینالین 200 یا 1M ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو کاسٹس آزمائیں۔

**تھائرائیڈین (Thyroidin):** اگر آئیوڈ اور برہیمیم ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ 3x یا 6x ٹرائی نوریشن دیتے۔

**سپونجیا (Spongia):** زبردرد گلنر۔ قلت حیض کے ساتھ دمہ ہوتا ہے۔ نکلنے وقت درد ہوتا ہے۔ وادیوں میں رہنے والوں میں گلنر۔ اس دوا کی علامات میں برہیمیم والی غدودوں کی بڑھوتری اور چہرے کا رنگ ہوتا ہے نیز آئیوڈم والی ذہنی پریشانی اور قوت حیات کی کمی ہوتی ہے۔

**فیرم میٹ (Ferrum Met):** کسٹھ مالا خصوصاً حیضوں کے دب جانے کے بعد۔

**لیپس البس (Lapis Albus):** غدودوں کی خنازیری بڑھوتری، پستانوں میں، معدہ میں اور رحم میں جلن دار اور ڈنک نکلنے جیسے درد کے ساتھ گلنر لاحق ہو۔

**لائکوپس (Lycopus):** دل کی تکلیف اور ضیق انسانی کے ساتھ کسٹھ مالا لاحق ہو۔

**اگنیشیا (Ignatia):** اعصابی مریضوں میں جب گلنر میں درد ہو۔

## جریان خون — (Haemorrhage)

(دیکھئے ”سیلان خون“)

## گرمی، حدت — (Heat)

ڈوری فورا (Doryphora): جسم کے مختلف حصوں میں جلن ہوتی ہے مثلاً منہ، گلا، خوراک کی نالی، معدہ، پیٹ، امعاء، مستقیم اور پستانوں وغیرہ میں۔  
کیمفر (Camphor): جسم کی اندرونی جانب گرمی ہوتی ہے اور بیرونی جانب ٹھنڈک ہوتی ہے۔

وریتروم البم (Veratrum Alb): جلن ہوتی ہے جبکہ ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ جاڑا اور گرمی اول بدل کر آتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): گرمی سے متماہٹ ہوتی ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصہ میں گرم نمبرہ رہی ہو جس کا اختتام آخر کار پسینے پر ہوتا ہے۔ حدت قطعات میں ہوتی ہے۔ پاؤں کے تلوؤں میں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں حدت ہوتی ہے۔

آر سینک البم (Ars. Alb): متواتر جلن دار حدت ہوتی ہے جس میں افادہ گرم چیزیں لگانے سے یا گرم کمرے میں جانے سے ہوتا ہے لیکن سر کی اندرونی جانب کی جلن میں افادہ ٹھنڈے پانی سے دھونے پر ہوتا ہے۔ گنٹھیاوی حالت میں جو کہ کھوپڑی پر اور بیرونی جانب کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے، جب جلن ہو تو افادہ گرمی سے ہوتا ہے۔

آکونائٹ این (Aconite N): بے چینی کے ساتھ جلن دار حدت ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ یا کھلی ہوا میں جانے سے بہتری ہوتی ہے۔

لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): ذیابیطس کے دوران جلن ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): جسم کے کسی بھی حصہ میں جلن ہو۔ ہڈیاں اور ٹائیفائیڈ وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ ٹیکن والی حدت ہوتی ہے جس میں مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔

امونیم میور (Ammonia Mur): ایلنے کا احساس پورے جسم میں ہوتا ہے جیسے کہ خون کی نالیوں میں خون ابل رہا ہو۔ ٹھنڈے حساسیت ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدت کی متماہٹ پسینے سے ختم ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): ہاتھ گرم ہوتے ہیں جبکہ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ رہنما کن علامت ہے۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): جسم کے صرف ایک حصہ میں حدت ہوتی ہے، دوسرا حصہ ٹھنڈا ہوتا

ہے۔  
تھائرائیڈین (Theridion): بازوؤں اور ٹانگوں کے علاقہ میں جلن ہوتی ہے جس کے ساتھ شور اور پھوٹنے سے ہاتھوں اور پاؤں میں حساسیت ہوتی ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔  
میڈورینم (Medorrhinum): پاؤں کے تلوؤں میں حدت ہوتی ہے۔ کمر کے گرد جلن دار حدت ہوتی ہے جیسا کہ جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا ہو۔

آگنیشیا (Ignatia): ایک کان اور ایک رخسار سرخ ہوتا ہے اور اس میں جلن ہوتی ہے۔  
آئرس ویر (Iris Ver): منہ میں 'زبان میں' گلے میں 'نیچے معدے تک جلن ہوتی ہے۔ بازوؤں میں جلن ہوتی ہے جبکہ اس سال لاحق ہوں۔

ایپس ایم (Apis M): چہرے 'آنکھوں' آنکھوں کے پپوٹوں 'ہونٹوں' زبان 'گلے' بازوؤں اور خیموں میں ڈنک لگنے جیسے اور جلن دار دردوں کے ساتھ سرخی اور سوجن ہوتی ہے۔  
بیلادونا (Belladonna): سرخی اور شدید جلن کے ساتھ حدت ہوتی ہے۔ پھوٹنے پر شدید گرم ہوتا ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): معمولی سا مطالعہ ریڑھ میں جلن کا باعث ہوتا ہے۔ ذہنی تھکان کے باعث جلن ہوتی ہے۔ بغیر درد کے جلن۔

پشیلیائی (Ptelia T): جلد اور چہرے کی جلن دار حدت۔ حتیٰ کہ سانس نشتوں کو جلاتا ہے۔  
روٹا (Ruta): آنکھوں میں حدت اور آگ کا احساس ہوتا ہے۔

ٹیریبنتھینا (Terebinthina): جسم کے تمام حصوں اور سوراخوں میں جلن ہوتی ہے۔ معدہ 'امعائے مستقیم' مثانہ یا پیشاب کی نالی وغیرہ میں جلن ہو سکتی ہے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): درجہ حرارت میں اضافہ ہوئے بغیر شام کے وقت اور رات کے وقت جسم سے بہت زیادہ حدت خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پاؤں جلتے ہیں اور مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے۔ وہ چہرے اور سر کو ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہتا ہے۔

ناجا (Naja): سر اور چہرے پر مسلسل حدت ہوتی ہے۔ ہتھیلیوں میں سوجن ہوتی ہے۔ حدت کا قتل برداشت احساس۔ گرم لوہے کے لگنے کا احساس ہوتا ہے۔

ایومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): گرمیوں کی انتہا درجے کی حدت 'مریضہ کی قوت کو ذائل کر دیتی ہے۔ چلنا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ریڑھ میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔

لیکسیس (Lachesis): دن کے دوران گرم تھماہٹ ہوتی ہے اور رات کو ٹھنڈی تھماہٹ

ہوتی ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔

### ہبک ورم کا مرض — (Hook Worm Disease)

تھائی مول (Thymol): ہبک ورم کے مرض کے لئے یہ مخصوص دوا ہے۔ 6th طاقت کی صورت میں دن میں دو مرتبہ یعنی صبح اور شام دیجئے۔

چینوپوڈیم (Chenopodium): یہ دوا ہبک ورم کے مرض کے لئے ہے۔ ہر چکر کے 10 قطرے دانی خوراکیں استعمال کیجئے۔ ہر دو گھنٹے کے بعد صرف تین خوراکیں دیجئے۔

کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ (Carbon Tetrachlorid): یہ ہبک ورم کے علاج کے لئے بہترین دوا ہے۔ ایسے ملک میں جہاں یہ مرض بہت زیادہ پایا جائے۔ 3cc کی صرف ایک دوا بڑوں کو دیجئے جس سے 95% ہبک ورم ختم ہو جائیں گے۔

### ہارمون — (Hormones)

یہ اصطلاح اندرونی افرازات کے لئے استعمال ہوتی ہے جو کہ ایڈریٹالین 'تھائرائیڈین' انسولین وغیرہ دینے سے مسامات سے محروم غدود سے خارج ہوتے ہیں۔ جب یہ مسامات سے محروم غدود ناکافی ہو جاتے ہیں تو جو امراض لاحق ہوتے ہیں ان کا علاج صرف ان غدود کو مناسب ہو میو پیٹھک ادویات کے استعمال کے ذریعے کافی بنانے سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بالوں کا قبل از وقت سفید ہو جانا اور بالوں کا گر جانا تھائرائیڈ غدود کے ناکافی ہو جانے کے باعث ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ کے 30 یا 200 ڈائی لیوشن کے استعمال سے نہ صرف بالوں کا سفید ہونا رک جائے گا بلکہ قدرتی رنگ بھی واپس لانے میں یہ دوا مدد کرے گی۔ اسی طرح سے انسولین 30 یا 200 عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے 'زیابیطس' میں تاکہ ان غدود کو کافی بنائے جو انسولین پیدا کرتے ہیں۔

### سوزش (سوجن) — (Inflammation)

بیلادونا (Belladonna): جب جلن اور تپکن والے درد کے ساتھ سوجن سرخ ہو۔ پھوٹے جانے والے حصے گرم ہوتے ہیں۔

ایپیس ایم (Apis M): پھولی ہوئی سوجن ہوتی ہے جیسا کہ شہد کی مکھیوں نے کاٹا ہو۔ پیشاب کم مقدار میں آتا ہے۔ اوپر والا ہونٹ بغیر کانٹے کے سوج جاتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب سوجن پیلی اور سخت ہو 200 طاقت کی صورت

میں دن میں تین مرتبہ روزانہ افادہ ہونے تک دیتے۔  
تھائرایڈینم (Thyroidinum): فلیکریا میں سوجن ہوتی ہے جو کہ عمومی اور بغیر درد کے ہوتی ہے۔

اورم سلف (Aurum Sulph): بغل کے غدود کی اور پستانوں کی سوجن۔  
لائیکوپس ویر (Lycopus Ver): درد کے ساتھ سوجن ہوتی ہے۔ اس دوا سے درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے جو بغیر درد کے سوجن متواتر برقرار رہتی ہے۔

### چوٹیں، زخم — (Injuries)

ہائپرکیم (Hypericum): جب نرم حصوں کے ساتھ اعصاب پر چوٹیں آئیں جیسے کہ ٹانگوں پر پھٹنے سے، سونیاں، پٹنیں لگنے سے، کیزوں کے کانٹے اور جانوروں کے کانٹے سے۔ ہونٹوں اور انگلیوں کے پوروں جیسے زیادہ اعصاب والے حصوں کے چر جانے، پھٹ جانے یا پوٹ لگنے کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ یہ ریزھ اور دہی میں چوٹوں کے لئے مفید ہے۔ فوری طور پر تشنج سے حفاظت کے لئے لیڈم پی دیتے۔ زخم لگنے کے نتیجے میں تشنج کے دوران ناقابل برداشت درد کی موجودگی میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ پرانے زخموں کے نشانات میں درد ہوتا ہے جو اعصاب کے ساتھ ساتھ جسم کے اندرونی جانب دوڑتا ہے۔

سمفیٹم (Symphytum): کند اوزار کے لگنے سے ہونے والے زخم۔ عمل جراحی کے بعد ٹخنا (کٹا ہوا حصہ) پر بھجانا ہوتا ہے۔ جوڑوں کے زخموں میں روٹا کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوا آزمائی جاتی ہے۔ زخم آہستہ آہستہ مندمل ہوتے ہیں۔ تیز دھار آلے سے کئے ہوئے زخموں میں یا جب جراح (سرجن) جراحی کے ذریعے جسم کے کسی حصے میں چیر پھاڑ کرے اور یہ جراح کا لگایا ہوا زخم غیر صحت مند دکھائی دے اور اس میں ڈنک لگنے جیسا جلن دار درد ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

لیڈم (Ladum): پھٹے ہوئے زخموں کے لئے جن میں چھوٹے سے مریض کو ٹھنڈک کا احساس ہو لیکن ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہو۔ ایسے زخم جن سے خون کم مقدار میں خارج ہو اور بعد میں درد ہو۔ متاثرہ حصے میں ابھار ہوتا ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ گھونسا لگنے سے یا پریشانی کے باعث آنکھ سیاہ ہو جاتی ہے۔ چلتے ہوئے زنگ آلود کیل چبھ جانے کے باعث زخم لگ جائے یا پاؤں کے ٹکڑوں میں یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں سوئیوں کا خطرناک انداز میں چبھ جانا جن کے باعث زہر پھیل جاتا ہے۔ یہ تشنج کو روک دیتی ہے لیکن جب تشنج حقیقتاً لاحق ہو چکا ہو تو پھر لیڈم دوا نہیں ہوتی اس صورت میں ہائپرکیم دیتے۔ زخم لگنے کے بعد یا زخم پھٹ جانے



کے بعد بیمار بازوؤں اور ٹانگوں کا مرتجھا جانا۔

**اناکارڈیم (Anacardium):** جب جوڑوں کے بندھن متاثر ہوں۔

**ارستولوچیا (Aristolochia):** جوتے کے کاٹنے کے باعث، گھوڑے کی پشت پر سواری کرنے کے باعث، کشتی رانی کے باعث، باغبانی وغیرہ کے باعث ہونے والے پھالے یا زخم۔

**روٹا (Ruta):** موج یا موج کے بعد بننے والی کھنیاں، موج کے بعد نگرہاٹ ہو خصوصاً ٹخنوں اور کلائیوں میں۔ موج یا چوٹ لگنے کے باعث ہڈیوں کے بندھنوں کا ٹوٹ جانا۔ فٹ بال کھیلنے والوں اور ہاکی کے کھلاڑیوں کے جسم پر لگنے والی ٹھوکروں کی خراشوں کو یہ دوا تیزی کے ساتھ شفا دیتی ہے۔ ہڈیوں، ہڈیوں کے بندھنوں اور کری ہڈیوں کی خراشوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

**آرنیکا مونٹ (Arnica Mont):** بے انتہا دردوں کے باعث شدید قسم کی حساسیت ہوتی ہے۔ یہ گتھیا میں، جوڑوں کے دردوں میں، ہڈیوں کے ٹوٹنے میں یا دیگر چوٹوں میں ہو سکتی ہے۔ نرم حصوں کے زخم، احمداں سے زیادہ تھکاوٹ، کھنچاؤ اور موج۔ پورے جسم میں دکھن ہوتی ہے۔ موج والے جوڑوں پر سیاہ یا نیلے اظہار کو یہ دوا شفا دیتی ہے۔

**کیلنڈولا (Calendula):** تیز دھار آلوں سے لگنے والے زخم۔

**ایلیئم سیپا (Allium Cepa):** عمل جراحی کے بعد کٹے ہوئے حصوں (ٹنڈ) میں شدید قسم کے ڈنک لگنے جیسے دردوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جلن دار درد ہوتا ہے۔

**رشاکس (Rhus Tox):** موجوں اور اعتدال سے زیادہ وزن اٹھانے کے باعث ہونے والی تکلیفوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ جب عضلات یا ہڈیوں کے بندھنوں میں کھنچاؤ ہو اور جب آرنیکا ٹاکنی ثابت ہو تو یہ دوا آزمائی چاہئے۔

**کلکیریا فاس (Calcarea Phos):** جب ہڈیوں میں دراڑیں آجائیں یا ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا آرنیکا IM، روٹا اور کیمیسیم کے ساتھ تبادلے میں ہر روز بدل بدل کر دی جاتی ہے۔ IM طاقت کی صورت میں استعمال کرنی چاہئے۔

**پائی اونیا (Paeonia):** دباؤ کے باعث ناسوری کیفیت لاحق ہو مثلاً بستر کے زخم اور تنگ جوتوں کے باعث ہونے والے زخم۔

**بیلز پیرینس (Bellis Perennis):** چوٹوں اور موجوں کے لئے بہت بڑی دوا ہے۔ متاثر حصے چھونے سے نرم ہوتے ہیں۔ یہ خون کی نالیوں اور اعصاب دونوں کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح آرنیکا اور ہائپرکیم دونوں کی خصوصیات کی حامل دوا ہے۔ پستانوں کی سختی لاحق ہوتی ہے جو کہ گھونسا لگنے کے بعد مستقل ہوتی ہے۔

کروکس (Crocus): زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

گھٹنے کا مڑ (ٹھک) جانا — (Knock Knee)

ٹیوبرکیولینم 200 (Tuberculinum 200): اسی دوا سے علاج کا آغاز کرنا چاہئے اور اسے ہر ماہ دو ہرانا چاہئے۔ سچ کے عرصہ میں درج ذیل ادویات دینی چاہئیں، سوائے ٹیوبرکیولینم دینے سے دو دن پہلے اور دو دن بعد تک۔

کلکیبریا فاس (Calcarea Phos): دن میں تین مرتبہ روزانہ لمبے عرصہ کے لئے دیجئے۔  
لیٹھی رس (Lathyrus): گھٹنا ٹھک جاتا ہے جبکہ مریض چل رہا ہو۔ لڑکھڑاہٹ والی چال ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں سختی اور اینٹھن ہوتی ہے۔

سیلیشیا 200 (Silicea 200): یہ دوا اس موقع پر جب اس کی ضرورت ہو ٹیوبرکیولینم کی جگہ دینی چاہئے۔

سستی — (Lassitudes)

(دیکھئے "انگری")

خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا (باکن کے امراض)

(Leukemia)

آر سینک البم (Arsenicum Alb): پیلاہٹ ہوتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، دل کا فعل کمزور ہوتا ہے۔ خون تبدیل کرنے والے عضلات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی علامات یوں ہیں: بے چینی ہوتی ہے، سہ پہر کے بعد اور آدھی رات کے بعد تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعصابی اندیشہ ٹانگی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ علامات نظر انداز نہیں ہونی چاہئیں۔

چائنا (China): جب بخار اور جاڑا دورے والا ہو جس کے ساتھ تلی کا بڑھ جانا نمایاں ہوتا ہے۔ پانٹنوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور جلد گرم اور خشک ہو جاتی ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): جریان خون اور عمومی نقاہت و قبض کے ساتھ قلت خون لاحق ہوتی ہے۔ مؤخر حیضوں کے ساتھ نوجوان لڑکیوں میں سبزی رکن ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مریض بہت زیادہ ڈھیلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے اور معمولی محنت سے تنفس میں اختصار آ جاتا ہے۔ مکمل تھکاوٹ کے ساتھ ڈھیلے

اور بدبودار پانخانے ہوتے ہیں۔

آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): یہ دوا کھانوں کے بعد دی جاسکتی ہے۔  
نیٹرم میور (Natrium Mur): جب جلد کا رنگ پیلا، نیلا ہو، جلد چکنی ہوتی ہے۔ جاڑے کے ساتھ قلت خون لاحق ہو۔ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور جاڑا کمر میں نیچے کی طرف ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب، کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Carb, Calcarea Iod): جب لمفینک غدود اور خصوصاً سرویکل غدود ملوث ہوں تو ان دواؤں کی خاص طور سے نشاندہی کی جاتی ہے۔ لمیٹہ مریض میں تھکاوٹ کا باعث ہوتا ہے۔

نیٹرم آرسینک، نیٹرم سلف (Natrium Ars, Natrium Sulph): لیوکیمیا (ہاکن کے امراض) کے شدید کیسوں میں یہ ادویات دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔  
سینو تھس (Ceanothus): تلی کے بڑھ جانے کے لئے یہ مخصوص دوا ہے۔ تلی کے بڑھ جانے کے نتیجے میں قلت خون کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ دوا مدر چھڑ کے پانچ قطروں کی خوراکیوں کی صورت میں دینی چاہئے۔

### جوائیں — Louse (Lice)

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جب جوائیں زیر ناف بالوں میں پائی جائیں (یعنی اعضائے مخصوص پر اگنے والے بالوں میں) یہ دوا سر کی جوؤں کے لئے بھی مفید ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): جلد میں جوائیں ہوتی ہیں۔ جلد کی جوؤں کے لئے یہ دوا مخصوص ہے۔ بچے دینے والی جوائیں۔

سورینم (Psorinum): سر کے بالوں میں جوائیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو کاربولک ایسڈ آزمائیں۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): یہ بھی جوؤں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

### چہرے کی جلد کی دق — (Lupus)

بیسلی لینم (Bacillinum): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دینی چاہئے۔ دیگر ادویات ایک ہفتے کے بعد شروع کی جائیں۔

ریڈیم بروم (Radium Brom): چہرے کی دق کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔  
آرسینک ایلیم (Ars. Alb): بہت زیادہ نقابت اور بے چینی ہوتی ہے۔ گرم چہرے لگانے

سے بہتری ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔  
الیومن (Alumen, Alumina): چہرے کی دق یا ناک کے سرطان کے لئے۔ چہرہ  
 لاش کی طرح سے چملا ہوتا ہے۔ ہونٹ نیلے ہوتے ہیں۔  
 نوٹ: اوپر دی گئی ادویات میں سے ہر دوا قابل لحاظ عرصہ کے لئے آزمائی جانی چاہئے تاکہ شفا  
 حاصل ہو جائے۔

### سوکھا مسان (Marasmus) —

(نیز دیکھئے ”جھریاں“)

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ایسے بچے جن میں کھوپڑی کی ہڈی یا سر کی پشت کا اندر  
 کی جانب ڈوبنے کا رجحان پایا جاتا ہو اور پیری ٹل (Parietal) ہڈیاں باہر کو نکل آتی ہیں جس  
 سے دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت عموماً ناجائز بچوں میں پائی جاتی ہے جن کا حمل چوری چھپے کے  
 جماع سے ٹھہر جاتا ہے۔

ایبروٹینم (Abrotanum): ایسے بچوں کی دوا جن میں نمایاں لاغری پائی جاتی ہے خصوصاً  
 ناکوں کی لاغری، جلد پٹیلی ہوتی ہے اور تسوں کی صورت میں لٹک جاتی ہے۔ سر کمزور ہوتا ہے  
 وہ سر کو اوپر اٹھا نہیں سکتے۔

کلکیریا فاس (Calcareia Phos): سوکھا مسان کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا 6x  
 ٹرائی ٹوریشن کی صورت میں دینی چاہئے۔ جلد خشک اور جھریوں والی ہوتی ہے۔  
نیٹرم میور (Natrum Mur): بچوں میں گردن کا سوکھا مسان، پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔  
 بچے مغموم اور پُراز حسرت ہوتے ہیں۔ بچہ ایک بغیر بالوں والے بندر کی طرح دکھائی دیتا ہے۔  
پیکرک ایسڈ (Picric Acid): بہت زیادہ بھوک کے ساتھ بچہ کمزور ہوتا ہے۔

سنٹی کیولا (Sanicula): بچہ بوڑھا، کندا اور چکنا دکھائی دیتا ہے۔ دہلا پن بڑھتا رہتا ہے۔  
 گردن اور ہاتھوں کی جلد جھریوں دار اور تہ دار ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر ضدی اور سخت سر  
 والا، مسلسل بدلنے والا ہوتا ہے۔ رات کے وقت سر پر پینہ آتا ہے جو کہ نکلنے کو گندا کر دیتا  
 ہے۔ پاؤں میں بدبو دار پینہ آتا ہے۔

برٹا کارب (Baryta Carb): سن بلوغ کو پہنچ کر عضلاتی کمزوری میں اس دوا کی نشاندہی کی  
 جاتی ہے۔ ایسے اشخاص کا ہڈی رتج گھٹتے گھٹتے پتلا ہو جاتا جو کبھی موٹے اور خوب صحت مند ہوتے  
 تھے۔ خرد و اور پیٹ کے بڑھنے کے ساتھ بچوں کی لاغری۔

آئیوڈم (Iodum): جب سوکھا مسان کا رجحان ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ پڑ پڑا پن ہوتا

ہے۔ بچہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا چاہتا۔ بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے جوڑ سوج جاتے ہیں اور بد وضع ہو جاتے ہیں۔  
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): یہ دوا عمل انگیز کے طور پر 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر ہفتے دینی چاہئے۔

### کنپٹیوں کی ہڈیوں کی سوزش — (Mastoid Process)

کیپسکیم (Capsicum): ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے 'سوجن ہوتی ہے' کنپٹیوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔

سیلیشا (Silicea): کنپٹیوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

پلاٹینا (Platina): کنپٹیوں کی ہڈیوں کا سن ہو جانا۔ کنپٹیوں کی ہڈیوں کے شدید سن ہو جانے کا احساس۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں سر کے ساتھ تپکوں کے ذریعے کسا گیا ہو۔

کینتھارس (Cantharis): پھاڑنے والا درد ہوتا ہے جیسے کہ ہڈیوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔

مرک آیوڈ (Merc. iod): کنپٹیوں کی ہڈیوں کی سوزش۔

بیلادونا (Belladonna): ابتدائی مراحل میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ سوزش ہوتی ہے اور متاثرہ حصے سرخ ہوتے ہیں۔

فلورک الیمڈ (Fluoric Acid): کنپٹیوں کی ہڈیوں کے پھوڑے، مسلسل پیلے رنگ کی گاڑھی پیپ کے اخراج کے ساتھ۔ شکر کے اونچے درجے کے فیصد قناب کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہوتی ہے۔ سخت قسم کی جنسی تحریک ہوتی ہے۔

### ملک لیگ — (Milk Leg)

(ٹانگ کی ایک خاص قسم کی سوزش)

پلساٹیل (Pulsatilla): اوپر دیئے گئے مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ پیلی سفید سوجن ہوتی ہے۔ وریدوں کے حلقے کے ساتھ درد اور نرمابٹ ہوتی ہے۔ مریض کو جاڑا لگتا ہے لیکن خود کو ڈھانپنا نہیں چاہتا۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): سفید ورید کی سوجن جو بڑھ جاتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے۔ یہ آخر تک معلوم کی جا سکتی ہے۔

سیلیشا (Silicea): ریشوں (شیج) اور ہڈیوں کے جوڑوں کے بیچ میں کھنچاؤ کے ساتھ۔

لیکیس (Lachesis): جب پلساٹلا ناکام ہو جائے اور جب دل متاثر ہو جائے تو اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ اس میں صبح کے وقت علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔  
ہیامیلس (Hamamelis): یہ ایک دوسری دوا ہے جسے پلساٹلا کے ناکام ہو جانے پر آزمانا چاہئے اور جب لیکیس کی علامات موجود نہ ہوں تب اسے آزمانا چاہئے۔

**طریق کار (کمی و بیشی) — (Modalities)**  
 (دیکھئے ”زیادتی“ اور ”کمی علامات میں“)

**موسیقی — (Music)**

سابنا (Sabina): موسیقی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور اعصابیت پیدا کرتی ہے۔ موسیقی ہڈیوں اور ہڈیوں کے گودے سے گزر جاتی ہے۔  
تھوجا (Thuja): موسیقی کے باعث مریض روتا ہے۔

**پیدائشی نشانات — Naevus (Birth Marks)**

تھوجا ایم (Thuja 1M): علاج اسی دوا سے شروع کیا جائے۔ اسی دوا کا مدر منچگر ہرونی طور پر صبح شام لگائیے۔

ریڈیم بروم 200 (Radium Brom 200): اوپر دی گئی دوا یعنی تھوجا کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ دیجئے جس روز یہ دوا دی جائے اس روز تھوجا نہیں دینی چاہئے۔  
فاسفورس (Phosphorus): اگر اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائیں۔  
ویکسی نم (Vaccinium): اس دوا کو 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں بطور عمل انگیز دوا چدرہ دن میں ایک بار استعمال کرنا چاہئے۔ اس روز کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

**ہڈیوں کا گلنا سرٹنا — (Necrosis)**

سلیشا (Silicea): جب شفا یابی میں سستی ہو تو یہ دوا دی جائے۔ اونچے درجے کی طاقتوں میں یعنی 200 یا 1000 کی صورت میں دیجئے اور لمبے وقفوں کے ساتھ دہرائیے۔  
کلکیریا فاس، کلکیریا فلور (Calcareo Phos, Calcareo Fluor): ہڈیوں کے گلنے سرنے کے علاج کے لئے یا روکنے کے لئے یہ اہم ادویات بدل بدل کر دی جائیں۔  
یوفوربیم (Euphorbium): جڑے کی ہڈی کا گلنا سرٹنا لاحق ہوتا ہے۔ نچلے جڑے کے غدہ میں

پیپ ہوتی ہے اور سوجن ہوتی ہے۔  
 فاسفورس (Phosphorus): نچلے جڑے کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔  
 کالی آیوڈ (Kali Iod): جب آنکھ یا پارے کے غلط استعمال کے باعث مرض لاحق ہو۔  
 کوکولس (Cocculus): سر یا ران کی ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ دوا اسے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔  
 ایسڈ فلور (Acid Fluor): گلنے سڑنے ریشوں (نیچ) کو نکالنے کے عمل کو تیز کرتی ہے۔

### چہرے کا اعصابی درد — (Neuralgia-Facial)

(نیز دیکھئے ”اعصابی نظام“ کے ذیل میں ”اعصابی درد“)  
 مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ایک ہفتہ یا کم و بیش عرصہ کے بعد تین چار روز کے لئے چہرے کا اعصابی درد لاحق ہوتا ہے اس میں گولی نگلنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ چہرے کی بائیں جانب کا اعصابی درد دوران شب مریض کو بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔ مسلسل حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے اور حرکت کو روک دینے سے ابتری ہوتی ہے۔  
 کولو سنٹھس (Colocynthis): جذبات یا جنگ عزت کے باعث درد لاحق ہوتے ہیں جو لہروں کی صورت میں آتے ہیں اور گرمی سے اور دبائے سے بہتر ہوتے ہیں اور آرام کرنے کے دوران ابتر ہو جاتے ہیں۔ بائیں جانب کا اعصابی درد۔ درد کے دوران چہرہ گھڑ جاتا ہے۔ رخساروں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نیز آنکھ کے نیچے کڑھے میں اعصابی درد ہوتا ہے۔  
 بیلادونا (Belladonna): سرخ چہرے، پر خون آنکھوں، گرم سر اور پھوٹے جانے والے حصے کی بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ شدید دریں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈ کے باعث دائیں جانب کا اعصابی درد ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): پھاڑنے والے اور گولی نگلنے جیسے درد بجلی چمکنے کی طرح سے اعصاب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جن میں گرمی سے اور دبائے سے افادہ ہوتا ہے۔ آنکھ کے اوپر والے اور نیچے والے کڑھے میں شدید قسم کے درد ہوتے ہیں۔  
 سینڈرون (Cedron): آنکھ کے اوپر والے کڑھے میں اعصابی درد ہوتا ہے جبکہ دوروں میں دروں کا آنا بہت نمایاں ہو۔

میزیریئم (Mezerium): جب درد چہرے کی گرمی سے دور ہوں (کوئی دوسری حدت تریا گرم افادہ نہیں کرتی) اور گھٹانے کے بعد دروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بائیں رخسار میں درد آنکھ کی طرف دوڑتا ہے۔ رات کے دوران ابتری ہوتی ہے۔

**لیکسیس (Lachesis):** جب چٹائی کی ہڈی میں درد ہو۔  
**ویلیریانہ (Valeriana):** جب آرام کرنے کے دوران درد میں اضافہ ہو جائے۔  
**اکونائٹ این (Aconite N):** متاثرہ حصوں میں جھنجھٹاہٹ کے ساتھ درد ہوتا ہے۔  
**سپائی جیلیا (Spigelia):** شدید جلن دار اور چھڑیاں لگنے جیسے درد بائیں جانب ہوتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔  
**سلفر (Sulphur):** چہرے کا اعصابی درد، حرام مغز کے پانچویں عصب کا اعصابی درد جو اسے چہرے تک پہنچاتا ہے۔  
**کالچیکم (Colchicum):** جب اعصابی درد کے ساتھ عضلات کی فالجی کمزوری بھی لاحق ہو لیکن سپائی جیلیا والی شدت نہیں ہوتی۔  
**سفلینیم (Syphilinum):** جب اعصابی درد رات کے وقت اتر ہو جائیں۔ اس میں بھی چہرے کے ایک جانب کا فالج ہوتا ہے۔ بہت اونچی طاقت کی دوا دیجئے (1000 یا CM)۔  
**ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit):** آنکھ کے اوپر والے اور نیچے والے گڑھے کے درد کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جب درد شروع میں بہت جگے ہوں پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں اور پھر بہت ہی اونچے درجے تک چلے جائیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جائیں۔ آنکھ کے اوپر والے گڑھے کا درد۔  
**کیمومیلا (Chamomilla):** جب درد بہت شدید اور ناقابل برداشت ہو۔ اس کے ساتھ دانت کا درد، کان کا درد اور گردن کا درد ہوتا ہے۔  
**پلاٹینا (Platina):** ٹھنڈک اور سن ہو جانے کے ساتھ اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔  
**پلانٹاگو میجر (Plantago Major):** یہ دوا تقریباً تمام قسم کے اعصابی درد کے لئے بہت مفید ہے۔ درد بچھڑ لگائیے۔  
**کالی آئیوڈ (Kali Iod):** جلد کی امتداد سے بڑھی ہوئی حساسیت۔ ضدی قسم کے کیسوں میں دی جاتی ہے۔ آنکھ کی۔  
**وربیسکم (Verbascum):** کان میں ناقابل برداشت کھنچاؤ کے ساتھ، 'تھمتاہٹ والا درد' معمولی حرکت سے تحریک ہوتی ہے۔ مریض دانتوں کو بھینچتا ہے یا زبان سے دانتوں کو چھوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ خراش دار ڈکار آتے ہیں۔  
**سینگونیریا سی (Sanguinaria):** چہرے کا اعصابی درد جس میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور سر کو زور سے فرش کے ساتھ دبانے کے ذریعے افادہ ہوتا ہے۔ درد بالائی جڑے سے تمام سمتوں میں پھیل جاتا ہے۔



شیننی سیکریا (Staphisagria): اعصابی درد ہونٹوں کو چپے یا کٹنے سے پھونے پر شدید قسم کا درد گولی کی طرح ہونٹوں سے چرے کی طرف جاتا ہے۔

### اعصابی رسولیاں — Neuromata (Nervous Tumors-Nods)

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): یہ دوا اعصابی رسولیوں کے لئے ہے۔ 200 طاقت کی دوا دن میں تین مرتبہ روزانہ چھ ماہ تک دیجئے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے یا افاقہ میں ترقی رک جائے تو درج ذیل ادویات آزمائیں۔

ہائپرکیم (Hypericum): جب آرنیکا ایم ناکام ہو جائے تو اعصابی رسولیوں کے لئے یہ دوا ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی دوا چار گھنٹے کے وقفے کے ساتھ دن میں تین مرتبہ روزانہ دیجئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): اعصابی رسولیاں ہر چار ہفتے کے بعد ظاہر ہوں۔ رسولیوں میں پیپ ہوتی ہے جو کہ خون آلود مواد پر مشتمل ہوتی ہیں۔

برائی اونیا (Bryonia): سر کے گوڑ جلد کے بہت سے حصوں میں پھوٹے سخت غدودوں کی طرح سے ہوتے ہیں۔

کیلنڈولا (Calendula): زخموں والی اور اعصابی رسولیاں۔

سفی لینم (Syphilinum): سر پر گوڑ ہوتے ہیں۔

### بُرے خواب — (Nightmare)

(A dream characterised by great distress and a sense of oppression or suffocation)

کونیم (Conium): دماغ میں قلت خون کے باعث۔

پانی اونیا (Paeonia): بھوت کا خواب جیسے کہ بھوت اس کی چھاتی پر بیٹھتا ہو، متواتر کراچے ہوئے جاگ جائے۔

سائیکل من (Cyclamen): نیند میں ڈوب جانے کے بعد۔

لیڈم (Ledum): مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ سو گئی تو سر جائے گی۔ کلم میں سوچن محسوس ہوتی ہے۔ دم کھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): دل کے امراض میں ہر رات بھیانک خواب آتے ہیں۔

نکس دامیکا (Nux Vom): آخر شب کے ہماری کھانے کے بعد یا شراب نوشی کے بعد۔

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): جریان منی یا احتلام وغیرہ میں۔

## موٹاپا — (Obesity)

(Accumulation of fat in the body)

**کلکیریا کارب** (Calcarea Carb): یہ چربی کو کم کرنے کے لئے ایک بنیادی دوا ہے۔  
ماٹھے پر پینہ آتا ہے جس سے نگیہ بھیگ جاتا ہے جبکہ مریض سو رہا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں یہ دوا دینی چاہئے اور ہر ہفتے دو ہرائی چاہئے۔

**فیرم میٹ** (Ferrum Met): قلت خون کے ساتھ موٹاپا لاحق ہوتا ہے۔ چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ جسم کا گوشت ایسا ہوتا ہے کہ دہانے پر گڑھا پڑ جاتا ہے۔

**امونیا میور** (Amm. Mur): چوتڑ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ چربی والی رسولیاں ہوتی ہیں۔ جسم موٹا اور ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں۔

**فیوکس ولس** (Fucus Ves): جب کلکیریا کارب ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائیں۔ مدر ٹچر قطروں کی صورت میں دیجئے۔

**تھائرائیڈینم** (Thyroidinum): چربی کو گھٹانے کے لئے یہ بھی ایک اچھی دوا ہے۔

**اورم میٹ** (Aurum Met): دل کی چربی کی ابتری کے ساتھ۔

**اسٹیم کروڈ** (Antim Crud): نوجوان لوگوں میں موٹاپا۔

**کریفائٹس** (Graphites): موٹاپے کا رجحان خصوصاً مستورات میں مؤخر حیضوں کے ساتھ۔

## استسقاءی سوجن — Oedema (Dropsical Swelling)

**اورم میور** (Aurum Mur): الیومن کے اخراج کے ساتھ استسقاءی سوجن۔ پیٹ کے اعضاء کی سختی کے باعث 'وقفہ دار بخاروں کے ساتھ' تب کالی 'جگر و کلی کے امراض کے باعث'۔

**نیٹرم کلورائیڈ** (Natrium Chloratum): چلنے پر ہاتھ سوج جاتے ہیں۔

**ایپس مل** (Apis Mel): پیٹ کے استسقاء میں استسقاءی سوجن۔ پیشاب کے کم مقدار اخراج کے ساتھ گردوں کی سوزش والے امراض ہوتے ہیں۔ پھوڑے پھنیوں کے دب جانے کے

بعد استسقاءی سوجن۔ جلد کے شفاف ہونے کے ساتھ اور پیاس نہ ہونے کے ساتھ گردوں کی

اصل والے امراض میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ پیشاب میں بہت زیادہ الیومن خارج ہوتی

ہے۔ بھل کی استسقاءی سوجن 'اعصابی استسقاءی سوجن' جلد پھول جاتی ہے جسے چلنے سے گڑھے

پڑتے ہیں۔

**ایپوسائٹم (Apocynum):** استسقاء میں پیشاب کے کم مقدار اخراج کے ساتھ استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ یہ امیہس مل کے برعکس ہے۔ حیضوں کے اجراء کے رک جانے کے باعث استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ ہیٹ پھولا ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے یا یہ استسقاءی سوجن تھکاوٹ کے ساتھ سانس کے لئے اور خراٹوں کے لئے جھپٹنے کے ساتھ بہت زیادہ حیض کے اجراء کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔

**آر سینک البم (Ars. Alb):** شرایین کے دل کے بڑھ جانے کے باعث لاحق ہونے والے دل کے امراض میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ آنکھوں، چہرے اور ٹخنوں کے قریب والی جلد کی استسقاءی سوجن زیادہ تر لاحق ہوتی ہے۔ مریض بے چین، پریشان اور بے خواب ہوتا ہے۔ منہ خشک ہوتا ہے۔

**فاسفورس (Phosphorus):** گردوں کی سوزش میں اسمال کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ قلت خون کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہو۔

**وسکی کیریا (Vesicaria):** گردوں کے مکمل طور پر فیل ہو جانے کے باعث استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے جو کہ پیشاب کے افراز کو روک دیتی ہے۔ گردوں کے فعل کے رک جانے کے باعث پیشاب خارج نہیں ہوتا۔ مدر ٹھیکر کی ایک ڈرام کی خوراکیں دیجئے۔

**کالی آئیوڈ (Kali Iod):** سوچے ہوئے غدود کے دباؤ کے باعث استسقاءی سوجن لاحق ہو۔ دل کے امراض میں استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ پہلے دائیں ٹانگ میں اور پھر بائیں ٹانگ میں۔ ٹیبری ستم (Terebinth): گردوں میں اجتماع خون کے باعث استسقاءی سوجن لاحق ہو۔ گردوں کی تکالیف کے ساتھ اور نقاہت کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔

**چائنا (China):** لاغری اور قلت خون کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہو۔

**فیسولس این (Phaseolus N):** جگر اور گردے کی پیچیدگی کے ساتھ دل کے امراض کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ گردوں کا اور دل کا استسقاء تیزی سے شفا پاتا ہے۔ پیشاب بڑھی ہوئی مقدار میں بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔ البیومن تیزی کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔

**ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle):** استسقاءی سوجن، فیل پا اور فلیوریا لاحق ہو۔ یہ دوا مخصوص اور مستند ہے۔ 1x ڈائی لیوشن دیجئے۔

**تھائرائیڈینم (Thyroldinum):** بغیر کسی ظاہری وجہ کے بازوؤں، ٹانگوں اور چہرے کا استسقاء لاحق ہو۔

**رشاکس (Rhus Tox):** خضیوں کی، عضو تناسل کی، لب ہائے فرج کی اور منہ کی استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ یہ جلد پر اثر انداز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جھلی پر ہو۔

### قبل از وقت بڑھاپا — (Old Age-Premature)

**امبر اگریشیا (Ambra Grisea):** قبل از وقت بڑھاپا لاحق ہو جائے اس طرح سے کہ پچاس برس کی عمر میں وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جو کہ اسی برس کی عمر میں ظاہر ہونی چاہئیں۔ یادداشت بھول جانے کے ساتھ دماغ کی لڑکھڑاہٹ اور خواب دہلی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔  
**برشا کارب (Baryta Carb):** قبل از وقت بڑھاپا لاحق ہوتا ہے۔ مریض بچوں جیسے کام کرتا ہے اور بچوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں بچوں والا رویہ ہوتا ہے۔ عضلات جواب دے جاتے ہیں۔ ذہانت میں خرابی آ جاتی ہے۔

### قبل از جراحی تکالیف — (Operation-Pre)

### بعد از جراحی تکلیفات — (Operation-Post)

(دیکھئے "خدمات (جراحی کے باعث)" )

### پسینہ — Perspiration (Sweat)

**کلیریا کارب (Calcarea Carb):** چلپے اشخاص یا بچوں میں اتنا زیادہ پسینہ خارج ہو کہ جس سے کتیکہ بھیگ جائے۔ یہ بنیادی دوا ہے۔ لاغر کردینے والا پسینہ 'دوران نیند سر پر پسینہ آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گلزوں میں پسینہ آتا ہے۔ جب پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان پر پسینہ آتا ہے۔

**سلیشیا (Silicea):** پسینے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے خصوصاً ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے ٹکڑوں میں پسینہ آتا ہے۔ گندی بو والا پسینہ آتا ہے۔

**سمبوکس (Sambucus):** جاگنے کے عرصہ کے دوران 'لاغری پیدا کئے بغیر پسینہ آتا ہے۔ مریض جیسے ہی نیند میں ڈوبتا ہے 'پسینہ رک جاتا ہے۔

**گنیشیا میور (Magnesia Mur):** پاؤں میں پسینہ آتا ہے یا پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن ہو۔  
**ورٹرم ایلیم (Veratrum Alb):** جلن ہوتی ہے جب کہ پسینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جاڑا اور گرمی بدل بدل کر آتے ہیں۔ چہرے پر عام طور پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔

**گنیشیا کارب (Magnesia Carb):** کھٹا پسینہ خارج ہوتا ہو۔

**پٹرولیم (Petroleum):** بدبودار پسینہ خصوصاً بفلوں میں آتا ہے جیسے ہی مریض کمرے میں داخل ہوتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ پسینہ اتنا بدبودار ہوتا ہے۔

بیمنزویک ایسڈ (Benzoic Acid): مریض جس کروت لیٹا نہیں ہوتا اس جانب پینہ آتا ہے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ گرے رنگ والا اور بہت بدبودار پیشاب خارج ہو جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب ہوتا ہے۔

ٹیرنٹ (Tarent): موسیقی سننے سے باافراط پینہ خارج ہوتا ہے۔  
کونیم (Conium): مریض جیسے ہی سوتا ہے پینہ بننے لگتا ہے خواہ دن میں سوئے یا رات میں حتیٰ کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی پینہ بہہ لگتا ہے۔ (مسموم کس کے برعکس)

مرکوریس (Mercurius): جب مریض چل رہا ہو تو باافراط پینہ آئے۔ پینہ دن رات آتا ہے گو رات کے دوران زیادہ آتا ہے۔ پکٹائی والا، تلہ والا اور بدبودار پینہ خارج ہوتا ہے جس سے بستر کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ بدبو ہر کہیں ہوتی ہے۔ پیشاب، پاخانہ اور پینہ سب بدبودار ہوتے ہیں۔ تیز میٹھی اور ٹاک میں گھس جانے والی بو ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ریشائی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پینہ آتا ہے۔

لکیسیس (Lachesis): دل کی دھڑکن کے ساتھ پینہ خارج ہو۔ خون آلود پینہ خارج ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): ہاتھوں کی ہتیلیوں پر ٹھنڈا پینہ آتا ہے۔ جس کروت لینے اسی کروت پینہ آتا ہے۔

کالی کارب (kali Carb): پر درد اعضاء میں پینہ آتا ہے۔  
ہیمپر سلف (Hepar Sul): پاؤں میں ٹھنڈا اور بدبودار پینہ آتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پینہ جسم کے صرف ایک حصہ پر آتا ہے اسی طرح سے جسم کے ایک حصہ میں حدت ہوتی ہے جبکہ دوسرا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔

سلی سلک ایسڈ (Salicylic Acid): باافراط بدبودار پینہ پاؤں میں آتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پاؤں پر پینہ آیا ہوا ہو۔

سنی کیولا (Sanicula): بہت زیادہ کمزور بچوں میں رات کے وقت سر پر پینہ آتا ہے جس کے ساتھ پاؤں کا بدبودار پینہ بھی ہوتا ہے۔ صرف ڈھکے ہوئے حصوں پر پینہ آئے (تھو جا کے برعکس) جب ہاتھوں کو ملایا جائے تو ہاتھوں میں پینہ آجائے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ذہنی تھکان کے باعث پینہ آتا ہے جس سے کپڑے پر چپلا داغ پڑ جاتا ہے۔ رات کو آنے والے پسینے، مریض موسم کی تبدیلی، ٹھنڈ، نمی، گرم یا برساتی موسم سے حساس ہوتا ہے۔ طوقان کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Niteric Acid): ہاتھوں اور پاؤں میں باافراط پینہ آتا ہے۔

انٹم ٹارٹ (Ant. Tart): متاثرہ حصوں پر بافراط پینہ آتا ہے۔  
 ٹیلوریم (Tellurium): پاؤں کا بدبودار پینہ۔  
 نیفٹھالین (Naphthaline): رات کا تھکا دینے والا پینہ، دن کے دوران پٹے، بدبودار اسہال ہوتے ہیں۔

کاربو انیملس (Carbo Ani): پیلا داغ ڈال دینے والا پینہ۔  
 گرافٹس (Graphites): پسینے سے پیلا داغ پڑ جاتا ہے۔ کھٹا بدبودار پینہ ہوتا ہے۔  
 بیلادونا (Belladonna): ڈھکے ہوئے حصوں پر پینہ آتا ہے۔  
 سورینم (Psorinum): معمولی تھکاوٹ سے پینہ آ جاتا ہے۔  
 سٹیفیسیگیا (Staphisagria): گندے انڈوں کی بو والا پینہ، 'دق کے آخری کنارے پر آئے ہوئے مریضوں میں رات کو پسینے آتے ہیں۔

اوسیم (Osmium): بغل کا پینہ، نرسن کی طرح سے بدبودار ہوتا ہے۔  
 جہوراندی (Jaborandi): بافراط پینہ چہرے اور ہاتھوں سے شروع ہو کر سارے جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اس کا اختتام کھٹے بلغم والی تہ پر ہوتا ہے۔

اکونائٹ لائیگٹونم (Aconite Lycotonum): ہاتھوں پر پینہ آتا ہے۔  
 لاروسیرا سکس (Laurocerasus): سرد مزاج مریضوں میں گرم کمرے کے اندر پینہ آتا ہے جن میں اتفاق کھلی ہوا میں چلنے سے ہوتا ہے۔  
 اورم میٹ (Aurum Met): پینہ گاڑھے پیشاب کے ساتھ آتا ہے جو گدلا اور بہت زیادہ متعفن ہوتا ہے۔

کروٹن ٹگ (Croton Tig): خون آلود پینہ آئے۔  
 چائینی نم آرسینک (Chininum Ars): سوتے میں بافراط تھکا دینے والا پینہ آتا ہے۔  
 انیشیا (Ignatia): چہرے کے کسی پھوٹے سے ہسے پر صرف پینہ آتا ہے جبکہ مریض کھا رہا ہو۔

کیلڈیم (Caladium): پیشی بو والا پینہ آتا ہے جو کھینوں کو کھینچ لیتا ہے۔  
 تھوجا (Thuja): جسم کے تنگے حصوں پر پینہ آتا ہے اور ڈھکے ہوئے حصوں پر پینہ نہیں آتا۔ اعضاء قائل کے قریب بدبودار پینہ آتا ہے۔ قیل والا، 'منھا' بدبودار پینہ آتا ہے۔  
 مریض جس کو ٹ نہیں لینا ہوتا اس جانب پینہ آتا ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrum Mur): کھاتے ہوئے پینہ آتا ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): کھانے یا پینے کے بعد چہرے پر پھیند آتا ہے۔  
 فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): ہاتھ اور پاؤں مسلسل پینے میں نہائے رہتے ہیں۔

### پینے کا دب جانا (Perspiration-Suppressed)

اکونائٹ (Aconite N): جب پینے کے دب جانے سے نزلہ، بخار اور بیرونی سوزش لاحق ہو۔  
 نکس وامیکا (Nux Vom): پینے کے دب جانے کے باعث بکچش لاحق ہو جائیں۔  
 کالچیکم (Colchicum): اچانک پینے کے بند ہو جانے کے باعث انگڑا ہٹ ہو جائے خصوصاً  
 پاؤں پر سارا جسم گھبرا جانے کے باعث پینے کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔  
 برائی اونیا (Bryonia): دوران زندگی پھیند دب جائے۔  
 ڈلکامارا (Dulcamara): متواتر بیماریوں کے ساتھ اچانک ٹھنڈ لگ جانے کے باعث پھیند  
 دب جاتا ہے۔

### ٹانگ کی سوزش (Phlegmasia Alba Dolens) — (دیکھئے ”ٹنگ لیگ“)

#### رسولی (Polypus)

#### مٹانہ (کی رسولی) (Bladder)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): مٹانے کی رسولی۔

#### کان (کی رسولی) (Ear)

ہائیڈراستس (Hydrastis): کان کی ہلتی جھلی کی بکھرت رسولی کی نشوونما۔

ٹھوجا (Thuja): کان کے وسط میں رسولی ہوتی ہے۔

مرکیورس (Mercurius): سماعت کی ٹالی بہت زیادہ سیلان خون والی نرم رسولی کے باعث

بالکل بند ہو جاتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): کان کی رسولی۔

#### حنجرہ (کی رسولی) (Larynx)

سنگونیریا (Sanguinaria): حنجرہ کی رسولی۔

برب دل (Berb Vul): آواز کی ٹلی کی رسولی جو سرخ ہوتی ہے۔ ڈنھل کی بنیاد والی۔

### ناک (کی رسولی) — (Nose)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): قوت شامہ کے کھو جانے کے ساتھ ناک کی رسولی لاحق ہوتی ہے۔

ٹیو کریم (Teucrium): رسولی پورے نتھنے پر قابض ہو جاتی ہے۔ مریض جس کروت لیتا ہے اس جانب سے ناک بند ہو جاتا ہے۔ نزلے کے غلط علاج کے بعد بڑی سی رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبزی مائل سفید مادہ خارج ہوتا ہے۔ مرطوب موسم میں رسولی بڑھ جاتی ہے۔ رسولی (Polypus) کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

کالی نائٹ (Kali Nit): درد سر کے ہر حملے کے بعد رسولی بہت تیزی سے نشوونما پاتی ہے۔ ناک دائیں جانب سے پھیلا ہوا بڑا ہوتا ہے۔

ہکلا لاولا (Heda Lava): چہرے کی بدہیتی کے ساتھ ناک کی رسولی ہوتی ہے جو آنکھ کے ذیلیوں کو اوپر کی جانب دھکیلاتی ہے۔ پلوں کو الٹ دیتی ہے، نتھنوں کو بند کر دیتی ہے۔ نیچے کی جانب منہ میں پھیل کر سانس اور چہانے کے عمل کو مشکل بنا دیتی ہے۔

الیومینا (Alumina): نتھنے کی رسولی۔ بائیں جانب۔

### امعائے مستقیم (کی رسولی) — (Rectum)

ٹیو کریم (Teucrium): پولی پس کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اسی دوا سے علاج کا آغاز کیجئے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات آزمائیں۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): امعائے مستقیم کی رسولی۔

فاسفورس (Phosphorus): مقعد کی سوزش کے ساتھ امعائے مستقیم کی رسولی۔

### روکنے والی (حفظ مانقدم) — (Preventives)

بیلادونا (Belladonna): سرخ بخار کے مقابلے میں۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): جانوروں میں منہ اور پاؤں کے امراض کے مقابلے میں۔

پائیلو کارپنی غم، پیروٹائڈینم (Pilocarpinum, Parotidinum): کن پیڑوں کے مقابلے میں۔

لیتھر س سٹی وا (Lathyrus Sat): ریڑھ کی ہڈی کے پیلے رنگ کے مادے کی سوزش کے



مقابلے میں۔

میلینڈرینیم، مورینی لینیم (Malandrinum, Morbilinum): خسرو کے مقابلے میں۔

سٹرانسیم (Strontium): تابکاری شعاعوں کے اثرات کے مقابلے میں۔

پرتوسین (Pertussin): کالی کھانسی کے مقابلے میں۔

انفلوئنزینیم (Influenzinum): انفلوئنزا کے مقابلے میں۔

ڈیپتھیرینیم (Diphtherinum): خناق کے مقابلے میں۔

### مانعات سے جلنا (Scalds)

(دیکھئے ”جلنا“)

### اسقربوط (Scurvy)

آرسینک البم (Arsenic Album): شدید قسم کی لاغری ہوتی ہے۔ بچہ دبلا ہوتا ہے۔

معدے کی آنتوں میں شدید قسم کا خلل ہوتا ہے۔ منہ سے بہت زیادہ متعفن بو آتی ہے۔

سلفر (Sulphur): جب سوڑھوں سے خون آئے اور متعفن سانس کے ساتھ مریض کی جلد پرانی جھریوں والی، مرجھائی ہوئی اور غیر صحت مند ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ خون اور متعفن پیپ دانٹوں کی جڑوں سے خارج ہوتی ہے۔

مرکیورس (Mercurius): جب سوڑھے دانٹوں سے الگ ہو جائیں اور نیلے اور غیر صحت مند رنگ والے ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ ٹانگیں سوجنی ہوئی اور بہت پرورد ہوتی ہیں۔ جلد کی غیر صحت مند نیلاہٹ مائل سوزش اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): منہ بدبودار اور ٹھروں جیسا ہوتا ہے۔ سوڑھوں میں ٹنہوری کیفیت ہوتی ہے۔ نکسیر پھوٹی ہے اور اعضائے تناسل سے اخراج ہوتا ہے۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): ٹانگ اور سوڑھوں سے مسلسل جریان خون ہوتا ہے۔ یہ گردوں اور آنتوں سے بھی ہو سکتا ہے۔

آرنیکا ایم، سمفیٹم (Arnica M, Symphytum): ٹانگوں میں دردوں کے لئے دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائیں۔

نوٹ: سکروی کے علاج کے لئے پرہیز بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پھلوں کے رس اور مہزیاں بنیادی غذا ہونی چاہئیں جو افادہ دینے میں بہت اچھے نتائج ظاہر کریں گی۔ ایک حصہ کیلنڈولا بدر پتھر دس حصہ مقطر پانی میں ملا کر کھلی کبجے ہر دو گھنٹہ کے بعد اس سے بہت جلد مرض جاتا

رہے گا اور بدبو ختم ہو جائے گی۔

### بحری سفر کی تکلیفات (Seasickness)۔

(بحری جہاز، موٹر گاڑی یا گاڑی وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے لاحق ہونے والی متلی، قے اور پکر وغیرہ)

پٹرولیم (Petroleum): سفر میں ہونے والی تکلیف (قے، متلی، پکر وغیرہ) کے لئے مخصوص دوا ہے۔ مریض شدید قسم کی متلی اور قے میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ پکر اور چاند میں درد سر ہوتا ہے۔ گاڑی میں سواری کے باعث متلی لاحق ہو۔

اپومورفیا (Apomorphia): دماغی علاقہ کی قے 30 ڈائی لیوشن یا اونچے درجے کی خفراکیں استعمال کیجئے۔

ٹاباکم (Tabacum): معمولی حرکت سے ابتری ہوتی ہے اور عرشہ پر ٹھنڈی تازہ ہوا میں بہتری ہوتی ہے لیکن اس مرض کی طبعی علامات پیلاہٹ، ٹھنڈا پبینہ اور سردی خصوصاً ہاتھوں کی، کے ساتھ۔

سٹیفنی سیگریا (Staphisagria): اعصابی مریضوں میں سفر کی تکلیفات کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا اس لمحے لینی چاہئے جب غنودگی اور متلی کا آغاز ہو، قے کے شروع ہونے سے پہلے۔

گوکولس انڈ (Cocculus Ind): گاڑی میں سواری کرتے ہوئے، جھولنے کے باعث۔ تھیرائیڈین (Theridion): سفر کی تکلیفات، اعصابی عورتوں کے لئے جو بحری جہاز کی حرکت سے بچنے کے لئے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): عرشے پر کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے لیکن مریض جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ سفری تکلیفات لاحق ہو جاتی ہیں۔ مریض مزاجاً خوش باش ہوتا ہے لیکن جلد ہی آنسو بہانے لگتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔

بوریکس (Borax): متلی اور قے، اس نمایاں ترین علامت کے ساتھ ”بچے کی جانب حرکت سے خوف کھاتا ہے“ جہاز یا گاڑی کی نیچے کی جانب حرکت متلی اور قے کا باعث بنتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): جب مریض خاموش لیٹنے سے بہتری محسوس کرے۔ ہر قسم کی غلط اندازی حتیٰ کہ دوا کا پیش کرنا بھی اس کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے۔

کافیا (Coffea): درد سر کے ساتھ ہیٹ میں تکلیف (متلی وغیرہ) جاری رہتی ہے۔ مسلسل قے کا رجحان خلق میں محسوس ہوتا ہے۔ درد شقیقہ کے شدید حملوں کے ساتھ بلغمی قے ہوتی

## احساسات — (Sensations)

کاربو انیملس (Carbo Animalis): تمام اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانے کا احساس۔ آنکھیں اپنے خاتوں میں اور دماغ سر میں ڈھیلا محسوس ہوتا ہے۔

امونیا میور (Amm. Mur): کانڈھوں کے درمیان کمر میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

ڈسٹنی (Daphne): یہ احساس کہ جسم کا کوئی حصہ بازو اور ٹانگوں سے الگ ہو رہا ہے۔

سپیا (Sepia): اسطے مستقیم میں سب یا آلو کی طرح کا گیند ہونے کا احساس۔ اس علامت کے ساتھ اسہال اور قبض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ آنکھوں میں ریت ہونے کا احساس۔

کروکس (Crocus): کوئی زندہ چیز بیٹ یا چھاتی میں حرکت کرتی ہونے کا احساس (شدید قسم کی جنین کی حرکت کے لئے اور اسی طرح سے تصوراتی حمل والے کیسوں میں یہ دوا دی جاتی ہے)۔

سکیل کار (Secale Cor): جلن کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ چنگاریاں اڑ رہی ہوں یا جلتا ہوا کوئلہ حشرہ حصوں پر گرے جو کہ پھوٹنے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ڈھانپنے کو مریض برداشت نہیں کر سکتا۔

میزیریئم (Mazerium): یہ احساس کہ جیسے دانت بہت لمبے ہوں۔

مرکوریس پیرینس (Mercurialis Perennis): دو ٹاک ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

مائرکا سیرنفر (Myrica Cerifera): نپوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے حشرات الارض چرے پر رینگ رہے ہوں۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Inflata): یہ احساس کہ حلق میں ہڈی موجود ہے۔

لیلیئم ٹگرینم (Lilium Tigrinum): کندھے سے نیچے کی جانب کھینچاؤ۔ یہ احساس کہ جیسے گریں لگا کر پاندھ دیا گیا ہو۔

لپٹانڈرا (Leptandra): یہ احساس کہ جیسے کوئی چیز اسطے مستقیم سے خارج ہو رہی ہو۔

لارویرا سس (Laurocerasus): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کھیاں اور ٹکڑیاں جسم پر رینگ رہی ہوں۔

کپسکیم (Capsicum): جلن کا احساس ہوتا ہے جیسے کہ مرچیں چھڑک دی گئی ہوں۔

آرسنک البم (Asr. Alb): جلن کا احساس جس میں گرمی سے اتفاق ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): کسی بھی حصہ میں جلن کے احساس کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سر کے

گرد کس کر پٹی بندھی ہونے کا احساس۔ حلق میں بالوں کا گچھا ہونے کا احساس۔ چھاتی میں برف کا ڈھیلہ ہونے کا احساس۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے چوہا بازوؤں اور چھاتی پر دوڑ رہا ہو۔

فسفورس (Phosphorus): جلن کا احساس۔

بوریکس (Borex): ککڑی، کھٹل یا کیڑوں کے چرے پر ریپگنے کا احساس ہوتا ہے۔

چیلینڈونیم (Chelidonium): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر چل رہی ہو۔ ہوا کی ٹالیوں میں گرد کا احساس ہوتا ہے جس کے باعث کھانسی ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ڈوبنے کا احساس۔

اگنیشیا (Ignatia): خلل پن کا احساس۔

تیربینٹھینا (Terebinthina): یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ایک چھوٹا گیند نگل لیا ہو جو کہ معدے کے گڑھے میں رہ گیا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے آنتیں ریزہ کی طرف کھینچی جا رہی ہوں۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ریزہ پر گئیے کیڑوں کا تکلیف دہ احساس۔

تھوجا (Thuja): یہ احساس ہوتا ہے جیسے دماغ میں کیل گاڑ دیئے گئے ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے ابلتا ہوا سیدھا احمائے مستقیم سے گزر رہا ہو۔ یہ احساس کہ جیسے پاخانے کے دوران مقعد کے گڑھے اڑ جائیں گے۔ یہ احساس کہ جیسے ٹانگیں ککڑی کی بنی ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے بدن شیشے کا بنا ہو اور ٹوٹ جائے گا۔ یہ احساس کہ جیسے کوئی زندہ چیز جسم کی اندرونی جانب اچھل کود کر رہی ہو۔

تھیرائیڈین (Theridion): یہ احساس کہ جیسے کوئی زندہ چیز جسم کی اندرونی جانب اچھل کود کر رہی ہو۔ تھوجا کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے آزما یا جاسکتا ہے۔

کیمومبیل (Chamomilla): یہ احساس کہ جیسے مریض ٹانگوں کی ہڈیوں کے سروں پر چل رہا ہو اور اس کے پاؤں نہ ہوں۔

گرافائٹس (Graphites): چہرے پر ککڑی ہونے کا احساس۔ مریض اسے اتار پھینکنے کے لئے بھانڈے کی سخت کوشش کرتا ہے۔

کیمفر (Camphor): کیڑے امانے کی خواہش کے ساتھ جسم کی سطح پر بہت زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ڈھانپنے کی خواہش کے ساتھ بہت زیادہ گرمی یا ٹھنڈ آتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا جسم کے چہرے پر چل رہی ہو۔

ایلن تھس (Allanthus): چوہا ٹانگوں پر اوپر کی جانب دوڑنے کا احساس۔ سر سے ٹانگوں اور بازوؤں کی جانب بجلی کی دو دوڑنے کا احساس ہوتا ہے۔

کروٹیلس سی (Crotalus C): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ چیز سر میں دائرے کی صورت میں چل رہی ہو۔ کھوپڑی میں سرخ گرم لوہے کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ ایک جگہ سے کھلا ہونے کا احساس ہوتا ہے جہاں سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد معدہ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل پانی میں ڈبو یا گیا ہو یا جیسے چھاتی میں پانی موجود ہو۔ دایاں پاؤں یا بازو چھوٹا ہونے کا احساس۔

پائروجن (Pyrogen): سر پر ایک ٹوپی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے مریض کا سر ایک ٹکے پر رکھا ہے لیکن باقی ماندہ جسم کہاں ہے وہ نہیں جانتی۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر کھوپڑی کے اوپر سے ایک کان سے دوسرے کان تک کسی ٹکے میں جکڑا ہوا ہو۔ حلق میں مچھلی کے کانٹوں کی طرح سے ٹکے پہننے ہونے کا احساس۔

اکونائٹ این (Aconite N): یہ احساس کہ چہرہ لہائی میں نشوونما پا رہا ہے۔ الیومینا (Alumina): بازوؤں اور ٹانگوں اور جسم کے ٹیوں میں بندھے ہونے کا احساس۔ حلق میں مچھلی کے کانٹے کا احساس۔ مریض جیسے ہی غذا کا لقمہ لگتا ہے تو ہر مرتبہ خوراک کی تالی کے معدے کی جانب نیچے کو کھینچنے کا احساس ہوتا ہے۔ کمر اور ٹانگوں پر چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ چہرے پر ٹکڑی یا انڈے کی خشک سفیدی یا خشک خون کے طے ہونے کا احساس۔

اکٹیاریس (Actea Race): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیاہ بادل مریض کے اوپر چھایا ہوا ہو اور مریض کا سر لٹکانے کی طرح اس بادل میں پھنسا ہوا ہو جس سے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سر پر سیسے کی طرح سے بھاری محسوس ہوتا ہے۔ دماغ میں لہروں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے گردن سے کھوپڑی تک سچ کس دیا گیا ہو۔

سس ٹس کین (Cistus Can): جسم کے تمام حصوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے مثلاً معدہ، حلق، چھاتی، انگلیوں کے پور وغیرہ میں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کہ لینے پر پریشانی اور حفس میں دقت کے ساتھ پورے جسم میں چیونٹیاں دوڑ رہی ہوں۔ مریض اٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں، تازہ ہوا کے لئے جس سے اتفاق ہوتا ہے۔ لیٹ جانے پر فوری طور پر دوبارہ یہ احساس لوٹ آتا ہے۔

کوکولس (Cocculus): کمزوری، کھوکھلے پن اور سر میں کچھ نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ گلونائین (Glonoine): یہ احساس کہ جیسے ٹھوڑی گھٹنے تک لمبی ہو گئی ہو۔

کالی یا ٹیکرام (Kali Bich): یہ احساس کہ جیسے سر اور ناک پھٹ جائیں گے۔ یہ احساس کہ

جیسے ڈھیلی ہڈیاں ٹاک میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھا گئی ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے ٹاک کے نقتوں میں بہت اوپر ایک ہال ہو۔ یہ احساس کہ جیسے زبان کے پیچھے ایک ہال ہو۔ پیشاب کا ایک قطرہ پیشاب کی ٹلی میں رہ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ لیٹنے پر دم کھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sulph) : قریب ہی ایک گڑھایا سوراخ ہونے کا احساس جس میں گر جانے کا خطرہ ہو۔ دونوں کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان وزن ہوتا ہے جو مریض کو آگے کی جانب ٹھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb) : معدہ میں کوئی کھونسہ، صدمہ یا بری خبر محسوس ہوتی ہے۔ حلق میں پھلی کا لٹٹا یا لکڑی کی پتھر ہونے کا احساس۔ دوپہر کے وقت شدید جائزے کا احساس ہوتا ہے۔

لکسیس (Lachesis) : حلق میں پھلی کی ہڈی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ جلد پر ایک جوں رنگ رہی ہے۔ گرمی سے اتھری ہوتی ہے نیز حرکت سے اور رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔

میڈورینیم (Medorrhinum) : یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک کیڑا دائیں کان میں رنگ رہا ہو اور سماعت کی ٹلی کی اندرونی دیوار میں سوراخ کرنے کا آغاز کر رہا ہو۔ معدہ کے کڑھے میں کافد یا پن زور لگا رہی ہو جس سے مریض چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے اور بھٹک کر دوہری ہو جاتی ہے۔ پنہیں ہر جانب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آنکھ کے پپٹوں کے نیچے ریت کا احساس ہوتا ہے۔

مرکیورس (Mercurius) : حلق میں سیب کے گودے کے چپک جانے کا احساس ہوتا ہے۔

اوپیم (Opium) : کسی بھی مرض میں غیر موجودگی کا احساس اس دوا کی نشاندہی کرتا ہے۔

کوکس کیکنٹائی (Coccus Cacti) : حلق میں ہال کی موجودگی کا احساس۔

اونوس موڈ (Onosmod) : یہ احساس کہ جیسے روٹی پر چل رہا ہو۔

ورٹرم ایلیم (Veratrum Alb) : یہ احساس کہ جیسے جو پانی اس نے پیا ہے وہ نیچے خوراک

والی ٹلی میں نہیں گیا۔ کھوپڑی میں ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈا

پانی دریدوں میں دوڑ رہا ہو۔ حاملہ ہونے کا احساس۔ یہ احساس کہ وہ کسی جرم کا مرکب ہو چکا

ہے۔ جیسے اس نے پودینہ کھایا ہو۔ منہ اور حلق میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ جیسے کوئی

زندہ چیز معدہ سے حلق کی جانب چڑھ رہی ہو۔ یہ احساس کہ جیسے آنتیں چاقوؤں سے کاٹی جا

رہی ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے پیٹ میں اور اعلائے مستقیم میں گرم کوئلے ہوں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos) : یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے جب تک وہ کھڑا رہتا ہے اس کے

پاؤں بلند ہوتے رہتے ہیں۔

ویلیریانہ (Valeriana): یہ احساس کہ جیسے ایک دھماکہ طلق میں نیچے کی جانب لٹک رہا ہو۔

نیٹرم میور (Natrum Mur): یہ احساس کہ جیسے ایک دھماکہ زبان پر لٹک رہا ہو۔

زینٹھوکسی لم (Xanthoxylum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے بھلی کے ہلکے جھٹکے اس کے سارے جسم میں سے گزر رہے ہوں۔

پالیدیئم (Palladium): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جانور پیٹ کی اندرونی جانب چھوٹے چھوٹے حصوں کو چیر پھاڑ رہا ہو۔ کمر، ہاتھوں، پیٹ، رانوں اور ٹخنوں پر پاؤں کے چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں کے کانٹے کی طرح کے حقیقی نشانات بہت سی جگہوں پر ظاہر ہوتے ہیں مثلاً ہونٹوں پر اور تھنوں وغیرہ پر۔ اس میں شدید خارش ہوتی ہے۔

پتھرولیم (Petroleum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ ٹھنڈک چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہوتی ہے۔

پلاٹینم (Platinum): یہ احساس ہوتا ہے جیسے رانیں سختی سے لپیٹ دی گئی ہوں۔ ماتھے پر پانی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھنڈک کا اور ریگنے کا احساس ہوتا ہے۔ ٹانگوں میں سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ کے اندر کی جانب کھینچنے کا احساس ہوتا ہے۔

پٹیلیا (Ptella T): دماغ میں کیل گارنے کا احساس ہوتا ہے۔

رینن کولس بی (Ranunculus B): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کمرے سے باہر نکلنے پر گیلا کپڑا جسم پر لگایا گیا ہو۔

روٹا (Ruta): آنکھوں میں گرمی اور آگ کا احساس ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں نیچے کی جانب ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

سلی سلک ایسڈ (Salicylic Acid): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پاؤں پر لپینہ آ رہا ہو۔

سینی کیولا (Sanicula): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر نکلا ہوا ہے اور ہوا اس میں سے گزر جاتی ہے۔ دماغ کے گرد ٹھنڈے کپڑے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے کمر دو ٹکڑے ہو گئی ہو۔ سانس کی ٹہلی میں ٹکٹے وقت کوئی سخت مادہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

سلیشا (Silicea): زبان کے اگلے حصہ پر بال پڑے ہونے کا احساس۔

سٹیفیساگیا (Staphisagria): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ اور معدہ ڈھیلے ہو کر نیچے کو لٹک رہے ہوں۔

وسکم الیم (Viscum Alb): مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اسے کمر سے نیچے کھینچ رہی ہو اور اس کے فوری بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کا اوپر والا حصہ ہوا میں تیر



رہا ہو۔

الیومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): دماغ میں بیہوشیوں میں لگنے کا احساس ہوتا ہے جو جسم میں نیچے کی طرف سفر کرتی ہیں اور غبوں میں آکر ٹھہر جاتی ہیں۔ مریض جسم کو لپیٹ لینا چاہتی ہے لیکن سر کو ٹھنڈی ہوا میں رکھنا چاہتی ہے۔

بیرویم سلف (Barium Sulph): سر میں حرکات کا احساس ہوتا ہے۔ دماغ کا ڈھیلا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

آرمنک سلف فلیویم (Arsenic Sul. Flavum): ٹانگوں اور پاؤں کے بھاری ہونے کا احساس۔ ٹانگیں من ہو جاتی ہیں اور ان میں جھٹکے لگتے ہیں۔

پیڈی کولس (Pediculus): یہ احساس جیسے پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا گیا ہو۔

کالی سلف (Kali Sulph): سر پر کسی ہوئی ٹوٹی ہوئے کا احساس۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پانی کے قطرے دل سے ٹپک رہے ہوں۔

کالی بائی (Kali Bi): دل کے قریب ٹھنڈک کا احساس۔

اوسمیم (Osmium): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے مریض نے نوٹے ہوئے پتھر نگل لئے ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کمر اور کندھوں پر کینزے رینگ رہے ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر کے گرد ایک ہاتھ ہو۔

اکونٹینم کیم (Aconitum Cam): بیٹ میں بیہوشیوں کے رنگ کر پھر لگنے کا احساس۔

کلیمنٹس (Clematis): صبح کے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی خند پوری نہیں ہوئی۔

ایتھوزا (Aethuza): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے معدہ کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ چھاتی میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔

سورینم (Psorinum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں سمیت سر اس کا اپنا نہ ہو۔

الیومن (Alumen): بازوؤں اور ٹانگوں کے گرد رسی یا پٹی بندھے ہوئے کا احساس خصوصاً ٹانگ کے گرد گھٹنے کے نیچے۔ چلتے وقت ٹکڑے وزن سے حساس ہوتے ہیں۔

آرگنٹم نائٹ (Argentum Nit): حلق میں ٹکڑے یا مچھلی کا کاٹنا ہونے کا احساس مریض ہرچہ ٹھنڈی رکھنا چاہتا ہے۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): ٹکڑے وقت حلق میں ٹکڑے کا احساس ہوتا ہے لیکن آرگنٹم نائٹ کی طرح سے نہیں۔ ہیمپٹر سلف کے مریض گرم چیزیں پسند کرتے ہیں۔



چائنا (China): آنکھوں میں ریت کا احساس ہوتا ہے۔  
 مگنیشیا میور (Magnesia Mur): یہ احساس کہ جیسے بال کھینچے گئے ہوں۔ بالوں کے مسامات میں دھکن ہوتی ہے۔ سر کو کس کر لپیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔  
 نیٹرم میور (Natrium Mur): حلق میں مچھلی کا کاٹنا ہونے کا احساس۔  
 سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): نظر آنے والی کپکپاہٹ کے بغیر سارے جسم میں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں تھر تھراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔  
 ایبروٹانم (Abrotanum): یہ احساس ہوتا ہے جیسے معدہ ٹکا ہوا ہو یا پانی میں تیر رہا ہو۔  
 ایلیم سیٹی وا (Allium Sat): زبان پر بال ہونے کا احساس۔ پڑھتے وقت بہتری ہوتی ہے۔  
 مگنیشیا کارب (Mag. Carb): دانت بہت لمبے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

### صدماٹ (Shocks)

اکونائٹ این (Aconite N): خوف کے باعث ذہنی صدمہ پیدا ہو۔ لینے ہونے کی حالت سے اٹھنے پر سرخ چہرہ مردے کی طرح پیلا پڑ جاتا ہے اور مریض دوبارہ اٹھنے سے ڈرتا ہے۔  
 کرنے سے یا چوٹ لگنے سے پھر آتے ہیں۔  
 اوبیم (Opium): تصوراتی خوف جیسے بھوتوں وغیرہ کا خوف ہو، کے باعث ذہنی صدمات۔  
 جنگلی جانوروں وغیرہ کے خوف کے باعث صدمات۔  
 آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): دماغی چوٹ لگنے کے باعث بصارت اور سماعت کھو جاتی ہے۔ بے ہوشی ہوتی ہے۔ چوٹ لگنے کے باعث بے ہوشی لاحق ہو۔  
 کیمفر (Camphor): زخم کے باعث صدمہ، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ زبان کپکپاتی ہے نیز ہاتھ اور پاؤں کپکپاتے ہیں۔ اعتدال سے بڑھی ہوئی کمزوری، ٹھانہ اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بے حسی ہوتی ہے۔  
 اگنیشیا (Ignatia): خاندان میں اموات یا دیگر اسی قسم کے واقعات کے باعث ذہنی صدمات لاحق ہوتے ہیں جن کے باعث ذہنی دباؤ اور برے محسوسات ہوتے ہیں۔  
 کنٹھرس (Cantharis): آگ سے جلنے یا گرم مائعات وغیرہ سے جلنے کے باعث صدمات لاحق ہوں تو یہ دوا 2x ذاتی لیوشن کی صورت میں دینے اور مدد ٹیچر پانی میں ملا کر جلے ہوئے حصے پر لگائیے۔  
 کاربووئج (Carbo Veg): پکھلا کئے جانے کی بہت زیادہ خواہش کے ساتھ سانس، حلق، منہ، دانت، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔

**چائنا آف (China off):** خون ضائع ہو جانے کے باعث مریض قریب المرگ ہو جائے۔  
 ڈھانچے جانے کی خواہش کے ساتھ کانوں میں گھنٹیاں بھتی ہیں۔  
**ہائپرکیم (Hypericum):** ذہنی صدمات جو ذہنی دباؤ کے نتیجے میں لاحق ہوں۔ مریض مسکرا کر  
 نہیں ہے اور ہرگز بات کرنا نہیں چاہتا۔ غذا اس کے لئے کوئی کشش نہیں رکھتی۔ زندگی میں  
 کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ صدمات علیحدگی (طلاق وغیرہ) محبت میں ٹاکائی یا اور کسی نامعلوم وجہ  
 کے باعث ہو سکتے ہیں۔ زخم کے باعث ذہنی صدمات اعصابیت، سن ہو جانا اور کیکاپاٹ کا باعث  
 بنتے ہیں۔

### صدمات (جراحت کے باعث)

#### Shocks (Surgical, Post-Operation Ailments)

**فاسفورس (Phosphorus):** پیٹ کے آپریشن (عمل جراحی) سے ایک دن پہلے متلی اور  
 آپریشن کے بعد کی دیگر تکالیف سے بچنے کے لئے اس دوا کی اونچی طاقت کی ایک خوراک دینی  
 چاہئے۔ اعصابی مریضوں میں کسی عضو کے کاٹنے میں جبکہ آپریشن سے پہلے یا بعد اعتدال سے  
 زیادہ خون بے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ کلوروفارم کے اثرات کو ذائل کر دیتی ہے  
 اور آپریشن کے بعد قے کو روکتی ہے۔ دانت نکالنے کے بعد بننے والے خون میں یہ دوا مفید  
 ہے۔

**آرنیکا مونٹ (Arnica Mont):** جراحت کے صدمات کے لئے یہ دوا بھی استعمال کی جاتی  
 ہے۔ عمل جراحی سے پہلے یا بعد دی جاسکتی ہے۔ عمل جراحی کے فوری بعد دینے سے یہ دوا  
 صدمات پر قابو پالے گی اور دکھن کو روک دے گی۔ یہ سر کے زخموں میں درد سر کو رفع کرتی  
 ہے۔ عمل جراحی کے بعد مٹانے کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔

**اکونائٹ این (Aconite N):** نیچے پر عمل جراحی میں جو کہ بہت حساس ہوتی ہے یہ دوا دینی  
 چاہئے۔ مثلاً آنکھ یا پیشاب کی ٹالی وغیرہ کی عمل جراحی میں۔ یہ آرنیکا مونٹ کی نسبت بہتر نتائج  
 فراہم کرے گی۔ جبکہ آرنیکا مونٹ بڑے بڑے آپریشنوں میں دی جاتی ہے۔

**رشاکس (Rhus Tox):** دکھن، بے چینی اور دیگر عمل جراحی کے بعد لاحق ہونے والی  
 تکالیف کو رفع کرنے میں یہ ایک نمایاں دوا ہے۔ ایسے عمل جراحی میں جو پیٹ کے دائیں جانب  
 کے نچلے چوتھائی حصہ سے متعلق ہو۔

**پلساٹیل (Pulsatilla):** جب مریض اپنے ہاتھ سر سے اوپر کئے لیٹا ہو۔ ہوا کا خواہاں رہتا ہو  
 اور متواتر کلی کرنا چاہتا ہو تو ایسے میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): عمل جراحی کے بعد قے کو رفع کرتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ابکائیاں آتی ہیں۔ مریض میں چڑچڑاہٹ ہوتا ہے۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): کٹے ہوئے بازو یا ٹانگ کے ٹخڑے میں اعصابی درد ہوتے ہیں۔ درد دھانگے کی طرح باریک اور گولی لگتے جیسے مزاج کے ہوتے ہیں۔

امونیا میور (Ammonia Mur): پاؤں کے کانٹے کے بعد پھاڑنے والے اور سونیاں جیسے جیسے درد ہوتے ہیں۔ رات کے وقت بستر میں اتھرتی ہوتی ہے اور مالش سے بہتری ہوتی ہے۔

ہائپرکیم (Hypericum): کسی انگلی کے کاٹ دینے کے باعث تیز گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں جب کہ انگلی کسی حادثے کے باعث اوپر سے کٹ جائے یا پھلی جائے۔ درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور زخم لگنے پر ہونے والے درودوں سے مناسب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جب عمل جراحی کے بعد لمبے عرصہ تک چاقو سے کانٹے جیسے درد کا احساس متواتر ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ عمل جراحی کے بعد درد اور تکلیف بڑی تیزی سے اس دوا کی ایک خوراک کے ذریعے رک جاتی ہے۔ پیشاب کی ٹالی کے پھیل جانے کے بعد یا تن جانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ عمل جراحی کے بعد زخم غیر صحت مند دکھائی دیتا ہے۔

وریرٹرم البم (Veratrum Alb): عمل جراحی کے بعد ٹھنڈے پینے جسم کے ٹھنڈا ہونے خصوصاً بازوؤں اور پاؤں کے ٹھنڈا ہونے، چہرہ پیلا پڑ جانے، چہرے کے خدوخال بگڑ جانے، بے چینی، تشنگی درودوں کے ساتھ بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے۔

کیمفر (Camphor): یہ دوا وریرٹرم البم کی نسبت زیادہ سنجیدہ کیسوں پر قابو پاتی ہے۔ صدمہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سانس ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نبض نرم لیکن تیز ہوتی ہے۔ زبان اور ہونٹ کپکپاتے ہیں۔ بعد آہستہ آہستہ آتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): قریب المرگ حالت کے لئے جو کہ زیادہ شدید اور مایوس کن مزاج کی ہوتی ہے۔ بے ہوشی ایسی ہوتی ہے جو کہ محرکات سے ختم نہیں ہوتی۔ نبض بدقت محسوس کی جاسکتی ہے اور سانس کھڑکھڑاہٹ والا ہوتا ہے۔

سٹرانٹیم کارب (Strontium Carb): عملی جراحی کے بعد والے صدمات۔ آپریشن کے بعد بہت زیادہ خون رستا ہے اور ٹھنڈک اور پھینک ہوتا ہے۔

اوپیم، ہیپلی بورس (Opium, Heleborus): مسلسل رہنے والی بے ہوشی کے لئے یہ ادویات دی جاتی ہیں۔ اگر اوپیم ناکام ہو جائے تو ہیپلی بورس آزمائیں۔

پائرو جینیم (Pyrogenium): عمل جراحی کے بعد کسی کیفیت کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

جوتے کا کاٹنا — (Shoe-Bites)

(دیکھئے "کاٹنا" کے ذیل میں)

کو تاہ قامتی — (Short Stature)

ٹیوبرکولینم 'برٹاکارپ' تھوجا (Tuberculinum, Baryta Carb, Thuja): 200  
ڈاکٹی لیوشن کی صورت میں یہ ادویات ہر ہفتے بدل بدل کر چھ ماہ تک یا زیادہ عرصہ کے لئے دی  
جانی چاہئیں۔ قد کے بڑھنے کی توقع صرف دس سے سترہ سال کی عمروں کے درمیان رکھی جاسکتی  
ہے۔ جتنی کم عمر میں دوا دی جائے گی اتنے بہتر نتائج ظاہر ہوں گے۔

بو — (Smell)

بووشا (Bovista): بغلوں کے نیچے بو ہوتی ہے۔  
گلکس موسکاٹا (Nux Mosch): بازوؤں کے نیچے بدبو ہوتی ہے اور عورتوں کے پستانوں کے  
درمیان بدبو ہوتی ہے۔

خواب خرابی — (Somnambulism)

ارنی میزا ولگ (Artemisia Vulg): مریض سوتے میں چلتا ہے یا کوئی دوسرا کام کرتا ہے۔  
نیرم میور (Natrur Mur): سوتے میں مریض اٹھتا ہے اور کمرے میں ادھر ادھر بیٹھتا  
ہے۔  
اگنیشیا (Ignatia): مریض گلی میں سے گزرنے والی ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن جاننے پر بھول جاتا  
ہے۔ دماغ کی اندرونی کیفیت کی صاف طور پر وضاحت کرتا ہے (عزت نفس کے بحروج ہو جانے  
کے اثرات)۔

غنودگی — (Somnolence)

ہیلی بوریس (Helleborus): شعور کو نقصان پہنچائے بغیر کوئی چیز دیکھی یا سنی نہیں جاتی۔ ہر  
چیز اپنا ذائقہ کھودیتی ہے۔

ریڑھ کی ہڈی سے کسی چیز کا خروج — (Spina Bifida)

(ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء کا خروج 'ریڑھ کی ہڈی کی تھیلی دار رسولی کی صورت میں ہوتا ہے)

ٹیوبرکولیئم (Tuberculinum): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ 200 طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

سیلیشا (Silicea): ٹیوبرکولیئم 200 دینے کے ایک ہفتہ بعد 200 طاقت کی اس دوا کی ایک خوراک دیجئے۔

آرسنک آئیوڈ (Arsenic Iod): سیلیشا 200 دینے کے تین دن بعد یہ دوا پندرہ روز تک روزانہ تین مرتبہ دیجئے۔ آرسنک آئیوڈ کے بعد سیلیشا 200 دوبارہ دینی چاہئے۔ ٹیوبرکولیئم 200 صرف دو ماہ میں ایک مرتبہ دوہرائی چاہئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب آرسنک آئیوڈ پراثر ثابت نہ ہو تو یہ دوا آزمائی چاہئے۔

### ریڑھ کے مہروں کی سوزش — (Spondylitis)

کلکیریا فلور (Calcarea Flour): گردن کے غدد اور نیچ سخت ہوں۔ میٹیم کا جھاؤ ہوتا ہے۔ پتھر ملی سخت ہوتی ہے۔ ریڑھ کے جوڑوں کے درمیان سوجن ہوتی ہے۔ پتھر آتے ہیں۔ درد کمر ہوتا ہے۔ جوڑے خشک ہیں۔ مریض ٹھنڈے سے اور مرطوب موسم سے حساس ہوتا ہے۔ آرام کرنے کے دوران ابتری ہوتی ہے۔ گرمی سے علامات میں کمی ہوتی ہے۔

نیفالیئم (Gnaphalium): سر پکراتا ہے خصوصاً اٹھنے پر۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں درد کے ساتھ ادلتی بدلتی ہوئی سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ٹانگ کے اگلے عصب میں تیز کانٹے والا درد ہوتا ہے۔ رانوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ عرق النساء والے عصب میں۔ لیٹنے سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیٹھنے سے افادہ ہوتا ہے۔

میڈورینم (Medorrhinum): جھکنے پر پتھر آتے ہیں۔ گردن اکڑی ہوتی ہے۔ گردن کے عضلات میں تشنجی دورے ہوتے ہیں۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ گردن کی ہڈی میں جلن دار درد، بھاری پن اور دباؤ ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ اعصاب تھر تھراتے ہیں اور ان میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں استقامتی سوجن ہوتی ہے۔ درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اذیت ناک اعصابی درد ہوتا ہے۔ صبح کی روشنی سے سورج کے غروب ہونے تک ابتری ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر بہتری ہوتی ہے۔ معدے کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): گردن کی گدی کے عضلات میں تھکاوٹ اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔ گدی میں سختی ہوتی ہے۔ کاندھوں اور کمر میں پھن ہوتی ہے۔

بازوؤں اور انگلیوں کے پوروں میں جھنجھناہٹ اور بھاری پن ہوتا ہے جیسے کہ ان میں دوران خون نہ ہو۔

**لیڈم (Ledum):** کندھوں میں ہاتھوں اور بازوؤں میں اٹھنے پر یا بازوؤں کو حرکت دینے پر پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں ڈنک لگتے ہیں۔ بازوؤں میں کھینچ اور پھین ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں سن ہو جانے کا اور بے حسی کا احساس ہوتا ہے۔

**فلورک الیسمڈ (Fluoric Acid):** گردن کی گدی میں اکڑن اور درد ہوتا ہے۔ انگلیوں میں چبھنے والا درد ہوتا ہے۔ لکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کولے کی ہڈیوں میں اور پاؤں کے تلوے کے نیچے ٹانگے سے لگتے ہیں۔ ٹانگیں سو جاتی ہیں۔ یہ دوا گرہوں اور دیگر ہڈیوں کی غیر معمولی نشور نما کو نرم کرتی ہے اور تحلیل کرتی ہے یا جذب کرتی ہے۔

**کاسٹیکم (Causticum):** گردن کے عضلات کی سوجن۔ گردن کی گدی میں نفاذ اور اکڑاؤ ہوتا ہے۔ کندھے کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں کھنچاؤ اور درد ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں قائمی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

**کالوفالیم (Caulophyllum):** گردن کی گدی کا اکڑاؤ سر کو حرکت دینے والے پٹھے میں کھنچاؤ ہوتا ہے چنانچہ سر بائیں جانب کھینچ جاتا ہے۔ انگلیاں بہت کھینچی ہوئی اور اکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاتھ بند کرنے سے کانٹے والا درد ہوتا ہے۔

**اکٹیا سپیکاٹا (Actea Spicata):** بازوؤں میں ننگراہٹ کا احساس ہوتا ہے خصوصاً دائیں بازو میں۔ قائمی کمزوری ہوتی ہے اور ہاتھوں میں درد ہوتا ہے۔ ہتھیلیاں دباؤ سے بہت حساس ہوتی ہیں۔

### موج (Sprain)۔

(نیز دیکھیے ”چوٹ“ زخم“)

**آرنیکا ایم (Arnica M):** یہ دوا مددِ نگہ کی صورت میں متاثرہ حصے پر لگائی جاسکتی ہے اور پھر اس جگہ کو سینک دیا جائے۔ اندرونی طور پر یہ دوا 1000 ذائی لیوشن کی صورت میں ہر پانچ گھنٹے کے بعد ایک خوراک دی جائے۔ جب افادہ ہونے لگے تو دوا لمبے وقفوں میں دو ہرانی چاہئے مثلاً ہفتے میں دو مرتبہ۔ موج آئے ہوئے جوڑ پر سیاہ اور نیلے اظہار کو یہ دوا بہت تیزی سے شفا دیتی ہے۔ مریض اس بات سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔

**رشاکس (Rhus Tox):** جب آرنیکا ناکام ہو جائے یا موج کو جزوی طور پر افادہ دے تو یہ دوا استعمال کی جائے گی۔ یہ دوا بہت تھوڑے وقت میں مکمل شفا دے گی۔ 1M طاقت کی دوا دیجئے۔

اگنیشیا (Ignatia): کم اور بے سکون نیند کے ساتھ ذہنی مریضوں میں اس دوا کی نشاندہی کی جائے گی۔ شور برداشت نہیں ہوتا۔ پیشاب پانی کی طرح ہوتا ہے۔ کیکاپاٹ اور بچڑکن ہوتی ہے۔

روٹا جی (Ruta G): خصوصاً کلائی یا منحنے کی سوچ۔ IM ذاتی لیوٹن کی صورت میں آرٹیکا TM کے ساتھ ہر تیسرے دن بدل بدل کر دیجئے۔ یہاں تک کہ صحت یابی ہو جائے۔

### قد — (Stature)

(دیکھئے ”گوتاہ قاسمی“)

### سختی — (Stiffness)

آرسنک سلفر فلیوم (Arsenic Sul. Flavum): زہر خورانی سے شغایاب ہونے کے بعد تمام جوڑوں میں سختی ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): سختی جس میں بہتری حرکت سے اور اتھری آرام سے ہوتی ہے۔  
انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): گردن کی سختی، گردن باہر کو پھیلی ہوتی ہے۔ سر پیچھے کو جھکا ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): اکڑی ہوئی گردن جو ہوا کھنے یا جاڑا کھنے کے باعث ہو جس کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے۔ گردن کو حرکت دینے سے اتھری ہوتی ہے۔ درد گردن سے کندھوں تک پھیل جاتا ہے۔

کالچیکم (Colchicum): فالج اور درد کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔  
روڈوڈنڈرون (Rhodohundron): ٹھنڈی خشک ہواؤں کے باعث سختی۔ طوفانی موسم کے آنے پر درد میں اتھری ہوتی ہے۔

چیلیدونیم (Chelidonium): دائیں جانب درد اور سختی ہوتی ہے۔  
برائی ٹھوٹیا البم (Bryonia Alb): درد کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ حرکت سے اتھری ہوتی ہے۔

### چوسنا — (Sucking)

نیٹرم میور (Natrurn Mur): بچی اپنا انگوٹھا چوستی ہے اور اپنے ناخنوں کو کاٹتی ہے۔ IM ذاتی لیوٹن کی صورت میں ہر پھٹے دوا دیجئے۔ کیڑوں پر ندوں اور پھوٹے جانوروں سے خوف زدہ ہوتی ہے۔

## دھوپ سے جلنا — (Sunburn)

**سال (Sal):** دھوپ سے جلنے کے لئے خصوصی دوا ہے۔  
**ٹوٹ:** امریکا یورپس کا مرہم جلے ہوئے حصوں پر لگایا جاسکتا ہے۔  
**اکونائٹ (Aconite):** پریشانی اور موت کے خوف کے ساتھ۔ مریض کندہ ذہن 'بے وقوف' ہوتا ہے اور بیٹھنے سے اٹھتی ہوتی ہے۔

**جلسی میم (Gelsemium):** چکر آتے ہیں۔ پلکوں کے بھاری پن کے ساتھ سر کے گرد پٹی بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کپٹی میں درد ہوتا ہے جو کان اور ناک کے پہلو تک پھیل جاتا ہے۔ ہڈیاں ہوتا ہے۔ سر ٹکٹے کے اوپر اٹھا کر رکھنا چاہتا ہے۔

**اوپیم 200 (Opium 200):** جب بے ہوشی اور تھکاوٹ ہو تو یہ دوا پیلاڈونا کے بعد آزمانی جائے۔

**گلوٹائین (Glonoine):** پٹیلے چہرے کے ساتھ 'آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہونے کے ساتھ زباں سفید' بھرپور دائرے والی نبض 'بہت زیادہ پیینہ آنے کے ساتھ' دماغی قے اور معدہ کے گڑھے میں ڈوبنے کے احساس کے ساتھ شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔ یہ دوا شروع میں ہر پانچ منٹ کے بعد دیکھتے اور پھر وقفے کو بڑھاتے جائیے۔

**پیلاڈونا (Belladonna):** چہرے میں خون بھرے ہونے اور چہرہ گرم ہونے کے ساتھ 'غٹوگی اور بے ہوشی کے ساتھ درد سر ہوتا ہے۔ ڈھانپے ہوئے حصوں پر پیینہ آتا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بھتی ہیں اور پھاتی میں کنپین ہوتی ہے۔

**نیٹرم میور (Natrium Mur):** گرم موسم میں لوٹ آنے والے درد سر کے ساتھ لو لگنے کے مزمن اثرات۔ سورج کی گرمی سے لاغری اور درد سر ہوتا ہے۔

**لیکسیس (Lackesis):** جب سورج کی گرمی مریض کو غٹوہ اور بے ہوش کر دے۔ گرم پانی سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔

## عرق (پسینہ) — (Sweat)

(دیکھئے "پسینہ")

## سوجن — (Swelling)

(دیکھئے "سوزش")



## گھٹنوں کے جوڑوں کی سوزش — (Synovitis)

سیلیشا (Silicea): ٹھنڈے مریضوں میں جوڑوں کی پکنائی خارج ہونے کے باعث جوڑوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ ایسے مریض گرم موسم میں بھی گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ متاثرہ حصوں کو گرم کپڑوں سے لپیٹنا چاہئے ہیں خصوصاً گردن اور کندھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ 200 یا 1000 ڈال کی لیوٹن کی صورت میں دوا دیجئے۔

ایپس مل (Apis Mel): گھٹنے کے جوڑ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ زیادہ تر بیرونی جانب اور سامنے کی طرف سفید سوجن اور جلن کے ساتھ گھٹنے میں گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): گھٹنے کے جوڑ کا گنٹھیاوی درد، دوران شب اور مرطوب موسم میں درد میں ابتری ہوتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): گھٹنوں کے جوڑ میں پکنائی والی سوزش۔ حرکت کرنے سے سختی اور ٹانگے لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ گھٹن اور جکڑن ہوتی ہے۔

آئیوڈم (Iodum): بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے۔ جگہ بدلنے والے پھاڑنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

پلساٹیللا (Pulsatilla): گھٹنے کی بغیر درد کی سوجن۔ گھٹنوں میں پھاڑنے والا، جھٹکے لگنے جیسا اور گھٹنے والا درد ہوتا ہے۔ گھٹنے میں گرم سوزشی سوجن ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): گھٹنوں کے جوڑوں کا استسقاء۔ گھٹنوں کے جوڑوں کی نیم حاد اور مزمن سوجن۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): گھٹنے کے جوڑ کے امراض کے لئے بنیادی دوا ہے۔

لیڈم (Ledum): گھٹنے کے جوڑوں کی زخموں والی سوزش جس سے مواد خارج ہوتا ہے۔ متاثرہ حصے حساس ہوتے ہیں۔ درد سوزشی، دکھن والے اور پھاڑنے والے ہوتے ہیں۔

روٹاجی (Ruta G): گھٹنے کے جوڑوں کی تھپی کی سوزش۔ گھٹیلو کام کرنے والی ملازموں کے گھٹنوں کی سوزش۔

## پیاس — (Thirst)

لائیکوپس ورگ (Lycopus Virg): خوفناک پیاس ہوتی ہے۔ مریض بہت زیادہ مقدار میں

پانی پیتا ہے۔ سرد ترین پانی کے علاوہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔

الیئم سیٹی وا (Allium Sat): اسکی پیاس جو نیند کو ختم کر دے۔

سلفر (Sulphur): جب مریض بے زیادہ اور کھائے کم۔

ڈیجیٹل (Digitalis): بھوک کے نہ رہنے کے ساتھ شدید پیاس لاحق ہو۔ جب سلفر ٹاکام ہو جائے تو اسے آزمایا جاسکتا ہے۔  
 آرسنک البم (Arsenic Alb): چھوٹے وقفوں میں پانی کی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ منہ خشک ہوتا ہے۔  
 کالکیریا آرسنک (Calcarea Ars): ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے لیکن غذا کی خواہش نہیں رہتی۔  
 کنٹھارس (Cantharis): حلق میں پیاس ہوتی ہے لیکن دماغ میں پانی سے نفرت ہوتی ہے۔  
 گوائیکم (Guaicum): بہت زیادہ پیاس کے ساتھ غذا یا دودھ سے بیزاری ہوتی ہے۔

### انجماد خون — (Thrombosis)

بوٹروپس لین (Bothrops Lan): انجماد خون کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ یہ انجماد خون والے اطہار کے لئے بھی مفید ہے۔  
 کالکیریا آرس (Calcarea Ars): ضمنی دریدیں، دورے، میں غیر معمولی ترقی۔  
 ایپس ایم (Apis M): رانوں کے جھکاؤ کے وسط میں ایک موٹی، حساس رسی رانوں کی اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔  
 لیکسیس (Lachesis): بلند فشار خون کے ساتھ انجماد خون کے لئے ایک دوا ہے۔  
 سبل (Sumbul): کہا جاتا ہے کہ انجماد خون میں بہت مفید ہوتی ہے۔

### ریل گاڑی کے سفر کی تکلیفات — (Train Sickness)

(دیکھئے ”بحری سفر کی تکلیفات“)

### رسولیاں — (Tumors)

(نیز دیکھئے ”اعضائے قاسل“ مستورات“ کے ذیل میں ”رسولیاں“)  
 کالکیریا فلور (Calcarea Flour): سخت قسم کے ڈھیلے اور گرہیں ہوتی ہیں۔ پتھر جی سختی والے سخت عضلات ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پھوڑوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ سرطان کی نشوونما کو روکتی ہے۔ مستورات کے پستانوں میں سخت گولے ہوتے ہیں۔  
 کونیم (Conium): سونیاں لگنے جیسے دردوں کے ساتھ ہموار والے غدود کی شدید قسم کی سختی

جس میں رات کے وقت ایتری ہوتی ہے۔ سرطان پستانوں کی رسولیاں یا سرطان کا آغاز۔  
غددی چوٹوں اور خراشوں کے لئے سب سے بڑی دوا ہے۔

میگ کارب (Mag Carb): یہ جسم کی رسولیوں کا علاج کرتی ہے۔

یرب ول (Berb Vul): رسولیوں کے لئے اور اگاؤ وغیرہ کے لئے۔

تھوجا (Thuja): چڑچڑے اور جلد باز لوگوں میں رسولیاں ہوتی ہیں۔ قبض کے باعث اچھارہ  
ہوتا ہے۔ خالی ذکار آتے ہیں۔ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا  
چاہتا ہے۔ ننگے حصوں میں ہیپو آتا ہے۔

بیلس پی (Bellis P): زخموں والے علاقہ کی رسولیاں (چوٹوں کے باعث) اگر اس کے ساتھ  
تلی متاثر ہو تو سیونٹنکس 1x تباہ لے میں دیتے۔

ریڈیم بروم (Radium Br): یہ دوا سرطان میں عمل انگیز دوا کے طور پر آزمائی جاسکتی ہے۔  
تمام مراحل میں مفید ہوتی ہے۔

لیپس البیس (Lapis Albus): یہ دوا پستانوں کے سرطان کے پہلے مرحلے کا علاج کرتی ہے۔

ہکلا لاولا (Hecia Lava): یہ رسولیوں کے لئے مفید ہے اور درد کو روک دیتی ہے چنانچہ  
جہاں ضروری ہو وہاں مارفیا کے ٹیکے کی جگہ کام کرتی ہے۔ مریض مخصوص قسم کی بری شکل والا  
دکھائی دیتا ہے۔ زرد تھکا ہوا اور خرچ شدہ نظر آتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): خنازیری مریضوں میں رسولیاں، یہ دوا عصی رسولیوں  
میں آزمائی جاتی چاہئے۔ پیپ والی رسولیاں یا ہرچو تھے ہفتے ظاہر ہونے والی رسولیاں۔ افراط  
خون والی رسولیاں جن میں خون ملا مواد شامل ہوتا ہے۔

برشا کارب (Baryta Carb): خصوصاً گردن سے متعلق رسولیاں، چربی والی رسولیاں  
خصوصاً کمر پر ہوتی ہیں۔ کمر کے عضلات میں تباہ ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): گردن پر رسولیاں ہوتی ہیں۔

ہائیڈراکس (Hydrastis): گلنڈ اور رحم کے سرطان میں مفید ہے۔ یہ دوا پستانوں کے غدد  
کی عام رسولیوں میں پائے جانے والے دردوں کو روکتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carb Animalis): پستانوں کی رسولیوں یا سرطان یا پھوٹی گرہیں جو پتھر کی  
طرح سخت ہوتی ہیں۔ بغض کے غدد سو جے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پستانوں میں کھینچنے والے  
درد ہوتے ہیں۔

کالی سائی ٹینم (Kali Cynatum): دماغ کی رسولی جس کے باعث شدید درد سر ہوتا ہے۔

آرنیکا ایم 200، ہائپرکیم 200 (Arnica 200, Hypricum 200): دی گئی ترتیب کے

مطابق چھ ماہ تک یہ ادویات آزمائیں۔ صبح شام دن میں دو مرتبہ دی جائے۔  
برٹا آئیوڈ (Baryta lod): سخت رسولیاں۔

### سارکوما (رسولیاں) — (Tumors-Sarcoma)

برٹا کارب (Baryta Carb): جلن ہوتی ہے خصوصاً گردن میں۔  
کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): جلن کے ساتھ مسک قسم کی رسولیاں ہوتی ہیں۔  
سٹیفی سیکریا (Staphisagria): جب کالی کارب ناکام ہو جائے تو عصبی رسولی کے لئے یہ دوا  
دی جاتی ہے۔

### حفاظتی ٹیکے (کی تکلیفات) — (Vaccination)

تھوجا (Thuja): اگر حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ یہ دوا دی جائے تو حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات  
ختم ہو جائیں گے۔ یہ دوا حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات کے لئے دی جاتی ہے مثلاً انگزیماد فیبرہ کے  
لئے۔  
وکیسی نیم (Vaccinium): سوزش اور متاثرہ حصوں سے مواد رسنے کے ساتھ حفاظتی ٹیکوں  
کے برے اثرات کے لئے دی جاتی ہے۔  
انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): جب تھوجا ناکام ہو جائے تو حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات کے لئے  
دیجئے۔

### حیاتین (وٹامن) — (Vitamin)

ہومیو پیتھی کے نقطہ نظر کے مطابق وٹامن کا نظریہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹامن کی  
گولیاں اور کیپسول جو کہ وٹامن اے 'بی' سی وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں بہت سے نمکیات کی  
کمی کو پورا کرنے کے لئے تجویز کئے جاتے ہیں جو کہ عام خوراک مہیا کرنے سے قاصر رہتی  
ہے۔ صرف وٹامن دینے کا نظریہ ہی کافی نہیں ہے۔ ایک نظریے کے مطابق انسانی نظام کو فعال  
بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نظام وہ تمام وٹامن غذا سے کھینچ لیتا ہے۔  
ہومیو پیتھی اس کا نظم البدل فراہم کرتی ہے۔ ہومیو پیتھی میں ایسی مناسب ادویات موجود ہیں جو  
نہ صرف نمکیات کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں بلکہ نظام کو بھی درست کر کے اس قابل بناتی ہیں کہ  
وہ غذا سے ضروری وٹامن حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر کپاشیم کے نمکیات کی کمی ٹکیریا فاس  
کے ذریعے آسانی سے دور ہو جائے گی۔ اس کی طاقت چھ سے کم نہ ہونی چاہئے۔

### مے — (Warts)

**تھوجا (Thuja):** زیادہ مقدار میں اگنے والے مے۔ سر کے پچھلی جانب مسوں کی طرح ہونے والی پھنسیاں نیز ٹھوڑی وغیرہ پر۔ چپٹے کالے مے 'لبے' بیجوں والے 'توں' والے 'بعض اوقات ان سے رطوبت رستی رہتی ہے اور خون آسانی سے خارج ہوتا ہے۔

**کلکیریا کارب (Calcarea Carb):** چھوٹے سیبگوں والے بہت زیادہ تعداد میں مے ہوتے ہیں جن میں خارش اور ڈنک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ سوزش ہوتی ہے اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

**سلفر (Sulphur):** سخت 'پزدرد' شکن والے مے ہوتے ہیں۔

**نیٹرم میور (Natrum Mur):** ہتھیلیوں پر مے ہوتے ہیں۔

**کالی میور (Kali Mur):** ہاتھوں پر مے ہوتے ہیں۔

**سیپیا (Sepia):** سر ذکر (حشفہ) کے کنارے پر مے ہوتے ہیں۔ جسم پر 'لبے' سخت اور سیاہ مے ہوتے ہیں۔

**کاسٹیکم (Causticum):** نرم بنیاد والے مے ہوتے ہیں۔ جلد پر سیبگوں والے مے ہوتے ہیں۔ بازوؤں اور ہاتھوں پر 'آنکھوں کے پپوٹوں اور چہرے پر مے ہوتے ہیں۔ کئی چھوٹے چھوٹے مے ہوتے ہیں۔

**روٹاجی (Ruta G):** دھنن والے درودوں کے ساتھ مے ہوتے ہیں۔ 'چپٹے' ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہموار مے ہوتے ہیں۔

**ڈلکامارا (Dulcamara):** ہاتھوں کی پشت پر مے ہوتے ہیں۔

**سٹیفنی سیکریا (Staph):** آتشک یا سوزاک والے مے 'شک' تے والے مے 'پھول' کو بھی جیسے مے 'پارے' کے غلط استعمال کے بعد۔

**نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid):** مے 'آلات قاتل' والے مے 'سائیکلوک' یا 'آتشکی' سے 'بڑے بڑے دانے دار مے' تے والے مے ہونے پر جلد خون بہہ نکلتا ہے۔ رطوبت رستی ہے۔ چھڑی لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔

**مگنیشیا سلف (Magnesia Sul):** پورے چہرے پر مے ہوتے ہیں۔

**سبنا (Sabina):** آتشکی یا سوزاک سے جن کے ساتھ ناقابل برداشت اور جلن ہوتی ہے۔ بکثرت دانے دار مے ہوتے ہیں۔

**فیریم پیکریم (Ferrum Pic):** آنکھوں کی صورت میں مے 'مسوں' سے ہاتھ بھر جاتے ہیں۔ یہ دوا باافراط مسوں کے لئے مخصوص ہے۔

نیزم کارب (Nat. Carb): ہاتھوں کی ہتیلیوں پر سے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے دھن سے۔

سفید ٹانگ (ٹانگ کی سوزش) — (White Leg)  
(دیکھئے "ملک لیگ")

جھریاں — (Wrinkles)

(نیز دیکھئے "سوکھا مسان")

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): مریض کے جسم کے اوپر والے حصہ پر جھریاں ہوتی ہیں اور مریض بیمار محسوس ہوتا ہے۔ ماتھے پر بھی جھریاں ہو سکتی ہیں۔ مریض چڑچڑا اور بیچانی ہوتا ہے۔ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔

وریمٹرم البم (Veratrum Alb): جھریوں والی جلد، تھوڑی سی ہے اور پانی والے اسہال ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ نیلا ہٹ مائل ہوتا ہے۔ ناک نوک دار ہوتی ہے۔

ایبروٹانم (Abrotanum): جب پورا جسم لاغر اور جھریوں والا ہو۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ نوزائیدہ بچہ بوڑھا شخص معلوم ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں اور مریض بیمار دکھائی دیتا ہے۔ جلد ٹپکلی ہوتی ہے اور ڈھیلی ہو کر تھوڑی سی لگ جاتی ہے۔

اورم میور (Aurum Mur): آتشک کے باعث چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں۔ جسم لمبا اور موٹا ہوتا ہے لیکن ٹانگیں بہت پتلی ہوتی ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): بڑھتی ہوئی لاغری خصوصاً ٹانگوں میں، مریض مر جھایا ہوا، سوکھا ہوا اور بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔

سنی کیولا (Sanicula): بڑھتی ہوئی کمزوری، بچہ گندا، چکنا اور بھورا نظر آتا ہے۔ گردن کے قریب والی جلد پر جھریاں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی لگ جاتی ہیں۔

جمائیاں — (Yawning)


اکونائٹ این (Aconite N): نیند کے بغیر متواتر جمائیاں آتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کھانے کے بعد جمائیاں آتی ہیں۔

نکس دامیکا (Nux Vom): کھانے کے بعد گھٹنوں جمائیاں آتی ہیں۔

اگنیشیا (Ignatia): سونے کے بعد جمائیاں آتی ہیں۔ کھاتے ہوئے جمائیاں آتی ہیں۔ اعتدال

یہ وہ ہمایاں آتی ہیں جیسے کہ جڑا اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔  
 رشاکس (Rhus Tox): جڑا اپنی جگہ سے ہل جانے کے خدشے کے ساتھ شدید قسم کی  
 ہمایاں آتی ہیں۔ نچلا جڑا سخت اور پردرد ہوتا ہے۔  
 نیشترم میور (Natrur Mur): اندرونی جاڑے کے ساتھ ہمایاں آتی ہیں۔  
 سلفر (Sulphur): دن کے دوران ڈکاروں کے ساتھ متواتر ہمایاں آتی ہیں۔  
 چیلڈونیم (Chelidonium): کھنچاؤ اور نیند آنے کے ساتھ ہمایاں آتی ہیں۔  
 لیکسیس (Lachesis): بے چینی اور کمر میں درد کے ساتھ ہمایاں آتی ہیں۔  
 ٹیلوریم (Tellurium): ابکائیوں کے بعد ہمایاں آتی ہیں۔ کھانے کے بعد غنودگی ہوتی ہے۔  
 ایل ٹائٹ (Amyl Nit): بکثرت اور بار بار ہمایاں آتی ہیں۔ کھنچاؤ گھنٹوں تک مسلسل رہتا  
 ہے۔ مریض بستر پر لیٹ جائے گا اور انگڑائی لینے کے لئے مدد کے لئے بلائے گا۔  
 پلمبم (Plumbum): متواتر انگڑائیاں (کھنچاؤ) اور ہمایاں آتی ہیں۔



130	● آنکھیں اور بصارت	547	● آپلے
189	● آواز کا بیٹھ جانا (حار)	209	● آپلے (پھالے 'ہونٹوں کے)
192	● آواز کا بیٹھ جانا (مزمین)	397	● آنکھ
21	● اہترائی دیوانگی	137	● آشوب چشم
455	● ابھار (فرج سے اوپر والی جگہ)	389	● آکزیٹ (پیشاب میں)
297	● اچھارہ	585	● آگ سے جلنا اور مانتات سے جلنا
474	● اچھارہ (رحم)	300	● آنٹوں کی تکلیف
642	● احساسات	300	● آنتیں (رکاوٹ)
409	● احکام	151	● آنسو
78	● اشتقاق الدم	150	● آنکھ کا بیدگاہین
163	● اخراج	146	● آنکھ کا درد
412	● اخراج (برونشیت)	143	● آنکھ کی پتلیوں کی سوزش
60	● اداسی (تمکینی)	145	● آنکھ کے امراض
59	● اوراک (شعور، سمجھ وغیرہ)	147	● آنکھ 'ہلائی پچھنوں کا فالج
71	● اویڑوں میں اینٹھن	140	● آنکھ کے پچھنوں کے دانے
10	● ارتکاز توجہ	151	● آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھار
462	● استقاء	130	● آنکھ کے پردہ شبکی کا سکراؤ
290	● استقاء (بیت میں)	141	● آنکھ کے سفید روئے کا ورم
473	● استقاء (رحم کا)	154	● آنکھ کے سیاہ حلقے کی سوزش
633	● استقاقائی سوچن	130	● آنکھ کے مصلات کی کمزوری
448	● استقاء (صل)	142	● آنکھ میں زخم
640	● استقراوط	160	● آنکھوں سے پانی بہے
337	● اسہال	144	● آنکھوں سے پانی کا اخراج
317	● اشتیا	133	● آنکھوں کا بھپکا
565	● اضافہ (علامات میں)	139	● آنکھوں کی بھپکاہٹ
10	● اعتماد کا فقدان	138	● آنکھوں کے ڈھیلے
106	● اعصاب		
53	● اعصابی تحکات		



268	• انچائیکا	630	• اعصابی درد چرسے کا
667	• انجمان خون	418	• اعصابی درد (فصیوں کا)
477	• اندام نہانی	231	• اعصابی درد (زبان کا)
510	• اندام زخم کے بعد کا نشان	207	• اعصابی درد (مسوڑھوں کا)
6	• اندیشہ	75	• اعصابی مرض: ذہن میں مضمرات
132	• اندھا پن		• بہ اختیارانہ پھڑکتے ہیں
387	• اندی کین (پیشاب میں)	73	• اعصابی نظام کے امراض
549	• انفو کنزا	194	• اعصابی... درم خلق
593	• انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا	50	• اعصابیت (گھبراہٹ)
612	• انگلیوں کا سن ہو جانا	431	• اعضائے تاسل کی غارش
595	• انگلیوں کا پتیلی کی جانب کھینچ جانا	394	• اعضائے تاسل کے امراض
179	• اورینا	394	• اعضائے تاسل... مشترک امراض
519	• اپنی ڈرمولائی سس	425	• اعضائے تاسل میں مسرت کا
404	• ایٹاؤکیاں		احسان
137	• ایک کے دو نظر آنا	22	• افسردگی... کیاؤ
71	• اینفشن (ایبوں) قلم کاروں وغیرہ میں	514	• آگزمیا (کھجلی و غارش)
78	• اینفشن (تشیخ)	459	• ایلیومن کا اخراج (دوران حمل)
472	• اینفشن (رحم)	571	• الرتی
499	• اینفشن (مضرات)	2	• اٹکھلی... القولیت
		222	• انگ ہونا (دانت)
		28	• امتحان
		275	• امراض قلب (عمومی)
383	• پافراط "پیشاب آنا"	331	• امعائے مستقیم اور پاخانہ
460	• پافراط حیض	357	• امعائے مستقیم کا خروج
68	• باتونی پن	357, 638	• امعائے مستقیم کی رسولی
388	• باس (پیشاب)	356	• امعائے مستقیم کی سوزش
140	• بال (گھٹوں کے) گرہیں	358	• امعائے مستقیم کی ٹھنڈی، جھٹی
897	• بال (زیر ناف)	356	• امعائے مستقیم میں درد



474	• برہادی (رہم کی)	541	• بالوں کا اگاؤ
529	• برص	542	• بالوں کا سفید ہونا، قبل از وقت
632	• بڑے خواب	540	• بالوں کا گرنا
635	• بڑھاپا، قبل از وقت	466	• بانجھ پن
412	• بڑھ جانا (پروٹیسٹ نورو کا)	610	• بکلی کے بھینٹے
317	• بڑھی ہوئی تیزابیت	328	• بچوں کا برقان
414	• بڑھی ہوئی خواہش جماع	535	• بچوں کی جلد کے ایک حصہ کی ختی
581	• بستر کے زخم	530	• بچھوا بچھوت، چھینے
538	• بسری --- جلد	467	• بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے
153	• بصارت	641	• بحرئ سنرکی تکلیفات
157	• بصارت دوہری	549	• بخار --- اقلو کزرا
158	• بصارت "قریب نظر"	561	• بخار --- ٹائیفائید
130	• بصارت میں دھندلاہٹ	548	• بخار، جسم کا بہت شدید
635	• بعد از جراثیم تکلیفات	557	• بخار، خسرے کا
375	• بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جانا	533	• بخار، سرخ
388	• بلفم (پیشاب میں)	545	• بخار، عام
651	• بو	558	• بخار، غلوئی (خون میں زہر)
357	• بو اسیر	547	• بخار، کمر توڑ (ڈینگلو)
352	• بو اسیری جریان خون	548	• بخار، گردن توڑ
509	• بوائیاں	551	• بخار --- طیریا
391	• بو (پیشاب)	49	• بخل
220	• بوسیدگی (دانتوں کی)	349, 356	• بدبودار پاخانے
208	• بوسیدگی (گٹا، سڑنا)	449	• بدبودار حیض
183	• بو کا وہم	512	• بد رنگ ہونا (جلد کا)
183	• بو کی حساسیت	513	• بد صورتی
216	• بوٹنے میں وقت	67	• بدگمانی (شک و شبہ)
181	• بو (متعفن)	222	• بدگمانی (دانتوں کی)
607	• بوٹا پن	346	• بد بھشی

366	• پتھری 'مگروں کی	161	• سوا پن
537	• پتی	386	• بھورا (پیشاب)
327	• پتے کی پتھری	305	• بھوک بڑھی ہوئی یا پیٹوں والی
325	• پتے کی سوزش (بغیر پتھری کے)	307	• بھوک 'کھو جائے
499	• پٹوں کا ڈھیلا پن (جب پٹے	32	• بھول جانا
	سکونے کے قابل نہ رہیں)	62	• بے خوابی
502	• پٹوں کی سوزش ہڈی کے سینے کے	463	• بے خوابی (دورانِ حمل)
	عمل کے ساتھ	593	• بے ذول
536	• پیٹیاں	579	• بے دھتے
382	• پردہ و پیشاب آنا	41	• بے رخی 'بے اعتنائی' لاپرواہی
443	• پردہ حیض	231	• بیرونی استعمال کے لئے (زبان)
426	• پردہ (مجامعت) (زنانہ)	511	• بیرونی بیکان کے باعث جلد کی حال
148	• پردہ خشکی اور عصب بصارت کے		سوزش
	امراض	6	• بے زاری
137	• پردہ خشکی کی عیلاج	460	• بے زاری (دورانِ حمل)
71	• پردہ مزاج	456	• بیضہ دانیاں
412	• پردہ شیٹ	77, 124	• بے ہوشی
287	• پردہ (دل کے امراض)		
11	• پریشانی		
435	• پستان	65	• پاخانہ
437	• پستانوں کا بڑھ جانا	358	• پاخانہ کرتے وقت زور لگانا
436	• پستانوں کا گھٹ جانا	120	• پار کنسن کے امراض
579	• پس ماندہ	47	• پاگل (جنون)
635, 655	• پیچیدہ	463	• پاگل پن (دورانِ حمل)
638	• پیسنے کا دب جانا	99	• پانی سے خوف
407	• پکڑنا (مضمونِ تسل)	137	• پانی کا اخراج (آنکھ سے)
144	• پگھلنے کا انداز کی جانب آگنا	321	• پانی منہ میں بھرنا
131	• پگھلنے کی سوزش	206	• پانی ریا



629	• پیدائشی نشانات	135	• یگوں کے امراض
370	• پیشاب آنا	138	• پٹلیں
378	• پیشاب آنا متواتر	631	• پچھو مدنی
382	• پیشاب خطا ہو جانا	209	• پھٹنا (ہونٹوں کا)
387	• پیشاب 'دودھیا' سفید	152	• پھر کن
371	• پیشاب کرنے کی خواہش	210	• پھر کن (ہونٹوں کی)
389	• پیشاب کم مقدار	130	• پھوڑا (آنکھ کے پردے کا)
380	• پیشاب کی بندش	435	• پھوڑا (بستان کا)
465	• پیشاب (کی بندش) دورانِ حمل	351	• پھوڑا (ناسور) (اسعائے مستقیم)
362	• پیشاب کی جراثیمیت	181	• پھوڑا 'ناگ کی نالی' کا
384	• پیشاب میں البیومین	204	• پھوڑے اور سوزش
387	• پیشاب میں چکنائی	519	• پھوڑے پھنسیاں (جلد)
379, 386	• پیشاب میں خون	407	• پھوڑے پھنسیاں (عضو تناسل کی)
383	• پیشاب میں رگولت	524	• پھوڑے پھنسیوں کا وب جانا
389	• پیشاب میں فاسفیٹ	506	• پھوڑے (جلد)
385	• پیشاب میں کھار	153	• پھوڑے 'قرنہ' کے
393	• پیشاب میں یوریا	207	• پھوڑے 'ناسوری کیفیت'
		656	• پیاس
		389	• پیپ (پیشاب میں)
			• پیٹ
27	• پیہ کن	288	• پیٹ کا بڑھ جانا
245, 561	• پیپ دق	297	• پیٹ کے کپڑے
303	• پیپ دق (پیٹ)	359	• پیٹ میں محسوس ہو 'زندہ چیز'
420	• پیپ دق (ضمیموں کا)	288	• پیٹ --- ناسور
177	• پیپ کالی	303	• پیٹ --- پیپ کی جانب کھنچاؤ
40	• پیرکات	292	• پیچش
578	• پیڑاق	344	• پیچش 'مزمن'
78, 121	• پیچ	296	• پیچیدہ بچے
150	• پیچنی ہینکے	603	

ت

628	• ہانگ کی ایک خاص قسم کی سوزش	121,358	• تشنجی دورے
638,661	• ہانگ کی سوزش	6	• تشویش
561	• ہائپوٹائیز	14	• تضاد یا تردید
472	• نکل جانا (رحم کا)	390	• تھجست (پیشاب)
484	• ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی سوزش	331	• تلی کے امراض
387	• ٹھنڈا (پیشاب)	232	• ٹھنڈا (زبان کا)
407	• ٹھنڈا (عضو تناسل)	212	• ٹھنڈا (زبان کے نیچے والی حلیلی دار
593	• ٹھنڈک		رسولی)
172	• ٹھنڈ (نزلہ)	58	• ٹنگ مزابی
		241	• ٹنگ چھاتی
		358	• ٹنگی (اسعائے مستقیم)
		584	• ٹنٹس
499	• جب ٹپے سکڑنے کے قابل نہ رہیں	584	• ٹنٹس --- تیز یا وقت کے ساتھ
207	• جزا	461	• ٹنٹس (دوران عمل)
208	• جزے کا بند ہو جانا	399	• تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی
208	• جزے کا گھٹنا سڑنا	67	• توہات
208	• جزے کی ریشہ دار رسولی	53,611	• تحکات
207	• جزے کی کڑکڑاہٹ	212	• تحوک
528	• جذام	217	• تحوکنہ
620	• جریان خون	137	• حلیلی (آنکھ میں ہوا)
352	• جریان خون (اسعائے مستقیم)	468	• حلیلیاں
548	• جسم کا بہت شدید بخار	369	• خیر تا یا حرکت کرتا گردہ
322	• جگر اور تلی	305	• خیزابیت
322	• جگر کے امراض	530	• خیل والی (جلد)
46	• جلایا		
504	• جلد		
530	• جلد اترنا		
503	• جلد بالوں اور ناخنوں کے امراض	200	• ناسل دور کرنے کے بعد کی تکالیف
	• جلد --- بچوں کی جلد کے ایک حصہ	197	• ناسل کا درم

ج

ٹ

586	• جوڑوں کی بھیلیوں سے برآمدہ
	چکنائی
478	• جوڑوں کے امراض
626	• جوئیں
35	• جوئے بازی
661	• جھریاں
60	• جھکڑاٹو
386	• جھلیاں (پیشاب میں)
5	• جھنجھلاہٹ

### ج

65	• چرانا
125	• چکر
388	• چکنا (پیشاب)
526	• چکنی (جلد)
101	• چٹنے کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی نااہلیت
133	• چمک (آنکھوں کی)
511	• چٹیاں
142	• چوت (یا زخم آنکھ میں)
623	• چوئیں زخم
440	• چوچیل
69	• چوری کرنا
654	• چوٹا
240	• چھاتی میں دباؤ
528	• چھپاکی
530	• چھٹے
504	• چہرے پر کیل مہاسے

535	کی تختی
538	• جلد --- بسرہ
530	• جلد --- تیل والی
526	• جلد --- چکنی
526	• جلد --- سخت
511	• جلد کا رنگ
533	• جلد --- کھردری
526	• جلد کی وق چہرے کی
538	• جلد --- کیل
518	• جلد --- لاغری
535	• جلد --- موٹی
535	• جلد --- ناسور
518	• جلد --- باقی کھال والی
441	• جلق (زنانہ)
406	• جلق (مردانہ)
161, 584	• جلن
100	• جلن (اعصابی)
370	• جلن وار (پیشاب)
407	• جلن (مضو تا سل کی)
661	• جمنائیاں
455	• جھنی جنون (زنانہ)
406	• جھنی جنون (مردانہ)
417	• جھنی (مردانہ)
47	• جنون
462	• جین --- اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور حرکت کرنا
651	• جوتے کا کانا
484	• جوڑوں کا درد

194	•• خلق --- ورم (اعصابی)
194	•• خلق --- ورم (گنٹھیاوی)
194	•• خلق --- ورم (نزلاوی)
193	•• خلق --- ورم (مزمن)
458	•• حمل
465	•• حمل کے دوران صبح کے وقت کی تکلیف
461	•• حمل کے دوران کھانسی
545	•• حمیات
638	•• حنجرہ (کی رسولی)
169	•• حنجرہ کے امراض
202	•• حنجرہ کے تکلفی ہسکے
201	•• حنجرہ، زخروہ
201	•• حنجرہ --- ورم
659	•• حیائین (وٹامن)
443	•• حیض، پُر دور / مؤخر
441	•• حیض --- غیر موجودگی
449	•• حیض، قبل از وقت
441	•• حیض کا وہب جانا یا رک جانا
454	•• حیض، کم مقدار
422	•• حیض موقوفی

## خ

528	•• خارش
514	•• خارش (جلد)
583	•• خارش، کھلبلی
410	•• خارش (کھوٹکت کی)
184	•• خراٹے

630	•• چہرے کا اعصابی درد
626	•• چہرے کی جلد کی وق
408	•• چھوٹا (عضو تا سل)
184	•• چھینکیں
559	•• چھپک
350	•• چہرے (مقعد)
509	•• چیلونیز (زخم کے نشان پر دانے وار اجمار)

## ح

511	•• حاد سوزش (بیرونی تہان کے باعث جلد کی حاد سوزش)
80	•• حالت غشی یا دیوانگی، سرسام
594	•• حالت نزع، غشی
505	•• حجام کی خارش
620	•• حدت
74	•• حرام معز کی بھلیوں کا ورم
501	•• حرکت کرنے پر عضلات کی بڑھی ہوئی کچھن
121	•• حساسیت
108	•• حساسیت، ضرورت سے زیادہ
46	•• حسد (جلایا)
405	•• حشد (عضو تا سل) کا سر
659	•• حفاظتی ٹیکے (کی تکلیفات)
639	•• حفظ، مقدم
184	•• خلق
201	•• خلق کا کوہ
169	•• خلق کے امراض

23	• خواہش (طلب)	460	• خروج
402	• خواہش گھٹی ہوئی (نامردی)	476	• خروج (رحم کا)
15	• خواہش (موت کی)	554	• خسرو
65	• خودکشی کا رجحان	557	• خسرو کا بخار
32	• خوشامد	230	• خشک (زبان)
29	• خوف	477	• خشکی (اندام تنائی)
59	• خوف 'ذہر خورانی کا	210	• خشکی (منہ کی)
14	• خوف (موت کا)	343	• خصوصاً بچوں میں اسہال کے لئے
461	• خوف موت کا 'دوران حمل	417	• خبیثے
386	• خون (پیشاب میں)	417	• خبیثے --- لاغری
576	• خون 'قلبت	414	• خبیثے --- ورم
125	• خون کی ٹالیوں کا پھیل جانا	420	• خبیثوں کا چڑھ جانا
268	• خون کی ٹالیوں کی پھیلاؤ	406	• خبیثوں کی تھیلی میں پانی بھرنا
558	• خون میں ذہر (بخار)	421	• خبیثوں کی رنگوں کا پھول جانا
625	• خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا	418	• خبیثوں کی سوزش
	(ہاکن کے امراض)	479	• خبیثگی (ریڑھ کی)
412	• خورش	239	• خنازیر
		186, 548	• خناق
		605	• خواب
526	• داو --- سمندے کے کنارے	61	• خواب آلودگی
	پھولے کول پتھر جیسی دار	632	• خواب 'بڑے
581	• داڑھی	651	• خواب خرابی
220	• دانت	61	• خوابی دورے
223	• دانت کا درد	403	• خواہش بڑھی ہوئی (مردانہ)
464	• دانت کا درد (دوران حمل)	371	• خواہش (پیشاب کرنے کی)
600	• دانت (نکٹے کا عمل)	428	• خواہش 'جنسی' بڑھی ہوئی
222	• دانتوں کا گرنا	429	• خواہش 'جنسی' دبی ہوئی یا گھٹی ہوئی
222	• دانتوں کا ناسور	461	• خواہش (دوران حمل)





275	● دل کی بھٹی کی سوزش	240	● دباؤ (چھائی میں)
281	● دل کی دھڑکن	611	● دباؤ
101	● دماغ کی جھیلیوں کا ورم	429	● دہی ہوئی یا گھنی ہوئی (جنسی خواہش)
100	● دماغ میں خون کا غیر معمولی اثر و حام	229	● درائیں (زبان کی)
1	● دماغی امراض	110	● درد اعصاب (درد جو اعصاب پر اثر انداز ہو)
123	● دماغی رسولیاں	630	● درد اعصابی چہرے کا
184	● دم گھٹنا	484	● درد (جوڑوں کا درد) گھٹیا وجہ
248	● دم		(المقاسل)
604	● دھیل (جلد)	223	● درد دانت کا
508	● دھیل گوشت خور پھوڑے	463	● درد (دوران حمل)
438	● دودھ (پستان)	475	● درد (رتم)
387	● دودھیا (سفید پیشاب)	89	● درد سر
461	● دوران حمل کھانسی	408	● درد (مضوضاقل)
465	● دوران حمل صبح کے وقت کی تکلیف	292	● درد قویج
461	● دوران حمل --- خوف موت کا	481	● درد کمر
460	● دوران حمل --- مقصد	163, 166	● درد کان کا
460	● دوران حمل --- نفرت بیزاری	310	● درد معدہ
144	● درد کی نظر کی کمزوری	463	● درد وضع حمل کے (خلط)
157	● دوہری بصارت	47	● دروغ گوئی
184	● دھبے (ناک پر)	1	● دشنام طرازی
27	● دہشت	372	● وقت (پیشاب)
655	● دھوپ سے جانا	195	● دکن (گلے کی)
15	● دھوکہ بازی	214	● دکن (منہ کی)
9	● دھوکہ دہی	206, 218	● دکن و زخم منہ
42	● دیوانگی (مائیخولیا)	268	● دل اور خون کی تالیوں کا مرض
		13	● دلجوئی یا دلا سے
		280	● دل کا بڑھ جانا

638	• رسولی --- مٹانے		
207	• رسولی --- سوز سے		
180, 639	• رسولی --- ٹاک	308	• ذکر
613	• رسولی --- ملفوف	548	• ڈیگرو (کرتوڑ بنانا)
210	• رسولی --- ہونٹ		
152, 657	• رسولیاں		
123	• رسولیاں ' دماغی	242	• ذات الجنب
659	• رسولیاں --- سارکوما	243	• ذات الجنب سے متعلق (مرض)
468	• رسولیاں (سرطان ' تحصیلاں ' گومری)	218	• ذائقہ
119	• رعشہ	8, 53	• ذاتی تھکاوٹ
10	• رفاقت کی تمنا	600	• ذیابیطس
9	• رفاقت یا صحبت		
301	• رکاوٹ (پیٹ)		
496	• رکش (ہڈیوں کا نرم پڑ جانا)	470	• رحم
137	• رکمت (کی تبدیلی)	474	• رحم کی سختی
532	• رنگ ورم	430	• رحم کی یا بیضہ دان کی سوزش
229	• رعینہ (زبان کی)	474	• رحم --- گھٹا سوتا
9	• روشن خمیری	474	• رحم --- گوشت کا لہو تھوڑا
146	• روشنی کا خوف (نور ترسی)	476	• رحم --- گومز
639	• روکنے والی (حفظ مانعہ)	476	• رحم --- تاسور
70	• رونا	470	• رحم --- نیچے کی جانب دباؤ
651	• ریڑھ کی ہڈی سے کسی چیز کا خروج	474	• رحم --- ہوا (اچھارو)
106	• ریڑھ کی ہڈی کا ورم یا سوزش	638	• رسولی
652	• ریڑھ کے صوبوں کی سوزش	639	• رسولی --- اسماعائے مستقیم
139	• ریشوں کی نشوونما	638	• رسولی --- خنجر
657	• ریل گاڑی کے سفر کی تکلیفات	212	• رسولی --- زبان کے نیچے والی ' حیل
			• دار
		638	• رسولی --- کان

387	• سبز (رنگ کا پیشاب)
139	• سبز موتیا
590	• سبز پرکان
526	• سخت (جلد)
654	• سختی
409	• سرخ بار (گھونگھٹ)
524, 648	• سرخ بارہ
583	• سرخ بخار
389	• سرخ (پیشاب)
526	• سردی کا کانا
80	• سرماس (سات غشی یا دیوانگی)
586, 468	• سرطان
331	• سرطان (اعضائے مستقیم)
412	• سرطان (پروٹینٹ کا)
437	• سرطان (پستانوں کا)
418	• سرطان (خضیوں کا)
226	• سرطان (زبان)
422	• سرطان (زنانہ اعضائے تناسل)
400	• سرطان (مردانہ امراض)
98	• سرمیں پانی (رطوبت) کا بھر جانا سر
	میں رطوبت کا اکٹھا ہو جانا
440	• سرمائے پستان (چوچیاں)
625	• سستی
661	• سفید ٹانگ (ٹانگ کی سوزش)
539	• سکری
130	• سکڑاؤ (آنکھ کے پردہ چھکی کا)
408	• سکڑاؤ (عضو تناسل کا)
59	• سمجھ

## ز

226	• زبان
230	• زبان خشک
226	• زبان کا کانا
231	• زبان کا قالج
229	• زبان کی دراڑیں
212	• زبان کے سچے والی خلی دار رسولی
142	• زخم آنکھ میں
581	• زخم ہستر کے
623	• زخم چوٹیں
232	• زخم زبان کی ناموری کیفیت
581	• زخم کاٹنے کے
509	• زخم کے نشان پر دانے دار ابھار
528	• زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار
	ابھار
206	• زخم منہ کا
172	• زکام (نزلہ)
422	• زنانہ (اعضائے تناسل)
424	• زنانہ --- مجامعت
435	• زندہ بچے کی پیدائش
463	• زندہ پیدائش (وضع حمل)
288	• زندہ (جنزہیت میں محسوس ہو)
59	• زہر خورانی (کا خوف)

## س

659	• سارکوما (رسولیاں)
578	• سانس رک جانا

141	• سوزش 'ورم' (آنکھ کے سفید پردے کا ورم)	114	• سن ہو جانا
83	• سوزش (ورم دماغ)	106	• سن ہو جانا (اعصاب)
281	• سوزش 'وریدوں کی'	144, 655	• سوجن
480	• سوزش 'ہڈیوں کی'	633	• سوجن 'استقامتی'
234	• سوزش 'ہوا کی ٹالیوں کی (حلقہ)	617	• سوجن 'خود کی'
236	• سوزش 'ہوا کی ٹالیوں کی (مزمین)	142	• سوجن 'قریب کی'
218	• سوزشی دکن 'منہ کی'	411	• سوجن (گھونگھٹ کی)
627	• سوکھا مسان	210	• سوجن (ہونٹ)
518	• سوکھا مسان 'لافری'	69	• سوچنا
386	• سیاہ (پیشاب)	394	• سوزاک
583, 140	• سیان خون	134	• سوزش (آنکھ کے سیاہ ملتے کی)
437	• سیان خون (پیتانوں سے)	100	• سوزش (اعصابی)
205	• سیان خون (مسوڑھے)	437	• سوزش (پیتانوں کی)
170	• سیان خون 'ناک سے'	638, 661	• سوزش 'ٹانگ کی'
209	• سیان خون (ہونٹ)	628	• سوزش 'ٹانگ کی ایک خاص قسم کی'
234	• سینہ اور گھچھڑے	418	• سوزش 'فصیوں کی'
234	• سینہ 'گھچھڑے اور کھانسی کے امراض'	430	• سوزش 'زخم کی یا بیضہ دان کی'
240	• سینہ میں درد	105	• سوزش 'ریڑھ کی ہڈی کی'
		652	• سوزش 'ریڑھ کے سروں کی'
		230	• سوزش (زبان کی)
		622	• سوزش (سوجن)
		501	• سوزش 'عضلات کی'
		302	• سوزش 'خٹائے مصلیٰ'
		628	• سوزش 'کپٹیوں کی ہڈیوں کی'
		363	• سوزش 'مگردوں کی'
		656	• سوزش 'گھٹنوں کے جوڑوں کی'
		409	• سوزش (گھونگھٹ کی)
		169	• سوزش 'ناک کی' اسفنجی

ش

60	• شرمیلا
59, 472	• شعور
67	• شک و شبہ
535	• شگل (سندھ کے کنارے چھوٹے گول پتھر جیسی دادا)
165	• شور

## ع

- 257 • عارضہ قلب کے ساتھ دمہ  
264 • عارضہ قلب والی کھانسی  
545 • عام بخار  
497 • عرق النساء  
655 • عرق (لہینہ)  
71 • عزت نفس، بھروسہ  
499 • عضلات  
501 • عضلات کی بڑھی ہوئی کھینچ  
• حرکت کرنے پر (مائیوٹونیا)  
120 • عضلات کی سختی  
501 • عضلات کی سوزش  
500 • عضلات کی کمزوری  
501 • عضلات کی لاغری (بڑھی ہوئی)  
478 • عضلات کے امراض  
407 • عضو تناسل  
405 • عضو تناسل کا سر  
409 • عضو تناسل کا گھونٹ  
408 • عضو تناسل کھینچنا  
408 • عضو تناسل - - - باور  
558 • عضلاتی بخار (خون میں زہر)  
35 • علامات یا دواؤں  
565 • علامات میں اضافہ  
572 • علامات میں کمی  
614 • عمومی تکلیفات (عام علامات)  
542 • عمومی تکلیفات (ناشر)

- 268 • شریانوں (خون کی نالیوں) کی  
• پھیلاؤ  
270 • شریانوں کی دیواروں کی سختی  
281 • شریانوں کی سوزش  
274 • شریانوں میں خون کے لوتھڑوں کا  
• بنا

## ص

- 9 • صحت  
648 • صدمات  
649 • صدمات (جراحت کے بعد)  
73 • صرع (مرگی)

## ض

- 58 • ضدی  
108 • ضرورت سے زیادہ حساسیت  
53 • ضعف اعصاب (اعصابی تھکاوٹ)  
• ذہنی تھکاوٹ یا تھکاوٹ  
40 • ضعف عقل (فائر اعقلی)  
609 • ضیق انفسی

## ط

- 556 • طامون  
629 • طریق کار (کی پیشی)  
14, 23 • طلب

## ظ

- 71 • ظریف (پر مزاج)

271

● فشار خون --- بلند

ق

334

● قبض

635

● قبل از جراحت تکالیف

542

● قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا

635

● قبل از وقت بڑھاپا

449

● قبل از وقت (جھپٹ)

595

● قبل از وقت موت

654

● قد

142

● قرنیہ کی سوجن

153

● قرنیہ کے ناسور (یا پھوڑے)

576

● قلت خون

71

● قلعہ کاروں (ایسوں وغیرہ) میں اینٹھن

71

● قوت ارادی

182

● قوت شامہ (دھیمی یا کھو جائے)

217

● قوت گویائی جاتی رہے

318

● قے

455

● قے (دوران حمل صبح کے وقت کی

تکلیف)

ک

226

● کانٹا (زبان)

681

● کانٹا (کامنٹے کے زخم)

264

● کالی کھانسی

166

● کان بہنا

163, 166

● کان کا درد

338

● کان (کی رسولی)

غ

615

● غرور

617

● غرور کی سوجن

310

● غدا کا زہر

59

● غرور

88

● غش کھانا

61, 594

● غش

4

● غصہ

462

● غلا تصور (حمل کا)

50

● غلطیاں

60

● غمگینی

651

● غنودگی

61

● غنودگی، خواب آلودگی (خوابی)

● دورے (غشی)

1

● غیر حاضر دماغی

407

● غیر موجود (مضبوط عمل)

ف

40

● فائز الحقی

389

● فاسٹیٹ (پیشاب میں)

231

● فالج (زبان کا)

192

● فالج (گلے کا)

28

● فرار

455

● فرن سے اوپر والی جگہ

35, 158

● فریب نظر

136

● فریب نظر (رنگوں کا)

613

● فساد نیچ

248, 259	• کھانسی	168	• کان کے پردہ کا سوراخ
266	• کھانسی، اضطرابی، مستورات میں	161	• کانوں کے اور سماعت کے امراض
461	• کھانسی (دوران حمل)	123	• کپکپاہٹ
514, 531, 533	• کھجلی	508	• کٹے پھٹے ہاتھ اور انگلیوں کے
533	• کھروڑی (جلد)		• پردوں میں شکاف
212	• کھٹنا (منہ کا)	392	• کثافت اضافی (پیشاب)
209	• کھینچا (ہونٹوں کا)	185	• کدوپ کھانسی (غیر خنثی)
408	• کھینچا (عضو تناسل کا)	207	• کڑکڑاہٹ (جڑے کی)
538	• کیل (جلد)	9	• کڑھنا
504	• کیل مہاسے	121	• کڑاڑ (جھنجھ)
308	• کیٹمر (معدہ)	152	• گھرے
		315	• کیلیج کی جلیں
		317	• کم تھراپیت (ہائیڈروکلورک ایسڈ کی)
484	• گھٹیا		• کمر توڑ بخار، ڈیکو
194	• گھٹیاوی --- ورم، حلق	548	• کمزوری (آنکھ کے عضلات میں)
206	• گر جانا (سوزھوں کا)	130	• کم مقدار (جینس)
547	• گردن توڑ بخار	454	• کم مقدار (پیشاب)
101	• گردن توڑ بخار (دماغ کی مہلیوں کا ورم)	389	• کی (عضلات میں)
366	• گردوں کی پھری	572	• کن جڑے
363	• گردوں کی سوزش	555	• کچھ سی --- بھل
369	• گردوں میں رکاوٹ کے باعث	49	• کوئٹہ قاسمی
	• پیشاب کا اجتماع	651	• کوریا (اعصابی مرض جس میں
362	• گردے، مثانہ اور پیشاب	75	• عضلات بے اختیارانہ پھڑکتے ہیں)
369	• گردے --- ورم	77	• کوما (بے ہوشی)
620	• گری، حدت	385	• کھار (پیشاب میں)
222	• گرنا (دامنوں کا)	28	• کھانا
184	• گھا (حلق)	512	• کھال کا اترنا

501	● لاغری، عضلات کی (بڑھی ہوئی)	208	● گنا، سونا
547	● لاکڑا کا کڑا	474	● گنا، سونا (ارجم)
302	● لبلہ	478, 629	● گنا، سونا، ہڈیوں کا
425	● لذت جلاع (اعضائے تکامل میں)	618	● گلز
	● مسرت کا احساس	394	● گیت
123	● لڑھ (کچکپاہٹ)	192	● گلے کا فالج
425	● لطف — غیر موجود	195	● گلے کی دکن
561	● لو گنا	169	● گلے کے امراض
432	● لیگوریا	508	● گوشت خور میوڑے (دھیل)
530	● لیور سپاٹس	474	● گوشت کا لو تھڑا (ارجم)
		539	● گنجاپن
		468	● گومز
414	● مادۂ منویہ کا اثران	476	● گومز (ارجم)
42, 49	● مالتو لیا	151	● گودا نہیں
640	● مانتات سے جانا	50	● گمبراہٹ
105	● مائی لی ٹیز (دریڑھ کی ہڈی کا ورم یا سوزش)	358	● مکھن (مکھی) (امعائے مستقیم)
501	● مائیوٹونیا (حرکت کرنے پر عضلات کی بڑھی ہوئی گھٹن)	656	● مکھنوں کے جوڑوں کی سوزش
181	● متعفن	625	● مکھن کا مڑ (ٹھک) جانا
349	● متعفن پانخانے (بدبودار پانخانے)	409	● مکھن گھٹ (عضو تکامل کا)
565	● متفرقات	410	● مکھن گھٹ کی غارش
318	● محلی	410	● مکھن گھٹ کے پردہ کی جھلی
378	● متواتر (پیشاب آنا)		
638	● مٹانہ (کی رسولی)	41	● لاپرواہی
368	● مٹانہ — ورم	596	● لاغری
424	● مجامعت (زنا)	436	● لاغری (پستانوں کا گھٹ جانا)
400	● مجامعت (مزدانہ)	518	● لاغری (جلد)
		417	● لاغری (ضمیموں کی)



628	• ملک لیگ (ٹانگ کی ایک خاص قسم کی سوزش)	424	• مجامعت کے دوران و بعد کے امراض
551	• ملیخا	35	• مجرم ضمیر
210	• منہ	71	• مجروح عزت نفس
50	• منہ چڑانا	47	• محبت میں گرفتار ہونا
212	• منہ کا کھانا	46	• محبت میں مایوسی
210	• منہ کی خشکی	36	• مراقبہ
214	• منہ کی دکھن	399	• مردانہ امراض
218	• منہ کی دکھن (سوزشی)	400	• مردانہ --- مجامعت
206	• منہ کی دکھن و زخم	84, 73	• مرگی
220	• منہ --- ماسوری کیفیت	358	• مردوز (پاخانہ کرتے وقت زور لگانا)
14	• موت	296	• مزمن نچیش
595	• موت، عمل از وقت	138	• سلامت اشکی کی خرابی (بندش)
14	• موت کا خوف	266	• مستورات میں اضطرابی کمائی
461	• موت (کا خوف دوران حمل)	206	• مسوزموں کا گر جانا
15	• موت کی خواہش	204	• مسوزموں 'منہ' دانتوں اور زبان کے امراض
134	• موچیا بند		• مسوزمے
633	• موٹاپا	204	• سے
535	• موٹی (جلد)	660	• مشترک امراض (امضائے قاسم)
653	• موج	394	• معدہ
443	• مؤخر اور / یا پچھ درود (جیض)	305	• معدہ کا کینسر
629	• موسیقی	308	• معدہ کا ماسور
422	• موقوفی جیض	315	• معدہ --- ماسوری کیفیت
604	• مہاسے (پہرے پرکیل مہاسے)	318	• مغالطے یا دوسرے
168	• میل	16	• مقعد (دوران حمل)
		460	• مکڑی کا جلا
		510	• ملخوف رسولی
132	• ن	613	

240	● نزل (درم نزعہ والا)	542	● ناسن
194	● نزلادی... درم طلق	542	● ناسن... عمومی تکلیفات
27	● نشوونما	543	● ناسنوں کا لگنا
362	● نظام بول کے امراض	303	● ناسور (بیٹ)
288	● نظام ہضم کے امراض	535	● ناسور... جلد
35	● نفرت	222	● ناسور دانتوں کا
460	● نفرت بخاری (دوران حمل)	476	● ناسور (درم کے)
196	● نگہا	408	● ناسور (عضو قاسل کے)
243	● نمونہ	153	● ناسور قریب کے
146	● نورتری	315	● ناسور معدہ کے
460	● نیچے کو دباؤ (خروج)	209	● ناسور ہونٹوں کا
470	● نیچے کی جانب دباؤ (درم)	207	● ناسوری کیفیت (چھوڑے وغیرہ)
292	● نیچے کی جانب کھینچاؤ (بیٹ)	232	● ناسوری کیفیت (زخم وغیرہ) زبان
61	● نیند	318	● ناسورنی کیفیت (معدہ)
		301	● نایف
		169	● ناک
659	● دناسن	184	● ناک پر دھبے
484	● وجع القاسل	170	● ناک سے سیلان خون
589	● وجوہات (تکلیفات کی)	169	● ناک کی استغنی سوزش
192	● درم طلق	180,639	● ناک کی رسولی
194	● درم طلق (احصائی)	181	● ناک کی نلی کا پھوڑا
194	● درم طلق (گنشیادی)	169	● ناک، گلے، طلق اور حنجرہ کے
193	● درم طلق (مزمن)		امراض
194	● درم طلق (نزلادی)	406	● ناسودی
201	● درم حنجرہ	285	● نبض
414	● درم خصبہ	201	● نزعہ
89	● درم دماغ	238	● نزعہ کا نمونہ
101	● درم دماغ کی مصلیوں کا	172	● نزل



[illegible]